

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

12
2024



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Ідентифікатор медіа
R30-01983

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 12, 2024

Головний редактор
Віштак І. А.

Editor-in-chief
I. Vishtak

Редакційна колегія
Мельник С. І.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board
S. Melnyk
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavliuk
(executive secretary)



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Шутенко Т. О.
Тиха Н. В.
Гринів С. М.
Линчак Н. Б.
Сиплива Н. О.
Стариченко Є. М.
Хоменко Т. М.

T. Shutenko
N. Tykha
S. Gryniv
N. Lynchak
N. Syplyva
Y. Starychenko
T. Khomenko

12 2024

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2024

УДК 347.77:633(055)

0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2024. Вип. 12. 510 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Офіційні відомості	6
Нормативно-правові документи	6
Відомості, внесені до Реєстру заявок	7
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд	7
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	11
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок	12
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин	13
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин	14
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	17
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	17
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати	27
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин	33
Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	36
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	37
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	37
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати	46
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати	51
Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту	53
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	56
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні	57
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	57
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності	68
Сільськогосподарські:	
злаки	68
<i>Кукурудза восковидна</i>	69
ПО200ВХ	69
ПО200ВХ	70
<i>Кукурудза звичайна</i>	71
АЛЕНАРО	71
БЕРКАНО	72
БРВ2445Б	74
БРВ2770Б	75
БРВ2814Б	76
БУКАЛО	77
ВЕРТУАЛ	79
ГРІНФІЛД	81
Дамір	82
ДКС3719	83
ДКС3924	84
ДКС4031	85
ДКС4231	86
ДКС4238	87
ДКС4533	88
ДКС4539	90
ДКС4655	92
ДКС4741	94
ДКС4933	96
ДОССІАН	97
ЕВ3732	99
ЕВ4150	101
ЕВ4931	103
ЕИ3669	105
ЕСТЕВІО	107
ЕХ2974	108
ЕХ3833	110
ІНДЕМ1316	112
ІНДЕМ1628	113
ЛГ30002	114
ЛГ31215	116
ЛГ31252	117
ЛГ31350	118
ЛГ31365	120
ЛГ31380	122
ЛЗМ272/10	124
МЕДІТА	126
МОГАБРІКС	128
ПО2085	130
П72847	131
П7655	132
П8115	133
П8256	134
П82703	135
П82848	136
П83224	137
П86010	138
П8660	139
П8738	140
П88844	141
П88844	143
П9002	144
П92440	145
П9279	146
П9759	147
РЖТ ПРЕТЕККСТ	148
РЖТ СЕДЕККС	150
РЖТ СУФІККС	151
РОМАНС	153
СИ АРТОС	155
СИ КОСМОС	157
СИ ОЛІВІЯ	158
СИ ФАНТАЗІЯ	160
Солід	162
Старді	164
ХА Квінта	166
<i>Кукурудза звичайна – батьківський компонент</i>	168
1ПАБЦ82	168
1ПВДГ15	169
1ПВДЕ32	170
1ПЙКУ24	171
1ПМРФ97	172
1ППГК72	173
1ППФС42	174
1ПФПТ76	175
А03473	176
А45673ХІВ3	177

A46013	178	P16033	238	КРЕЙЗІ КЛ	286
АГБЦ173	179	P16077	239	ЛЕПОРЕЛЛО	287
БС001А	180	P19009	240	Соняшник однорічний	288
БС002	181	P20021	241	1043Л КЛП	288
В 138	182	PВІ323	242	Амарок	289
В 510 зс	183	PВІ441	243	АПС85	291
В 510 с	184	РЕЕ80ФФ	244	АПС94	293
В 66	185	РИЦ74ВІ	245	АПСФ77	295
В 831 СВ	186	САД35ЛІ	246	Аркана	297
В00273	187	САД36ЛІ	247	Аркона	299
В09873	188	САД36ЛІ САД35ЛІ	248	АРКОС	301
В12093	189	СМС6466 ЛОН3752	249	Бамбус	303
В14823	190	Т08343	250	БАРСЕЛЛОНА	305
В27993	191	Т49053	251	ВАЛЬКІРІЯ	307
В30083	192	Ф15873	252	Варді	309
В53993	193	ФСІД3075	253	ВІВАЛЛЬТО КЛП	311
В63863	194	ХА 1821 МВ	254	ГЕНДАЛЬФ КЛП	313
В67263ХЛБЗ	195	Харківська 341 ЗМ	255	Дайна	314
В79203ХЛБЗ	196	ЦАФ3362С	256	ЄС Аркада	316
В93653ХЛБЗ	197	ЮААБ3713С	257	ЄС Бравус	318
ВК 1001	198	ЮАІД2036	258	ЄС Діксон	320
ВК 2001	199	ЮАІД2042	259	ЖЕРОНІМО СУ	322
ВК 4001	200			Захисник	324
ВЛ3483	201	Сільськогосподарські:		ІНСАН 266 КЛП	325
ГВІКС1660С	202	бобові	260	Інсан 277 СУ	326
ГЕІКС1764	203	Нут звичайний	261	Корунд	327
ГЕНА0903	204	Вента	261	ЛГ50449 СХ	329
ДБ1	205	Соя культурна	262	ЛГ50489 СХ	330
ДЖ08963	206	Волонтерка	262	ЛЕРОС КЛП	331
ДЖ09303	207	ЕХТС 402	263	Магнус	333
ДЖ24313	208	ЕХТС 411	264	МАС 852СУ	335
ДЖ24903ХЛБЗ	209	ЕХТС 416	265	МАС 900СУ	337
ДЖ25263	210	ЕХТХ 103	266	Н4Х202 Е	339
ДЖ28753	211	ЕХТХ 114	267	Немея	341
ДЖ39723ХЛБЗ	212	ЛІД Едукатор	268	НЕРІДА АР	343
ДЖ72143	213	ЛІД Конструктор	269	Сабінус	345
ДЖ85233	214	ЛІД Промотор	270	САЛАМАНКА	347
ДЖ96563	215	Памела	271	Саяд	349
ІАКС3300С	216	САЦ224914	272	СУВОРА	351
ІВВ666	217	САЦ224920	273	СУНАРІС	353
КЮВІ492 КЮВІ447	218	Світлиця	274	ХАЙСАН182ІТ	355
КЮКЮА28ВІ	219	СЕЙЛОР	275	Соняшник однорічний –	
КЮЛД47ФФ	220	СТАЙН 04Н32	276	батьківський	
ЛНР3494 ЛОН3752	221	СУЗА	277	компонент	357
ЛРР6404	222			211СУ	357
М77673	223	Сільськогосподарські:		422RIMI	358
М79613	224	круп'яні	278	АР 008 А	359
М79613ХІВЗ	225	Сорго звичайне		АР 008 Б	360
М84583ХІВЗ	226	(двокольорове)	279	АТ2721	361
М85823ХАІЗ	227	МАРГО	279	АТ3717	362
ПДД38ФФ	228	Н2Г234	280	Б96	363
ПРЦ16ВІ ІІВ483	229	Н2Ф282 БМР	281	БА2850	364
ПРЦ23ВІ РЕЕД28ВІ	230	СІНАЙ	282	БС8501	365
ПС 50 Сст	231			ВА2160	366
ПС 52 СВ	232	Сільськогосподарські:		ВХ 2101 В	367
ПС 53 СВ	233	олійні та прядивні	283	ВХ 2603 А	368
ПХ2Т03	234	Коноплі посівні	284	ЕХ701 х МХ702	369
ПХ4ЦТД	235	ЄС Джин	284	ЕХ820	370
Р12010СМС	236	Ріпак (ярий)	285	ЕХ908	371
Р15078ЦМС	237	Калімера КЛ	285	ЕХ993	372

ЄС 121	373	ФР842ЛС23	414	Огірок посівний	442
ЄС 421	374	ФС74221	415	ДВА ВЕСЕЛИХ КУМА	442
ЄС 522	375	Х 66 Б	416	Перець однорічний	
ЄС-122	376	ЮР408ЛН00	417	(солодкий)	443
ЄС-211	377	ЮР603ЛС01	418	Кольт	443
ЄС-212	378			Ліра Спарк	444
ЄС-311	379	Сільськогосподарські:		Оранж Босс	445
ЄС-312	380	буряк	419	Ред Булл Спарк	446
ЄС-422	381	Буряк цукровий	420	Стріт	447
ЄС-521	382	БТС 8835	420	Помідор їстівний	448
Л71234МІОА	383	БТС СМАРТ 1215 Н	421	Блейз	448
ЛЦ166АІР	384	БТС СМАРТ 3525	422	Джордано	450
МГ8372	385	СМАРТ АМАЛЪТЕЯ КВС	423	Ельза	452
НЕ9706	386			Еллоу Пешен	454
НМ4600	387	Сільськогосподарські:		ІС 1510	456
НС4754	388	кормові	424	Оранж Плам	458
НУ6433	389	Сорго суданське	425	Ремербе	460
П991Р	390	Скарб Степу	425	Солідо Спарк	462
Р13СЛ1МІО	391	Сорго цукрове	426		
Р14В34МЖІ	392	Ботанічний	426	Плодові та ягідні	464
Р8035М2ЖК	393			Абрикос звичайний	465
РД8413	394	Сільськогосподарські:		Бержерон 1	465
РТ7721	395	овочеві	427	Перла 1	466
РТ7821	396	Баклажан	428	Ліщина звичайна	467
РФ1711СУ	397	Ден	428	Мортарелла	467
РХ529	398	Джаз	429	Тонда ді Джіффоні	468
РХ598	399	Мірінда	430	Суниця садова	469
РХ738СУЛ	400	Ріко	431	ФЛ 16 78 109	469
РХ766СУЛ	401	Васильки справжні	432		
РХ788	402	Віолет Кінг	432	Декоративні	
РХ790СУЛ	403	Грін Дом	433	та лікарські	470
РХА470	404	Кабачок	434	Первоцвіт	471
СБ5100	405	Золотий Дракон	434	Вишиванка	471
СВ 4 В	406	ТІГРЕТТО ді ІТАЛІЯ	436	Сутінки	473
СФ1561М2ІА	407	Капуста білоголова	438	Півонія	475
ТРС5570Р	408	Вірджинія	438	Квітка Ксенія	475
Ф18БДЗМСА	409	Кріп пахучий	439	Хризантема	476
ФА718ЛС05	410	Брум	439	Мальвіна	476
ФА730ЛС05	411	Кукурудза цукрова	440	Циганочка	478
ФР410Л300	412	ДРАЙВЕР Р	440		
ФР84229	413	РОЗІ	441		
Описи сортів рослин та показники господарської придатності					480
Горох посівний (зерновий)	481	ГУ2063	491	ДЕСПІНА	499
Іконік	481	ГУ3378	492	КВС МЕРІНОС	500
Картопля	483	ГУ8361	493	Соя культурна	501
Мікадо	483	Сурінго	494	Алгебра	501
Пондус	484	Таррако	495	Арієтта	502
Ред Буллет	485	Пшениця м'яка (озима)	496	Ячмінь звичайний (ярий)	503
Кукурудза звичайна	486	БГ Уніголд	496	СБ Скорє	503
Альпедро	486	Пшениця м'яка (озима)		Стінг	504
Апріоло	487	(батьківський компонент)	497		
ГУ0739	488	ТА21БВ026	497		
ГУ1083	489	ТБ21БВ326	498		
ГУ2042	490	Ріпак (озимий)	499		
Інші відомості					505
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту,					
володілців патенту					505
Загальноновживані скорочення термінів					508

Офіційні відомості

Official notifications

Нормативно-правові документи

Regulatory documents

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 4338 від 16.12.2024 «Про затвердження Методики визначення відповідності сортів капусти кільоподібної, гірчиці кільоподібної (*Brassica carinata* A. Braun) критеріям відмінності, однорідності та стабільності» затверджено Методику визначення відповідності сортів капусти кільоподібної, гірчиці кільопо-

дібної (*Brassica carinata* A. Braun) критеріям відмінності, однорідності та стабільності (див. за покликанням <https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/09.2024/viznachennya-vidpovidnosti-sortiv-kapusti-kilopodibnoi-girchitsi-kilopodibnoi-171024-na-mk.pdf> та <https://sops.gov.ua/uploads/page/6762d147ea244.pdf>)

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд
Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Кукурудза звичайна Zea mays L. Maize, Corn					
24009070	31.10.2024	ІНВІТЕЙШН INVITATION	793	ПС, АС PBR, AC	Daniel Comin
24009077	01.11.2024	Альпедро Alpedro	2011	РС, АС NLI, AC	Robert Taucher
24009078	01.11.2024	Таррако Tarraco	2011	РС, АС NLI, AC	Robert Taucher
24009079	01.11.2024	Апріоло Apriolo	2011	РС, АС NLI, AC	Robert Taucher
24009080	01.11.2024	Сурінго Suringo	2011	РС, АС NLI, AC	Robert Taucher
24009082	22.11.2024	ЛІД3620Ц LID3620C	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24009083	22.11.2024	ЕС БОНД ES BOND	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24009084	22.11.2024	ЕС ДЖОКЕР ES JOKER	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24009085	22.11.2024	ЛІД2888Ц LID2888C	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24009086	22.11.2024	КС КІССМІ CS KISSMI	2890	ПС, АС PBR, AC	Laurent BETTINGER
24009087	22.11.2024	ОВЕРСТОУН OVERSTONE	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24009088	22.11.2024	МОТІВІ КС MOTIVI CS	2890	РС NLI	Laurent BETTINGER
24009098	25.11.2024	ЛІД3750Ц LID3750C	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24009090	26.11.2024	КХС5261 KXC5261	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009091	26.11.2024	КХС5231 KXC5231	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009094	26.11.2024	РОЛЛІНГСТОУН ROLLINGSTONE	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24009097	26.11.2024	ЛАУТАРІО LAUTARIO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009099	26.11.2024	КХС5262 KXC5262	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009100	26.11.2024	КХС5232 KXC5232	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009101	26.11.2024	КВС ЛЕМОНДО KWS LEMONDO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009102	26.11.2024	КХС5234 KKhS5234	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009103	26.11.2024	КХС4318 KKhS4318	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009106	02.12.2024	PX24034 RH24034	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Chatre
24009108	02.12.2024	PX24040 RH24040	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Chatre
24009113	10.12.2024	СБ1773 SB1773	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
24009116	10.12.2024	СЦ3213 SC3213	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
24009117	10.12.2024	ЛІД1145Ц LID1145C	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24009118	10.12.2024	СБ1683 SB1683	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
24009120	11.12.2024	ЛІД3999Ц LID3999C	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
24009121	11.12.2024	ЛІД2155Ц LID2155C	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24009122	11.12.2024	ЛІД5410Ц LID5410C	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24009123	11.12.2024	ЛІД1244Ц LID1244C	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24009124	13.12.2024	СБ1483 SB1483	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)					
24011003	29.11.2024	Булан Носівський Bulan Nosivskyi	1990	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Буняк Наталія Миколаївна Бочковська Ольга Андріївна Буняк Олександр Іванович
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
24039040	29.10.2024	Вільний Vilnyi	1702	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Щудря Лариса Іванівна Середа Валентина Олексіївна Безсусідній Олександр Васильович Одинець Сергій Іванович Шугурова Наталія Олексіївна Кутіщева Наталія Миколаївна
24039047	13.11.2024	Бруно Bruno	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
24039048	13.11.2024	Оріон Orion	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
24039049	13.11.2024	Бріоні Brióni	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
24039051	13.11.2024	Фест Fest	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
24039055	22.11.2024	ІНСАН 355 СУ INSUN 355 SU	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jean Pierre Dufourcq
24039056	22.11.2024	ІНСАН 322 КЛП INSUN 322 CLP	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jean Pierre Dufourcq
24039057	22.11.2024	ХЕРІТАЖ КЛП HERITAGE CLP	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jean Pierre Dufourcq
24039058	22.11.2024	ЛІД1062Х КЛП LID1062H CLP	2890	ПС, РС PBR, NLI	Jean Pierre Dufourcq
24039062	02.12.2024	РА8126042 RA8126042	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Chatre
24039064	12.12.2024	НХ52236 NX52236	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
24039065	12.12.2024	СИ КАПРІСІО АР SY CAPRICIO AR	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
24039066	12.12.2024	СИ ФАБІАН АР SY FABIAN AR	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
24039067	12.12.2024	НХ52248 NX52248	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
24039068	12.12.2024	НХ52244 NX52244	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
24039069	12.12.2024	НХ52135 NX52135	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
24045035	22.11.2024	Австралія Australia	1564	ПС, АС PBR, AC	Bernhard Mayr
24045036	22.11.2024	Алгебра Algebra	1564	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bernhard Mayr
24045037	22.11.2024	Арієтта Arietta	1564	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bernhard Mayr
24045038	22.11.2024	Австралія Australia	1498	РС, АС NLI, AC	Bernhard Mayr
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
24088009	18.11.2024	КЕЛЛІ KELLY	2584	РС NLI	ERIC BONNEL
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
24096012	19.11.2024	ВІНЧІ VINCI	2643	РС, АС NLI, AC	Twan Groot
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika					
24113018	18.12.2024	Рікардо Ricardo	753	РС, АС NLI, AC	Marta Graziani

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
24115042	02.12.2024	ПОРЦЕЛЯН PORCELAIN	2643	PC, AC NLI, AC	Luis Ortega
24115043	03.12.2024	Васмія Wasmiya	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Maarten Verlaan
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish					
24118006	12.11.2024	Донато Donato	2086	PC NLI	
24118007	19.11.2024	БАЛТАЗАР BALTAZAR	2643	PC, AC NLI, AC	Joske van den Burg
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach					
24130003	27.11.2024	Лізард Lizard	1730	PC, AC NLI, AC	Petrus Egelmeers
24130004	03.12.2024	Анатасе Anatase	3384	PC, AC NLI, AC	Johan Rijk
Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli					
24136003	19.11.2024	САМБУКО SAMBUCO	2643	PC, AC NLI, AC	Martina Gunnemann
Мангольд (буряк листковий) <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>cicla</i> L. (Ulrich) Leaf Beet, Swiss Chard					
24137001	27.11.2024	Родстер Roadster	3384	PC, AC NLI, AC	Joan de Visser
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
24147006	18.12.2024	МАРАДОНА MARADONA	2020	ПС, РС PBR, NLI	
Малина <i>Rubus idaeus</i> L. Raspberry					
24296003	22.11.2024	АМАЛІЯ РОССА AMALIA ROSSA	2816	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Diego IORIATTI
Шипшина <i>Rosa</i> L. Rose					
24298001	23.10.2024	Рубіновий Дар Rubinovyi Dar	3247 3215	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Змічук Сергій Володимирович
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine					
24304001	20.11.2024	Грюнер Вальтлінер Gruner Veltliner	3383	П М	
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn					
24645001	30.10.2024	MAC 440BKC MAS 440WX	2720	PC NLI	Benoit PETIARD
Вишня звичайна (підщеп) <i>Prunus cerasus</i> L. Maraschino cherry; morello cherry; tart cherry					
23682002	03.10.2023	Кас Cass	3373	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Amy IEZZONY
23682003	03.10.2023	Кроуфорд Crawford	3373	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Amy IEZZONY
23682004	03.10.2023	Клінтон Clinton	3373	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Amy IEZZONI
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
24909093	26.11.2024	KB 9EY0162 KW 9EY0162	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Daniel Kleiber
24909094	26.11.2024	KB 7EЦ2243 KW 7EC2243	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael Dilger
24909095	26.11.2024	KB 4FP2166 KW 4FP2166	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Nicolas Couteau
24909097	26.11.2024	KB 9FD0055 KW 9FD0055	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Carsten Grohn
24909098	26.11.2024	KB 6FD0077 KW 6FD0077	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Carsten Grohn
24909099	26.11.2024	KB 9EY0150 KW 9EY0150	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Daniel Kleiber
24909100	26.11.2024	KB 7EЦ2244 KW 7EC2244	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael Dilger
24909101	26.11.2024	KB 5ГГ5342 KW 5GG5342	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sen Han
24909102	26.11.2024	KB 6FЮ2322 KW 6FQ2322	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Antoine Vincent

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
24909103	26.11.2024	KB 9FD0070 KW 9FD0070	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Carsten Grohn
24909104	26.11.2024	KB 4EP2147 KW 4ER2147	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	George Musat
24909105	26.11.2024	KB 9EY0165 KW 9EY0165	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Daniel Kleiber
24909109	02.12.2024	P22017 R22017	1783	ПС, АС PBR, AC	Sebastien Chatre
24909110	02.12.2024	P22024 R22024	1783	ПС, АС PBR, AC	Sebastien Chatre
24909111	02.12.2024	P23014 R23014	1783	ПС, АС PBR, AC	Sebastien Chatre
24909112	02.12.2024	P21023 R21023	1783	ПС, АС NLI, AC	Sebastien Chatre
24909113	02.12.2024	P21036 R21036	1783	ПС, АС PBR, AC	Sebastien Chatre
24909114	02.12.2024	P17106 R17106	1783	ПС, АС PBR, AC	Stephane Melkior
24909115	02.12.2024	P24014 R24014	1783	ПС, АС PBR, AC	Sebastien Chatre
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component					
24915004	24.06.2024	IP Крафт В IR Kraft V	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Циганко Віктор Анатолійович Глухова Наталія Анатоліївна Дем'яненко Світлана Борисівна Дриль Валентина Петрівна Єгоров Дмитро Константинович
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
24939038	08.11.2024	7ПУРЙ07Р 7PURJ07R	1688	ПС PBR	
24939050	02.12.2024	AT2120 AT2120	1783	ПС, АС PBR, AC	Sebastien Chatre
24939051	02.12.2024	PT8522 RT8522	1783	ПС, АС PBR, AC	Sebastien Chatre
24939052	02.12.2024	PT8822 RT8822	1783	ПС, АС PBR, AC	Sebastien Chatre
24939053	04.12.2024	MA022340 x X02020B340 MA022340 kh Kh02020B340	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Olivier Cottet
24939054	04.12.2024	X02020A340 H02020A340	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Olivier Cottet
24939055	04.12.2024	MR089223 MR089223	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Olivier Cottet
24939056	13.12.2024	FP842XC27 FR842HC27	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
24939059	13.12.2024	FA777LN01 FA777LN01	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
24939060	13.12.2024	FA407X309 FA407HZ09	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
24939061	13.12.2024	FA308L300 FA308LZ00	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
24939062	13.12.2024	FP842X324 FR842HZ24	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
24939066	13.12.2024	YU421LN00 UR421LN00	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
Соняшник однорічний Sunflower					
22039063	26.12.2022	СИ МОПІСОН SY MORISON	а: 2643 б:	РС, АС NLI, АС	19.12.2024
23039048	20.11.2023	7042D093 11 7042D093 11	а: 2715 б:	РС NLI	06.12.2024

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок
Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про погодження внесення змін» від 24.12.2024 № 21-1331-09/32109, змінено адресу міс-

цезнаходження заявника «вул. Велика Васильківська, 139, м. Київ, 03150» щодо сортів рослин згідно з переліком.

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
1	Ріпак (ярий)	Інвігор 305 ПС	24041001	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс	РЗ
2	Ріпак (озимий)	2ЕВ0296	23040003	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс	РЗ
3	Ріпак (озимий)	2ЕВ0299	23040008	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс	РЗ
4	Ріпак (озимий)	2ЕВ0304	23040007	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс	РЗ
5	Ріпак (озимий)	2ЕВ0305	23040002	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс	РЗ
6	Ріпак (озимий)	2ЕВ0292	24040016	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс	РЗ
7	Ріпак (озимий)	2ЕВ0294	24040017	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс	РЗ
8	Ріпак (озимий)	Інвігор 2050	24040019	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс	РЗ

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 4387 від 24.12.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок» унесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок, стосовно сортів соняшника однорічного – батьківський компонент: ВН23Е146А (заявка № 23939055, дата подання 13 грудня 2023 року), ВН23Е65А (заявка № 23939056, дата подання 13 грудня 2023 року), ВН23Е150Р (заявка № 23939057, дата подання 13 грудня 2023 року), ВН23Е62А (заявка № 23939058, дата подання 13 грудня 2023 року), ВН23Е61А (заявка № 23939059, дата подання 13 грудня 2023 року), ВН23Е148Р (заявка № 23939066, дата подання 20 грудня 2023 року),

ВН23Е127Р (заявка № 24939013, дата подання 16 січня 2024 року), ВН23Е69А (заявка № 24939014, дата подання 16 січня 2024 року) щодо складу заявників, доповнивши словами, літерами та цифрами «Товариство з обмеженою відповідальністю «ВНІС ГЕНЕТИКС» (вул. Васильківська, 32, м. Київ, 03022)».

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про погодження внесення змін» від 27.12.2024 № 21-1331-09/32539, змінено адресу місцезнаходження заявника «вул. Велика Васильківська, 139, м. Київ, 03150» щодо сортів рослин згідно з переліком.

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
1	Пшениця м'яка (озима)	БХВ24УВ0030	24012014	БАСФ СЕ	РЗ
2	Пшениця м'яка (озима)	БХВ24УВ0031	24012016	БАСФ СЕ	РЗ
3	Пшениця м'яка (озима)	БХВ24УВ0032	24012017	БАСФ СЕ	РЗ
4	Пшениця м'яка (озима)	БХВ24УВ0033	24012015	БАСФ СЕ	РЗ
5	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТР24УВ657	24900002	БАСФ СЕ	РЗ
6	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТР24УВ658	24900001	БАСФ СЕ	РЗ
7	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТА21ВВ026	24900006	БАСФ СЕ	РЗ
8	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТБ21ВВ326	24900005	БАСФ СЕ	РЗ
9	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТА23УВ041	23900008	БАСФ СЕ	РЗ
10	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТА23УВ042	23900002	БАСФ СЕ	РЗ
11	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТА23УВ043	23900005	БАСФ СЕ	РЗ
12	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТА23УВ044	23900003	БАСФ СЕ	РЗ
13	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТБ23УВ341	23900010	БАСФ СЕ	РЗ
14	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТБ23УВ342	23900006	БАСФ СЕ	РЗ
15	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТБ23УВ343	23900001	БАСФ СЕ	РЗ
16	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТБ23УВ344	23900004	БАСФ СЕ	РЗ
17	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТР23УВ646	23900009	БАСФ СЕ	РЗ
18	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТР23УВ647	23900007	БАСФ СЕ	РЗ

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 4453 від 31.12.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі зая-

вок» унесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок, щодо найменування заявника стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту	Дата подання	Найменування заявника	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Диня звичайна	18147003	КУРЕЛЛА	22.11.2019	Монсанта Веджітбл ІП Менеджмент Б. В. (Monsanto Vegetable IP Management B. V.)	Байер Холланд Б.В. (Bayer Holland B.V.)
2	Капуста білоголова	21096010	ОМАЛОС	01.12.2021		
3	Помідор їстівний	23115027	СВТМ9018	05.12.2023		
4	Помідор їстівний	23115028	БРІВІО	05.12.2023		
5	Помідор їстівний	23115030	МУЛЬТИФЛОРА	05.12.2023		
6	Цибуля городня	21106004	ЛОВІТО	30.11.2021	Монсанта Холланд Б.В. (Monsanto Holland B.V.)	
7	Цибуля городня	23106003	ХАРЛАН	05.12.2023		
8	Перець однорічний (солодкий)	21113009	КАМЕЛЕОН	01.12.2021		

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn				
22009106	844	16.12.2024	ЕХ4744	ДКС4741 DKC4741
22009145	793	04.12.2024	ЛГ31358	БЕРКАНО BERCANO
23009018	2788	04.12.2024	СТАЙН 95-23745	СТАЙН 9510 STINE 9510
23009019	2788	04.12.2024	СТАЙН 94-23535	СТАЙН 9430 STINE 9430
23009020	2788	04.12.2024	СТАЙН 94-23875	СТАЙН 9310 STINE 9310
23009127	2649	04.12.2024	КВС ЛАТО	ЛАТО LATO
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower				
22039061	2643	04.12.2024	СИ НЕРІДА АР	НЕРІДА АР NERIDA AR
23039006	2890	04.12.2024	ЛДХ92838	ЛІД6038Х КЛП LID6038H CLP
23039007	2890	04.12.2024	ЛДХ22013	ІНСАН 366 КЛП INSUN 366 CLP
23039023	2890	04.12.2024	ЦСФ21084	ЛІД1034Л СУ LID1034L SU
23039062	2890	04.12.2024	ЛДХ22125	ЛІД1068Л СУ LID1068L SU
23039064	2890	16.12.2024	ЛДХ22011	ЛІД1061Л КЛП LID1061L CLP
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn				
24645001	2720	16.12.2024	МАС 440ВАКСІ	МАС 440ВКС MAS 440WX

Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
24009077	2011	19.12.2024	Альпедро
24009078	2011	19.12.2024	Алредро
24009079	2011	19.12.2024	Таррако
24009080	2011	19.12.2024	Апріоло
24009082	2890	09.12.2024	Сурінго
24009083	2890	09.12.2024	Suringo
24009084	2890	10.12.2024	ЛІД3620Ц
24009085	2890	09.12.2024	LID3620C
24009086	2890	27.12.2024	ЕС БОНД
24009087	2890	27.12.2024	ES BOND
24009088	2890	27.12.2024	ЕС ДЖОКЕР
24009089	2890	09.12.2024	ES JOKER
24009094	2890	11.12.2024	ЛІД2888Ц
24009097	2649	16.12.2024	LID2888C
24009098	2890	11.12.2024	КС КІССМІ
24009117	2890	24.12.2024	CS KISSMI
24009120	2890	26.12.2024	ОВЕРСТОУН
24009121	2890	26.12.2024	OVERSTONE
24009122	2890	26.12.2024	МОТІВІ КС
24009123	2890	26.12.2024	MOTIVI CS
			ЕС СКАЙТАВЕР
			ES SKYTOWER
			РОЛЛІНГСТОУН
			ROLLINGSTONE
			ЛАУТАРІО
			LAUTARIO
			ЛІД3750Ц
			LID3750C
			ЛІД1145Ц
			LID1145C
			ЛІД3999Ц
			LID3999C
			ЛІД2155Ц
			LID2155C
			ЛІД5410Ц
			LID5410C
			ЛІД1244Ц
			LID1244C
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)			
24011003	1990	30.12.2024	Булан Носівський
			Bulan Nosivskyi
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)			
24020005	3376	20.12.2024	Масімо
			Masimo
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea			
23028002	1669	23.12.2024	Вента
			Venta
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
24039045	1688	30.12.2024	Мендоза
24039055	2890	09.12.2024	Mendoza
24039056	2890	09.12.2024	ІНСАН 355 СУ
24039057	2890	09.12.2024	INSUN 355 SU
24039058	2890	09.12.2024	ІНСАН 322 КЛП
			INSUN 322 CLP
			ХЕРІТАЖ КЛП
			HERITAGE CLP
			ЛІД1062Х КЛП
			LID1062H CLP
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean			
24045033	2430	20.12.2024	Ейваз
			Eivaz

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
24045034	2430	16.12.2024	Соулу Soulu
24045035	1564	30.12.2024	Австралія Australia
24045036	1564	13.12.2024	Алгебра Algebra
24045037	1564	26.12.2024	Арієтта Arietta
24045038	1498	12.12.2024	Австралія Australia
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato			
24088009	2584	05.12.2024	КЕЛЛІ KELLY
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage			
24096009	2643	30.12.2024	НОБЕЛЬ NOBEL
24096010	2643	16.12.2024	КУБІЦА KUBICA
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber			
24110012	3236	16.12.2024	Бочковий засол Bochkovyi zasol
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika			
24113013	2643	30.12.2024	СИМОНА SIMONA
24113018	753	30.12.2024	Рікардо Ricardo
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato			
24115034	2710	20.12.2024	Джолі Jolie
24115036	2643	16.12.2024	КМ7212 KM7212
24115037	2643	16.12.2024	МАДАНО MADANO
24115038	2643	16.12.2024	КОРБІН CORBYN
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach			
24130002	2643	16.12.2024	ЕЛ ФУРІО EL FURIO
24130003	1730	09.12.2024	Лізард Lizard
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon			
24146012	2662	20.12.2024	ЕКСПЛОРЕР EXPLORER
24146013	2643	30.12.2024	ЯМАЙКА JAMAICA
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin			
24228002	2643	30.12.2024	БУНІОО BUNIOO
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry			
24262004	3377	20.12.2024	Прим 31 Prim 31
24262005	3377	20.12.2024	Прим 21 Prim 21
24262007	3377	23.12.2024	Фінал 131 Final 131
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine			
24304001	3383	16.12.2024	Грюнер Вальтлінер Gruener Veltliner
Кукурудза восковидна (батьківський компонент) <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn			
24358001	2720	04.12.2024	СВіКC4206 CWX4206
24358002	2720	30.12.2024	СВіКC4206BC CWX4206WS

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut			
24543003	2709	23.12.2024	БАРСЕЛОНА BARCELONA
Міскантус гігантський <i>Miscanthus x giganteus</i> J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize Giant Chinese Silver Grass			
24553001	3374	20.12.2024	Терравеста Атена Terravesta Athena
Вишня звичайна (підщепана) <i>Prunus cerasus</i> L. Maraschino cherry; morello cherry; tart cherry			
23682002	3373	20.12.2024	Кас Cass
23682003	3373	20.12.2024	Кроуфорд Crawford
23682004	3373	20.12.2024	Клінтон Clinton
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component			
24939038	1688	30.12.2024	7ПУРЙ07Р 7PURJ07R
24939040	1688	16.12.2024	7ПЙКС48Б 7PJQS48B
24939041	2715	30.12.2024	7ПЛВК55А 7PLVK55A
24939048	1435	16.12.2024	СФ1561М2ЖА SF1561M2JA

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
21009072	03.11.2021	240735	12.12.2024	03.11.2021	ВЕРТУАЛ VERTUAL	844	бюлетень, випуск 11, 2024
21009073	03.11.2021	240736	12.12.2024	03.11.2021	ЕСТЕБІО ESTEBIO	844	
21009074	03.11.2021	240737	12.12.2024	03.11.2021	АЛЕНАРО ALENARO	844	
21009076	03.11.2021	240738	12.12.2024	03.11.2021	ЕВ4931 EW4931	844	
21009077	03.11.2021	240739	12.12.2024	03.11.2021	ЕВ4150 EW4150	844	
21009078	03.11.2021	240740	12.12.2024	03.11.2021	ДКС4533 DKC4533	844	
21009098	29.11.2021	240741	12.12.2024	29.11.2021	ДКС3924 DKC3924	844	
21009099	29.11.2021	240742	12.12.2024	29.11.2021	ДКС4238 DKC4238	844	
21009100	30.11.2021	240743	12.12.2024	30.11.2021	ДКС4433 DKC4433	844	
21009103	30.11.2021	240744	12.12.2024	30.11.2021	МОГАБРІКС MOGABRIX	844	
21009104	30.11.2021	240745	12.12.2024	30.11.2021	БУКАЛО BOUCALO	844	
21009105	30.11.2021	240746	12.12.2024	30.11.2021	ДОССІАН DOSSIAN	844	
21009106	30.11.2021	240747	12.12.2024	30.11.2021	ДКС3719 DKC3719	844	
21009108	30.11.2021	240748	12.12.2024	30.11.2021	ЕВ3732 EV3732	844	
22009056	22.11.2022	240870	27.12.2024	22.11.2022	Старді Stardi	2742	
22009057	22.11.2022	240871	27.12.2024	22.11.2022	Солід Solid	2742	
22009088	01.12.2022	240749	12.12.2024	01.12.2022	ДКС4655 DKC4655	844	
22009089	01.12.2022	240750	12.12.2024	01.12.2022	ДКС4539 DKC4539	844	
22009090	01.12.2022	240751	12.12.2024	01.12.2022	ДКС4231 DKC4231	844	
22009091	01.12.2022	240752	12.12.2024	01.12.2022	ДКС4031 DKC4031	844	
22009093	01.12.2022	240753	12.12.2024	01.12.2022	ДКС4933 DKC4933	844	
22009097	01.12.2022	240754	12.12.2024	01.12.2022	ЕІ3669 EY3669	844	
22009105	01.12.2022	240755	12.12.2024	01.12.2022	ЕХ3833 EX3833	844	
22009106	01.12.2022	240756	12.12.2024	01.12.2022	ДКС4741 DKC4741	844	
22009107	01.12.2022	240757	12.12.2024	01.12.2022	МЕДІТА MEDITIA	844	
22009164	01.12.2022	240758	12.12.2024	01.12.2022	ЕХ2974 EKH2974	844	
22009127	12.12.2022	240692	11.12.2024	12.12.2022	РОМАНС ROMANCE	793	
22009128	12.12.2022	240693	11.12.2024	12.12.2022	ЛГ31380 LG31380	793	
22009163	12.12.2022	240702	11.12.2024	12.12.2022	ЛГ31365 LG31365	793	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22009130	14.12.2022	240694	11.12.2024	14.12.2022	РЖТ СЕДЕККС RGT CEDEXX	1783	
22009153	14.12.2022	240700	11.12.2024	14.12.2022	РЖТ СУФІККС RGT SUFFIXXE	1783	
22009154	14.12.2022	240701	11.12.2024	14.12.2022	РЖТ ПРЕТЕККС RGT PRETEXTE	1783	
22009131	16.12.2022	240695	11.12.2024	16.12.2022	ЛЗМ272/10 LZM272/10	793	
22009133	16.12.2022	240696	11.12.2024	16.12.2022	ЛГ31215 LG31215	793	
22009135	16.12.2022	240697	11.12.2024	16.12.2022	ЛГ30002 LG30002	793	
22009137	16.12.2022	240698	11.12.2024	16.12.2022	ЛГ31252 LG31252	793	
22009138	16.12.2022	240699	11.12.2024	16.12.2022	ЛГ31350 LG31350	793	
22009145	16.12.2022	240806	16.12.2024	16.12.2022	БЕРКАНО BERCANO	793	
23009026	18.08.2023	240619	05.12.2024	18.08.2023	БРВ2814Б BRV2814B	1688	
23009027	18.08.2023	240620	05.12.2024	18.08.2023	Р8660 P8660	1688 1690	
23009028	18.08.2023	240621	05.12.2024	18.08.2023	Р88844 P88844	1688	
23009031	18.08.2023	240623	05.12.2024	18.08.2023	Р82848 P82848	1688	
23009032	18.08.2023	240624	05.12.2024	18.08.2023	Р9002 P9002	1688 1690	
23009035	18.08.2023	240625	05.12.2024	18.08.2023	Р9279 P9279	1688	
23009042	18.08.2023	240629	05.12.2024	18.08.2023	Р86010 P86010	1688	
23009044	18.08.2023	240630	05.12.2024	18.08.2023	Р9759 P9759	1688	
23009046	18.08.2023	240631	05.12.2024	18.08.2023	Р83224 P83224	1688	
23009047	18.08.2023	240632	05.12.2024	18.08.2023	Р8738 P8738	1688	
23009048	18.08.2023	240633	05.12.2024	18.08.2023	ІНДЕМ1316 INDEM1316	1688	
23009055	18.08.2023	240636	05.12.2024	18.08.2023	Р92440 P92440	1688	
23009029	21.08.2023	240622	05.12.2024	21.08.2023	Р7655 P7655	1688	
23009036	21.08.2023	240626	05.12.2024	21.08.2023	Р8115 P8115	1688	
23009037	21.08.2023	240627	05.12.2024	21.08.2023	Р82703 P82703	1688	
23009041	21.08.2023	240628	05.12.2024	21.08.2023	ГРІНФІЛД GREENFIELD	1688	
23009049	21.08.2023	240634	05.12.2024	21.08.2023	БРВ2770Б BRV2770B	1688	
23009050	21.08.2023	240635	05.12.2024	21.08.2023	Р8256 P8256	1688	
24009022	22.01.2024	240637	05.12.2024	22.01.2024	ІНДЕМ1628 INDEM1628	1688	
24009023	22.01.2024	240638	05.12.2024	22.01.2024	Р72847 P72847	1688	
24009025	22.01.2024	240639	05.12.2024	22.01.2024	БРВ2445Б BRV2445B	1688	
24009027	22.01.2024	240640	05.12.2024	22.01.2024	Р02085 P02085	1688	
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum							
24018005	20.03.2024	240609	02.12.2024	20.03.2024	СІНАЙ SINAI	2890	
24018008	20.03.2024	240610	02.12.2024	20.03.2024	МАРГО MARGO	2890	
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
21039086	17.12.2021	240582	02.12.2024	17.12.2021	1043Л КЛП 1043L CLP	2890	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21039101	22.12.2021	240834	23.12.2024	22.12.2021	АПСФ77 APSF77	2440	бюлетень, випуск 11, 2024
21039112	29.12.2021	240650	05.12.2024	29.12.2021	Корунд Korund	1581	
22039040	28.11.2022	240583	02.12.2024	28.11.2022	ГЕНДАЛЬФ КЛП GANDALF CLP	793	
22039042	28.11.2022	240584	02.12.2024	28.11.2022	ЛГ50449 CX LG50449 SX	793	
22039044	28.11.2022	240585	02.12.2024	28.11.2022	ЛГ50489 CX LG50489 SX	793	
22039046	08.12.2022	240586	02.12.2024	08.12.2022	САЛАМАНКА SALAMANCA	2882	
22039047	08.12.2022	240587	02.12.2024	08.12.2022	АРКОС ARCOS	2882	
22039048	14.12.2022	240728	11.12.2024	14.12.2022	ЛЕРОС КЛП LEROS CLP	1783	
22039049	14.12.2022	240729	11.12.2024	14.12.2022	БАРСЕЛЛОНА BARCELLONA	1783	
22039053	14.12.2022	240730	11.12.2024	14.12.2022	ВАЛЬКІРІЯ VALKYRIE	1783	
22039054	14.12.2022	240731	11.12.2024	14.12.2022	ВІВАЛЛЬТО КЛП VIVALLTO CLP	1783	
22039050	15.12.2022	240835	23.12.2024	15.12.2022	Саяд Sayad	2843	
22039060	21.12.2022	240588	02.12.2024	21.12.2022	ХАЙСАН182IT HYSUN182IT	2554	
22039066	27.12.2022	240809	16.12.2024	27.12.2022	Магнус Mahnus	3093	
22039067	27.12.2022	240810	16.12.2024	27.12.2022	Бамбус Bambus	3096	
22039068	27.12.2022	240811	16.12.2024	27.12.2022	Варді Vardi	3091	
22039071	27.12.2022	240812	16.12.2024	27.12.2022	Немея Nemeia	3094	
22039073	27.12.2022	240813	16.12.2024	27.12.2022	Сабінус Sabinus	3201	
22039069	28.12.2022	240661	06.12.2024	28.12.2022	Амарок Amarok	1265	
22039072	28.12.2022	240589	02.12.2024	28.12.2022	М96КЛП51 M96CLP51	273	
22039074	28.12.2022	240662	06.12.2024	28.12.2022	Аркана Arkana	1265	
22039075	29.12.2022	240836	23.12.2024	29.12.2022	Дайна Dayna	2843	
23039001	06.01.2023	240837	23.12.2024	06.01.2023	АПС85 APS85	2440	
23039004	06.01.2023	240838	23.12.2024	06.01.2023	АПС94 APS94	2440	
23039008	13.01.2023	240590	02.12.2024	13.01.2023	ІНСАН 266 КЛП INSUN 266 CLP	2890	
23039014	13.01.2023	240591	02.12.2024	13.01.2023	Інсан 277 СУ Insun 277 SU	2890	
23039011	16.01.2023	240852	25.12.2024	16.01.2023	ЄС Аркада YeS Arkada	2287	
23039015	16.01.2023	240853	25.12.2024	16.01.2023	ЄС Бравус YeS Bravus	2287	
23039016	16.01.2023	240854	25.12.2024	16.01.2023	ЄС Діксон YeS Dikson	2287	
23039021	20.02.2023	240651	05.12.2024	20.02.2023	Захисник Zakhysnyk	1581	
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring)							
22041001	21.12.2022	240848	25.12.2024	21.12.2022	КРЕЙЗІ КЛ CRAZY CL	912	
22041002	21.12.2022	240849	25.12.2024	21.12.2022	ЛЕПОРЕЛЛО LEPORELLO	912	
22041003	21.12.2022	240850	25.12.2024	21.12.2022	Калімера КЛ Calimera CL	912	
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean							
20045047	03.12.2020	240611	02.12.2024	03.12.2020	СЕЙЛОР Sailor	806	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21045024	17.12.2021	240612	02.12.2024	17.12.2021	ЛІД Конструктор LID Constructor	2890	бюлетень, випуск 11, 2024
21045025	17.12.2021	240613	02.12.2024	17.12.2021	ЛІД Едукатор LID Educator	2890	
21045026	17.12.2021	240614	02.12.2024	17.12.2021	ЛІД Промотор LID Promotor	2890	
21045037	29.12.2021	240865	25.12.2024	29.12.2021	EXTX 114	2264	
21045038	29.12.2021	240866	25.12.2024	29.12.2021	EXTX 114 EXTX 103 EXTX 103	2264	
21045039	29.12.2021	240867	25.12.2024	29.12.2021	EXTC 416	2264	
21045040	29.12.2021	240868	25.12.2024	29.12.2021	EXTC 416 EXTC 411	2264	
21045041	29.12.2021	240869	25.12.2024	29.12.2021	EXTC 411 EXTC 402	2264	
21045042	30.12.2021	240615	02.12.2024	30.12.2021	Світлиця Svitlytsia	1581	
22045025	05.10.2022	240616	02.12.2024	05.10.2022	Памела Pamela	2011	
22045032	14.12.2022	240833	17.12.2024	14.12.2022	Байрактар Bairaktar	1669	
23045005	20.02.2023	240617	02.12.2024	20.02.2023	Волонтерка Volonterka	1581	
23045007	28.02.2023	240843	23.12.2024	28.02.2023	САЦ224914 SAC224914	2863	
23045008	28.02.2023	240844	23.12.2024	28.02.2023	САЦ224920 SAC224920	2863	
23045009	08.03.2023	240827	17.12.2024	08.03.2023	СТАЙН 04Н32 STINE 04N32	2788	
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet							
23069012	15.12.2023	240828	17.12.2024	15.12.2023	СМАРТ АМАЛТЕЯ КВС SMART AMALTEA KWS	2649	
Коноплі посівні <i>Cannabis sativa</i> L. Нерп							
23080001	16.01.2023	240846	25.12.2024	16.01.2023	ЄС Джин YeS Dzhyn	2287	
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant							
24093002	29.03.2024	240666	11.12.2024	29.03.2024	Джаз Dzhaz	2429	
24093004	29.03.2024	240668	11.12.2024	29.03.2024	Ріко Riko	2429	
24093005	29.03.2024	240669	11.12.2024	29.03.2024	Мірінда Mirinda	2429	
24093003	01.04.2024	240667	11.12.2024	01.04.2024	Ден Den	2429	
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage							
24096006	29.03.2024	240672	11.12.2024	29.03.2024	Вірджинія Virzhyniia	2429	
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn							
23103003	15.02.2023	240807	16.12.2024	15.02.2023	РОЗІ ROSIE	2662	
23103004	15.02.2023	240808	16.12.2024	15.02.2023	ДРАЙВЕР Р DRIVER R	2662	
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber							
24110008	04.07.2024	240826	17.12.2024	04.07.2024	ДВА ВЕСЕЛИХ КУМА DVA VESELYKh KUMA	3236	
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika							
24113003	29.03.2024	240676	11.12.2024	29.03.2024	Оранж Босс Oranzh Boss	2429	
24113004	29.03.2024	240677	11.12.2024	29.03.2024	Ред Булл Спарк Red Bull Spark	2429	
24113005	29.03.2024	240678	11.12.2024	29.03.2024	Стріт Strit	2429	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
24113006	29.03.2024	240679	11.12.2024	29.03.2024	Кольт Kolt	2429	
24113007	01.04.2024	240680	11.12.2024	01.04.2024	Ліра Спарк Lira Spark	2429	
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato							
24115019	01.04.2024	240681	11.12.2024	01.04.2024	Ельза Elsa	2429	
24115020	01.04.2024	240682	11.12.2024	01.02.2024	Ремембе Remembe	2429	
24115021	01.04.2024	240683	11.12.2024	01.04.2024	Джордано Dzhordano	2429	
24115022	01.04.2024	240684	11.12.2024	01.04.2024	Єллоу Пешен Yellou Peshen	2429	
24115023	01.04.2024	240685	11.12.2024	01.04.2024	Блейз Bleiz	2429	
24115024	01.04.2024	240686	11.12.2024	01.04.2024	Солідо Спарк Solido Spark	2429	
24115025	01.04.2024	240687	11.12.2024	01.04.2024	Оранж Плам Oranzh Plam	2429	
24115026	01.04.2024	240688	11.12.2024	01.04.2024	IC 1510 IS 1510	2429	
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill							
24125003	29.03.2024	240673	11.12.2024	29.03.2024	Брум Brum	2429	
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash							
24148009	11.09.2024	240824	17.12.2024	11.09.2024	Золотий Дракон Zoloty Drakon	3236	
24148010	11.09.2024	240825	17.12.2024	11.09.2024	ТИГРЕТТО ді ІТАЛІЯ TIHRETTO di ITALIAIA	3236	
Сорго суданське <i>Sorghum sudanense</i> (Piper.) Stapf Sudan Grass							
22227001	24.01.2022	240689	11.12.2024	24.01.2022	Скарб Степу Skarb Stepu	2706	
Сорго цукрове <i>Sorghum saccharatum</i> (L.) Moench Sweet Sorghum							
22241001	26.07.2022	240832	17.12.2024	26.07.2022	Ботанічний Botanichnyi	348	
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry							
24294007	04.10.2024	240845	23.12.2024	04.10.2024	ФЛ 16 78 109 FL 16 78 109	1282	
Півонія <i>Paeonia</i> L. Peony							
24329003	16.08.2024	240847	25.12.2024	16.08.2024	Квітка Ксенія Kvitka Kseniia	348	
Хризантема <i>Chrysanthemum</i> L. Chrysanthemum							
24337002	17.05.2024	240690	11.12.2024	17.05.2024	Мальвіна Malvina	348	
24337004	17.05.2024	240691	11.12.2024	17.05.2024	Циганочка Tsyganochka	348	
Васильки справжні <i>Ocimum basilicum</i> L. Basil							
24464001	29.03.2024	240670	11.12.2024	29.03.2024	Віолет Кінг Violet King	2429	
24464002	29.03.2024	240671	11.12.2024	29.03.2024	Грін Дом Grin Dom	2429	
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn							
23645001	18.08.2023	240618	05.12.2024	18.08.2023	PO200BX PO200WX	1688	
Слива верболиста <i>Prunus salicina</i> Lindl. Japanese Plum, Plum							
24672002	06.03.2024	240851	25.12.2024	06.03.2024	Ті Сі Сан 2 TC Sun 2	3218 3241	бюлетень, випуск 5, 2024
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula							
24680001	01.08.2024	240674	11.12.2024	01.08.2024	Сутінки Sutinky	348	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
24680002	01.08.2024	240675	11.12.2024	01.08.2024	Вишиванка Yshyvanka	348	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
21909026	01.02.2021	240703	11.12.2024	01.02.2021	Харківська 341 3M Kharkivska 341 ZM	1581	
21909125	03.11.2021	240759	12.12.2024	03.11.2021	M77673 M7767Z	844	
21909126	03.11.2021	240760	12.12.2024	03.11.2021	ДЖ96563 J9656Z	844	
21909127	03.11.2021	240761	12.12.2024	03.11.2021	B53993 V5399Z	844	
21909128	03.11.2021	240762	12.12.2024	03.11.2021	ДЖ25263 J2526Z	844	
21909129	03.11.2021	240763	12.12.2024	03.11.2021	B00273 V0027Z	844	
21909130	03.11.2021	240764	12.12.2024	03.11.2021	B09873 W0987Z	844	
21909131	03.11.2021	240765	12.12.2024	03.11.2021	ВЛ3483 WL348Z	844	
21909156	29.11.2021	240766	12.12.2024	29.11.2021	B27993 V2799Z	844	
21909157	29.11.2021	240767	12.12.2024	29.11.2021	M79613 M7961Z	844	
21909158	29.11.2021	240768	12.12.2024	29.11.2021	ДЖ72143 J7214Z	844	
21909159	29.11.2021	240769	12.12.2024	29.11.2021	T08343 T0834Z	844	
21909160	29.11.2021	240770	12.12.2024	29.11.2021	T49053 T4905Z	844	
22909083	22.11.2022	240872	27.12.2024	22.11.2022	B 831 CB V 831 SV	2742	
22909084	22.11.2022	240873	27.12.2024	22.11.2022	B 510 зс V 510 zs	2742	
22909085	22.11.2022	240874	27.12.2024	22.11.2022	B 66 V 66	2742	
22909086	22.11.2022	240875	27.12.2024	22.11.2022	B 510 с V 510 s	2742	
22909087	22.11.2022	240876	27.12.2024	22.11.2022	B 138 V 138	2742	
22909088	01.12.2022	240771	12.12.2024	01.12.2022	A46013 A4601Z	844	
22909089	01.12.2022	240772	12.12.2024	01.12.2022	ДЖ24313 J2431Z	844	
22909090	01.12.2022	240773	12.12.2024	01.12.2022	B30083 V3008Z	844	
22909091	01.12.2022	240774	12.12.2024	01.12.2022	B14823 V1482Z	844	
22909092	01.12.2022	240775	12.12.2024	01.12.2022	B63863 V6386Z	844	
22909093	01.12.2022	240776	12.12.2024	01.12.2022	ДЖ24903ХЛБЗ J2490ZHLBZ	844	
22909094	01.12.2022	240777	12.12.2024	01.12.2022	ДЖ85233 J8523Z	844	
22909095	01.12.2022	240778	12.12.2024	01.12.2022	A45673ХІВЗ A4567ZXIWZ	844	
22909096	01.12.2022	240779	12.12.2024	01.12.2022	Ф15873 F1587Z	844	
22909097	01.12.2022	240780	12.12.2024	01.12.2022	M84583ХІВЗ M8458ZXIWZ	844	
22909098	01.12.2022	240781	12.12.2024	10.11.2022	M85823ХАІЗ M8582ZXAIZ	844	
22909100	01.12.2022	240782	12.12.2024	01.12.2022	B93653ХЛБЗ V9365ZHLBZ	844	
22909101	01.12.2022	240783	12.12.2024	01.12.2022	B67263ХЛБЗ V6726ZHLBZ	844	
22909102	01.12.2022	240784	12.12.2024	01.12.2022	ДЖ39723ХЛБЗ J3972ZHLBZ	844	
22909104	01.12.2022	240785	12.12.2024	01.12.2022	B79203ХЛБЗ V7920ZHLBZ	844	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22909110	01.12.2022	240786	12.12.2024	01.12.2022	M79613XIB3	844	
22909113	01.12.2022	240787	12.12.2024	01.12.2022	M7961ZXIWZ	844	
22909114	01.12.2022	240788	12.12.2024	01.12.2022	ДЖ09303	844	
22909115	01.12.2022	240789	12.12.2024	01.12.2022	J0930Z	844	
22909205	01.12.2022	240790	12.12.2024	01.12.2022	B12093	844	
22909128	12.12.2022	240704	11.12.2024	12.12.2022	V1209Z	844	
22909129	12.12.2022	240705	11.12.2024	12.12.2022	ДЖ08963	844	
22909130	12.12.2022	240706	11.12.2024	12.12.2022	J0896Z	844	
22909131	14.12.2022	240707	11.12.2024	14.12.2022	A03473	844	
22909134	14.12.2022	240710	11.12.2024	14.12.2022	A0347Z	844	
22909135	14.12.2022	240711	11.12.2024	14.12.2022	ПРЦ16ВІ ИВ483	793	
22909136	14.12.2022	240712	11.12.2024	14.12.2022	PRC16VI YIV483	793	
22909132	15.12.2022	240708	11.12.2024	15.12.2022	ПДД38ФФ	793	
22909133	15.12.2022	240709	11.12.2024	15.12.2022	PDD38FF	793	
22909139	15.12.2022	240713	11.12.2024	15.12.2022	КЮЛД47ФФ	793	
22909141	15.12.2022	240714	11.12.2024	15.12.2022	QLD47FF	793	
22909142	15.12.2022	240715	11.12.2024	15.12.2022	P16077	1783	
22909143	15.12.2022	240716	11.12.2024	15.12.2022	R16077	1783	
22909144	16.12.2022	240717	11.12.2024	16.12.2022	P16033	1783	
22909148	19.12.2022	240580	02.12.2024	19.12.2022	R16033	1783	
22909152	19.12.2022	240581	02.12.2024	19.12.2022	P15078ЦМС	1783	
22909170	26.12.2022	240641	05.12.2024	26.12.2022	R15078СМС	1783	
22909171	26.12.2022	240642	05.12.2024	26.12.2022	P12010СМС	1783	
22909172	26.12.2022	240643	05.12.2024	26.12.2022	R12010SMS	1783	
22909174	26.12.2022	240644	05.12.2024	26.12.2022	САД36ЛІ	793	
22909175	26.12.2022	240645	05.12.2024	26.12.2022	САД35ЛІ	793	
22909176	26.12.2022	240646	05.12.2024	26.12.2022	SAD36LI SAD35LI	793	
22909177	26.12.2022	240647	05.12.2024	26.12.2022	САД35ЛІ	793	
22909178	26.12.2022	240648	05.12.2024	26.12.2022	SAD35LI	793	
22909179	26.12.2022	240649	05.12.2024	26.12.2022	РЕЕ80ФФ	793	
23909019	17.01.2023	240718	11.12.2024	17.01.2023	REE80FF	793	
23909029	17.01.2023	240719	11.12.2024	17.01.2023	РИЦ74ВІ	793	
23909042	03.02.2023	240720	11.12.2024	03.02.2023	RYC74VI	793	
23909043	03.02.2023	240721	11.12.2024	03.02.2023	САД36ЛІ	793	
					SAD36LI	793	
					КЮВІ492	793	
					КЮВІ447	793	
					KIUVI492	793	
					KIUVI447	793	
					ПРЦ23ВІ	793	
					РЕЕД28ВІ	793	
					PRC23VI	793	
					REED28VI	793	
					ЛРР6404	2720	
					LRR6404	2720	
					ЛОР3688	2720	
					LOR3688	2720	
					ЮААБ3713С	1219	
					UAAБ3713S	1219	
					ІАКС3300С	1219	
					IAХ3300S	1219	
					ГВІКС1660С	1219	
					GWIX1660S	1219	
					ЦАФ3362С	1219	
					CAF3362S	1219	
					ГЕІКС1764	1959	
					GEIX1764	1959	
					ГЕНА0903	1219	
					GENA0903	1219	
					ЮАІД2042	1219	
					UAID2042	1219	
					ЮАІД2036	1219	
					UAID2036	1219	
					ФСІД3075	1219	
					FSID3075	1219	
					ДБ1	793 2649	
					DB1	793 2649	
					АГБЦ173	793 2649	
					AGBC173	793 2649	
					ІВВ666	793	
					IVV666	793	
					РВЛ173	793	
					RVL173	793	

бюлетень, випуск 8, 2024

бюлетень, випуск 10, 2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety	
23909044	03.02.2023	240722	11.12.2024	03.02.2023	PBI323	793	бюлетень, випуск 10, 2024	
23909045	03.02.2023	240723	11.12.2024	03.02.2023	RVI323	793		
23909047	03.02.2023	240724	11.12.2024	03.02.2023	PBI441	793		
23909048	03.02.2023	240725	11.12.2024	03.02.2023	RVI441	793		
23909054	18.08.2023	240791	16.12.2024	18.08.2023	КЮКЮА28BI	1688		
23909067	18.08.2023	240793	16.12.2024	18.08.2023	QQA28VI	1688		
23909077	18.08.2023	240794	16.12.2024	18.08.2023	ЛІМІВВ957	1688		
23909078	18.08.2023	240795	16.12.2024	18.08.2023	LIMIVV957	1688		
23909056	21.08.2023	240792	16.12.2024	21.08.2023	1ПВДГ15	1688		
23909079	21.08.2023	240796	16.12.2024	21.08.2023	1PVDG15	1688		
23909087	20.11.2023	240726	11.12.2024	20.11.2023	ПХ4ЦТД	1783		
23909088	20.11.2023	240727	11.12.2024	20.11.2023	RH4CTD	1783		
23909138	28.12.2023	240797	16.12.2024	28.12.2023	1ПВДЕ32	2548		
23909139	28.12.2023	240798	16.12.2024	28.12.2023	1PWDE32	2548		
23909148	28.12.2023	240799	16.12.2024	28.12.2023	ПХ2Т03	2548		
24909055	22.01.2024	240800	16.12.2024	22.01.2024	RH2T03	1688		
24909057	22.01.2024	240801	16.12.2024	22.01.2024	1ППФС42	1688		
24909060	22.01.2024	240802	16.12.2024	22.01.2024	1PPFS42	1688		
24909065	22.01.2024	240803	16.12.2024	22.01.2024	1ПАБЦ82	1688		
24909077	28.02.2024	240829	17.12.2024	28.02.2024	1PABC82	3356		
24909078	28.02.2024	240830	17.12.2024	28.02.2024	P20021	3356		
24909079	28.02.2024	240831	17.12.2024	28.02.2024	R20021	3356		
24909085	20.03.2024	240877	27.12.2024	20.03.2024	P19009	2873		
24909086	20.03.2024	240878	27.12.2024	20.03.2024	R19009	2873		
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component								
20939055	10.11.2020	240592	02.12.2024	10.11.2020	ЛЦ166AIP	2743		
20939130	18.12.2020	240839	23.12.2024	18.12.2020	LC166AIR	2440		
21939016	08.02.2021	240652	05.12.2024	08.02.2021	211CU	1581		
21939110	22.12.2021	240840	23.12.2024	22.12.2021	211SU	2440		
22939016	11.11.2022	240593	02.12.2024	11.11.2022	X 66 Б	2743		
22939020	28.11.2022	240594	02.12.2024	28.11.2022	Kh 66 B	1435		
22939021	28.11.2022	240595	02.12.2024	28.11.2022	PXA470	1435		
22939022	28.11.2022	240596	02.12.2024	28.11.2022	RHA470	793		
22939023	28.11.2022	240597	02.12.2024	28.11.2022	PФ1711CU	1435		
22939024	28.11.2022	240598	02.12.2024	28.11.2022	RF1711SU	1435		
22939025	28.11.2022	240599	02.12.2024	28.11.2022	P14B34MЖІ	1435		
					R14WZ4MJI	1435		
					P8035M2ЖК	1435		
					R8035M2JK	1435		
					Л71234MIOA	1435		
					L71234MIOA	1435		
					СФ1561M2IA	1435		
					SF1561M2IA	1435		
					P13CL1MIO	1435		
					R13SL1MIO	1435		
					Ф18БД3MCA	1435		
					F18BD3MSA	1435		

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22939026	08.12.2022	240600	02.12.2024	08.12.2022	PX766CYL RH766SUL	2267	бюлетень, випуск 11, 2024
22939046	14.12.2022	240732	11.12.2024	14.12.2022	AT2721 AT2721	1783	
22939053	14.12.2022	240733	11.12.2024	14.12.2022	PT7821 RT7821	1783	
22939054	14.12.2022	240734	11.12.2024	14.12.2022	PT7721 RT7721	1783	
22939057	21.12.2022	240601	02.12.2024	21.12.2022	EX701 x MX702 EKH701 kh MKH702	2267	
22939058	21.12.2022	240602	02.12.2024	21.12.2022	PX790CYL RH790SUL	2267	
22939060	21.12.2022	240603	02.12.2024	21.12.2022	EX993 EH993	2267	
22939061	21.12.2022	240604	02.12.2024	21.12.2022	PX598 RH598	2267	
22939062	21.12.2022	240605	02.12.2024	21.12.2022	PX788 RH788	2267	
22939063	21.12.2022	240606	02.12.2024	21.12.2022	EX908 EH908	2267	
22939064	21.12.2022	240607	02.12.2024	21.12.2022	PX738CYL RH738SUL	2267	
22939065	26.12.2022	240653	05.12.2024	26.12.2022	ЮР603ЛС01 UR603LS01	1219	
22939066	26.12.2022	240654	05.12.2024	26.12.2022	ЮР408ЛН00 UR408LN00	1219	
22939067	26.12.2022	240655	05.12.2024	26.12.2022	ФА730ЛС05 FA730LS05	1219	
22939068	26.12.2022	240656	05.12.2024	26.12.2022	ФР842ЛС23 FR842LS23	1219	
22939069	26.12.2022	240657	05.12.2024	26.12.2022	ФР410ЛЗ00 FR410LZ00	1219	
22939070	26.12.2022	240658	05.12.2024	26.12.2022	ФС74221 FS74221	1219	
22939071	26.12.2022	240659	05.12.2024	26.12.2022	ФР84229 FR84229	1959	
22939072	27.12.2022	240814	16.12.2024	27.12.2022	РД8413 RD8413	3091	
22939073	27.12.2022	240815	16.12.2024	27.12.2022	БА2850 BA2850	3096	
22939074	27.12.2022	240816	16.12.2024	27.12.2022	БС8501 BS8501	3096	
22939075	27.12.2022	240817	16.12.2024	27.12.2022	ВА2160 VA2160	3091	
22939077	27.12.2022	240818	16.12.2024	27.12.2022	НУ6433 NU6433	3201	
22939078	27.12.2022	240819	16.12.2024	27.12.2022	НМ4600 NM4600	3094	
22939080	27.12.2022	240820	16.12.2024	27.12.2022	НС4754 NS4754	3093	
22939082	27.12.2022	240821	16.12.2024	27.12.2022	МГ8372 MH8372	3093	
22939084	27.12.2022	240823	16.12.2024	27.12.2022	СБ5100 SB5100	3201	
22939076	28.12.2022	240663	06.12.2024	28.12.2022	СВ 4 В SV 4 V	1265	
22939079	28.12.2022	240664	06.12.2024	28.12.2022	АР 008 Б AR 008 B	1265	
22939081	28.12.2022	240608	02.12.2024	28.12.2022	АККАІР AKKAIR	273	
22939083	28.12.2022	240822	16.12.2024	28.12.2022	НЕ9706 NE9706	3094	
22939086	28.12.2022	240665	06.12.2024	28.12.2022	АР 008 А AR 008 A	1265	
23939001	06.01.2023	240841	23.12.2024	06.01.2023	422PIMI 422RIMI	2440	
23939002	06.01.2023	240842	23.12.2024	06.01.2023	Р991Р P991R	2440	
23939009	20.01.2023	240660	05.12.2024	20.01.2023	ФА718ЛС05 FA718LS05	1219	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
23939017	19.06.2023	240855	25.12.2024	19.06.2023	ЄС 421 YeS 421	2287	
23939018	19.06.2023	240856	25.12.2024	19.06.2023	ЄС 522 YeS 522	2287	
23939019	22.06.2023	240857	25.12.2024	22.06.2023	ЄС 121 YeS 121	2287	
23939043	06.11.2023	240858	25.12.2024	06.11.2023	ЄС-211 YeS-211	2287	
23939044	06.11.2023	240859	25.12.2024	06.11.2023	ЄС-312 YeS-312	2287	
23939045	06.11.2023	240860	25.12.2024	06.11.2023	ЄС-212 YeS-212	2287	
23939046	06.11.2023	240861	25.12.2024	06.11.2023	ЄС-311 YeS-311	2287	
23939047	06.11.2023	240862	25.12.2024	06.11.2023	ЄС-521 YeS-521	2287	
23939048	06.11.2023	240863	25.12.2024	06.11.2023	ЄС-422 YeS-422	2287	
23939049	06.11.2023	240864	25.12.2024	06.11.2023	ЄС-122 YeS-122	2287	
23939077	28.12.2023	240804	16.12.2024	28.12.2023	BX 2101 B VKh 2101 V	2548	
23939089	28.12.2023	240805	16.12.2024	28.12.2023	BX 2603 A VKh 2603 A	2548	

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
22009127	12.12.2022	240692	РОМАНС ROMANCE	793	20.12.2024
22009128	12.12.2022	240693	ЛГ31380 LG31380	793	20.12.2024
22009131	16.12.2022	240695	ЛЗМ272/10 LZM272/10	793	20.12.2024
22009133	16.12.2022	240696	ЛГ31215 LG31215	793	20.12.2024
22009135	16.12.2022	240697	ЛГ30002 LG30002	793	20.12.2024
22009137	16.12.2022	240698	ЛГ31252 LG31252	793	20.12.2024
22009138	16.12.2022	240699	ЛГ31350 LG31350	793	20.12.2024
22009163	12.12.2022	240702	ЛГ31365 LG31365	793	20.12.2024
23009026	18.08.2023	240619	БРВ2814Б BRV2814B	1688	12.12.2024
23009027	18.08.2023	240620	П8660 P8660	1688 1690	12.12.2024
23009028	18.08.2023	240621	П88844 P88844	1688	12.12.2024
23009029	21.08.2023	240622	П7655 P7655	1688	12.12.2024
23009031	18.08.2023	240623	П82848 P82848	1688	12.12.2024
23009032	18.08.2023	240624	П9002 P9002	1688 1690	12.12.2024
23009035	18.08.2023	240625	П9279 P9279	1688	12.12.2024
23009036	21.08.2023	240626	П8115 P8115	1688	12.12.2024
23009037	21.08.2023	240627	П82703 P82703	1688	12.12.2024
23009041	21.08.2023	240628	ГРІНФІЛД GREENFIELD	1688	12.12.2024
23009042	18.08.2023	240629	П86010 P86010	1688	12.12.2024
23009044	18.08.2023	240630	П9759 P9759	1688	12.12.2024
23009046	18.08.2023	240631	П83224 P83224	1688	12.12.2024
23009047	18.08.2023	240632	П8738 P8738	1688	12.12.2024
23009048	18.08.2023	240633	ІНДЕМ1316 INDEM1316	1688	12.12.2024
23009049	21.08.2023	240634	БРВ2770Б BRV2770B	1688	12.12.2024
23009050	21.08.2023	240635	П8256 P8256	1688	12.12.2024
23009055	18.08.2023	240636	П92440 P92440	1688	12.12.2024
24009023	22.01.2024	240638	П72847 P72847	1688	12.12.2024
24009025	22.01.2024	240639	БРВ2445Б BRV2445B	1688	12.12.2024
24009027	22.01.2024	240640	П02085 P02085	1688	12.12.2024
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)					
20011001	28.10.2020	240517	Амар Amar	1658	03.12.2024
20011002	28.10.2020	240518	Андрій Andrii	1658	03.12.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
22012042	28.07.2022	240423	Вальтер Walther	2552	04.12.2024
22012043	28.07.2022	240424	Хантер Khapter	2552	04.12.2024
22012044	28.07.2022	240425	Інвіктус Invictus	2552	04.12.2024
22012045	28.07.2022	240426	Валлонія Vallontia	2552	04.12.2024
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum					
24018005	20.03.2024	240609	СІНАЙ SINAI	2890	27.12.2024
24018008	20.03.2024	240610	МАРГО MARGO	2890	27.12.2024
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
22020005	24.01.2022	240473	Бунчук Bunchuk	2706	02.12.2024
22020011	09.11.2022	240507	Рагнар Rahnar	1669	16.12.2024
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed					
20035001	31.03.2020	240505	Антант Antant	1658	03.12.2024
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
21039086	17.12.2021	240582	1043Л КЛП 1043L CLP	2890	27.12.2024
22039040	28.11.2022	240583	ГЕНДАЛЬФ КЛП GANDALF CLP	793	20.12.2024
22039042	28.11.2022	240584	ЛГ50449 CX LG50449 SX	793	20.12.2024
22039044	28.11.2022	240585	ЛГ50489 CX LG50489 SX	793	20.12.2024
22039046	08.12.2022	240586	САЛАМАНКА SALAMANCA	2882	16.12.2024
22039047	08.12.2022	240587	АРКОС ARCOS	2882	16.12.2024
22039060	21.12.2022	240588	ХАЙСАН182ІТ HYSUN182IT	2554	17.12.2024
22039069	28.12.2022	240661	Амарок Amarok	1265	12.12.2024
22039074	28.12.2022	240662	Аркана Arkana	1265	12.12.2024
23039008	13.01.2023	240590	ІНСАН 266 КЛП INSUN 266 CLP	2890	27.12.2024
23039014	13.01.2023	240591	Інсан 277 СУ Insun 277 SU	2890	27.12.2024
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
20045047	03.12.2020	240611	СЕЙЛОР Sailor	806	27.12.2024
21045024	17.12.2021	240612	ЛІД Конструктор LID Constructor	2890	27.12.2024
21045025	17.12.2021	240613	ЛІД Едукатор LID Educator	2890	27.12.2024
21045026	17.12.2021	240614	ЛІД Промотор LID Promotor	2890	27.12.2024
21045030	20.12.2021	240530	РЖТ СЕФОРА RGТ SEFORA	1783	19.12.2024
22045025	05.10.2022	240616	Памела Pamela	2011	24.12.2024
22045029	14.12.2022	240531	СУПЕРНОВА SUPERNOVA	1783	19.12.2024
22045030	14.12.2022	240532	СУЗА SUZA	1783	19.12.2024
23045009	08.03.2023	240827	СТАЙН 04Н32 STINE 04N32	2788	24.12.2024
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
19069010	07.11.2019	240429	Керолл Caroll	2552	04.12.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant					
24093002	29.03.2024	240666	Джаз Dzhaz	2429	19.12.2024
24093003	01.04.2024	240667	Ден Den	2429	19.12.2024
24093004	29.03.2024	240668	Ріко Riko	2429	19.12.2024
24093005	29.03.2024	240669	Мірінда Mirinda	2429	19.12.2024
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
24096006	29.03.2024	240672	Вірджинія Virdzhyniia	2429	19.12.2024
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
24110008	04.07.2024	240826	ДВА ВЕСЕЛИХ КУМА DVA VESELYKH KUMA	3236	26.12.2024
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika					
24113003	29.03.2024	240676	Оранж Босс Oranzh Boss	2429	19.12.2024
24113004	29.03.2024	240677	Ред Булл Спарк Red Bull Spark	2429	19.12.2024
24113005	29.03.2024	240678	Стріт Strit	2429	19.12.2024
24113006	29.03.2024	240679	Кольт Kolt	2429	19.12.2024
24113007	01.04.2024	240680	Ліра Спарк Lira Spark	2429	19.12.2024
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
22115017	28.10.2022	240481	Філікса Filiksa	1730	02.12.2024
24115019	01.04.2024	240681	Ельза Elsa	2429	19.12.2024
24115020	01.04.2024	240682	Реємбе Remembe	2429	19.12.2024
24115021	01.04.2024	240683	Джордано Dzhordano	2429	19.12.2024
24115022	01.04.2024	240684	Єллоу Пешен Yellow Peshen	2429	19.12.2024
24115023	01.04.2024	240685	Блейз Bleiz	2429	19.12.2024
24115024	01.04.2024	240686	Солідо Спарк Solido Spark	2429	19.12.2024
24115025	01.04.2024	240687	Оранж Плам Oranzh Plam	2429	19.12.2024
24115026	01.04.2024	240688	IS 1510 IS 1510	2429	19.12.2024
24115027	03.04.2024	240527	Хайрул Hyrule	1730	02.12.2024
24115032	27.08.2024	240519	Редсонні Redsonny	1730	02.12.2024
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill					
24125003	29.03.2024	240673	Брум Brum	2429	19.12.2024
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean					
23127001	02.01.2023	240500	ВІНСТОН WINSTON	1050	27.12.2024
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
20146017	30.12.2020	240499	ОКСАМИТ OKSAMYT	1939	03.12.2024
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash					
23148003	26.09.2023	240224	Кефрен Kefren	1730	02.12.2024
24148009	11.09.2024	240824	Золотий Дракон Zoloty Drakon	3236	26.12.2024
24148010	11.09.2024	240825	ТИГРЕТТО ді ІТАЛІЯ TIHRETTO di ITALIA	3236	26.12.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin					
20228003	30.12.2020	240496	Світанок Svitanok	1939	03.12.2024
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose					
24339003	22.07.2024	240427	СКХ 12711 SCH 12711	2690	26.12.2024
24339004	22.07.2024	240428	СКХ 14206 SCH 14206	2690	26.12.2024
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Lettuce, Head Lettuce					
17421005	16.08.2017	191009	Ізанас Izanas	1730	02.12.2024
17421006	16.08.2017	191010	Асмера Asmara	1730	02.12.2024
Гарбуз великоплідний <i>Cucurbita maxima</i> Duch. Pumpkin					
20455002	30.12.2020	240495	ФАРАОН FARAON	1939	03.12.2024
Васильки справжні <i>Ocimum basilicum</i> L. Basil					
24464001	29.03.2024	240670	Віолет Кінг Violet King	2429	19.12.2024
24464002	29.03.2024	240671	Грін Дом Grin Dom	2429	19.12.2024
Боби турецькі (квасоля багатоквіткова) <i>Phaseolus coccineus</i> L. Multiflora Bean					
21465001	09.12.2021	240501	Оброшинська місцева Obroshynska mistseva	1658	03.12.2024
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce					
17546006	24.10.2017	191015	Турінус Thurinus	1730	02.12.2024
Дворядник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)					
17582002	15.11.2017	191004	Темісто Themisto	1730	02.12.2024
17582003	15.11.2017	191005	Синоп Sinope	1730	02.12.2024
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn					
23645001	18.08.2023	240618	PO200BX PO200WX	1688	12.12.2024
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
22909128	12.12.2022	240704	ПРЦ16ВІ ИІВ483 PRC16VI YIV483	793	20.12.2024
22909129	12.12.2022	240705	ПДД38ФФ PDD38FF	793	20.12.2024
22909130	12.12.2022	240706	КЮЛД47ФФ QLD47FF	793	20.12.2024
22909132	15.12.2022	240708	САД36ЛІ САД35ЛІ SAD36LI SAD35LI	793	20.12.2024
22909133	15.12.2022	240709	САД35ЛІ SAD35LI	793	20.12.2024
22909139	15.12.2022	240713	РЕЕ80ФФ REE80FF	793	20.12.2024
22909141	15.12.2022	240714	РИЦ74ВІ RYC74VI	793	20.12.2024
22909142	15.12.2022	240715	САД36ЛІ SAD36LI	793	20.12.2024
22909143	15.12.2022	240716	КЮВІ492 КЮВІ447 KIUVI492 KIUVI447	793	20.12.2024
22909144	16.12.2022	240717	ПРЦ23ВІ РЕЕД28ВІ PRC23VI REED28VI	793	20.12.2024
22909170	26.12.2022	240641	ЮААБ3713С UAAB3713S	1219	27.12.2024
22909171	26.12.2022	240642	ІАКС3300С IAX3300S	1219	27.12.2024
22909172	26.12.2022	240643	ГВІКС1660С GWIX1660S	1219	27.12.2024
22909174	26.12.2022	240644	ЦАФ3362С CAF3362S	1219	27.12.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
22909175	26.12.2022	240645	ГЕІКC1764	1959	27.12.2024
22909176	26.12.2022	240646	ГЕІХ1764	1219	27.12.2024
22909177	26.12.2022	240647	ГЕНА0903	1219	27.12.2024
22909178	26.12.2022	240648	ГЕНА0903	1219	27.12.2024
22909179	26.12.2022	240649	ЮАІД2042	1219	27.12.2024
23909019	17.01.2023	240718	УАІД2042	793 2649	20.12.2024
23909029	17.01.2023	240719	ЮАІД2036	793 2649	20.12.2024
23909042	03.02.2023	240720	УАІД2036	793	20.12.2024
23909043	03.02.2023	240721	ФСІД3075	793	20.12.2024
23909044	03.02.2023	240722	ФСІД3075	793	20.12.2024
23909045	03.02.2023	240723	ДБ1	793	20.12.2024
23909047	03.02.2023	240724	ДВ1	793	20.12.2024
23909054	18.08.2023	240791	АГБЦ173	1688	25.12.2024
23909056	21.08.2023	240792	АГВС173	1688	25.12.2024
23909067	18.08.2023	240793	ІВВ666	1688	25.12.2024
23909077	18.08.2023	240794	ІВВ666	1688	25.12.2024
23909078	18.08.2023	240795	РВЛ173	1688	25.12.2024
23909079	21.08.2023	240796	РВЛ173	1688	25.12.2024
23909138	28.12.2023	240797	RVL173	2548	25.12.2024
23909139	28.12.2023	240798	PBI323	2548	25.12.2024
23909148	28.12.2023	240799	PBI323	2548	25.12.2024
24909055	22.01.2024	240800	RVI441	1688	25.12.2024
24909057	22.01.2024	240801	RVI441	1688	25.12.2024
24909060	22.01.2024	240802	КЮКЮА28ВІ	1688	25.12.2024
24909065	22.01.2024	240803	QQA28VI	1688	25.12.2024
24909077	28.02.2024	240829	1ПВДГ15	3356	26.12.2024
24909078	28.02.2024	240830	1РВДГ15	3356	26.12.2024
24909079	28.02.2024	240831	1ППФС42	3356	26.12.2024
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L.					
Sunflower – parental component					
20939055	10.11.2020	240592	ЛЦ166AIP	2743	24.12.2024
22939016	11.11.2022	240593	LC166AIR	2743	24.12.2024
22939020	28.11.2022	240594	РФ1711CУ	1435	20.12.2024
22939021	28.11.2022	240595	RF1711SU	1435	20.12.2024
22939022	28.11.2022	240596	P14B34MЖІ	793	20.12.2024
22939023	28.11.2022	240597	R14WZ4MЖІ	1435	20.12.2024
22939024	28.11.2022	240598	P8035M2ЖК	1435	20.12.2024
22939025	28.11.2022	240599	R8035M2ЖК	1435	20.12.2024
			R71234MІОА	1435	20.12.2024
			L71234MІОА	1435	20.12.2024
			СФ1561M2ІА	1435	20.12.2024
			SF1561M2ІА	1435	20.12.2024
			P13CL1MІО	1435	20.12.2024
			R13SL1MІО	1435	20.12.2024
			Ф18БД3МСА	1435	20.12.2024
			F18BD3MSA		

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
22939026	08.12.2022	240600	PX766CUL RH766SUL	2267	12.12.2024
22939057	21.12.2022	240601	EX701 x MX702 EKH701 kh MKH702	2267	12.12.2024
22939058	21.12.2022	240602	PX790CUL RH790SUL	2267	12.12.2024
22939060	21.12.2022	240603	EX993 EH993	2267	12.12.2024
22939061	21.12.2022	240604	PX598 RH598	2267	12.12.2024
22939062	21.12.2022	240605	PX788 RH788	2267	12.12.2024
22939063	21.12.2022	240606	EX908 EH908	2267	12.12.2024
22939064	21.12.2022	240607	PX738CUL RH738SUL	2267	12.12.2024
22939065	26.12.2022	240653	ЮР603ЛС01 UR603LS01	1219	27.12.2024
22939066	26.12.2022	240654	ЮР408ЛН00 UR408LN00	1219	27.12.2024
22939067	26.12.2022	240655	ФА730ЛС05 FA730LS05	1219	27.12.2024
22939068	26.12.2022	240656	ФР842ЛС23 FR842LS23	1219	27.12.2024
22939069	26.12.2022	240657	ФР410ЛЗ00 FR410LZ00	1219	27.12.2024
22939070	26.12.2022	240658	ФС74221 FS74221	1219	27.12.2024
22939071	26.12.2022	240659	ФР84229 FR84229	1959	27.12.2024
22939076	28.12.2022	240663	CB 4 B SV 4 V	1265	12.12.2024
22939079	28.12.2022	240664	AP 008 B AR 008 B	1265	12.12.2024
22939086	28.12.2022	240665	AP 008 A AR 008 A	1265	12.12.2024
23939009	20.01.2023	240660	ФА718ЛС05 FA718LS05	1219	27.12.2024
23939077	28.12.2023	240804	BX 2101 B VKh 2101 V	2548	25.12.2024
23939089	28.12.2023	240805	BX 2603 A VKh 2603 A	2548	25.12.2024

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on the termination of intellectual property rights for plant varieties

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Гречка їстівна <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench Buckwheat					
10002002	140443	Надійна Nadiina	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
11002001	150208	Мальва Malva	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
07004029	110027	Остреч СВ Ostrech SV	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
07004030	110028	Смотрич МВ Smotrych MV	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
08004001	110057	Ятрань МВ Yatran' MV	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
10004290	140095	Трубіж СВ Trubizh SV	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
14009016	160379	Гідний Hidnyi	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
14009017	160380	Заїслав М Zaislav M	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
18009088	210171	КВС ГЕНДАЛЬФ KWS GANDALF	2649	31.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 31.12.2024 № 4451 (за клопотанням)
20009117	220855	КВС КАПРІЦЦІО KWS KAPRICCIO	2649	31.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 31.12.2024 № 4451 (за клопотанням)
20009120	220857	КВС АДОНІСІО KWS ADONISIO	2649	31.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 31.12.2024 № 4451 (за клопотанням)
20009121	220858	КВС ПІКАДЕРО KWS PIKADERO	2649	31.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 31.12.2024 № 4451 (за клопотанням)
20009122	220859	КВС САВАННО KWS SAVANNO	2649	31.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 31.12.2024 № 4451 (за клопотанням)
20009123	220860	КВС КАТРІНО KWS KATHRINO	2649	31.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 31.12.2024 № 4451 (за клопотанням)
20009124	220861	КВС РОЛАНДО KWS ROLANDO	2649	31.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 31.12.2024 № 4451 (за клопотанням)
20009125	220862	КВС ГАРМІНО KWS GARMINO	2649	31.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 31.12.2024 № 4451 (за клопотанням)
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
16012039	190517	Русява Rusiava	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
16012041	190518	Осяйна Osiaina	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
16012040	210289	Заотар Zaotar	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
18012023	210882	Мокоша Mokosha	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)					
17022004	211061	Фанат Fanat	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Квасоля звичайна (зернова) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean					
04087003	07544	Перлина Perlyna	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
07087005	110096	Щедра Shchedra	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed					
06094003	07412	Симпатик Sympatyk	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
10094001	120319	Оригінал Oryhinal	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
22039019	230951	П64ЛП655 P64LP655		31.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 31.12.2024 № 4451 (за клопотанням)

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
20040036	220541	Скотч Scotch	807	31.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 31.12.2024 № 4451 (за клопотанням)
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
01018003	0640	Єлена Yelena	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
97018008	0643	Київська 98 Kyivs'ka 98	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
04018010	07103	Анжеліка Anzhelika	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
07018013	120170	Вільшанка Vilshanka	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
10018016	140378	Сілесія Silesia	142	31.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 31.12.2024 № 4451 (за клопотанням)
13045020	170716	Голубка Holubka	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
14045015	170719	Переяславка Pereiaslavka	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Сурпича звичайна (озима) <i>Barbarea vulgaris</i> R. Br. Rocket-cress (Winter)					
15046001	180975	Заграва Zahrava	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover					
05052001	08357	Полісянка Polisianka	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Гростеця збірна <i>Dactylis glomerata</i> L. Cocksfoot					
05049002	130144	Українка Ukrainka	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Люпин білий <i>Lupinus albus</i> L. White Lupin					
09055002	130146	Чабанський Chabans'kyi	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Костриця лучна <i>Festuca pratensis</i> Huds. Meadow Fescue					
15204003	180925	Веста Vesta	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Пажитниця багатоквіткова <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Italian Ryegrass					
12061001	160409	Лучана Luchana	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Пажитниця багаторічна <i>Lolium perenne</i> L. Perennial Ryegrass					
05062010	10336	Мрія MRIIA	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Люпин жовтий <i>Lupinus luteus</i> L. Yellow Lupin					
10057002	150061	Агат Полісся Ahat Polissia	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
15402001	190494	Рябчик Riabchik	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Люпин вузьколистий <i>Lupinus angustifolius</i> L. Blue Lupin					
04056001	07205	Зірковий Zirkovyi	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
05056002	08352	Пелікан Pelikan	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Люцерна серповидна <i>Medicago falcata</i> L. Sickle Lucerne					
05462001	07208	Наречена Півночі Narechena Pivnochi	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
09004276	10187	УкПг 101 М UkPh 101 M	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
09004277	10188	УкПг 102 М UkPh 102 M	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
09004273	10240	Антей М Antei M	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
09004274	10241	Граніт М Hranit M	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
09004275	10242	Фортуна С Fortuna S	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
09004280	10244	Псьол М Ps`ol M	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
09004281	110190	Ук 1712 СВ Uk 1712 SV	1626	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)
09004270	110391	Ук 2 УВ Uk 2 UV	345	24.12.2024	Наказ Мінагрополітики від 24.12.2024 № 4388 (за клопотанням)

Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин
Other notifications as listed in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про погодження внесення змін» від 12.12.2024 № 21-1331-09/3135 унесено зміни щодо найменування представника та адреси для листування – «Кордіна Леся Леонідівна, вул. Житомирська,

380, м. Дніпро, 49046, тел. +38/098-239-67-91, e-mail: lesia.kordina@ukr.net» змінено на «Марченко Іванна Вікторівна, вул. Соборна, 31, смт Катеринопіль, Черкаська обл., 20501, тел. +38098-450-85-99, e-mail: marchenko_ivanna@ukr.net» щодо сортів рослин, згідно з переліком.

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
1	Соняшник однорічний	Солексіс	19039112	ТОВ «Грано Де Оро Україна»	РС, РП
2	Соняшник однорічний	Сандер	19039111	ТОВ «Грано Де Оро Україна»	РС, РП
3	Соняшник однорічний	Арсеніо	19039110	ТОВ «Грано Де Оро Україна»	РС, РП
4	Соняшник однорічний	Маттіа	21039108	ТОВ «Грано Де Оро Україна»	РС, РП
5	Соняшник однорічний	Ліон	21039106	ТОВ «Грано Де Оро Україна»	РС, РП

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 4410 від 26.12.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в

Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин щодо назв сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Запропонована нова назва сорту	Підстава
1	Кукурудза звичайна	20009139	ЕВ3077 (EV3077)	ДКС3027 (DKC3027)	клопотання від 27.11.2024 № Ext – 24/0181 представника за дорученням, Товариства з обмеженою відповідальністю «Монсанто Україна»
2	Кукурудза звичайна	20009136	ЕВ3738 (EW3738)	ВАГАС (VAGAS)	
3	Кукурудза звичайна	20009091	ЕЮ4139 (EU4139)	ІОНІТІ (IONITI)	

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 4442 від 30.12.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до

відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, стосовно сорту соняшника однорічного АЯЧЕ, щодо заявки № 20039108 – у назві сорту рослини (українською мовою та мовою заявника) слова «АЯЧЕ (AIACE)» замінити словами та літерами «АЯЧЕ СУ (AIACE SU)».

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
21009072	12.12.2024	03.11.2021	ВЕРТУАЛ VERTUAL	844	844		
21009076	12.12.2024	03.11.2021	ЕВ4931 EW4931	844	844		
21009077	12.12.2024	03.11.2021	ЕВ4150 EW4150	844	844		
21009078	12.12.2024	03.11.2021	ДКС4533 DKC4533	844	844		
21009103	12.12.2024	30.11.2021	МОГАБРІКС MOGABRIX	844	844		
21009104	12.12.2024	30.11.2021	БУКАЛО BOUCALO	844	844		
21009105	12.12.2024	30.11.2021	ДОССІАН DOSSIAN	844	844		
21009108	12.12.2024	30.11.2021	ЕВ3732 EV3732	844	844		
21009131	17.12.2024	16.12.2021	ІБАРАМА IBARAMA	2890	2890		
22009023	18.12.2024	27.01.2022	Дамір Damir	1581	1581		
22009056	30.12.2024	22.11.2022	Старді Stardi	2742	2742		
22009057	30.12.2024	22.11.2022	Солід Solid	2742	2742		
22009061	18.12.2024		П88844 P88844	2715	2715		
22009088	12.12.2024	01.12.2022	ДКС4655 DKC4655	844	844		
22009089	12.12.2024	01.12.2022	ДКС4539 DKC4539	844	844		
22009097	12.12.2024	01.12.2022	ЕІ3669 EY3669	844	844		
22009105	12.12.2024	01.12.2022	ЕХ3833 EX3833	844	844		
22009106	12.12.2024	01.12.2022	ДКС4741 DKC4741	844	844		
22009107	12.12.2024	01.12.2022	МЕДІТА MEDITIA	844	844		
22009127	18.12.2024	12.12.2022	РОМАНС ROMANCE	793	793		
22009128	18.12.2024	12.12.2022	ЛГ31380 LG31380	793	793		
22009131	18.12.2024	16.12.2022	ЛЗМ272/10 LZM272/10	793	793		
22009135	18.12.2024	16.12.2022	ЛГ30002 LG30002	793	793		
22009138	18.12.2024	16.12.2022	ЛГ31350 LG31350	793	793		
22009141	11.12.2024		СИ ФАНТАЗІЯ SY FANTASIA	2643	1219		
22009142	11.12.2024		СИ АРТОС SY ARTOS	2643	1219		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22009143	11.12.2024		СИ КОСМОС SY COSMOS	2643	1219		
22009144	11.12.2024		СИ ОЛІВІЯ SY OLIVIA	2643	1219		
22009145	23.12.2024	16.12.2022	БЕРКАНО BERCANO	793	793		
22009153	12.12.2024	14.12.2022	РЖТ СУФІККС RGT SUFFIXE	1783	1783		
22009154	12.12.2024	14.12.2022	РЖТ ПРЕТЕККСТ RGT PRETEXXTE	1783	1783		
22009163	18.12.2024	12.12.2022	ЛГЗ1365 LG31365	793	793		
22009164	12.12.2024	01.12.2022	EX2974 EKh2974	844	844		
23009002	17.12.2024	09.01.2023	ЛІД2123Ц LID2123C	2890		2890	
23009017	18.12.2024	20.02.2023	ХА Квінта KhA Kvinta	1581	1581		
24009014	26.12.2024		СЮ РАПІРОЛ SU RAPIROL	2644	1959		
24009077	23.12.2024		Альпедро Alpredro	2011	2011		
24009078	23.12.2024		Таррако Tarraco	2011		2011	
24009079	23.12.2024		Апріоло Apriolo	2011		2011	
24009080	23.12.2024		Сурінго Suringo	2011		2011	
24009081	30.12.2024	14.11.2024	ГРЕЙСТОУН GREYSTONE	2890	2890		
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
24012055	17.12.2024		Ілюмінація Illuminacja	1105	1105		
24012058	17.12.2024		Алегорія Alegoria	1105	1105		
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)							
24013004	23.12.2024		Ітака Itaka	1105	1105		
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum							
21018005	02.12.2024	15.12.2021	H2F282 BMP N2F282 BMR	1985	1985		
21018006	02.12.2024	22.12.2021	H2G234 N2G234	1985	1985		
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)							
24022003	17.12.2024	11.10.2024	Метро Metro	1105	1105		
24022005	23.12.2024		Трібуто Tributo	1105	1105		
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea							
23028002	30.12.2024	27.11.2023	Вента Venta	1669	1669		
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed							
20035001	18.12.2024	31.03.2020	Антант Antant	1658	1658		бюлетень, випуск 11, 2024
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
21039018	12.12.2024	07.04.2021	Аркона Arkona	2793	2793		
21039101	23.12.2024	22.12.2021	АПСФ77 APSF77	2440	2440		
21039112	11.12.2024	29.12.2021	Корунд Korund	1581	1581		
22039046	02.12.2024	08.12.2022	САЛАМАНКА SALAMANCA	2882	2882		
22039047	02.12.2024	08.12.2022	АРКОС ARCOS	2882	2882		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22039048	02.12.2024	14.12.2022	ЛЕРОС КЛП LEROS CLP	1783	1783		
22039049	02.12.2024	14.12.2022	БАРСЕЛЛОНА BARCELLONA	1783	1783		
22039050	23.12.2024	15.12.2022	Саяд Sayad	2843	2843		
22039052	02.12.2024	22.11.2022	Н4Х202 Е N4H202 E	1985	1985		
22039053	02.12.2024	14.12.2022	ВАЛЬКІРІЯ VALKYRIE	1783	1783		
22039054	02.12.2024	14.12.2022	ВІВАЛЛЬТО КЛП VIVALLTO CLP	1783	1783		
22039055	11.12.2024		ЖЕРОНИМО СУ GERONIMO SU	2720	2720		
22039056	11.12.2024	19.12.2022	МАС 900СУ MAS 900SU	2720	2720		
22039057	11.12.2024	19.12.2022	МАС 852СУ MAS 852SU	2720	2720		
22039060	02.12.2024	21.12.2022	ХАЙСАН182ІТ HYSUN182IT	2834	2554		
22039061	18.12.2024	26.12.2022	НЕРІДА АР NERIDA AR	2643	1219		
22039062	11.12.2024	26.12.2022	СУВОРА SUVORA	2643	1219		
22039064	11.12.2024		СУНАРІС SUNARIS	2643	1219		
22039069	23.12.2024	28.12.2022	Амарок Amarok	1265	1265		
22039074	23.12.2024	28.12.2022	Аркана Arkana	1265	1265		
22039075	23.12.2024	29.12.2022	Дайна Dayna	2843	2843		
23039011	26.12.2024	16.01.2023	ЄС Аркада YeS Arkada	2287	2287		
23039015	26.12.2024	16.01.2023	ЄС Бравус YeS Bravus	2287	2287		
23039016	26.12.2024	16.01.2023	ЄС Діксон YeS Dikson	2287	2287		
24039053	17.12.2024	22.11.2024	1021Л КЛП 1021L CLP	2890	2890		
24039054	17.12.2024	22.11.2024	ІНСАН 130 INSUN 130	2890	2890		
24039055	23.12.2024	22.11.2024	ІНСАН 355 СУ INSUN 355 SU	2890	2890		
24039056	23.12.2024	22.11.2024	ІНСАН 322 КЛП INSUN 322 CLP	2890	2890		
24039058	26.12.2024	22.11.2024	ЛІД1062Х КЛП LID1062H CLP	2890	2890		
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring)							
22041001	18.12.2024	21.12.2022	КРЕЙЗІ КЛ CRAZY CL	912	912		
22041002	18.12.2024	21.12.2022	ЛЕПОРЕЛЛО LEPORELLO	912	912		
22041003	18.12.2024	21.12.2022	Калімера КЛ Calimera CL	912	912		
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean							
21045025	12.12.2024	17.12.2021	ЛІД Едукатор LID Educator	2890	2890		
21045042	11.12.2024	30.12.2021	Світлиця Svitlytsia	1581	1581		
23045005	11.12.2024	20.02.2023	Волонтерка Volonterka	1581	1581		
23045009	02.12.2024	08.03.2023	СТАЙН 04Н32 STINE 04N32	2788	2788		
24045032	09.12.2024		Папріка Paprika	2726	2726		
24045036	17.12.2024	22.11.2024	Алгебра Algebra	1564	1564		
24045037	30.12.2024	22.11.2024	Арієтта Arietta	1564	1564		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
24045038	17.12.2024		Австралія Australia	1498	1498		
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet							
22069010	11.12.2024		БТС СМАРТ 3525	1974	1974		
22069011	11.12.2024		БТС СМАРТ 3525	1974	1974		
22069012	11.12.2024		БТС СМАРТ 1215 Н БТС СМАРТ 1215 Н БТС 8835 БТС 8835	1974	1974		
Конопля посівна <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp							
23080001	26.12.2024	16.01.2023	ЄС Джин YeS Dzhyn	2287	2287		
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato							
24088009	30.12.2024		КЕЛЛІ KELLY	2584	2584		
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant							
24093002	11.12.2024	29.03.2024	Джаз Dzhaz	2429	2429		
24093003	11.12.2024	01.04.2024	Ден Den	2429	2429		
24093004	11.12.2024	29.03.2024	Ріко Riko	2429	2429		
24093005	11.12.2024	29.03.2024	Мірінда Mirinda	2429	2429		
24093006	12.12.2024		Сара Sara	2226		2226	
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage							
24096006	11.12.2024	29.03.2024	Вірджинія Virzhyniia	2429	2429		
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn							
23103003	23.12.2024	15.02.2023	РОЗІ ROSIE	2662	2662		
23103004	23.12.2024	15.02.2023	ДРАЙВЕР Р DRIVER R	2662	2662		
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber							
24110008	18.12.2024	04.07.2024	ДВА ВЕСЕЛИХ КУМА DVA VESELYKH KUMA	3236	3236		
Перець однорічний (гіркий) <i>Capsicum annuum</i> L. Hot Pepper, Chili							
24112002	17.12.2024		Хірош Hiros	2621		2621	
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika							
24113003	11.12.2024	29.03.2024	Оранж Босс Oranzh Boss	2429	2429		
24113004	11.12.2024	29.03.2024	Ред Булл Спарк Red Bull Spark	2429	2429		
24113005	11.12.2024	29.03.2024	Стріт Strit	2429	2429		
24113006	11.12.2024	29.03.2024	Кольт Kolt	2429	2429		
24113007	11.12.2024	01.04.2024	Ліра Спарк Lira Spark	2429	2429		
24113012	17.12.2024		Сонетт Sonett	2621		2621	
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato							
24115019	11.12.2024	01.04.2024	Ельза Elsa	2429	2429		
24115020	11.12.2024	01.02.2024	Ремембе Remembe	2429	2429		
24115021	11.12.2024	01.04.2024	Джордано Dzhordano	2429	2429		
24115022	11.12.2024	01.04.2024	Єллоу Пешен Yellow Peshen	2429	2429		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
24115023	11.12.2024	01.04.2024	Блейз Bleiz	2429	2429		
24115024	11.12.2024	01.04.2024	Солідо Спарк Solido Spark	2429	2429		
24115025	11.12.2024	01.04.2024	Оранж Плам Oranzh Plam	2429	2429		
24115026	11.12.2024	01.04.2024	IC 1510 IS 1510	2429	2429		
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish							
24118006	30.12.2024		Донато Donato	2086	2086		
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill							
24125003	11.12.2024	29.03.2024	Брум Brum	2429	2429		
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach							
24130003	23.12.2024		Лізард Lizard	1730	1730		
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash							
24148009	18.12.2024	11.09.2024	Золотий Дракон Zoloty Drakon	3236	3236		
24148010	18.12.2024	11.09.2024	ТИГРЕТТО ді ІТАЛІЯ TIHRETTO di ITALIA	3236	3236		
Сорго суданське <i>Sorghum sudanense</i> (Piper.) Stapf Sudan Grass							
22227001	12.12.2024	24.01.2022	Скарб Стену Skarb Stepu	2706	2706		
Сорго цукрове <i>Sorghum saccharatum</i> (L.) Moench Sweet Sorghum							
22241001	26.12.2024	26.07.2022	Ботанічний Botanichnyi	348	348		
Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Apricot							
24256002	18.12.2024	14.10.2024	Бержерон 1 Bergeron 1	3218 3241	3218 3241		
24256003	18.12.2024	14.10.2024	Перла 1 Perla 1	3218 3241	3218 3241		
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry							
24294007	12.12.2024	04.10.2024	ФЛ 16 78 109 FL 16 78 109	2820	1282		
Півонія <i>Paeonia</i> L. Peony							
24329003	26.12.2024	16.08.2024	Квітка Ксенія Kvitka Kseniia	348	348		
Хризантема <i>Chrysanthemum</i> L. Chrysanthemum							
24337002	26.12.2024	17.05.2024	Мальвіна Malvina	348	348		
24337004	26.12.2024	17.05.2024	Циганочка Tsyganochka	348	348		
Васильки справжні <i>Ocimum basilicum</i> L. Basil							
24464001	11.12.2024	29.03.2024	Віолет Кінг Violet King	2429	2429		
24464002	11.12.2024	29.03.2024	Грін Дом Grin Dom	2429	2429		
Боби турецькі (квасоля багатоквіткова) <i>Phaseolus coccineus</i> L. Multiflora Bean							
21465001	18.12.2024	09.12.2021	Оброшинська місцева Obroshynska mistseva	1658	1658		бюлетень, випуск 11, 2024
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut							
24543001	17.12.2024		Тонда ді Джіффоні Tonda di Giffoni	2709		2709	
24543002	17.12.2024		Мортарелла Mortarella	2709		2709	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn							
22645001	11.12.2024		П0200BX P0200WX	2715	2715		
24645001	23.12.2024		MAC 440BKC MAS 440WX	2720	2720		
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula							
24680001	26.12.2024	01.08.2024	Сутінки Sutinky	348	348		
24680002	26.12.2024	01.08.2024	Вишиванка Yyshyvanka	348	348		
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
21909026	18.12.2024	01.02.2021	Харківська 341 3М Kharkivska 341 ZM	1581	1581		
21909125	12.12.2024	03.11.2021	M77673 M7767Z	844	844		
21909126	12.12.2024	03.11.2021	ДЖ96563 J9656Z	844	844		
21909127	12.12.2024	03.11.2021	B53993 V5399Z	844	844		
21909128	12.12.2024	03.11.2021	ДЖ25263 J2526Z	844	844		
21909129	12.12.2024	03.11.2021	B00273 V0027Z	844	844		
21909131	12.12.2024	03.11.2021	ВЛ3483 WL348Z	844	844		
21909137	23.12.2024		ЛНР3494 ЛОН3752 LNR3494 LON3752	2720	2720		
21909156	12.12.2024	29.11.2021	B27993 V2799Z	844	844		
21909158	12.12.2024	29.11.2021	ДЖ72143 J7214Z	844	844		
21909159	12.12.2024	29.11.2021	T08343 T0834Z	844	844		
21909160	12.12.2024	29.11.2021	T49053 T4905Z	844	844		
21909161	12.12.2024	01.12.2021	ДЖ28753 J2875Z	844	844		
21909207	23.12.2024	28.12.2021	ЕГ7Ц11 EG7C11	2890	2890		
21909209	17.12.2024	28.12.2021	ЕГ7Б84 EG7B84	2890	2890		
22909083	30.12.2024	22.11.2022	B 831 CB V 831 SV	2742	2742		
22909084	30.12.2024	22.11.2022	B 510 зс V 510 zs	2742	2742		
22909085	30.12.2024	22.11.2022	B 66 V 66	2742	2742		
22909086	30.12.2024	22.11.2022	B 510 с V 510 s	2742	2742		
22909087	30.12.2024	22.11.2022	B 138 V 138	2742	2742		
22909088	12.12.2024	01.12.2022	A46013 A4601Z	844	844		
22909089	12.12.2024	01.12.2022	ДЖ24313 J2431Z	844	844		
22909090	12.12.2024	01.12.2022	B30083 V3008Z	844	844		
22909091	12.12.2024	01.12.2022	B14823 V1482Z	844	844		
22909092	12.12.2024	01.12.2022	B63863 6386Z	844	844		
22909093	12.12.2024	01.12.2022	ДЖ24903ХЛБЗ J2490ZHLBZ	844	844		
22909094	12.12.2024	01.12.2022	ДЖ85233 J8523Z	844	844		
22909095	12.12.2024	01.12.2022	A45673ХІВЗ A4567ZXIWZ	844	844		
22909096	12.12.2024	01.12.2022	Ф15873 F1587Z	844	844		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22909097	12.12.2024	01.12.2022	M84583XIB3	844	844		
22909098	12.12.2024	10.11.2022	M84582XIWZ	844	844		
22909100	12.12.2024	01.12.2022	M85823XA13	844	844		
22909101	12.12.2024	01.12.2022	M8582ZXAIZ	844	844		
22909102	12.12.2024	01.12.2022	B93653XLB3	844	844		
22909104	12.12.2024	01.12.2022	V9365ZHLBZ	844	844		
22909110	12.12.2024	01.12.2022	B67263XLB3	844	844		
22909113	12.12.2024	01.12.2022	V6726ZHLBZ	844	844		
22909114	12.12.2024	01.12.2022	ДЖ39723XLB3	844	844		
22909115	12.12.2024	01.12.2022	J3972ZHLBZ	844	844		
22909128	18.12.2024	12.12.2022	B79203XLB3	844	844		
22909129	18.12.2024	12.12.2022	V7920ZHLBZ	844	844		
22909131	12.12.2024	14.12.2022	M79613XIB3	844	844		
22909132	18.12.2024	15.12.2022	M7961ZXIWZ	844	844		
22909133	18.12.2024	15.12.2022	ДЖ09303	844	844		
22909134	12.12.2024	14.12.2022	J0930Z	844	844		
22909135	12.12.2024	14.12.2022	B12093	844	844		
22909136	12.12.2024	14.12.2022	V1209Z	844	844		
22909141	18.12.2024	15.12.2022	ДЖ08963	844	844		
22909142	18.12.2024	15.12.2022	J0896Z	844	844		
22909143	18.12.2024	15.12.2022	ПРЦ16ВІ ІІВ483	793	793		
22909144	18.12.2024	16.12.2022	PRC16VI YIV483	793	793		
22909148	23.12.2024	19.12.2022	ПДД38ФФ	793	793		
22909156	23.12.2024		PDD38FF	793	793		
22909170	02.12.2024	26.12.2022	R16077	1783	1783		
22909171	02.12.2024	26.12.2022	САД36ЛІ САД35ЛІ	793	793		
22909172	02.12.2024	26.12.2022	SAD36LI SAD35LI	793	793		
22909174	02.12.2024	26.12.2022	САД35ЛІ	793	793		
22909175	02.12.2024	26.12.2022	SAD35LI	793	793		
22909176	02.12.2024	26.12.2022	R16033	1783	1783		
22909177	02.12.2024	26.12.2022	R16033	1783	1783		
22909178	02.12.2024	26.12.2022	P15078ЦМС	1783	1783		
22909179	02.12.2024	26.12.2022	R15078CMS	1783	1783		
22909205	12.12.2024	01.12.2022	R12010CMC	1783	1783		
23909029	18.12.2024	17.01.2023	R12010SMS	1783	1783		
23909049	18.12.2024	20.02.2023	РИЦ74ВІ	793	793		
			RYC74VI	793	793		
			САД36ЛІ	793	793		
			SAD36LI	793	793		
			КЮВІ492 КЮВІ447	793	793		
			KIUVI492 KIUVI447	793	793		
			ПРЦ23ВІ РЕЕД28ВІ	793	793		
			PRC23VI REED28VI	793	793		
			ЛРР6404	2720	2720		
			LRR6404	2720	2720		
			СМС6466 ЛОН3752	2720	2720		
			CMS6466 LON3752	2720	2720		
			ЮААБ3713С	2643	1219		
			UAAAB3713S	2643	1219		
			ІАКС3300С	2643	1219		
			IAKX3300S	2643	1219		
			ГВІКС1660С	2643	1219		
			GWIX1660S	2643	1219		
			ЦАФ3362С	2643	1219		
			CAF3362S	2643	1219		
			ГЕІКС1764	2644	1959		
			GEIX1764	2643	1219		
			ГЕНА0903	2643	1219		
			GENA0903	2643	1219		
			ЮАІД2042	2643	1219		
			UAID2042	2643	1219		
			ЮАІД2036	2643	1219		
			UAID2036	2643	1219		
			ФСІД3075	2643	1219		
			FSID3075	2643	1219		
			А03473	844	844		
			A0347Z	844	844		
			АГБЦ173	793 2649	793 2649		
			AGBC173	793 2649	793 2649		
			ХА 1821 MB	1581	1581		
			KhA 1821 MV	1581	1581		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
23909087	12.12.2024	20.11.2023	P20021	1783	1783		
23909088	12.12.2024	20.11.2023	R20021				
			P19009	1783	1783		
			R19009				
23909138	18.12.2024	28.12.2023	BK 1001	2548	2548		
			VK 1001				
23909139	18.12.2024	28.12.2023	BK 4001	2548	2548		
			VK 4001				
23909148	18.12.2024	28.12.2023	BK 2001	2548	2548		
			VK 2001				
24909077	18.12.2024	28.02.2024	ПС 50 Сст	3356	3356		
			PS 50 Sst				
24909078	18.12.2024	28.02.2024	ПС 53 СВ	3356	3356		
			PS 53 SV				
24909079	18.12.2024	28.02.2024	ПС 52 СВ	3356	3356		
			PS 52 SV				
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L.							
Sunflower – parental component							
20939055	11.12.2024	10.11.2020	ЛЦ166AIP	2743	2743		
			LC166AIR				
20939130	23.12.2024	18.12.2020	211CU	2440	2440		
			211SU				
20939150	12.12.2024		PX529	2267	2267		
			RH529				
20939152	12.12.2024		B96	2267	2267		
			B96				
20939154	12.12.2024		EX820	2267	2267		
			EH820				
21939016	11.12.2024	08.02.2021	X 66 Б	1581	1581		
			Kh 66 B				
21939088	17.12.2024	17.12.2021	P9017МЖ	1435	1435		
			R9017MJ				
21939099	17.12.2024	17.12.2021	Ф9А38МЖА	1435	1435		
			F9AZ8MJA				
21939104	17.12.2024	17.12.2021	P14И32М	1435	1435		
			R14YZ2M				
21939110	23.12.2024	22.12.2021	PXA470	2440	2440		
			RHA470				
22939016	11.12.2024	11.11.2022	РФ1711CU	2743	2743		
			RF1711SU				
22939021	12.12.2024	28.11.2022	P8035M2ЖК	1435	1435		
			R8035M2JK				
22939025	12.12.2024	28.11.2022	Ф18БД3МСА	1435	1435		
			F18BD3MSA				
22939026	12.12.2024	08.12.2022	PX766CУЛ	2267	2267		
			RH766SUL				
22939046	12.12.2024	14.12.2022	AT2721	1783	1783		
			AT2721				
22939053	12.12.2024	14.12.2022	PT7821	1783	1783		
			RT7821				
22939054	12.12.2024	14.12.2022	PT7721	1783	1783		
			RT7721				
22939057	12.12.2024	21.12.2022	EX701 x MX702	2267	2267		
			EKh701 kh MKh702				
22939058	12.12.2024	21.12.2022	PX790CУЛ	2267	2267		
			RH790SUL				
22939059	11.12.2024	19.12.2022	TPC5570P	2720	2720		бюлетень, випуск 11, 2024
			TRS5570R				
22939060	12.12.2024	21.12.2022	EX993	2267	2267		
			EH993				
22939061	12.12.2024	21.12.2022	PX598	2267	2267		
			RH598				
22939062	12.12.2024	21.12.2022	PX788	2267	2267		
			RH788				
22939063	12.12.2024	21.12.2022	EX908	2267	2267		
			EH908				
22939064	12.12.2024	21.12.2022	PX738CУЛ	2267	2267		
			RH738SUL				
22939065	02.12.2024	26.12.2022	ЮР603ЛC01	2643	1219		
			UR603LS01				
22939066	02.12.2024	26.12.2022	ЮР408ЛH00	2643	1219		
			UR408LN00				

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22939067	02.12.2024	26.12.2022	ФА730ЛС05	2643	1219		
22939068	02.12.2024	26.12.2022	ФА730ЛС05	2643	1219		
22939069	02.12.2024	26.12.2022	ФР842ЛС23	2643	1219		
22939070	02.12.2024	26.12.2022	ФР842ЛС23	2643	1219		
22939071	02.12.2024	26.12.2022	ФР410ЛЗ00	2644	1959		
22939076	23.12.2024	28.12.2022	ФР410ЛЗ00	1265	1265		
22939079	23.12.2024	28.12.2022	ФС74221	1265	1265		
22939086	23.12.2024	28.12.2022	FS74221	1265	1265		
23939001	23.12.2024	06.01.2023	ФР84229	2440	2440		
23939002	23.12.2024	06.01.2023	СВ 4 В	2440	2440		
23939009	02.12.2024	20.01.2023	SV 4 V	2643	1219		
23939017	26.12.2024	19.06.2023	АР 008 Б	2287	2287		
23939018	26.12.2024	19.06.2023	АР 008 В	2287	2287		
23939019	26.12.2024	22.06.2023	АР 008 А	2287	2287		
23939043	26.12.2024	06.11.2023	АР 008 А	2287	2287		
23939044	26.12.2024	06.11.2023	422PIMI	2287	2287		
23939045	26.12.2024	06.11.2023	422RIMI	2287	2287		
23939046	30.12.2024	06.11.2023	П991Р	2287	2287		
23939047	26.12.2024	06.11.2023	Р991R	2287	2287		
23939048	26.12.2024	06.11.2023	ФА718ЛС05	2287	2287		
23939049	26.12.2024	06.11.2023	ФА718ЛС05	2287	2287		
23939053	12.12.2024	23.11.2023	ЕС 421	2287	2287		
23939075	17.12.2024	28.12.2023	YeS 421	2287	2287		
23939077	18.12.2024	28.12.2023	ЕС 522	2287	2287		
23939089	18.12.2024	28.12.2023	YeS 522	2287	2287		
			ЕС 121	2287	2287		
			YeS 121	2287	2287		
			ЕС-211	2287	2287		
			YeS-211	2287	2287		
			ЕС-312	2287	2287		
			YeS-312	2287	2287		
			ЕС-212	2287	2287		
			YeS-212	2287	2287		
			ЕС-311	2287	2287		
			YeS-311	2287	2287		
			ЕС-521	2287	2287		
			YeS-521	2287	2287		
			ЕС-422	2287	2287		
			YeS-422	2287	2287		
			ЕС-122	2287	2287		
			YeS-122	2287	2287		
			АТ3717	1783	1783		
			АТ3717	1435	1435		
			Р4НА1МЖО	2548	2548		
			R4NA1MJO	2548	2548		
			ВХ 2101 В	2548	2548		
			VKh 2101 V	2548	2548		
			ВХ 2603 А				
			VKh 2603 A				

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Apricot					
24256002	14.10.2024	240932	Бержерон 1 Bergeron 1	3241	24.12.2024
24256003	14.10.2024	240933	Перла 1 Perla 1	3218	24.12.2024
24256003	14.10.2024	240933	Перла 1 Perla 1	3241	24.12.2024
24256002	14.10.2024	240932	Бержерон 1 Bergeron 1	3218	24.12.2024
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant					
24093002	29.03.2024	240799	Джаз Dzhaz	2429	19.12.2024
24093003	01.04.2024	240800	Ден Den	2429	19.12.2024
24093004	29.03.2024	240801	Ріко Riko	2429	19.12.2024
24093005	29.03.2024	240802	Мірінда Mirinda	2429	19.12.2024
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
22069012	27.12.2022	240805	БТС 8835 BTS 8835	1974	20.12.2024
22069010	27.12.2022	240803	БТС СМАРТ 3525 BTS SMART 3525	1974	24.12.2024
22069011	27.12.2022	240804	БТС СМАРТ 1215 Н BTS SMART 1215 N	1974	20.12.2024
Васильки справжні <i>Ocimum basilicum</i> L. Basil					
24464001	29.03.2024	240806	Віолет Кінг Violet King	2429	19.12.2024
24464002	29.03.2024	240807	Грін Дом Grin Dom	2429	19.12.2024
Гарбуз великоплідний <i>Cucurbita maxima</i> Duch. Pumpkin					
20455002	30.12.2020	240686	ФАРАОН FARAON	1939	03.12.2024
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash,					
20228003	30.12.2020	240687	Світанок Svitanok	1939	03.12.2024
Горох посівний (озимий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea (Winter)					
24559001	24.09.2024	240573	ФЕРО FEROE	912	20.12.2024
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
20147004	30.12.2020	240688	ПІСНЯ PISNIA	1939	03.12.2024
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash					
24148009	11.09.2024	240935	Золотий Дракон Zoloty Drakon	3236	26.12.2024
24148010	11.09.2024	240936	ТИГРЕТТО ді ІТАЛІЯ TIHRETTO di ITALIA	3236	26.12.2024
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
20146017	30.12.2020	240689	ОКСАМІТ OKSAMYT	1939	03.12.2024
21146007	18.11.2021	240694	РОМАН ROMAN	1219	27.12.2024
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
24096006	29.03.2024	240808	Вірджинія Virzhyniia	2429	19.12.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower					
23101001	03.01.2023	240695	TATUIN TATUIN	1219	27.12.2024
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill					
24125003	29.03.2024	240809	Брум Brum	2429	19.12.2024
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn					
22645001	20.11.2022	240810	P0200BX P0200WX	2715	25.12.2024
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
22009144	26.12.2022	240814	СИ ОЛІВІЯ SY OLIVIA	1219	27.12.2024
22009153	14.12.2022	240854	РЖТ СУФІККС RGT SUFFIXXE	1783	19.12.2024
24009069	08.10.2024	240633	ІНВІТЕЙШН INVITATION	793	20.12.2024
22009143	26.12.2022	240813	СИ КОСМОС SY COSMOS	1219	27.12.2024
22009142	26.12.2022	240812	СИ АРТОС SY ARTOS	1219	27.12.2024
22009141	26.12.2022	240811	СИ ФАНТАЗІЯ SY FANTASIA	1219	27.12.2024
22009061	30.11.2022	240938	П88844 P88844	2715	24.12.2024
21009131	16.12.2021	240916	ІБАРАМА IBARAMA	2890	27.12.2024
22009154	14.12.2022	240855	РЖТ ПРЕТЕККСТ RGT PRETEXTE	1783	19.12.2024
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
23909138	28.12.2023	240957	ВК 1001 VK 1001	2548	25.12.2024
22909179	26.12.2022	240778	ФСІД3075 FSID3075	1219	27.12.2024
22909178	26.12.2022	240777	ЮАІД2036 UAID2036	1219	27.12.2024
23909087	20.11.2023	240892	P20021 R20021	1783	19.12.2024
23909088	20.11.2023	240893	P19009 R19009	1783	19.12.2024
23909139	28.12.2023	240958	ВК 4001 VK 4001	2548	25.12.2024
23909148	28.12.2023	240959	ВК 2001 VK 2001	2548	25.12.2024
21909209	28.12.2021	240918	ЕГ7Б84 EG7B84	2890	27.12.2024
24909077	28.02.2024	240960	ПС 50 Сст PS 50 Sst	3356	26.12.2024
24909079	28.02.2024	240962	ПС 52 СВ PS 52 SV	3356	26.12.2024
22909177	26.12.2022	240776	ЮАІД2042 UAID2042	1219	27.12.2024
24909078	28.02.2024	240961	ПС 53 СВ PS 53 SV	3356	26.12.2024
22909175	26.12.2022	240774	ГЕІКС1764 GEIX1764	1959	27.12.2024
22909174	26.12.2022	240773	ЦАФ3362С CAF3362S	1219	27.12.2024
22909172	26.12.2022	240772	ГВІКС1660С GWIX1660S	1219	27.12.2024
22909171	26.12.2022	240771	ІАКС3300С IAX3300S	1219	27.12.2024
22909170	26.12.2022	240770	ЮААБ3713С UAAB3713S	1219	27.12.2024
22909136	14.12.2022	240890	P12010СМС R12010SMS	1783	19.12.2024
22909135	14.12.2022	240889	P15078ЦМС R15078CMS	1783	19.12.2024
22909131	14.12.2022	240887	P16077 R16077	1783	19.12.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
19909055	22.01.2019	240681	ПХ4376 РН4376	2715	12.12.2024
22909176	26.12.2022	240775	ГЕНА0903 GENA0903	1219	27.12.2024
22909134	14.12.2022	240888	Р16033 R16033	1783	19.12.2024
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
24110008	04.07.2024	240964	ДВА ВЕСЕЛИХ КУМА DVA VESELYKH KUMA	3236	26.12.2024
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika					
24113003	29.03.2024	240815	Оранж Босс Oranzh Boss	2429	19.12.2024
24113009	07.08.2024	240525	Бравія Bravia	1730	02.12.2024
24113007	01.04.2024	240819	Ліра Спарк Lira Spark	2429	19.12.2024
24113006	29.03.2024	240818	Кольт Kolt	2429	19.12.2024
24113004	29.03.2024	240816	Ред Булл Спарк Red Bull Spark	2429	19.12.2024
24113005	29.03.2024	240817	Стріт Strit	2429	19.12.2024
Підщепи сливи <i>Prunus</i> L. Plum Rootstocks					
24588002	04.10.2024	240683	ВанКло WanClo	3218	16.12.2024
24588002	04.10.2024	240683	ВанКло WanClo	3241	16.12.2024
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
24115026	01.04.2024	240827	ІС 1510 IS 1510	2429	19.12.2024
22115017	28.10.2022	240644	Філікса Filiksa	1730	02.12.2024
24115019	01.04.2024	240820	Ельза Elsa	2429	19.12.2024
24115020	01.04.2024	240821	Ремембе Remembe	2429	19.12.2024
24115021	01.04.2024	240822	Джордано Dzhordano	2429	19.12.2024
24115022	01.04.2024	240823	Еллоу Пешен Yellow Peshen	2429	19.12.2024
24115023	01.04.2024	240824	Блейз Bleiz	2429	19.12.2024
24115024	01.04.2024	240825	Солідо Спарк Solido Spark	2429	19.12.2024
24115028	03.07.2024	240449	Хроміс Chromis	1730	02.12.2024
24115032	27.08.2024	240701	Редсонні Redsonny	1730	02.12.2024
24115025	01.04.2024	240826	Оранж Плам Oranzh Plam	2429	19.12.2024
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
24012062	21.10.2024	240661	ЗУ КВІЗ SU QUIZ	1223	20.12.2024
22012042	28.07.2022	240537	Вальтер Walther	2552	04.12.2024
22012043	28.07.2022	240538	Хаптер Khapter	2552	04.12.2024
22012044	28.07.2022	240539	Інвіктус Invictus	2552	04.12.2024
22012045	28.07.2022	240540	Валлонія Valloniia	2552	04.12.2024
24012048	16.09.2024	240558	Мошус Moschus	2552	04.12.2024
24012061	21.10.2024	240660	ЗУ МАРАФОН SU MARATHON	1223	20.12.2024
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
24040015	10.05.2024	240650	КРОКАНТ CROCANT	912	20.12.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring)					
22041002	21.12.2022	240966	ЛЕПОРЕЛЛО LEPORELLO	912	20.12.2024
22041003	21.12.2022	240967	Калімера КЛ Calimera CL	912	20.12.2024
22041001	21.12.2022	240965	КРЕЙЗИ КЛ CRAZY CL	912	20.12.2024
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
22039062	26.12.2022	240832	СУВОРА SUVORA	1219	27.12.2024
22039061	26.12.2022	240968	НЕРІДА АР NERIDA AR	1219	27.12.2024
24039054	22.11.2024	240924	ІНСАН 130 INSUN 130	2890	27.12.2024
24039053	22.11.2024	240923	1021Л КЛП 1021L CLP	2890	27.12.2024
24039043	07.11.2024	240718	Скайлайн Skyline	2715	12.12.2024
24039042	07.11.2024	240717	Рокетт Roquette	2715	12.12.2024
24039041	07.11.2024	240716	Мендоза Mendoza	2715	12.12.2024
22039047	08.12.2022	240780	АРКОС ARCOS	2882	16.12.2024
22039060	21.12.2022	240786	ХАЙСАН182ІТ HYSUN182IT	2554	17.12.2024
22039046	08.12.2022	240779	САЛАМАНКА SALAMANCA	2882	16.12.2024
22039054	14.12.2022	240785	ВІВАЛЛЬТО КЛП VIVALLTO CLP	1783	19.12.2024
22039053	14.12.2022	240784	ВАЛЬКІРІЯ VALKYRIE	1783	19.12.2024
22039049	14.12.2022	240782	БАРСЕЛЛОНА BARCELLONA	1783	19.12.2024
22039048	14.12.2022	240781	ЛЕРОС КЛП LEROS CLP	1783	19.12.2024
22039064	26.12.2022	240833	СУНАРІС SUNARIS	1219	27.12.2024
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
22939067	26.12.2022	240789	ФА730ЛС05 FA730LS05	1219	27.12.2024
22939066	26.12.2022	240788	ЮР408ЛН00 UR408LN00	1219	27.12.2024
22939065	26.12.2022	240787	ЮР603ЛС01 UR603LS01	1219	27.12.2024
22939068	26.12.2022	240790	ФР842ЛС23 FR842LS23	1219	27.12.2024
22939063	21.12.2022	240909	ЕХ908 EH908	2267	19.12.2024
23939009	20.01.2023	240794	ФА718ЛС05 FA718LS05	1219	27.12.2024
22939062	21.12.2022	240908	РХ788 RH788	2267	19.12.2024
22939064	21.12.2022	240910	РХ738СУЛ RH738SUL	2267	19.12.2024
23939089	28.12.2023	240970	ВХ 2603 А VKh 2603 A	2548	25.12.2024
22939069	26.12.2022	240791	ФР410ЛЗ00 FR410LZ00	1219	27.12.2024
22939071	26.12.2022	240793	ФР84229 FR84229	1959	27.12.2024
21939103	17.12.2021	240700	Р5ПЕ4М2К R5PE4M2K	1435	27.12.2024
23939053	23.11.2023	240911	АТ3717 AT3717	1783	19.12.2024
23939075	28.12.2023	240928	Р4НА1МЖ0 R4NA1MJO	1435	27.12.2024
23939077	28.12.2023	240969	ВХ 2101 В VKh 2101 V	2548	25.12.2024
22939061	21.12.2022	240907	РХ598 RH598	2267	19.12.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
22939070	26.12.2022	240792	ФС74221	1219	27.12.2024
20939152	29.12.2020	240896	FS74221	2267	19.12.2024
22939016	11.11.2022	240836	B96	2743	24.12.2024
20939150	28.12.2020	240895	B96	2267	19.12.2024
22939060	21.12.2022	240906	РФ1711СУ	2267	19.12.2024
20939154	29.12.2020	240897	RF1711SU	2267	19.12.2024
21939088	17.12.2021	240925	PX529	1435	27.12.2024
21939099	17.12.2021	240926	RH529	1435	27.12.2024
21939104	17.12.2021	240927	EX993	1435	27.12.2024
22939025	28.11.2022	240899	EH993	1435	20.12.2024
22939026	08.12.2022	240900	EX820	2267	19.12.2024
22939046	14.12.2022	240901	EH820	1783	19.12.2024
22939053	14.12.2022	240902	P9017МЖ	1783	19.12.2024
22939054	14.12.2022	240903	R9017MJ	1783	19.12.2024
22939058	21.12.2022	240905	Ф9А38МЖА	2267	19.12.2024
22939021	28.11.2022	240898	F9A28MJA	1435	20.12.2024
20939055	10.11.2020	240834	P14I32M	2743	24.12.2024
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
21045025	17.12.2021	240913	Р14YZ2М	2890	27.12.2024
24045038	22.11.2024	240930	R14YZ2M	1498	24.12.2024
24045036	22.11.2024	240929	Ф18БД3МСА	1564	24.12.2024
23045009	08.03.2023	240797	F18BD3MSA	2788	16.12.2024
23045002	24.01.2023	240768	PX766СУЛ	2715	12.12.2024
22045007	12.01.2022	240766	RH766SUL	2715	12.12.2024
23045001	23.01.2023	240767	AT2721	2715	12.12.2024
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry					
24294007	04.10.2024	240914	AT2721	1282	24.12.2024
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose					
24339003	22.07.2024	240647	РТ7821	2690	26.12.2024
24339004	22.07.2024	240648	RT7821	2690	26.12.2024
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
22020011	09.11.2022	240685	Р14I32М	1669	16.12.2024
			R14I32M		

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати

Information on issued certificates of authorship for plant varieties and their duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
21020001	16.01.2021	240363	Ельф Elf	Важенина Ольга Євгенівна Vazhenina Olha Ievhenivna	04.12.2024
21020001	16.01.2021	240363	Ельф Elf	Васько Наталія Іванівна Vasko Nataliia Ivanivna	04.12.2024
21020001	16.01.2021	240363	Ельф Elf	Козаченко Михайло Романович Kozachenko Mykhailo Romanovych	04.12.2024
21020001	16.01.2021	240363	Ельф Elf	Наумов Олексій Германович Naumov Olexsii Hermanovych	04.12.2024
21020001	16.01.2021	240363	Ельф Elf	Солонечний Павло Миколайович Solonechnyi Pavlo Mykolaiovych	04.12.2024
22020011	09.11.2022	240430	Рагнар Rahnar	Нежбірська Людмила Іванівна Nezhbirska Liudmyla Ivanivna	16.12.2024
22020011	09.11.2022	240430	Рагнар Rahnar	Дорошук Василь Олексійович Doroshchuk Vasyl Olexsiiovych	16.12.2024
22020011	09.11.2022	240430	Рагнар Rahnar	Маренюк Олександр Борисович Marenjuk Olexsandr Borysovych	16.12.2024
22020011	09.11.2022	240430	Рагнар Rahnar	Смолій Світлана Іванівна Smolii Svitlana Ivanivna	16.12.2024
22020011	09.11.2022	240430	Рагнар Rahnar	Корнійчук Олександр Васильович Korniichuk Olexsandr Vasylovych	16.12.2024
23020002	20.02.2023	240364	Гордій Hordii	Солонечний Павло Миколайович Solonechnyi Pavlo Mykolaiovych	04.12.2024
23020002	20.02.2023	240364	Гордій Hordii	Васько Наталія Іванівна Vasko Nataliia Ivanivna	04.12.2024
23020002	20.02.2023	240364	Гордій Hordii	Зимогляд Олексій Вікторович Zymohliad Olexsii Viktorovych	04.12.2024
23020002	20.02.2023	240364	Гордій Hordii	Наумов Олексій Германович Naumov Olexsii Hermanovych	04.12.2024
23020002	20.02.2023	240364	Гордій Hordii	Козаченко Михайло Романович Kozachenko Mykhailo Romanovych	04.12.2024
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
21045001	04.01.2021	230296	Господиня Hospodynia	Шелякін Віктор Олексійович Sheliakin Viktor Olexsiiovych	04.12.2024
21045001	04.01.2021	230296	Господиня Hospodynia	Безугла Ольга Миколаївна Bezuhla Olha Mykolaivna	04.12.2024
21045001	04.01.2021	230296	Господиня Hospodynia	Рябуха Сергій Станіславович Riabukha Serhii Stanislavovych	04.12.2024
21045001	04.01.2021	230296	Господиня Hospodynia	Чернишенко Павло Володимирович Chernyshenko Pavlo Volodymyrovych	04.12.2024
Хміль звичайний <i>Humulus lupulus</i> L. Hop					
23072001	17.11.2023	240294	Витязь Vytiaz	Юрківський Йосип Михайлович Yurkivskiy Iosyp Mykhailovych	11.12.2024
23072001	17.11.2023	240294	Витязь Vytiaz	Цибульський Василь Олексійович Tsybul'skyy Vasyl Olexsiiovych	11.12.2024
23072001	17.11.2023	240294	Витязь Vytiaz	Ляшенко Микола Іванович Liashenko Mykola Ivanovych	11.12.2024
23072001	17.11.2023	240294	Витязь Vytiaz	Проценко Лідія Василівна Protsenko Lidiia Vasylivna	11.12.2024
23072001	17.11.2023	240294	Витязь Vytiaz	Ратошнюк Віктор Іванович Ratoshniuk Viktor Ivanovych	11.12.2024
23072001	17.11.2023	240294	Витязь Vytiaz	Кошицька Ніна Анатоліївна Koshytska Nina Anatoliivna	11.12.2024
23072001	17.11.2023	240294	Витязь Vytiaz	Фурлет Володимир Іванович Furlet Volodymyr Ivanovych	11.12.2024
23072001	17.11.2023	240294	Витязь Vytiaz	Козлова Ірина Василівна Kozlova Iryna Vasylivna	11.12.2024
Аніс звичайний <i>Anisum vulgare</i> Gaertn. Anise					
23092001	27.10.2023	240370	Маяк 50 Maiak 50	Тризуб Зоя Анатоліївна Tryzub Zoia Anatoliivna	07.12.2024
23092001	27.10.2023	240370	Маяк 50 Maiak 50	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	07.12.2024
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
20146017	30.12.2020	240419	ОКСАМИТ OKSAMYT	Палінчак Оксана Володимирівна Palinchak Oksana Volodymyrivna	12.12.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
20146017	30.12.2020	240419	ОКСАМИТ OKSAMYT	Заверталиук Володимир Філімонович Zavertaliuk Volodymyr Filimonovych	12.12.2024
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
20147004	30.12.2020	240418	ПІСНЯ PISNIA	Палінчак Оксана Володимирівна Palinchak Oksana Volodymyrivna	12.12.2024
20147004	30.12.2020	240418	ПІСНЯ PISNIA	Заверталиук Володимир Філімонович Zavertaliuk Volodymyr Filimonovych	12.12.2024
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin					
20228003	30.12.2020	240416	Світанок Svitanok	Заверталиук Володимир Філімонович Zavertaliuk Volodymyr Filimonovych	12.12.2024
Тритикале (яре) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Spring)					
21288003	30.12.2021	240362	Свобода харківська Svoboda kharkivska	Щеченко Ольга Євгенівна Shchchenko Olha Yevheniivna	04.12.2024
21288003	30.12.2021	240362	Свобода харківська Svoboda kharkivska	Капустіна Тетяна Борисівна Kapustina Tetiana Borysivna	04.12.2024
21288003	30.12.2021	240362	Свобода харківська Svoboda kharkivska	Мельник Віра Сергіївна Melnyk Vira Serhiivna	04.12.2024
21288003	30.12.2021	240362	Свобода харківська Svoboda kharkivska	Чернобай Сергій Володимирович Chernobai Serhii Volodymyrovych	04.12.2024
21288003	30.12.2021	240362	Свобода харківська Svoboda kharkivska	Рябчун Віктор Кузьмич Riabchun Viktor Kuzmych	04.12.2024
Смикавець їстівний (чуфа) <i>Cyperus esculentus</i> L. Hufo Sedge, Nut Grass, Yellow Nutsedge					
23347001	27.10.2023	240374	Екватор Ekvator	Тризуб Зоя Анатоліївна Tryzub Zoia Anatoliivna	07.12.2024
23347001	27.10.2023	240374	Екватор Ekvator	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	07.12.2024
Вівсяний корінь <i>Tragopogon porrifolium</i> L. Salsify					
23391001	27.10.2023	240371	Прометей Prometei	Тризуб Зоя Анатоліївна Tryzub Zoia Anatoliivna	07.12.2024
23391001	27.10.2023	240371	Прометей Prometei	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	07.12.2024
Скорзонера іспанська <i>Scorzonera hispanica</i> L. Black Salsify, Scorzonera					
23392001	27.10.2023	240373	Сила Syla	Тризуб Зоя Анатоліївна Tryzub Zoia Anatoliivna	04.12.2024
23392001	27.10.2023	240373	Сила Syla	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.12.2024
Гарбуз великоплідний <i>Cucurbita maxima</i> Duch. Pumpkin					
20455002	30.12.2020	240415	ФАРАОН FARAON	Заверталиук Володимир Філімонович Zavertaliuk Volodymyr Filimonovych	12.12.2024

Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту

Information on the termination of the validity of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Гречка їстівна <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench Buckwheat					
10002002	04.04.2014	24.12.2024	Надійна Nadiina	1626	1626
11002001	05.02.2015	24.12.2024	Мальва Malva	1626	1626
83002003	01.01.1987	24.12.2024	Лілея Lileia	345	1626
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
07004029	30.11.2010	24.12.2024	Остреч СВ Ostrech SV	345	1626
07004030	30.11.2010	24.12.2024	Смотрич МВ Smotrych MV	345	1626
08004001	30.11.2010	24.12.2024	Ятрань МВ Yatran` MV	345	1626
10004290	04.04.2014	24.12.2024	Трубіж СВ Trubizh SV	1626	1626
14009016	01.03.2016	24.12.2024	Гідний Hidnyi	1626	1626
14009017	01.03.2016	24.12.2024	Заїслав М Zaislav M	1626	1626
18009088	15.12.2020	31.12.2024	КВС ГЕНДАЛЬФ KWS GANDALF	2649	2649
20009117	14.12.2022	31.12.2024	КВС КАПРИЦЦІО KWS KAPRICCIO	2649	2649
20009120	14.12.2022	31.12.2024	КВС АДОНІСІО KWS ADONISIO	2649	2649
20009121	14.12.2022	31.12.2024	КВС ПІКАДЕРО KWS PIKADERO	2649	2649
20009122	14.12.2022	31.12.2024	КВС САВАННО KWS SAVANNO	2649	2649
20009123	14.12.2022	31.12.2024	КВС КАТРИНО KWS KATHRINO	2649	2649
20009124	14.12.2022	31.12.2024	КВС РОЛАНДО KWS ROLANDO	2649	2649
20009125	14.12.2022	31.12.2024	КВС ГАРМІНО KWS GARMINO	2649	2649
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
01007003	01.01.2005	24.12.2024	Столична Stolychna	345	1626
16012039	05.12.2018	24.12.2024	Русява Rusiava	1626	1626
16012041	05.12.2018	24.12.2024	Осяйна Osiaina	1626	1626
Просо посівне <i>Panicum miliaceum</i> L. Common Millet					
00006003	26.12.2003	24.12.2024	Новокиївське 01 Novokyivs`ke 01	345	1626
Квасоля звичайна (зернова) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean					
04087003	01.01.2006	24.12.2024	Перлина Perlyna	345	1626
07087005	30.11.2010	24.12.2024	Щедра Shchedra	345	1626
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed					
06094003	11.01.2007	24.12.2024	Симпатик Sympatyk	345	1626
10094001	15.05.2012	24.12.2024	Оригінал Oryhinal	345	1626
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
02016008	01.01.2006	24.12.2024	Сенатор Люкс Senator Liuks	345	1626
02016009	01.01.2006	24.12.2024	Чемпіон України Chempion Ukrainy	345	1626
17040046	11.11.2019	31.12.2024	Принц Prince	807	807

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
20040036	02.09.2022	31.12.2024	Скотч Scotch	807	807
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
01018003	26.12.2003	24.12.2024	Єлена Yelena	345	1626
04018010	11.01.2007	24.12.2024	Анжеліка Anzhelika	345	1626
07018013	20.12.2011	24.12.2024	Вільшанка Vilshanka	345	1626
10018016	01.04.2014	31.12.2024	Сілесія Silesia	142	142
13045020	22.03.2017	24.12.2024	Голубка Holubka	1626	1626
14045015	22.03.2017	24.12.2024	Переяславка Pereiaslavka	1626	1626
97018008	01.01.2001	24.12.2024	Київська 98 Kyivs'ka 98	345	1626
Суріпиця звичайна (озима) <i>Barbarea vulgaris</i> R. Br. Rocket-cress (Winter)					
15046001	05.05.2018	24.12.2024	Заграва Zahrava	1626	1626
Льон звичайний, довгунець <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax, Linseed					
97015001	01.01.2000	24.12.2024	Рушничок Rushnychok	345	1626
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover					
05052001	15.01.2010	24.12.2024	Полісянка Polisiianka	345	1626
92052001	01.01.1996	24.12.2024	Поліс Polis	345	1626
Грястиця збірна <i>Dactylis glomerata</i> L. Cocksfoot					
05049002	01.01.2009	24.12.2024	Українка Ukrainka	337	1626
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne					
82058002	01.01.1987	24.12.2024	Ярославна Yaroslavna	345	1626
89058004	01.01.1997	24.12.2024	Роксолана Roksolana	345	1626
94058001	01.01.2000	24.12.2024	Ольга Ol'ha	345	1626
Люпин білий <i>Lupinus albus</i> L. White Lupin					
09055002	22.04.2013	24.12.2024	Чабанський Chabans'kyi	345	1626
94055001	01.01.1998	24.12.2024	Володимир Volodymyr	345	1626
99055001	12.02.2003	24.12.2024	Вересневий Veresnevyi	345	1626
Костриця лучна <i>Festuca pratensis</i> Huds. Meadow Fescue					
15204003	05.05.2018	24.12.2024	Веста Vesta	1626	1626
Костриця очеретяна <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. Tall Fescue					
00109001	20.01.2001	24.12.2024	Доменіка Domenika	337	1626
05109001	01.01.2006	31.12.2024	Меандре Meandre	600	807
15205001	26.05.2017	31.12.2024	Томагавк Tomahawk	807	807
Пажитниця багатоквітова <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Italian Ryegrass					
12061001	01.03.2016	24.12.2024	Лучана Luchana	1626	1626
Пажитниця багаторічна <i>Lolium perenne</i> L. Perennial Ryegrass					
05062010	15.01.2010	24.12.2024	Мрія MRIIA	345	1626

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Тимофіївка лучна <i>Phleum pratense</i> L. Timothy					
94068003	20.01.2001	24.12.2024	Вишгородська Vyshhorods`ka	337	1626
Костриця червона <i>Festuca rubra</i> L. Red Fescue, Creeping Fescue					
00111001	20.01.2001	24.12.2024	Богданка Bohdanka	337	1626
Люпин жовтий <i>Lupinus luteus</i> L. Yellow Lupin					
01057001	26.12.2003	24.12.2024	Бурштин Burshtyn	345	1626
10057002	31.03.2015	24.12.2024	Арат Полісся Ahat Polissia	1626	1626
15402001	11.02.2019	24.12.2024	Рябчик Riabchyk	1626	1626
Люпин вузьколистий <i>Lupinus angustifolius</i> L. Blue Lupin					
04056001	01.01.2005	24.12.2024	Зірковий Zirkovyi	345	1626
05056002	23.01.2008	24.12.2024	Пелікан Pelikan	345	1626
Люцерна серповидна <i>Medicago falcata</i> L. Sickle Lucerne					
05462001	11.01.2007	24.12.2024	Наречена Півночі Narechena Pivnochi	345	1626
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
09004273	29.03.2010	24.12.2024	Антей М Antei M	345	1626
09004274	29.03.2010	24.12.2024	Граніт М Hranit M	345	1626
09004275	05.03.2010	24.12.2024	Фортуна С Fortuna S	345	1626
09004276	05.03.2010	24.12.2024	УкПр 101 М UkPh 101 M	345	1626
09004277	05.03.2010	24.12.2024	УкПр 102 М UkPh 102 M	345	1626
09004280	29.03.2010	24.12.2024	Псьол М Ps`ol M	345	1626
09004281	28.12.2010	24.12.2024	Ук 1712 СВ Uk 1712 SV	345	1626

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про погодження внесення змін» від 12.12.2024 № 21-1331-09/3135 унесено зміни щодо найменування представника та адреси для листування – «Кордіна Леся Леонідівна, вул. Житомирська,

380, м. Дніпро, 49046, тел. +38/098-239-67-91, e-mail: lesia.kordina@ukr.net» змінено на «Марченко Іванна Вікторівна, вул. Соборна, 31, смт Катеринопіль, Черкаська обл., 20501, тел. +38098-450-85-99, e-mail: marchenko_ivanna@ukr.net» щодо сортів рослин, згідно з переліком.

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
1	Соняшник однорічний	Солексіс	19039112	ТОВ «Грано Де Оро Україна»	РС, РП
2	Соняшник однорічний	Сандер	19039111	ТОВ «Грано Де Оро Україна»	РС, РП
3	Соняшник однорічний	Арсеніо	19039110	ТОВ «Грано Де Оро Україна»	РС, РП
4	Соняшник однорічний	Маттіа	21039108	ТОВ «Грано Де Оро Україна»	РС, РП
5	Соняшник однорічний	Ліон	21039106	ТОВ «Грано Де Оро Україна»	РС, РП

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 4410 від 26.12.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Украї-

ні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо назв сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Запропонована нова назва сорту	Підстава
1	Кукурудза звичайна	20009139	ЕВ3077 (EV3077)	ДКС3027 (DKC3027)	клопотання від 27.11.2024 № Ext – 24/0181
2	Кукурудза звичайна	20009136	ЕВ3738 (EW3738)	ВАГАС (VAGAS)	представника за дорученням, Товариства з обмеженою відповідальністю «Монсанта Україна»
3	Кукурудза звичайна	20009091	ЕЮ4139 (EU4139)	ІОНІТІ (IONITI)	

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 4442 від 30.12.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що міс-

тяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сорту соняшника однорічного АЯЧЕ, щодо заявки № 20039108 – у назві сорту рослини (українською мовою та мовою заявника) слова «АЯЧЕ (AIACE)» замінити словами та літерами «АЯЧЕ СУ (AIACE SU)».

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
24012055	Ілюмінація <i>Illuminacija / Iluminacija</i>		1105	1105			2024				
24012058	Алегорія <i>Alegoria / Alegoria</i>		1105	1105			2024				
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
24013004	Ітака <i>Itaka / Itaka</i>		1105	1105			2024				
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter) (<i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus; x <i>Triticale</i> ; x <i>Triticosecale</i> Wittmack)											
24022003	Метро <i>Metro / Metro</i>	C3	1105	1105			2024				
24022005	Трібуто <i>Tributo / Tributo</i>	C3	1105	1105			2024				
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn (<i>Zea americana</i> ; <i>Zea alba</i> ; <i>Zea vulgaris</i> Mill.; <i>Mays zea</i> Gaertn; <i>Zea segetalis</i> Salisb.; <i>Mays americana</i> Baumg.; <i>Thalasia mays</i> O. Kuntze.)											
® 21009077	ЕВ4150 <i>EW4150 / EW4150</i>	F1	844	844	844		2024	СЛП	зерн	сс	
22009023	Дамір <i>Damir / Damir</i>		1581	1581			2024	П	зерн	ср	
® 21009072	ВЕРТУАЛ <i>VERTUAL / VERTUAL</i>	F1	844	844	844		2024	П	зерн	ср	
® 21009076	ЕВ4931 <i>EW4931 / EW4931</i>	F1	844	844	844		2024	СЛ	зерн	сп	
® 21009078	ДК4533 <i>DKC4533 / DKC4533</i>	F1	844	844	844		2024	ЛП	зерн	сс	
® 22009056	Старді <i>Stardi / Stardi</i>	F1	2742	2742	2742		2024	СЛП	зерн	ср	
® 22009057	Солід <i>Solid / Solid</i>	F1	2742	2742	2742		2024	ЛП	зерн	ср	
® 22009088	ДК4655 <i>DKC4655 / DKC4655</i>	F1	844	844	844		2024	СП	зерн	сс	
® 22009127	РОМАНС <i>ROMANCE / ROMANCE</i>	F1	793	793	793		2024	СП	зерн	ср	
® 22009128	ЛГ31380 <i>LG31380 / LG31380</i>	F1	793	793	793		2024	ЛП	зерн	сс	
22009141	СИ ФАНТАЗІЯ <i>SY FANTASIA / SY FANTASIA</i>	F1	2643	1219			2024	П	зерн	ср	
22009144	СИ ОЛІВІЯ <i>SY OLIVIA / SY OLIVIA</i>	F1	2643	1219			2024	СЛП	зерн	ср	
23009002	ЛІД2123С <i>LID2123C / LID2123C</i>	F1	2890			2890	2024				
® 22009131	ЛЗМ272/10 <i>LZM272/10 / LZM272/10</i>	F1	793	793	793		2024	ЛП	зерн	ср	
21009131	ІБАРАМА <i>IBARAMA / IBARAMA</i>	F1	2890	2890			2024				
23009017	ХА Квінта <i>KhA Kvinta / KhA Kvinta</i>	F1	1581	1581			2024	П	зерн	рс	
® 22009163	ЛГ31365 <i>LG31365 / LG31365</i>	F1	793	793	793		2024	ЛП	зерн	сс	
® 22009164	ЕХ2974 <i>EX2974 / EXh2974</i>	F1	844	844	844		2024	СП	зерн	рс	

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
24009014	СЮ РАПІРОЛ SU RAPIROL / SU RAPIROL	F1	2644	1959			2024				
22009061	П88844 P88844 / P88844	F1	2715	2715			2024	П	зерн	сс	
® 22009097	ЕІ3669 EY3669 / EY3669	F1	844	844	844		2024	СЛП	зерн	ср	
® 22009106	ДКС4741 DKC4741 / DKC4741	F1	844	844	844		2024	СЛП	зерн	сс	
® 22009105	ЕХ3833 EX3833 / EX3833	F1	844	844	844		2024	СЛП	зерн	ср	
® 22009135	ЛГ30002 LG30002 / LG30002	C3	793	793	793		2024	С	зерн	ср	
22009142	СИ АРТОС SY ARTOS / SY ARTOS	F1	2643	1219			2024	ЛП	зерн	сс	
22009143	СИ КОСМОС SY COSMOS / SY COSMOS	F1	2643	1219			2024	СЛП	зерн	рс	
® 22009153	РЖТ СУФІККС RGT SUFFIXXE / RGT SUFFIXXE	F1	1783	1783	1783		2024	П	зерн	сс	
® 22009154	РЖТ ПРЕТЕХХТ RGT PRETEXTE / RGT PRETEXTE	F1	1783	1783	1783		2024	П	зерн	сс	
® 22009145	БЕРКАНО BERCANO / BERCANO	F1	793	793	793		2024	ЛП	зерн	сс	
® 22009138	ЛГ31350 LG31350 / LG31350	F1	793	793	793		2024	П	зерн	сс	
® 22009089	ДКС4539 DKC4539 / DKC4539	F1	844	844	844		2024	ЛП	зерн	сс	
® 22009107	МЕДІТА MEDITIA / MEDITIA	F1	844	844	844		2024	СП	зерн	ср	
24009077	Альпедро Alpedro / Alpedro	F1	2011	2011			2024				
24009080	Сурінго Suringo / Suringo	F1	2011			2011	2024	СЛП			
® 21009103	МОГАБРІКС MOGABRIX / MOGABRIX		844	844	844		2024	ЛП	зерн	сс	
24009081	ГРЕЙСТОУН GREYSTONE / GREYSTONE		2890	2890			2024				
24009078	Таррако Tarraco / Tarraco		2011			2011	2024				
® 21009104	БУКАЛО BOUCALO / BOUCALO		844	844	844		2024	ЛП	зерн	сс	
24009079	Апріоло Apriolo / Apriolo		2011			2011	2024				
® 21009105	ДОССІАН DOSSIAN / DOSSIAN		844	844	844		2024	СП	зерн	ср	
® 21009108	ЕВ3732 EV3732 / EV3732		844	844	844		2024	П	зерн	ср	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component											
® 21909126	ДЖ9656З J9656Z / J9656Z	C3	844	844	844		2024				
® 21909128	ДЖ2526З J2526Z / J2526Z	C3	844	844	844		2024				
® 21909129	В0027З V0027Z / V0027Z	C3	844	844	844		2024				
® 21909131	ВЛ348З WL348Z / WL348Z	F1	844	844	844		2024				
® 21909125	М7767З M7767Z / M7767Z	C3	844	844	844		2024				
® 21909127	В5399З V5399Z / V5399Z	C3	844	844	844		2024				
® 22909083	В 831 СВ B 831 CB / V 831 SV	C3	2742	2742	2742		2024				
® 22909092	В6386З V6386Z / V6386Z	C3	844	844	844		2024				
® 22909110	М7961ЗХІВЗ M7961ZXIWZ / M7961ZXIWZ		844	844	844		2024				
® 22909101	В6726ЗХЛБЗ V6726ZHLBZ / V6726ZHLBZ		844	844	844		2024				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
22909128	ПРЦ16ВІ ІІВ483 PRC16VI YIV483 / PRC16VI YIV483	F1	793	793	793		2024				
22909132	САД36ЛІ САД35ЛІ SAD36LI SAD35LI / SAD36LI SAD35LI	F1	793	793	793		2024				
22909143	КЮВІ492 КЮВІ447 QVI492 QVI447 / KIUVI492 KIUVI447	F1	793	793	793		2024				
22909142	САД36ЛІ SAD36LI / SAD36LI	C3	793	793	793		2024				
22909176	ГЕНА0903 GENA0903 / GENA0903	C3	2643	1219	1219		2024				
22909141	РІЦ74ВІ RYC74VI / RYC74VI	C3	793	793	793		2024				
23909029	АГБЦ173 AGBC173 / AGBC173	C3	793 2649	793 2649	793 2649		2024				
22909135	Р15078ЦМС R15078CMS / R15078CMS	C3	1783	1783	1783		2024				
22909136	Р12010СМС R12010SMS / R12010SMS	C3	1783	1783	1783		2024				
22909129	ПДД38ФФ PDD38FF / PDD38FF	C3	793	793	793		2024				
21909207	ЕГ7Ц11 EG7C11 / EG7C11	C3	2890	2890			2024				
23909049	ХА 1821 МВ XA 1821 MB / KhA 1821 MV	C3	1581	1581			2024				
22909170	УААБ3713С UAAAB3713S / UAAAB3713S	C3	2643	1219	1219		2024				
21909209	ЕГ7Б84 EG7B84 / EG7B84	C3	2890	2890			2024				
22909133	САД35ЛІ SAD35LI / SAD35LI	C3	793	793	793		2024				
22909131	Р16077 R16077 / R16077	C3	1783	1783	1783		2024				
22909205	А0347З A0347Z / A0347Z	C3	844	844	844		2024				
22909171	ІАКС3300С IAX3300S / IAX3300S	C3	2643	1219	1219		2024				
22909172	ГВІКС1660С GWIX1660S / GWIX1660S	C3	2643	1219	1219		2024				
22909174	ЦАФ3362С CAF3362S / CAF3362S	C3	2643	1219	1219		2024				
23909088	Р19009 R19009 / R19009	C3	1783	1783	1783		2024				
23909138	ВК 1001 VK 1001 / VK 1001	C3	2548	2548	2548		2024				
24909077	ПС 50 Сст PS 50 Sst / PS 50 Sst	F1	3356	3356	3356		2024				
21909026	Харківська 341 ЗМ Kharkivska 341 ZM / Kharkivska 341 ZM	C3	1581	1581	1581		2024				
23909139	ВК 4001 VK 4001 / VK 4001	C3	2548	2548	2548		2024				
24909079	ПС 52 СВ PS 52 SV / PS 52 SV	C3	3356	3356	3356		2024				
21909137	ЛНР3494 ЛОН3752 LNR3494 LON3752 / LNR3494 LON3752	F1	2720	2720			2024				
22909084	В 510 зс V 510 zs / V 510 zs	C3	2742	2742	2742		2024				
22909089	ДЖ2431З J2431Z / J2431Z	C3	844	844	844		2024				
22909098	М8582ЗХАІЗ M8582ZXAIZ / M8582ZXAIZ		844	844	844		2024				
22909100	В9365ЗНЛБЗ V9365ZHLBZ / V9365ZHLBZ		844	844	844		2024				
22909104	В7920ЗНЛБЗ V7920ZHLBZ / V7920ZHLBZ		844	844	844		2024				
22909088	А4601З A4601Z / A4601Z	C3	844	844	844		2024				
22909144	ПРЦ23ВІ РЕЕД28ВІ PRC23VI REED28VI / PRC23VI REED28VI	F1	793	793	793		2024				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
® 22909148	LPP6404 LRR6404 / LRR6404	C3	2720	2720	2720		2024				
® 22909177	ЮАІД2042 UAID2042 / UAID2042	C3	2643	1219	1219		2024				
® 22909178	ЮАІД2036 UAID2036 / UAID2036	C3	2643	1219	1219		2024				
® 22909085	B 66 B 66 / V 66	C3	2742	2742	2742		2024				
® 22909086	B 510 c B 510 c / V 510 s		2742	2742	2742		2024				
® 22909102	ДЖ39723ХЛБЗ J3972ZHLBZ / J3972ZHLBZ		844	844	844		2024				
® 23909148	БК 2001 BK 2001 / VK 2001	C3	2548	2548	2548		2024				
® 22909097	M84583XIB3 M8458ZXIWZ / M8458ZXIWZ		844	844	844		2024				
® 22909095	A45673XIB3 A4567ZXIWZ / A4567ZXIWZ		844	844	844		2024				
® 22909096	Ф1587З F1587Z / F1587Z	C3	844	844	844		2024				
® 22909094	ДЖ8523З J8523Z / J8523Z	C3	844	844	844		2024				
® 22909093	ДЖ24903ХЛБЗ J2490ZHLBZ / J2490ZHLBZ		844	844	844		2024				
® 24909078	ПС 53 СВ PS 53 SV / PS 53 SV	C3	3356	3356	3356		2024				
® 22909087	B 138 B 138 / V 138	C3	2742	2742	2742		2024				
® 22909090	B30083 V3008Z / V3008Z	C3	844	844	844		2024				
® 22909091	B14823 V1482Z / V1482Z	C3	844	844	844		2024				
22909156	СМС6466 ЛОН3752 CMS6466 LON3752 / CMS6466 LON3752	F1	2720	2720			2024				
® 22909175	ГЕІК1764 GEIX1764 / GEIX1764	C3	2644	1959	1959		2024				
® 22909179	ФСІД3075 FSID3075 / FSID3075	C3	2643	1219	1219		2024				
® 22909134	P16033 R16033 / R16033	C3	1783	1783	1783		2024				
® 23909087	P20021 R20021 / R20021		1783	1783	1783		2024				
® 21909156	B27993 V2799Z / V2799Z		844	844	844		2024				
21909161	ДЖ2875З J2875Z / J2875Z		844	844			2024				
® 21909159	T08343 T0834Z / T0834Z		844	844	844		2024				
® 21909160	T49053 T4905Z / T4905Z		844	844	844		2024				
® 22909115	ДЖ0896З J0896Z / J0896Z		844	844	844		2024				
® 22909114	B12093 V1209Z / V1209Z		844	844	844		2024				
® 21909158	ДЖ7214З J7214Z / J7214Z		844	844	844		2024				
® 22909113	ДЖ0930З J0930Z / J0930Z		844	844	844		2024				
Кукурудза восковида <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn (<i>Zea mays</i> L. subsp. <i>mays</i>; <i>Zea mays</i> subsp. <i>amylacea</i> (Sturtev.) Zhuk.; <i>Zea mays</i> var. <i>indentata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey; <i>Zea mays</i> var. <i>indurata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey; <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey)											
22645001	П0200ВХ P0200WX / P0200WX	F1	2715	2715			2024	СЛП	ун		
24645001	МАС 440ВКС MAS 440BKC / MAS 440WX		2720	2720			2024	СЛП			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: бобові Agricultural: Field pulse Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea (<i>Cicer grossum</i> Salisb.; <i>Cicer sativum</i> Schkuhr; <i>Cicer physodes</i> Rchb.; <i>Cicer rotundum</i> Jord.; <i>Cicer sintensii</i> Hausskn.; <i>Cicer edessanum</i> Stapf.)											
23028002	Вента <i>Venta / Venta</i>	C3	1669	1669			2024				
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean (<i>Glycine max</i> (L.) Merrill; <i>Glycine hispida</i> var. <i>lutea</i> Skvortsov; <i>Glycine soja</i> (L.) Merr.; <i>Glycine hispida</i> var. <i>brunnea</i> Skvortsov; <i>Glycine gracilis</i> Skvortsov; <i>Phaseolus max</i> L.; <i>Dolichos soja</i> L.; <i>Soja hispida</i> Moench; <i>Phaseolus sordilis</i> Salisb.; <i>Soja japonica</i> Savi; <i>Soja angustifolia</i> Miq.; <i>Glycine tabacina</i> ; <i>Glycine tomentosa</i> Benth.; <i>Glycine hispida</i> (Moench) Maxim.; <i>Soja soja</i> Karst.; <i>Soja max</i> Piper)											
21045042	Світлиця <i>Svitlytsia / Svitlytsia</i>	C3	1581	1581	1581		2024	ЛП	зерн	рс	сбіл, сл
23045005	Волонтерка <i>Volonterka / Volonterka</i>	C3	1581	1581	1581		2024	Л	зерн	рс	сбіл, сл
23045009	СТАЙН 04Н32 <i>STINE 04N32 / STINE 04N32</i>	C3	2788	2788	2788		2024	СЛП	зерн	рс	сбіл, вл
21045025	ЛІД Едукатор <i>LID Educator / LID Educator</i>	C3	2890	2890	2890		2024	ЛП	зерн	сс	сбіл, вл
24045036	Алгебра <i>Algebra / Algebra</i>		1564	1564			2024				
24045037	Аріетта <i>Arietta / Arietta</i>		1564	1564			2024				
24045038	Австралія <i>Australia / Australia</i>		1498	1498			2024				
24045032	Папrika <i>Paprika / Paprika</i>		2726	2726			2024				
Сільськогосподарські: круп'яні Agricultural: Field groats Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench; <i>Holcus sorghum</i> ; <i>Holcus bicolor</i> L.; <i>Holcus arduini</i> Gmel.; <i>Andropogon bicolor</i> Roxb.; <i>Andropogon halepensis</i> var. <i>bicolor</i> Vined et Druce.)											
21018006	Н2Г234 <i>N2G234 / N2G234</i>	F1	1985	1985			2024				
21018005	Н2Ф282 БМР <i>N2F282 BMR / N2F282 BMR</i>	F1	1985	1985			2024				
Сільськогосподарські: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalus</i> ; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
21039112	Корунд <i>Korund / Korund</i>	F1	1581	1581	1581		2024	С	олн	рс	сл
21039018	Аркона <i>Arkona / Arkona</i>	F1	2793	2793			2024	С	олн	рс	сл
21039101	АПСФ77 <i>APSF77 / APSF77</i>	F1	2440	2440	2440		2024	С	олн	ср	
22039054	ВІВАЛЛТО КЛП <i>VIVALLTO CLP / VIVALLTO CLP</i>	F1	1783	1783	1783		2024	СЛ	олн	рс	вл
22039064	СУНАРИС <i>SUNARIS / SUNARIS</i>	F1	2643	1219			2024	С	олн	рс	сл
22039056	MAC 900CY <i>MAS 900SU / MAS 900SU</i>	F1	2720	2720			2024	СЛ	олн	рс	
22039057	MAC 852CY <i>MAS 852SU / MAS 852SU</i>	C3	2720	2720			2024	СЛ	олн	ср	
23039015	ЄС Бравус <i>ЄС Бравус / YeS Bravus</i>	F1	2287	2287	2287		2024	СЛ	олн	сс	
22039075	Дайна <i>Dayna / Dayna</i>	F1	2843	2843	2843		2024	СЛ	олн	ср	сл
22039074	Аркана <i>Arkana / Arkana</i>	F1	1265	1265	1265		2024	Л	олн	ср	сл
22039060	ХАЙСАН182ІТ <i>HYSUN182IT / HYSUN182IT</i>	F1	2834	2554	2554		2024	С	олн	ср	
22039053	ВАЛЬКІРІЯ <i>VALKYRIE / VALKYRIE</i>	F1	1783	1783	1783		2024	С	олн	рс	сл

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
® 22039048	ЛЕРОС КЛП LEROS CLP / LEROS CLP	F1	1783	1783	1783		2024	СЛ	олн	ср	
22039061	НЕРІДА АР NERIDA AR / NERIDA AR	F1	2643	1219			2024	СЛ	олн	ср	сл
® 22039047	АРКОС ARCOS / ARCOS	F1	2882	2882	2882		2024	С	олн	ср	
® 23039011	ЄС Аркада ЄС Аркада / YeS Arkada	F1	2287	2287	2287		2024	Л	олн	ср	сл
22039052	Н4Х202 Е N4H202 E / N4H202 E	F1	1985	1985			2024	СЛ	ВОЛ	рс	вл
® 22039046	САЛАМАНКА SALAMANCA / SALAMANCA	C3	2882	2882	2882		2024	С	олн	ср	
® 22039049	БАРСЕЛЛОНА BARCELLONA / BARCELLONA	F1	1783	1783	1783		2024	СЛ	олн	рс	вл
22039055	ЖЕРОНИМО СУ GERONIMO SU / GERONIMO SU	F1	2720	2720			2024	С	олн	рс	
22039062	СУВОРА SUVORA / SUVORA	F1	2643	1219			2024	СЛ	олн	ср	вл
® 22039069	Амарок Амарок / Amarok	F1	1265	1265	1265		2024	С	олн	сс	сл
® 22039050	Саяд Sayad / Sayad	F1	2843	2843	2843		2024	С	олн	ср	сл
® 23039016	ЄС Діксон ЄС Діксон / YeS Dikson	F1	2287	2287	2287		2024	С	олн	ср	сл
24039053	1021Л КЛП 1021L CLP / 1021L CLP		2890	2890			2024	СЛП			
24039055	ІНСАН 355 СУ INSUN 355 SU / INSUN 355 SU		2890	2890			2024				
24039058	ЛІД1062Х КЛП LID1062H CLP / LID1062H CLP		2890	2890			2024				
24039056	ІНСАН 322 КЛП INSUN 322 CLP / INSUN 322 CLP		2890	2890			2024				
24039054	ІНСАН 130 INSUN 130 / INSUN 130		2890	2890			2024				
Соняшник однорічний – батьківський компонент Sunflower – parental component <i>Helianthus annuus</i> L. (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> ; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
® 21939016	Х 66 Б Х 66 Б / Kh 66 B		1581	1581	1581		2024				
20939154	ЕХ820 EH820 / EH820	C3	2267	2267			2024				
® 21939110	РХА470 RHA470 / RHA470	C3	2440	2440	2440		2024				
® 20939130	211СУ 211SU / 211SU	C3	2440	2440	2440		2024				
20939150	РХ529 RH529 / RH529	C3	2267	2267			2024				
20939152	В96 B96 / B96	C3	2267	2267			2024				
® 22939025	Ф18БД3МСА F18BD3MSA / F18BD3MSA	C3	1435	1435	1435		2024				
® 22939016	РФ1711СУ RF1711SU / RF1711SU	C3	2743	2743	2743		2024				
® 22939058	РХ790СУЛ RH790SUL / RH790SUL	C3	2267	2267	2267		2024				
® 22939059	ТРС557ОР TRS557OR / TRS557OR	C3	2720	2720	2720		2024				
® 23939001	422РІМІ 422RIMI / 422RIMI	C3	2440	2440	2440		2024				
® 23939009	ФА718ЛСО5 FA718LSO5 / FA718LSO5	C3	2643	1219	1219		2024				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
® 23939002	<i>P991P</i> <i>P991R / P991R</i>	C3	2440	2440	2440		2024				
® 22939071	<i>ФР84229</i> <i>FR84229 / FR84229</i>	C3	2644	1959	1959		2024				
® 23939043	<i>ЄС-211</i> <i>EC-211 / YeS-211</i>	C3	2287	2287	2287		2024				
® 23939048	<i>ЄС-422</i> <i>EC-422 / YeS-422</i>	C3	2287	2287	2287		2024				
® 23939045	<i>ЄС-212</i> <i>EC-212 / YeS-212</i>	C3	2287	2287	2287		2024				
® 23939046	<i>ЄС-311</i> <i>EC-311 / YeS-311</i>	C3	2287	2287	2287		2024				
® 23939044	<i>ЄС-312</i> <i>EC-312 / YeS-312</i>	C3	2287	2287	2287		2024				
® 22939070	<i>ФС74221</i> <i>FS74221 / FS74221</i>	C3	2643	1219	1219		2024				
® 22939065	<i>ЮР603ЛС01</i> <i>UR603LS01 / UR603LS01</i>	C3	2643	1219	1219		2024				
21939088	<i>P9017МЖ</i> <i>R9017MJ / R9017MJ</i>	C3	1435	1435			2024				
® 23939018	<i>ЄС 522</i> <i>EC 522 / YeS 522</i>	C3	2287	2287	2287		2024				
® 23939019	<i>ЄС 121</i> <i>EC 121 / YeS 121</i>	C3	2287	2287	2287		2024				
® 23939047	<i>ЄС-521</i> <i>EC-521 / YeS-521</i>	C3	2287	2287	2287		2024				
23939075	<i>P4HA1МЖО</i> <i>R4NA1MJ0 / R4NA1MJ0</i>	C3	1435	1435			2024				
® 23939077	<i>BX 2101 B</i> <i>BX 2101 B / VKh 2101 V</i>	C3	2548	2548	2548		2024				
® 23939089	<i>BX 2603 A</i> <i>BX 2603 A / VKh 2603 A</i>		2548	2548	2548		2024				
® 20939055	<i>ЛЦ166AIR</i> <i>LC166AIR / LC166AIR</i>	C3	2743	2743	2743		2024				
® 22939046	<i>AT2721</i> <i>AT2721 / AT2721</i>	C3	1783	1783	1783		2024				
® 22939053	<i>РТ7821</i> <i>RT7821 / RT7821</i>	C3	1783	1783	1783		2024				
® 22939054	<i>РТ7721</i> <i>RT7721 / RT7721</i>	C3	1783	1783	1783		2024				
® 22939076	<i>CB 4 B</i> <i>CB 4 B / SV 4 V</i>	C3	1265	1265	1265		2024				
® 22939086	<i>AP 008 A</i> <i>AP 008 A / AR 008 A</i>	F1	1265	1265	1265		2024				
® 22939079	<i>AP 008 Б</i> <i>AP 008 B / AR 008 B</i>	F1	1265	1265	1265		2024				
® 22939021	<i>P8035М2ЖК</i> <i>R8035M2JK / R8035M2JK</i>	C3	1435	1435	1435		2024				
® 23939017	<i>ЄС 421</i> <i>EC 421 / YeS 421</i>	C3	2287	2287	2287		2024				
® 22939066	<i>ЮР408ЛН00</i> <i>UR408LN00 / UR408LN00</i>	C3	2643	1219	1219		2024				
® 22939026	<i>PX766CVЛ</i> <i>RH766SUL / RH766SUL</i>	C3	2267	2267	2267		2024				
® 22939057	<i>EX701 x MX702</i> <i>EH701 x MH702 / EK701 kh MKh702</i>	C3	2267	2267	2267		2024				
® 22939060	<i>EX993</i> <i>EH993 / EH993</i>	C3	2267	2267	2267		2024				
® 22939061	<i>PX598</i> <i>RH598 / RH598</i>	C3	2267	2267	2267		2024				
® 22939062	<i>PX788</i> <i>RH788 / RH788</i>	C3	2267	2267	2267		2024				
® 22939063	<i>EX908</i> <i>EH908 / EH908</i>	C3	2267	2267	2267		2024				
® 22939064	<i>PX738CVЛ</i> <i>RH738SUL / RH738SUL</i>	C3	2267	2267	2267		2024				
® 22939069	<i>ФР410Л300</i> <i>FR410LZ00 / FR410LZ00</i>		2643	1219	1219		2024				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
© 23939049	EC-122 EC-122 / YeS-122		2287	2287	2287		2024				
21939104	P14I32M R14YZ2M / R14YZ2M		1435	1435	2024						
© 22939067	ФА730ЛС05 FA730LS05 / FA730LS05		2643	1219	1219		2024				
21939099	Ф9А38МЖА F9AZ8MJA / F9AZ8MJA		1435	1435	2024						
© 22939068	ФР842ЛС23 FR842LS23 / FR842LS23		2643	1219	1219		2024				
23939053	АТ3717 AT3717 / AT3717		1783	1783	2024						
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring) (<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. emend. Metzg. ssp. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk; <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica oleifera</i> Moench.; <i>Brassica oleifera</i> Delile; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>napus</i> Briquet.)											
© 22041001	КРЕЙЗІ КЛ CRAZY CL / CRAZY CL	F1	912	912	912		2024				
© 22041003	Калімера КЛ Calimera CL / Calimera CL	F1	912	912	912		2024				
© 22041002	ЛЕПОРЕЛЛО LEPORELLO / LEPORELLO	F1	912	912	912		2024				
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed (<i>Proles brevimulticaula</i> Vav. et Ell)											
© 20035001	Антант Antant / Antant	C3	1658	1658	1658		2024	ЛП	н		
Конопля посівні <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp (<i>Cannabis chinensis</i> Delile; <i>Cannabis erratica</i> Siev.; <i>Cannabis foetens</i> Gilib.; <i>Cannabis lupulus</i> Scop.; <i>Cannabis macrosperma</i> Stokes; <i>Cannabis gigantea</i> Hort.)											
© 23080001	ЄС Джин ЄС Джин / YeS Dzhyn	C3	2287	2287	2287		2024	СЛП	н		
Сільськогосподарські: буряк Agricultural: Beet Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet (<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>europaea</i> convar. <i>saccharifera</i> (Alef.) Krass.; <i>Beta vulgaris</i> provar. <i>altissima</i> Doll.; <i>Beta alba</i> Langenthal.; <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>saccharifera</i> Alef.)											
22069010	БТС СМАРТ 3525 BTS SMART 3525 / BTS SMART 3525	F1	1974	1974			2024				
22069011	БТС СМАРТ 1215 Н BTS SMART 1215 N / BTS SMART 1215 N	F1	1974	1974			2024				
22069012	БТС 8835 BTS 8835 / BTS 8835	F1	1974	1974			2024				
Сільськогосподарські: картопля Agricultural: Potato Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato (<i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>tuberosum</i> ; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>chiloense</i> DC.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>cultum</i> DC.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>sabini</i> DC.; <i>Solanum fonckii</i> Phil.; <i>Solanum chiloense</i> (DC.) Benth.; <i>Solanum cultum</i> (DC.) Berth.; <i>Solanum sabini</i> (DC.) Berth.; <i>Solanum maglia</i> Schlecht. var. <i>guaytecum</i> Bitt.; <i>Solanum maglia</i> var. <i>chutuberse</i> Bitt.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>europaeum</i> Buk.; <i>Solanum leptostigma</i> Juz.; <i>Solanum molinae</i> Juz.; <i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>chileanum</i> Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>guaytecum</i> (Bitt.) Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>chutubense</i> (Bitt.) Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>andigenum</i> (Juz. et Buk.) Hawk.; <i>Solanum andigenum</i> Juz. et Buk.; <i>Solanum herrerae</i> Juz.; <i>Solanum subandigenum</i> Hawk.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>grauense</i> Varg.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>digitobatrosum</i> Varg.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>carhua</i> Varg.)											
24088009	КЕЛЛІ KELLY / KELLY		2584	2584			2024				
Сільськогосподарські: кормові Agricultural: Fodder Сорго цукрове <i>Sorghum saccharatum</i> (L.) Moench Sweet Sorghum (<i>Andropogon sorghum</i> ddp. <i>sativus</i> f. <i>technicus</i> Koern.; <i>Sorghum dochna</i> var. <i>technicum</i> (Koern.) Snowd.)											
© 22241001	Ботанічний Ботанічний / Botanichnyi	C3	348	348	348		2024	СЛП	корм		
Сорго суданське <i>Sorghum sudanense</i> (Piper.) Stapf Sudan Grass (<i>Andropogon sorghum sudanensis</i> Piper; <i>Sorghum exiguum</i> auct., non Piper; <i>Andropogon sorghum</i> var. <i>sudanensis</i>)											
© 22227001	Скарб Стену Скарб Стену / Skarb Stepu	П	2706	2706	2706		2024	СЛ	корм		
Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant (<i>Solanum longum</i> L.; <i>Melongena teres</i> Mill.; <i>Solanum undatum</i> Lam.; <i>Solanum esculentum</i> Dun.)											
© 24093002	Джаз Dzhaz / Dzhaz	F1	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж, пер		
© 24093005	Мірінда Mirinda / Mirinda	F1	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж, пер		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
24093003	Ден Den / Den	F1	2429	2429	2429		2024				
24093004	Ріко Riko / Riko	F1	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж, пер		
24093006	Сара Sara / Sara	F1	2226			2226	2024	СЛП			
Васильки справжні Ocimum basilicum L. Basil (<i>Ocimum basilicum indicum</i> ; <i>Basilicum citratum</i> Rumph.; <i>Ocimum americanum</i> Jacq.; <i>Ocimum album</i> L.; <i>Ocimum hispidum</i> Lam.; <i>Ocimum integerrimum</i> Willd.; <i>Ocimum pilosum</i> Willd.; <i>Ocimum caryophyllatum</i> Roxb.; <i>Ocimum barrelieri</i> Roth; <i>Ocimum graveolens</i> R. Br.; <i>Ocimum menthaefolium</i> Benth.; <i>Ocimum petitianum</i> A. Rich.)											
24464001	Віолет Кінг Violet King / Violet King	C3	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж		
24464002	Грін Дом Grin Dom / Grin Dom	C3	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж		
Кабачок Cucurbita pepo var. giraumontia Filov Vegetable Marrow, Squash											
24148010	ТІГРЕТТО ді ІТАЛІЯ TIHRETTO di ITALIA / TIHRETTO di ITALIA	П	3236	3236	3236		2024				
24148009	Золотий Дракон Zoloty Drakon / Zoloty Drakon	П	3236	3236	3236		2024				
Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. White Cabbage (<i>Brassica oleracea L. convar. capitata</i> (L.) Alef. var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC.; <i>Brassica oleracea L. var. capitata</i> L.; <i>Brassica capitata</i> DC.; <i>Brassica oleracea ssp. capitata laevis</i> Metzg.; <i>Brassica oleracea L.</i> ; <i>Brassica</i> (White Cabbage))											
24096006	Вірджинія Virdzhyniia / Virdzhyniia	F1	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж, пер		
Кріп пахучий Anethum graveolens L. Dill											
24125003	Брум Brum / Brum	C3	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж		
Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt. Sweet Corn (<i>Zea mays L. saccharata</i> Koern.)											
23103004	ДРАЙВЕР Р DRIVER R / DRIVER R	F1	2662	2662	2662		2024	СЛП	ун		
23103003	РОЗІ ROSIE / ROSIE	F1	2662	2662	2662		2024	СЛП	свж, пер		
Огірок посівний Cucumis sativus L. Cucumber (<i>Cucumis sativus chlar</i> Forsk.; <i>Cucumis esculentus</i> Salisb.; <i>Cucumis muricatus</i> Willd.)											
24110008	ДВА ВЕСЕЛИХ КУМА DVA VESELYKH KUMA / DVA VESELYKH KUMA	F1	3236	3236	3236		2024	ЗГр	свж		
Перець однорічний (гіркий) Capsicum annuum L. Hot Pepper, Chili (<i>Capsicum annuum L. var. annuum</i> ; <i>Capsicum annuum subsp. annuum var. pomiferum</i> ; <i>Capsicum annuum var. fasciculatum</i> (Sturtev.) Irish; <i>Capsicum annuum var. grossum</i> (L.) Sendtn.; <i>Capsicum annuum var. longum</i> Sendtn.; <i>Capsicum indicum</i> Rumph.; <i>Capsicum frutescens</i> L.; <i>Capsicum grossum</i> ; <i>Capsicum baccatum</i> L.; <i>Capsicum corsicum</i> ; <i>Capsicum tetragonum</i> ; <i>Capsicum cerasiforme</i> ; <i>Capsicum olivaeformae</i> ; <i>Capsicum peramidale</i> ; <i>Capsicum conoides</i> ; <i>Capsicum minimum</i> Mill.; <i>Capsicum bicolor</i> Jacq.; <i>Capsicum longum</i> DC.; <i>Capsicum cordiforme</i> Mill.; <i>Capsicum mexicanum</i> Haz.)											
24112002	Хірош Hiros / Hiros	C3	2621			2621	2024				
Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L. Sweet Pepper, Paprika (<i>Capsicum annuum L. var. annuum</i> ; <i>Capsicum annuum subsp. annuum var. pomiferum</i> ; <i>Capsicum annuum var. fasciculatum</i> (Sturtev.) Irish; <i>Capsicum annuum var. grossum</i> (L.) Sendtn.; <i>Capsicum annuum var. longum</i> Sendtn.; <i>Capsicum indicum</i> Rumph.; <i>Capsicum frutescens</i> L.; <i>Capsicum grossum</i> ; <i>Capsicum baccatum</i> L.; <i>Capsicum corsicum</i> ; <i>Capsicum tetragonum</i> ; <i>Capsicum cerasiforme</i> ; <i>Capsicum olivaeformae</i> ; <i>Capsicum peramidale</i> ; <i>Capsicum conoides</i> ; <i>Capsicum minimum</i> Mill.; <i>Capsicum bicolor</i> Jacq.; <i>Capsicum longum</i> DC.; <i>Capsicum cordiforme</i> Mill.; <i>Capsicum mexicanum</i> Haz.)											
24113005	Спрім Strit / Strit	F1	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж, пер		
24113003	Оранж Босс Oranzh Boss / Oranzh Boss	F1	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж, пер		
24113007	Ліра Спарк Lira Spark / Lira Spark	F1	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж, пер		
24113006	Кольт Kolt / Kolt	F1	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж, пер		
24113004	Ред Булл Спарк Red Bull Spark / Red Bull Spark	F1	2429	2429	2429		2024	ЗГр	свж, пер		
24113012	Сонетт Sonett / Sonett	F1	2621			2621	2024	ЗГр			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato (<i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill.; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farwell; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>esculentum</i> ; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>cerasiforme</i> (Dun.) A. Gray; <i>Lycopersicon pomum</i> Mori Moench; <i>Solanum litorale</i> Salisb.; <i>Solanum foliosum</i> Link; <i>Lycopersicon esculentum</i> Alef.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst.; <i>Lycopersicon lycopersicon</i> Britt. et Brown; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. ssp. <i>esculentum</i> Prokh.)											
® 24115025	Оранж Плам <i>Oranzh Plam / Oranzh Plam</i>	F1	2429	2429	2429		2024	Згр	свж, пер		
® 24115019	Ельза <i>Elsa / Elsa</i>	F1	2429	2429	2429		2024	Згр	свж, пер		
® 24115021	Джордано <i>Dzhordano / Dzhordano</i>	F1	2429	2429	2429		2024	Згр	свж, пер		
® 24115020	Ремембе <i>Remembe / Remembe</i>	F1	2429	2429	2429		2024	Згр	свж, пер		
® 24115024	Солідо Спарк <i>Solido Spark / Solido Spark</i>	F1	2429	2429	2429		2024	Згр	свж, пер		
® 24115026	ІС 1510 <i>IS 1510 / IS 1510</i>	F1	2429	2429	2429		2024	Згр	свж, пер		
® 24115022	Єллоу Пешен <i>Yellou Peshen / Yellou Peshen</i>	F1	2429	2429	2429		2024	Згр	свж, пер		
® 24115023	Блейз <i>Bleiz / Bleiz</i>		2429	2429	2429		2024	Згр	свж, пер		
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish (<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> ; <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radicula</i> Pers.; <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radiculus</i> Pers.; <i>Raphanus raphanistrum</i> ssp. <i>sativus</i> Thell.; <i>Raphanus sativus</i> prol. <i>radiculus</i> Pers.; <i>Raphanus sativus</i> var. <i>radicula</i> DC.; <i>Raphanus sativus minor</i> Dod.; <i>Raphanus raphanistrum</i> ssp. <i>sativus</i> Thell.; <i>Raphanus sativus niger</i> Pers.; <i>Raphanus sativus major</i> Schubler et Mart.)											
24118006	Донато <i>Donato / Donato</i>		2086	2086			2024				
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach (<i>Spinacia domestica</i> Borkh.)											
24130003	Лізард <i>Lizard / Lizard</i>		1730	1730			2024				
Боби турецькі (квасоля багатоквіткова) <i>Phaseolus coccineus</i> L. Multiflora Bean (<i>Phaseolus multiflorus</i> Wild.)											
® 21465001	Оброшинська місцева <i>Obroshynska mistseva</i>	П	1658	1658	1658		2024	ЛП	овоч		
Плодові та ягідні Fruit and Berry Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Apricot (<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.; <i>Prunus armeniaca</i> var. <i>typica</i> Maxim.; <i>Prunus tiliacifolia</i> Salisb.)											
24256002	Бержерон 1 <i>Bergeron 1 / Bergeron 1</i>		3218 3241	3218 3241			2024	СЛП	ун	сс	
24256003	Перла 1 <i>Perla 1 / Perla 1</i>		3218 3241	3218 3241			2024	СЛП	ун	сс	
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry (<i>Fragaria x ananassa</i> Duch.; <i>Fragaria grandiflora</i> Ehrh. non (L.) Crantz)											
® 24294007	ФЛ 16 78 109 <i>FL 16 78 109 / FL 16 78 109</i>		2820	1282	1282		2024	Згр	ун	рс	
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut (<i>Corylus maxima</i> Mill.; <i>Corylus pontica</i> K. Koch; <i>Corylus avellana</i> var. <i>sativa</i> Ludwig; <i>Corylus tubulosa</i> Willd.; <i>Corylus avellana</i> var. <i>tubulosa</i> Loud; <i>Corylus avellana</i> var. <i>lamberti</i> Loud.; <i>Corylus arborescens</i> Gaertn.)											
24543002	Мортарелла <i>Mortarella / Mortarella</i>		2709			2709	2024	СЛП	ун	рсдн	
24543001	Тонда ді Джіффоні <i>Tonda di Giffoni / Tonda di Giffoni</i>		2709			2709	2024	СЛП	ун	сс	
Декоративні та лікарські Ornamental and Healing Півонія <i>Paeonia</i> L. Реону											
® 24329003	Квітка Ксенія <i>Kvitka Kseniia / Kvitka Kseniia</i>		348	348	348		2024	ЛП	озл		
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula											
® 24680002	Вишиванка <i>Yushyvanka / Yushyvanka</i>		348	348	348		2024	ЛП	озл		
® 24680001	Сутінки <i>Sutinky / Sutinky</i>		348	348	348		2024	ЛП	озл		
Хризантема <i>Chrysanthemum</i> L. Chrysanthemum (<i>Chrysanthemum dendranthema</i> ; <i>Dendranthema</i> (DC.) Desmoul.)											
® 24337002	Мальвіна <i>Malvina / Malvina</i>		348	348	348		2024	Л	озл		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
® 24337004	Циганочка Tsyganochka / Tsyganochka		348	348	348		2024	Л	озл		

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

Кукурудза восковидна

Кукурудза звичайна

Кукурудза звичайна – батьківський компонент



Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності

Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Кукурудза восковидна *Zea mays* var. *ceratina* L.

Заявка № 22645001 **Назва сорту:** П0200ВХ **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240810

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки в просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	до дуже широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого забарвлення	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 16. ФАО – 450. Висота прикріплення першого нижнього розвиненого (з зерном) качана, см – 135. Вміст амілопектину, % – 75. Загальний вміст крохмалю, % – 90. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 8; сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 8; сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 8; фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза восковидна *Zea mays* var. *ceratina* L.**Заявка №** 23645001 **Назва сорту:** ПО200ВХ **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2024 **Патент №** 240618**Дата пріоритету:** 18.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки в просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	до дуже широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого забарвлення	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009074 Назва сорту: АЛЕНАРО **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240737

Дата пріоритету: 03.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230589

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 22009145 **Назва сорту:** БЕРКАНО **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Володілець патенту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.12.2024 **Патент №** 240806**Дата пріоритету:** 16.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 23.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240971**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	пізній	7	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	до довгої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,31	9,23	7,88
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,20	0,24	-0,06
+, - до усередненої урожайності, %	-3,1	2,7	-0,8
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	121	124	127
Висота рослини, см	243,2	258,4	267
Вихід зерна, %	88,3	82,9	84,8
Висота прикріплення качана, см	80,5	90,2	97
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	31,2	26,5	10,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,3	3,8	3,6
Вміст білка, %	10	8,7	8,6
Вміст крохмалю, %	71,9	73,4	73,2
Стійкість до посухи, бал	4	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	4
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	6	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 24009025 **Назва сорту:** БРВ2445Б **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2024 **Патент №** 240639**Дата пріоритету:** 22.01.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009049 Назва сорту: БРВ2770Б Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240634

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009026 **Назва сорту:** БРВ2814Б **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2024 **Патент №** 240619**Дата пріоритету:** 18.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	до малого
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	до малого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	до вузької
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	до середнього
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009104 Назва сорту: БУКАЛО **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240745

Дата пріоритету: 30.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240845

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,45	9,26	9,67
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,06	0,27	1,73
+, - до усередненої урожайності, %	-16,3	3,0	21,8
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	120	126	127
Висота рослини, см	216	245,8	256
Вихід зерна, %	83,8	81,3	82,3
Висота прикріплення качана, см	74,5	85,9	87,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	34,5	19,8	4,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	4,3	3,7
Вміст білка, %	9,2	8,4	8,3
Вміст крохмалю, %	72,4	74,1	74
Стійкість до посухи, бал	4	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009072 Назва сорту: ВЕРТУАЛ Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240735

Дата пріоритету: 03.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240840

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,27	7,65	8,33
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,82	-0,90	0,91
+, - до усередненої урожайності, %	-13,5	-10,5	12,3
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	109	112	114
Висота рослини, см	224	245,7	253,6
Вихід зерна, %	85,8	81,6	82,6
Висота прикріплення качана, см	94,2	91,8	96,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	49	23,5	23,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,7	5	3,9
Вміст білка, %	8,7	8,5	8,9
Вміст крохмалю, %	72,2	72,8	72,5
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009041 Назва сорту: ГРІНФІЛД Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240628

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 22009023 Назва сорту: Дамір **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата пріоритету: 27.01.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024
Свідцтво про державну реєстрацію № 240937
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,56	7,21	8,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,53	-1,34	0,60
+, - до усередненої урожайності, %	-25,1	-15,7	8,1
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	111	120	117
Висота рослини, см	220,7	231,1	249,1
Вихід зерна, %	80,6	79,8	82
Висота прикріплення качана, см	96,5	96,7	101,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	60,3	11,3	5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	4,9	3,9
Вміст білка, %	9,9	9,6	9,8
Вміст крохмалю, %	71,9	71,6	71,2
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	8	8	9
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009106 Назва сорту: ДКС3719 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240747

Дата пріоритету: 30.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230592

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 21009098 **Назва сорту:** ДКС3924 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844**Володілець патенту (код):** 844**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.12.2024 **Патент №** 240741**Дата пріоритету:** 29.11.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.09.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230590**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	до сильної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009091 **Назва сорту:** ДКС4031 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240752

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009090 Назва сорту: ДКС4231 Заявник (код): 844 Підтримувач сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240751

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.05.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240342

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009099 Назва сорту: ДКС4238 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240742

Дата пріоритету: 29.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230591

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 21009078 **Назва сорту:** ДКС4533 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844**Володілець патенту (код):** 844**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.12.2024 **Патент №** 240740**Дата пріоритету:** 03.11.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240843**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,44	9,67	9,29
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,07	0,68	1,35
+, - до усередненої урожайності, %	-16,4	7,6	17,0
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	119	125	127
Висота рослини, см	208,7	239,1	242
Вихід зерна, %	87	81,6	82,9
Висота прикріплення качана, см	76,7	80,3	86,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	32,8	24,4	5,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	3,1	3,7
Вміст білка, %	8,1	7,8	7,4
Вміст крохмалю, %	74,3	74,2	74,5
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	6	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009089 Назва сорту: ДКС4539 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240750

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240849

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,37	9,96	8,21
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,14	0,97	0,27
+, - до усередненої урожайності, %	-2,2	10,8	3,4
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	119	125	125
Висота рослини, см	221,3	241,5	248,3
Вихід зерна, %	86,9	83,9	84,1
Висота прикріплення качана, см	87,8	86,5	96,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	33,2	24,6	6,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	5,3	3,6
Вміст білка, %	8,3	8,1	7,4
Вміст крохмалю, %	73,4	73,8	73
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	4	6
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	6	9	9
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 22009088 **Назва сорту:** ДКС4655 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844**Володілець патенту (код):** 844**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.12.2024 **Патент №** 240749**Дата пріоритету:** 01.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240848**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,51	8,80	8,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,00	-0,19	0,34
+, - до усередненої урожайності, %	-0,0	-2,1	4,3
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	119	127	125
Висота рослини, см	211,7	226,8	236,5
Вихід зерна, %	87,6	83	84
Висота прикріплення качана, см	79,5	78,2	90,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	32,3	26,6	9,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,6	4	3,5
Вміст білка, %	8,8	7,4	7,5
Вміст крохмалю, %	73,7	74,5	73,1
Стійкість до посухи, бал	4	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	4	7
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	7	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 22009106 **Назва сорту:** ДКС4741 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844**Володілець патенту (код):** 844**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.12.2024 **Патент №** 240756**Дата пріоритету:** 01.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240852**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до слабого
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,47	9,80	8,53
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,04	0,81	0,59
+, - до усередненої урожайності, %	-0,6	9,0	7,4
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	119	127	126
Висота рослини, см	220,5	247,5	244
Вихід зерна, %	86,3	82,4	84,3
Висота прикріплення качана, см	77,3	92,2	89,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	53,3	25,8	20
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4	5,8	3,5
Вміст білка, %	8,7	7,3	7,5
Вміст крохмалю, %	73,8	75,4	74,7
Стійкість до посухи, бал	5	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 22009093 **Назва сорту:** ДКС4933 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844**Володілець патенту (код):** 844**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.12.2024 **Патент №** 240753**Дата пріоритету:** 01.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.05.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240363**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009105 Назва сорту: ДОССІАН Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240746

Дата пріоритету: 30.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240846

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,19	7,78	8,51
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,10	-0,77	1,09
+, - до усередненої урожайності, %	1,6	-9,0	14,7
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	108	113	116
Висота рослини, см	225,3	232,5	252,4
Вихід зерна, %	83,8	81,6	83,9
Висота прикріплення качана, см	92	86,7	89,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	55,2	21,8	9,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	4,2	4,1
Вміст білка, %	9,2	8,7	8,4
Вміст крохмалю, %	71,8	72,3	72,6
Стійкість до посухи, бал	6	4	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009108 **Назва сорту:** EB3732 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240748

Дата пріоритету: 30.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240847

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,82	8,42	8,22
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,27	-0,13	0,80
+, - до усередненої урожайності, %	-20,9	-1,5	10,8
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	110	114	114
Висота рослини, см	218,3	233,2	240,5
Вихід зерна, %	82,9	81,9	82,1
Висота прикріплення качана, см	90	87,6	90,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38,3	25,8	8,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7	4,3	3,7
Вміст білка, %	9	8,4	8,6
Вміст крохмалю, %	71,9	72,5	72,3
Стійкість до посухи, бал	5	5	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	3
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009077 Назва сорту: EB4150 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240739

Дата пріоритету: 03.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240842

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,95	10,18	9,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,44	1,19	1,62
+, - до усередненої урожайності, %	6,8	13,2	20,4
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	119	124	126
Висота рослини, см	219,3	243,9	258,3
Вихід зерна, %	85,6	81,4	82,3
Висота прикріплення качана, см	82,3	95,4	101
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38,3	14,5	5,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,7	4,6	3,2
Вміст білка, %	8,6	7,6	8,4
Вміст крохмалю, %	73,3	73,9	72,7
Стійкість до посухи, бал	5	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	8	9
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009076 Назва сорту: EB4931 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент № 240738**

Дата пріоритету: 03.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240841

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,91	8,95	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,64	9,21	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,27	0,26	
+, - до усередненої урожайності, %	-3,9	2,9	
Довірчий інтервал, т/га	0,37	0,21	
Тривалість періоду вегетації, діб	124	134	
Висота рослини, см	222,3	242,1	
Вихід зерна, %	85,7	82	
Висота прикріплення качана, см	76,2	76,1	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	27,2	14,3	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,2	5,2	
Вміст білка, %	9	7,8	
Вміст крохмалю, %	72,7	74,1	
Стійкість до посухи, бал	5	7	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009097 Назва сорту: ЕІ3669 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240754

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240850

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,06	9,27	8,30
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,03	0,72	0,88
+, - до усередненої урожайності, %	-0,5	8,4	11,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	108	115	115
Висота рослини, см	232,3	238,6	252,6
Вихід зерна, %	82,8	83,4	83,4
Висота прикріплення качана, см	98	90,4	102,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	53	15,8	18,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,5	4,3	3,3
Вміст білка, %	9	8,1	8,5
Вміст крохмалю, %	72,5	73,7	72,3
Стійкість до посухи, бал	5	5	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	8
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009073 Назва сорту: ЕСТЕВІО Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240736

Дата пріоритету: 03.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230588

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 22009164 **Назва сорту:** EX2974 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844**Володілець патенту (код):** 844**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.12.2024 **Патент №** 240758**Дата пріоритету:** 01.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240856**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,32	8,01	6,78
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,13	6,89	7,43
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,19	-1,12	0,65
+, - до усередненої урожайності, %	-3,6	-14,0	9,6
Довірчий інтервал, т/га	0,29	0,21	0,24
Тривалість періоду вегетації, діб	102	102	102
Висота рослини, см	222,8	238	247,5
Вихід зерна, %	82,8	82	82,1
Висота прикріплення качана, см	80,3	92	95,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	41,2	5,5	11,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	4,7	4,2
Вміст білка, %	9,5	8,9	8,7
Вміст крохмалю, %	72,4	71,7	72
Стійкість до посухи, бал	6	3	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	3
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 22009105 **Назва сорту:** EX3833 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844**Володілець патенту (код):** 844**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.12.2024 **Патент №** 240755**Дата пріоритету:** 01.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240851**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,76	9,31	7,64
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,67	0,76	0,22
+, - до усередненої урожайності, %	11,0	8,9	3,0
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	111	116	116
Висота рослини, см	220	244,3	247,5
Вихід зерна, %	83,5	84,2	82,7
Висота прикріплення качана, см	85,7	88,5	94,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,5	20,5	14,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,4	3,5	3,2
Вміст білка, %	8,6	8,2	8,2
Вміст крохмалю, %	73,1	73,5	73,3
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	4
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009048 **Назва сорту:** ІНДЕМ1316 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2024 **Патент №** 240633**Дата пріоритету:** 18.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 24009022 Назва сорту: ІНДЕМ1628 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240637

Дата пріоритету: 22.01.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка № 22009135 Назва сорту:** ЛГ30002 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Володілець патенту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240697**Дата пріоритету:** 16.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240942**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,17	8,00	7,09
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,08	-0,55	-0,33
+, - до усередненої урожайності, %	1,3	-6,4	-4,4
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	110	114	114
Висота рослини, см	253	251,2	266,1
Вихід зерна, %	83,4	82,2	83
Висота прикріплення качана, см	92,2	88,5	99,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38,8	8,8	6,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,4	4,8	4,1
Вміст білка, %	9,2	8,4	8,5
Вміст крохмалю, %	72	72	72,3
Стійкість до посухи, бал	5	5	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009133 Назва сорту: ЛГ31215 Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 Патент № 240696

Дата пріоритету: 16.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.04.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240270

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009137 Назва сорту: ЛГ31252 Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 Патент № 240698

Дата пріоритету: 16.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.04.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240250

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильної
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка № 22009138 Назва сорту:** ЛГ31350 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Володілець патенту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240699**Дата пріоритету:** 16.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240943**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,94	7,69	7,89
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,57	-1,30	-0,05
+, - до усередненої урожайності, %	-8,8	-14,5	-0,6
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	119	125	126
Висота рослини, см	242,3	257,3	257
Вихід зерна, %	88,8	83,2	82,2
Висота прикріплення качана, см	87,8	93,3	94
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	62,7	24,8	19,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	4,7	3,2
Вміст білка, %	9,6	8,9	8,5
Вміст крохмалю, %	71,6	72,6	72,5
Стійкість до посухи, бал	5	6	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	9
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009163 Назва сорту: ЛГ31365 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240702**

Дата пріоритету: 12.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240944

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,67	8,96	8,30
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,84	-0,03	0,36
+, - до усередненої урожайності, %	-12,9	-0,3	4,5
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	120	125	127
Висота рослини, см	236	271,5	265,9
Вихід зерна, %	86,6	82,4	83,7
Висота прикріплення качана, см	83,5	94,8	95,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,8	35,9	14
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	5,3	2,7
Вміст білка, %	9,5	8,4	7,9
Вміст крохмалю, %	72,4	73	72,5
Стійкість до посухи, бал	5	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 22009128 **Назва сорту:** ЛГ31380 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Володілець патенту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240693**Дата пріоритету:** 12.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240940**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,54	8,92	8,32
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,97	-0,07	0,38
+, - до усередненої урожайності, %	-14,9	-0,8	4,8
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	118	123	127
Висота рослини, см	242,8	266,5	267
Вихід зерна, %	86,8	83,6	83,2
Висота прикріплення качана, см	90	91,3	91,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	53	20	16,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	3,5	3,3
Вміст білка, %	9,2	8,4	8,1
Вміст крохмалю, %	72,4	73	72,6
Стійкість до посухи, бал	5	6	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	6	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009131 Назва сорту: ЛЗМ272/10 Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 Патент № 240695

Дата пріоритету: 16.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240941

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно заплілюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,70	8,69	7,83
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,39	0,14	0,41
+, - до усередненої урожайності, %	-6,4	1,6	5,5
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	111	112	115
Висота рослини, см	244,3	265,9	272,9
Вихід зерна, %	81,1	80,7	82,9
Висота прикріплення качана, см	92,2	94,5	108,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51,2	28,4	14
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	4	3,5
Вміст білка, %	9,7	9,1	9,3
Вміст крохмалю, %	71,8	72,4	72,5
Стійкість до посухи, бал	5	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	4
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009107 Назва сорту: МЕДІТА **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240757

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240853

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,21	8,11	7,57
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,12	-0,44	0,15
+, - до усередненої урожайності, %	2,0	-5,1	2,0
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	114
Висота рослини, см	210,5	226,4	237,8
Вихід зерна, %	82,2	82,4	83,1
Висота прикріплення качана, см	90,3	87,9	97,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45	11,9	15,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	4,5	3,4
Вміст білка, %	9,1	8,6	8,8
Вміст крохмалю, %	72,9	72,9	72,6
Стійкість до посухи, бал	4	6	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	7	8	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 21009103 **Назва сорту:** МОГАБРІКС **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844**Володілець патенту (код):** 844**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.12.2024 **Патент №** 240744**Дата пріоритету:** 30.11.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240844**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,34	9,53	8,95
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,17	0,54	1,01
+, - до усередненої урожайності, %	-2,6	6,0	12,7
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	119	124	126
Висота рослини, см	218,5	249,4	250,3
Вихід зерна, %	86,5	83	82,1
Висота прикріплення качана, см	76,2	88,1	94,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	25,8	12,6	6,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,9	4,4	3,6
Вміст білка, %	8,8	7,7	7,8
Вміст крохмалю, %	73,3	73,8	73,1
Стійкість до посухи, бал	4	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	6	9	9
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 24009027 **Назва сорту:** ПО2085 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2024 **Патент №** 240640**Дата пріоритету:** 22.01.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до помірного
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 24009023 Назва сорту: П72847 Заявник (код): 1688

Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240638

Дата пріоритету: 22.01.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009029 **Назва сорту:** П7655 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2024 **Патент №** 240622**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009036 Назва сорту: П8115 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240626

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009050 **Назва сорту:** П8256 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2024 **Патент №** 240635**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009037 Назва сорту: П82703 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240627

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009031 Назва сорту: П82848 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240623

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009046 Назва сорту: П83224 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240631

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильної
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	до довгої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009042 **Назва сорту:** П86010 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2024 **Патент №** 240629**Дата пріоритету:** 18.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009027 Назва сорту: П8660 Заявник (код): 1688 1690 Володілець патенту (код): 1688 1690

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240620

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильної
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкого
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середнього
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009047 Назва сорту: П8738 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240632

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009061 Назва сорту: П88844 Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240938

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,95	8,23	8,35
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,56	-0,76	0,41
+, - до усередненої урожайності, %	-8,6	-8,5	5,2
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	118	121	126
Висота рослини, см	235,5	269,5	279
Вихід зерна, %	84,1	81,6	81,9
Висота прикріплення качана, см	88,3	102,5	107,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40	25,5	11,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	4,3	3,3
Вміст білка, %	10	9,8	9,5
Вміст крохмалю, %	72,8	73,2	72,9
Стійкість до посухи, бал	5	8	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	5
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009028 Назва сорту: П88844 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240621

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009032 **Назва сорту:** П9002 **Заявник (код):** 1688 1690 **Володілець патенту (код):** 1688 1690**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2024 **Патент №** 240624**Дата пріоритету:** 18.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильної
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	сильне	7	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009055 Назва сорту: П92440 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240636

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	до дуже довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009035 **Назва сорту:** П9279 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2024 **Патент №** 240625**Дата пріоритету:** 18.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	до середньої кількості
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до великого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009044 Назва сорту: П9759 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 Патент № 240630

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильної
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до великого
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009154 Назва сорту: РЖТ ПРЕТЕККСТ **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240701

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240855

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,59	8,34	8,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,92	-0,65	0,21
+, - до усередненої урожайності, %	-14,1	-7,2	2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	120	126	127
Висота рослини, см	225,2	241,4	249,1
Вихід зерна, %	86,7	79,8	81,7
Висота прикріплення качана, см	77,3	85,6	89,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,3	30	14,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,1	4,7	3,7
Вміст білка, %	8,5	8,3	8,3
Вміст крохмалю, %	73,1	72,9	73,1
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009130 Назва сорту: РЖТ СЕДЕККС **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240694

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	середній	5	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009153 Назва сорту: РЖТ СУФІККС Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 Патент № 240700

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240854

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,38	8,71	8,49
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,13	-0,28	0,55
+, - до усередненої урожайності, %	-17,4	-3,1	6,9
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	121	126	127
Висота рослини, см	235,3	259	261
Вихід зерна, %	85,4	80,5	82,2
Висота прикріплення качана, см	94,5	99,3	102,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	39,3	27,5	10,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,4	5,9	3,2
Вміст білка, %	8,6	7,9	8,5
Вміст крохмалю, %	72,7	73,8	72,9
Стійкість до посухи, бал	4	7	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009127 Назва сорту: РОМАНС Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 Патент № 240692

Дата пріоритету: 12.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240939

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	до помірного
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,36	8,05	7,59
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,27	-0,50	0,17
+, - до усередненої урожайності, %	4,4	-5,8	2,3
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	109	113	116
Висота рослини, см	230	253,4	265,9
Вихід зерна, %	82	81,6	82,2
Висота прикріплення качана, см	84,5	82,6	89,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	39,2	1,8	6,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,4	5,8	4,1
Вміст білка, %	9,3	8,7	8,3
Вміст крохмалю, %	72,9	73,2	73,9
Стійкість до посухи, бал	5	4	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	3
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009142 Назва сорту: СИ АРТОС **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240812

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,99	9,75	8,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,52	0,76	0,33
+, - до усередненої урожайності, %	-8,0	8,5	4,2
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	121	124	127
Висота рослини, см	229,7	257	266,5
Вихід зерна, %	83,8	81,6	82,9
Висота прикріплення качана, см	88,3	94,9	98,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47,3	23,8	17,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,8	4,7	3,7
Вміст білка, %	9,3	8,5	8,9
Вміст крохмалю, %	72,8	73,4	73,1
Стійкість до посухи, бал	4	6	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009143 Назва сорту: СИ КОСМОС Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240813

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,32	8,01	6,78
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,73	7,80	7,53
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,41	-0,21	0,75
+, - до усередненої урожайності, %	7,7	-2,6	11,1
Довірчий інтервал, т/га	0,29	0,21	0,24
Тривалість періоду вегетації, діб	102	101	102
Висота рослини, см	220,3	227,8	248,3
Вихід зерна, %	81,3	83,1	83,2
Висота прикріплення качана, см	78	77,1	79,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40,8	8,3	5,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,7	5	3,1
Вміст білка, %	9,1	8,4	9
Вміст крохмалю, %	72,6	72,6	72,4
Стійкість до посухи, бал	6	4	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	3
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка № 22009144 Назва сорту:** СИ ОЛІВІЯ **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.12.2024**Свідчення про державну реєстрацію № 240814****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,08	8,85	7,88
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,01	0,30	0,46
+, - до усередненої урожайності, %	-0,2	3,5	6,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	109	115	116
Висота рослини, см	234	246,4	263,6
Вихід зерна, %	84,4	83,1	83,1
Висота прикріплення качана, см	93,7	90,1	97,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,5	21,3	10
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	3	4,1
Вміст білка, %	9,4	8,5	8,5
Вміст крохмалю, %	73,4	73,6	73,6
Стійкість до посухи, бал	4	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	5
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	8	9	9
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009141 Назва сорту: СИ ФАНТАЗІЯ Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240811

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,38	7,75	7,94
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,71	-0,80	0,52
+, - до усередненої урожайності, %	-11,7	-9,4	7,0
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	108	115	116
Висота рослини, см	237,8	248,6	264,4
Вихід зерна, %	86	83,3	82,4
Висота прикріплення качана, см	88,8	89,2	98,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,3	28	6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,4	4,2	3,5
Вміст білка, %	9,6	8	8,2
Вміст крохмалю, %	73,7	73,4	73,5
Стійкість до посухи, бал	4	6	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	8	9	9
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009057 Назва сорту: Солід **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

Володілець патенту (код): 2742

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.12.2024 **Патент №** 240871

Дата пріоритету: 22.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 30.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 241022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,83	9,36	7,73
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,26	0,81	0,31
+, - до усередненої урожайності, %	-4,3	9,5	4,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	111	117	116
Висота рослини, см	220,8	241	260,8
Вихід зерна, %	83	82,6	82,9
Висота прикріплення качана, см	81,5	91,8	99,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,7	23,3	8,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,3	4,2	3,3
Вміст білка, %	9,6	8,4	8,3
Вміст крохмалю, %	72	72,7	72,9
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	3
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	7	9	9
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 22009056 **Назва сорту:** Старді **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742**Володілець патенту (код):** 2742**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.12.2024 **Патент №** 240870**Дата пріоритету:** 22.11.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 30.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 241021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,60	9,12	8,31
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,51	0,57	0,89
+, - до усередненої урожайності, %	8,4	6,7	12,0
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	110	115	116
Висота рослини, см	225,5	241,2	259,9
Вихід зерна, %	81,3	82,2	79,7
Висота прикріплення качана, см	90,3	88,4	100,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	66,2	20,3	9,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,8	5	3,9
Вміст білка, %	8,8	9	8,8
Вміст крохмалю, %	73	72,5	72,4
Стійкість до посухи, бал	7	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка № 23009017 Назва сорту:** ХА Квінта **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581**Дата пріоритету:** 20.02.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240945**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,32	8,01	6,78
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,39	6,69	7,11
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,93	-1,32	0,33
+, - до усередненої урожайності, %	-17,5	-16,5	4,9
Довірчий інтервал, т/га	0,29	0,21	0,24
Тривалість періоду вегетації, діб	102	102	102
Висота рослини, см	195	223,4	230,3
Вихід зерна, %	79,6	79,2	80,2
Висота прикріплення качана, см	86,2	91,6	96,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52,8	5,3	17,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4	5,1	4,5
Вміст білка, %	10	9,6	8,8
Вміст крохмалю, %	71,2	71,7	71,5
Стійкість до посухи, бал	3	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	3
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	8	8	8
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909079 Назва сорту: 1ПАБЦ82 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240796

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909054 Назва сорту: 1ПВДГ15 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 Патент № 240791

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909077 Назва сорту: 1ПВДЕ32 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240794

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: нійка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909060 Назва сорту: 1ПЙКУ24 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 Патент № 240802

Дата пріоритету: 22.01.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909055 Назва сорту: 1ПМРФ97 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240800**

Дата пріоритету: 22.01.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	дуже сильне	9	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	дуже сильне	9	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909057 Назва сорту: 1ППГK72 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240801**

Дата пріоритету: 22.01.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909056 **Назва сорту:** 1ППФС42 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240792

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909065 Назва сорту: 1ФПТ76 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 Патент № 240803

Дата пріоритету: 22.01.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка №** 22909205 **Назва сорту:** A03473 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844**Володілець патенту (код):** 844**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.12.2024 **Патент №** 240790**Дата пріоритету:** 01.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240891**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909095 Назва сорту: A45673XIB3 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240778

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240875

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909088 **Назва сорту:** A46013 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240771

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240868

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабке	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909029 Назва сорту: АГБЦ173 **Заявник (код):** 793 2649 **Власник сорту (код):** 793 2649

Володілець патенту (код): 793 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240719**

Дата пріоритету: 17.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240955

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909086 Назва сорту: БС001А **Заявник (код):** 2873 **Володілець патенту (код):** 2873

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.12.2024 **Патент № 240878**

Дата пріоритету: 20.03.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909085 Назва сорту: БС002 **Заявник (код):** 2873 **Володілець патенту (код):** 2873

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.12.2024 **Патент № 240877**

Дата пріоритету: 20.03.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909087 Назва сорту: В 138 **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

Володілець патенту (код): 2742

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.12.2024 **Патент №** 240876

Дата пріоритету: 22.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 30.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241027

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909084 Назва сорту: В 510 зс **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

Володілець патенту (код): 2742

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.12.2024 **Патент №** 240873

Дата пріоритету: 22.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 30.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909086 Назва сорту: В 510 с **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

Володілець патенту (код): 2742

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.12.2024 **Патент №** 240875

Дата пріоритету: 22.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 30.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 241026

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909085 Назва сорту: В 66 **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

Володілець патенту (код): 2742

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.12.2024 **Патент №** 240874

Дата пріоритету: 22.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 30.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка №** 22909083 **Назва сорту:** В 831 СВ **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742**Володілець патенту (код):** 2742**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.12.2024 **Патент №** 240872**Дата пріоритету:** 22.11.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 30.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 241023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909129 Назва сорту: B00273 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240763

Дата пріоритету: 03.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240861

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 21909130 Назва сорту:** B09873 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844**Володілець патенту (код):** 844**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.12.2024 **Патент №** 240764**Дата пріоритету:** 03.11.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.09.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230604**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909114 Назва сорту: B12093 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240788

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240885

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909091 Назва сорту: B14823 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240774

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240871

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабке	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909156 Назва сорту: B27993 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240766

Дата пріоритету: 29.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240863

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909090 Назва сорту: В30083 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240773

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240870

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909127 Назва сорту: B53993 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240761

Дата пріоритету: 03.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240859

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909092 Назва сорту: B63863 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240775

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідство про державну реєстрацію № 240872

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909101 Назва сорту: B67263ХЛБЗ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240783

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240880

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909104 Назва сорту: B79203ХЛБЗ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240785

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240882

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабке	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909100 Назва сорту: В93653ХЛБЗ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240782

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240879

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909138 Назва сорту: ВК 1001 **Заявник (код):** 2548 **Власник сорту (код):** 2548

Володілець патенту (код): 2548

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240797

Дата пріоритету: 28.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240957

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909148 Назва сорту: ВК 2001 **Заявник (код):** 2548 **Власник сорту (код):** 2548

Володілець патенту (код): 2548

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240799

Дата пріоритету: 28.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240959

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909139 Назва сорту: ВК 4001 **Заявник (код):** 2548 **Власник сорту (код):** 2548

Володілець патенту (код): 2548

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240798

Дата пріоритету: 28.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240958

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909131 Назва сорту: ВЛЗ483 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240765

Дата пріоритету: 03.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240862

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909172 Назва сорту: ГВІКС1660С **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240643

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240772

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	1	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	червоно-оранжеве	6	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	червоно-оранжеве	6	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909175 Назва сорту: ГЕІКС1764 **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959

Володілець патенту (код): 1959

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240645

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240774

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909176 Назва сорту: ГЕНА0903 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240646

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240775

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909019 Назва сорту: ДБ1 **Заявник (код):** 793 2649 **Власник сорту (код):** 793 2649

Володілець патенту (код): 793 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240718**

Дата пріоритету: 17.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231042

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909115 Назва сорту: ДЖ08963 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240789

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240886

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909113 Назва сорту: ДЖ09303 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240787

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240884

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабке	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909089 Назва сорту: ДЖ24313 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240772

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240869

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909093 Назва сорту: ДЖ24903ХЛБЗ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240776

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240873

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909128 Назва сорту: ДЖ25263 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240762

Дата пріоритету: 03.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240860

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909161 Назва сорту: ДЖ28753 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата пріоритету: 01.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240867

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабке	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909102 Назва сорту: ДЖ39723ХЛБ3 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240784

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240881

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабке	2	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909158 Назва сорту: ДЖ72143 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240768

Дата пріоритету: 29.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240864

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909094 Назва сорту: ДЖ85233 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240777

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240874

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909126 Назва сорту: ДЖ96563 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240760

Дата пріоритету: 03.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240858

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909171 Назва сорту: ІАКС3300С **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240642

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240771

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909042 Назва сорту: IBV666 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240720

Дата пріоритету: 03.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 13.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231244

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909143 Назва сорту: КЮВІ492 КЮВІ447 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240716

Дата пріоритету: 15.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240953

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909047 Назва сорту: КЮКЮА28ВІ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240724**

Дата пріоритету: 03.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 13.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231248

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909130 Назва сорту: КЮЛД47ФФ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240706

Дата пріоритету: 12.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідцтво про державну реєстрацію № 231040

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909137 Назва сорту: ЛНР3494 ЛОН3752 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240972

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909148 Назва сорту: ЛРР6404 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

Володілець патенту (код): 2720

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240580

Дата пріоритету: 19.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240973

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909125 Назва сорту: M77673 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240759

Дата пріоритету: 03.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240857

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка №** 21909157 **Назва сорту:** M79613 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844**Володілець патенту (код):** 844**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.12.2024 **Патент №** 240767**Дата пріоритету:** 29.11.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.09.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230605**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909110 Назва сорту: M79613XIB3 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240786

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240883

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909097 Назва сорту: M84583XB3 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240780

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240877

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909098 Назва сорту: M85823XAІ3 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240781

Дата пріоритету: 10.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240878

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909129 Назва сорту: ПДД38ФФ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240705**

Дата пріоритету: 12.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240948

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909128 Назва сорту: ПРЦ16ВІ ІІВ483 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240704**

Дата пріоритету: 12.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240947

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909144 Назва сорту: ПРЦ23ВІ РЕЕД28ВІ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240717

Дата пріоритету: 16.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240954

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909077 Назва сорту: ПС 50 Сст **Заявник (код):** 3356 **Власник сорту (код):** 3356

Володілець патенту (код): 3356

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.12.2024 **Патент №** 240829

Дата пріоритету: 28.02.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240960

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909079 Назва сорту: ПС 52 СВ **Заявник (код):** 3356 **Власник сорту (код):** 3356

Володілець патенту (код): 3356

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.12.2024 **Патент №** 240831

Дата пріоритету: 28.02.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240962

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909078 Назва сорту: ПС 53 СВ **Заявник (код):** 3356 **Власник сорту (код):** 3356

Володілець патенту (код): 3356

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.12.2024 **Патент №** 240830

Дата пріоритету: 28.02.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240961

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909078 Назва сорту: ПХ2Т03 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 Патент № 240795

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909067 Назва сорту: ПХ4ЦТД **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240793**

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909136 Назва сорту: P12010СМС **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240712

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240890

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909135 Назва сорту: P15078ЦМС **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240711

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240889

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 22909134 Назва сорту:** P16033 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783**Володілець патенту (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240710**Дата пріоритету:** 14.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240888**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909131 Назва сорту: P16077 Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 Патент № 240707

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240887

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 23909088 Назва сорту:** P19009 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783**Володілець патенту (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240727**Дата пріоритету:** 20.11.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240893**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909087 Назва сорту: P20021 Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 Патент № 240726

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240892

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 23909044 Назва сорту:** РВІ323 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Володілець патенту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240722**Дата пріоритету:** 03.02.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 13.12.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 231246**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909045 Назва сорту: РВІ441 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240723**

Дата пріоритету: 03.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 13.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231247

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909139 Назва сорту: РЕЕ80ФФ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240713

Дата пріоритету: 15.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.03.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240173

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909141 Назва сорту: РИЦ74ВІ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240714

Дата пріоритету: 15.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240951

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909133 Назва сорту: САД35ЛІ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240709

Дата пріоритету: 15.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240950

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909142 Назва сорту: САД36ЛІ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240715

Дата пріоритету: 15.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240952

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909132 Назва сорту: САДЗБЛІ САДЗ5ЛІ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240708

Дата пріоритету: 15.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240949

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909156 Назва сорту: СМС6466 ЛОН3752 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240974

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909159 Назва сорту: T08343 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240769

Дата пріоритету: 29.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240865

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909160 Назва сорту: T49053 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 Патент № 240770

Дата пріоритету: 29.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240866

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909096 Назва сорту: Ф15873 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

Володілець патенту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.12.2024 **Патент №** 240779

Дата пріоритету: 01.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідство про державну реєстрацію № 240876

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909179 Назва сорту: ФСІД3075 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240649

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240778

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909049 Назва сорту: ХА 1821 МВ **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата пріоритету: 20.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідчення про державну реєстрацію № 240956

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909026 Назва сорту: Харківська 341 3М **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Володілець патенту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240703

Дата пріоритету: 01.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240946

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909174 Назва сорту: ЦАФ3362С **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240644

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240773

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	червоно-оранжеве	6	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	червоно-оранжеве	6	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909170 Назва сорту: ЮААБ3713С **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240641

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240770

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909178 Назва сорту: ЮАІД2036 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240648

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240777

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909177 Назва сорту: ЮАІД2042 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240647

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240776

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БОБОВІ

Нут звичайний
Соя культурна



Вид: Нут звичайний *Cicer arietinum* L.

Заявка № 23028002 Назва сорту: Вента **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата пріоритету: 27.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 30.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241028

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (після цвітіння)	прямий	1	
2	Рослина: галузнення	слабке	3	
3	Рослина: за висотою (за повного розвитку бобів)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листочок: розмір	середній	5	
7	Квітка: забарвлення	біле	1	
8	Біб: плодоніжка за довжиною	середня	5	
9	Біб: розмір	великий	7	
10	Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
12	Біб: кількість насінин	одна або дві	2	
13	Насінина: забарвлення (через місяць після збирання)	бежеве	2	
14	Насінина: інтенсивність забарвлення (як для озн. 13)	помірна	5	
15	Насіння: маса	велика	7	
16	Насінина: форма	від кулястої до кутастої	2	
17	Насінина: ребристість	помірна	5	
18	Час цвітіння (80% рослин із щонайменше однією квіткою)	ранній	3	
19	Час достигання насіння	ранній	3	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,8. Тривалість періоду вегетації, діб – 95. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 25. Вміст білка, % – 23. Висота рослин, см – 70. Маса 1000 зерен, г – 360. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз – 7; кореневі гнилі – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): зернівка – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 23045005 Назва сорту: Волонтерка **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240617
Дата пріоритету: 20.02.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240839
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	малий	3	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час достигання	від раннього до середнього	4	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	від малої до середньої	4	
23	Насіння: глянуватість	помірна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,03	3,13	3,03
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,81	3,45	2,89
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,22	0,32	-0,14
+, - до усередненої урожайності, %	-10,8	10,2	-4,6
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,08	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	105	109	112
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	162,7	153,5	151,8
Висота рослини, см	68,1	73,8	75,2
Висота прикріплення нижнього бобу, см	15,3	13,5	14,1
Стійкість до вилягання, бал	9	5	6
Стійкість до обсіпання, бал	6	7	7
Стійкість до посухи, бал	8	7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	41	40,1	38,5
Вміст олії, %	19,3	20,3	20,4
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045041 **Назва сорту:** EXTC 402 **Заявник (код):** 2264 **Володілець патенту (код):** 2264

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240869

Дата пріоритету: 29.12.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,20	3,25	3,06
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,83	3,13	3,40
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,37	-0,12	0,34
+, - до усередненої урожайності, %	-16,8	-3,7	11,1
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,06	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	118	116	122
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	178	176,4	179,1
Висота рослини, см	65,6	84,2	92,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,3	11,9	14
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	8
Стійкість до посухи, бал	6	7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	42,3	41,7	41,7
Вміст олії, %	20,9	21	21,1
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 21045040 Назва сорту: EXTC 411 **Заявник (код):** 2264 **Володілець патенту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент № 240868**
Дата пріоритету: 29.12.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовто-зелене	2	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	слабка	2	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	помірна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,03	3,13	3,03
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,67	3,38	3,60
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,36	0,25	0,57
+, - до усередненої урожайності, %	-17,7	8,0	18,8
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,08	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	108	113	117
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	192,2	169,3	175,6
Висота рослини, см	62,6	80,8	82,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,3	11	11,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	6	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	39,4	38,7	38,2
Вміст олії, %	21,2	21,9	22
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045039 Назва сорту: EXTC 416 Заявник (код): 2264 Володілець патенту (код): 2264

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 Патент № 240867

Дата пріоритету: 29.12.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,20	3,25	3,06
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,80	3,34	3,49
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,40	0,09	0,43
+, - до усередненої урожайності, %	-18,2	2,8	14,1
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,06	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	121	121	125
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	177,8	179,8	186,3
Висота рослини, см	69,4	78,4	79,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,6	11,7	12,2
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	7	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	8
Вміст білка, %	41,4	40,4	41
Вміст олії, %	20,6	21,2	21,1
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 21045038 Назва сорту: EXTX 103 **Заявник (код):** 2264 **Володілець патенту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент № 240866**
Дата пріоритету: 29.12.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжена	3	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	дуже сильна	5	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	помірна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,03	3,13	3,03
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,62	3,20	3,62
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,41	0,07	0,59
+, - до усередненої урожайності, %	-20,2	2,2	19,5
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,08	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	94	113	108
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	173,5	168,1	170,2
Висота рослини, см	60,7	82,4	84,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,9	10,1	13,5
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	6	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	38,8	39	38
Вміст олії, %	21,9	22,2	22,5
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045037 Назва сорту: EXTХ 114 Заявник (код): 2264 Володілець патенту (код): 2264

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 Патент № 240865

Дата пріоритету: 29.12.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насіння: розмір	середній	5	
14	Насіння: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насіння: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насіння: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насіння: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насіння: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час достигання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	сильна	4	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	помірна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,20	3,25	3,06
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,63	3,51	3,83
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,57	0,26	0,77
+, - до усередненої урожайності, %	-25,9	8,0	25,2
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,06	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	121	128	131
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	164,9	175,5	183,3
Висота рослини, см	70	90,8	92,7
Висота прикріплення нижнього бобу, см	14,3	14,7	16,7
Стійкість до вилягання, бал	9	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	6	9	9
Стійкість до посухи, бал	5	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	8
Вміст білка, %	40,9	40,3	39,6
Вміст олії, %	20,8	21,2	21,3
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 21045025 Назва сорту: ЛІД Едукатор **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890
Володілець патенту (код): 2890
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240613
Дата пріоритету: 17.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240913
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час достигання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	сильна	4	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,20	3,25	3,06
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,06	3,65	3,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,14	0,40	0,79
+, - до усередненої урожайності, %	-6,4	12,3	25,8
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,06	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	119	119	123
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	181	170,1	192
Висота рослини, см	56,8	67	72,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,4	10,5	13,2
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	9
Стійкість до посухи, бал	5	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	7	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	41,3	40,2	39,9
Вміст олії, %	21,9	22,5	22,7
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045024 Назва сорту: ЛІД Конструктор **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент № 240612**

Дата пріоритету: 17.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230963

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	майже чорне	5	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час достигання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045026 Назва сорту: ЛІД Промотор **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240614

Дата пріоритету: 17.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230964

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричнє	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричнє	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричнє	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час достигання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	сильна	4	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045025 Назва сорту: Памела **Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011

Володілець патенту (код): 2011

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент № 240616**

Дата пріоритету: 05.10.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230629

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	малий	3	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 23045007 Назва сорту: САЦ224914 **Заявник (код):** 2863 **Володілець патенту (код):** 2863
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.12.2024 **Патент №** 240843
Дата пріоритету: 28.02.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	помірна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,03	3,13	3,03
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,05	3,33	3,60
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,02	0,20	0,57
+, - до усередненої урожайності, %	1,0	6,4	18,8
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,08	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	107	111	114
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	172,3	170,4	182,7
Висота рослини, см	60,4	79,4	77,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,3	9,5	11,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	8
Вміст білка, %	38,8	38,5	37,6
Вміст олії, %	21,9	21,9	22,5
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 23045008 Назва сорту: САЦ224920 **Заявник (код):** 2863 **Володілець патенту (код):** 2863

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.12.2024 **Патент № 240844**

Дата пріоритету: 28.02.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	сильна	4	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	помірна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,03	3,13	3,03
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,88	2,91	3,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,15	-0,22	0,24
+, - до усередненої урожайності, %	-7,4	-7,0	7,9
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,08	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	106	111	115
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	153	158,5	167,6
Висота рослини, см	48,5	68,1	71,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,8	9,9	9,4
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	39,1	38,7	38,5
Вміст олії, %	22,2	22,2	22,6
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 21045042 Назва сорту: Світлиця **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240615
Дата пріоритету: 30.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024
Свідомо про державну реєстрацію № 240838
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насінина: розмір	малий	3	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	слабка	2	
22	Насіння: маса 1000 насінин	мала	3	
23	Насіння: глянуватість	помірна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,03	3,13	3,03
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,67	3,17	3,11
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,36	0,04	0,08
+, - до усередненої урожайності, %	-17,7	1,3	2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,08	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	105	109	114
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	157,9	150,3	152,5
Висота рослини, см	66,8	73,9	70,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	14,6	12,3	14,9
Стійкість до вилягання, бал	8	6	4
Стійкість до обсіпання, бал	6	7	7
Стійкість до посухи, бал	6	7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	41,1	38,8	38,8
Вміст олії, %	19,5	20,7	20,8
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 20045047 Назва сорту: СЕЙЛОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Володілець патенту (код): 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент № 240611**

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230988

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час достигання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	сильна	4	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 23045009 Назва сорту: СТАЙН 04Н32 **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788
Володілець патенту (код): 2788
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.12.2024 **Патент №** 240827
Дата пріоритету: 08.03.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240797
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,03	3,13	3,03
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,05	3,33	3,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,02	0,20	0,49
+, - до усередненої урожайності, %	1,0	6,4	16,2
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,08	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	93	113	109
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	180,8	161,7	183,6
Висота рослини, см	63	87,8	88,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,6	13	13,4
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	39,4	40,1	39,3
Вміст олії, %	22,5	21,8	22,4
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045030 Назва сорту: СУЗА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.11.2024 **Патент № 240532**

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231035

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КРУП'ЯНІ

Сорго звичайне (двокольорове)



Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

Заявка № 24018008 Назва сорту: МАРГО **Заявник (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент № 240610**

Дата пріоритету: 20.03.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля	відсутня або дуже слабка	1	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
7	Листок: зелене забарвлення	помірне	3	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	середня	5	до великої
10	Листок: забарвлення центральної жилки	світло-зелене	3	
11	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	світло-жовте	4	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння–кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
16	Приймочка: забарвлення	жовте	3	
17	Приймочка: за довжиною	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	середня	5	
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	нещільна	3	
20	Сухі тичинки: забарвлення	помаранчево-червоне	4	
21	Рослина: за довжиною	коротка	7	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням флагового листка)	малий	3	до середнього
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	середня	5	до довгої
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
27	Волоть: за щільністю (за досягання)	нещільна	3	
28	Волоть: положення найширшої частини	низьке	2	
29	Волоть: шийка за довжиною	коротка	3	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	червонувато-коричневе	5	
31	Колоскова луска: за довжиною	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення за досягання	помаранчеве	5	
33	Маса 1000 зерен	середня	5	до великої
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	4	
36	Зернівка: розмір зародка	великий	7	
38	Зернівка: вміст таніну	відсутній або дуже низький	1	
39	Зернівка: тип ендосперму	на 3/4 крохмалистий	4	
40	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	помаранчеве	3	
41	Рослина: кількість бічних продуктивних пагонів	мала	2	
42	Квітка: здатність до самозапилення	сильна	3	
43	Рослина: чутливість до фотоперіодизму	відсутня	1	

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.
Заявка № 21018006 Назва сорту: Н2Г234 **Заявник (код):** 1985 **Власник сорту (код):** 1985
Дата пріоритету: 22.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240796
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля	слабка	3	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5	
7	Листок: зелене забарвлення	помірне	3	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	середня	5	
10	Листок: забарвлення центральної жилки	світло-зелене	3	
11	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	зелене	2	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння–кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
16	Приймочка: забарвлення	світло-жовте	2	
17	Приймочка: за довжиною	середня	5	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	середня	5	
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	щільна	7	
20	Сухі тичинки: забарвлення	помаранчево-червоне	4	
21	Рослина: за довжиною	від середньої до довгої	10	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням флагового листка)	середній	5	
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	середня	5	
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
27	Волоть: за щільністю (за досягання)	щільна	7	
28	Волоть: положення найширшої частини	середнє	3	
29	Волоть: шийка за довжиною	коротка	3	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	червонувато-коричневе	5	
31	Колоскова луска: за довжиною	коротка	3	
32	Зернівка: забарвлення за досягання	помаранчево-червоне	6	
33	Маса 1000 зерен	середня	5	
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	4	
36	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зернівка: тип ендосперму	на 1/2 склоподібний	3	
40	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	2	
41	Рослина: кількість бічних продуктивних пагонів	мала	2	
42	Квітка: здатність до самозапилення	сильна	3	
43	Рослина: чутливість до фотоперіодизму	відсутня	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,96	6,23	
Довірчий інтервал, т/га	0,62	0,70	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,94	8,22	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,02	1,99	
+, - до усередненої урожайності, %	-0,4	31,9	
Тривалість періоду вегетації, діб	100	110	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	24,7	26,4	
Висота рослини, см	123,3	122	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	7	
Вирівняність за висотою, бал	6,5	7,3	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	7	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	9	9	
Стійкість проти попелиці, бал	9	7	
Вміст білка, %	11,1	9,5	
Вміст крохмалю, %	75,8	76,9	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.**Заявка № 21018005 Назва сорту:** Н2Ф282 БМР **Заявник (код):** 1985 **Власник сорту (код):** 1985**Дата пріоритету:** 15.12.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240795**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля	помірна	5	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	слабка	3	
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	пізній	7	
7	Листок: зелене забарвлення	помірне	3	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	велика	7	
10	Листок: забарвлення центральної жилки	жовтувато-біле	2	
11	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	світло-жовте	4	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння–кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
16	Приймочка: забарвлення	світло-жовте	2	
17	Приймочка: за довжиною	середня	5	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	середня	5	
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	помірно щільна	5	
20	Сухі тичинки: забарвлення	помаранчеве	3	
21	Рослина: за довжиною	дуже довга	13	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням флагового листка)	середній	5	
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	довга	7	
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
27	Волоть: за щільністю (за досягання)	щільна	7	
28	Волоть: положення найширшої частини	середнє	3	
29	Волоть: шийка за довжиною	коротка	3	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	червонувато-коричневе	5	
31	Колоскова луска: за довжиною	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення за досягання	світло-коричневе	7	
33	Маса 1000 зерен	велика	7	
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	4	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зернівка: тип ендосперму	на 1/2 склоподібний	3	
40	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	помаранчеве	3	
41	Рослина: кількість бічних продуктивних пагонів	мала	2	
42	Квітка: здатність до самозапилення	сильна	3	
43	Рослина: чутливість до фотоперіодизму	відсутня	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,96	6,23	
Довірчий інтервал, т/га	0,62	0,70	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,31	6,34	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,65	0,11	
+, - до усередненої урожайності, %	-33,3	1,8	
Тривалість періоду вегетації, діб	103	114	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	28,8	28,2	
Висота рослини, см	155,5	186,3	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	7	
Вирівняність за висотою, бал	7,2	7,6	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	7	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти попелиці, бал	8	7	
Вміст білка, %	11,2	10,8	
Вміст крохмалю, %	75,7	73,5	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.**Заявка № 24018005 Назва сорту:** СІНАЙ **Заявник (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.12.2024 **Патент № 240609****Дата пріоритету:** 20.03.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптіля	відсутня або дуже слабка	1	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
7	Листок: зелене забарвлення	помірне	3	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	мала	3	до середньої
10	Листок: забарвлення центральної жилки	світло-зелене	3	
11	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	світло-жовте	4	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння–кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
16	Приймочка: забарвлення	біле	1	
17	Приймочка: за довжиною	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	коротка	3	до середньої
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	нещільна	3	
20	Сухі тичинки: забарвлення	помаранчеве	3	
21	Рослина: за довжиною	коротка	7	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням флагового листка)	малий	3	до середнього
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	середня	5	
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	до широкої
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	до довгих
27	Волоть: за щільністю (за досягання)	нещільна	3	
28	Волоть: положення найширшої частини	низьке	2	
29	Волоть: шийка за довжиною	коротка	3	до середньої
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	темно-коричневе	6	
31	Колоскова луска: за довжиною	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення за досягання	жовтувате-біле	2	
33	Маса 1000 зерен	середня	5	до великої
34	Зернівка: форма зі спинки	яйцеподібна	3	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	до великого
38	Зернівка: вміст таніну	відсутній або дуже низький	1	
39	Зернівка: тип ендосперму	на 3/4 крохмалистий	4	
40	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	2	
41	Рослина: кількість бічних продуктивних пагонів	відсутня або дуже мала	1	
42	Квітка: здатність до самозапилення	сильна	3	
43	Рослина: чутливість до фотоперіодизму	відсутня	1	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

Коноплі посівні

Ріпак (ярий)

Соняшник однорічний

Соняшник однорічний – батьківський компонент



Вид: Коноплі посівні *Cannabis sativa* L.
Заявка № 23080001 Назва сорту: ЄС Джин **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287
Володілець патенту (код): 2287
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240846
Дата пріоритету: 16.01.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 241000
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядоля: форма	вузькообернено-яйцеподібна	1	
2	Сім'ядоля: забарвлення	світло-зелене	2	
3	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки	слабка	3	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
6	Листок: черешок за довжиною	короткий	1	
7	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення черешка	відсутня або дуже слабка	1	
8	Листок: кількість листочків	мала	1	
9	Центральна листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Центральна листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Час цвітіння чоловічих суцвіть	пізній	7	
12	Суцвіття: інтенсивність антоціанового забарвлення чоловічих суцвіть	відсутня або дуже слабка	1	
13	Суцвіття: вміст ТГК	відсутній або дуже низький	1	
14	Рослина: співвідношення гермафродитних рослин	велике	5	
15	Рослина: співвідношення жіночих рослин	мале	1	
16	Рослина: співвідношення чоловічих рослин	мале	1	
17	Рослина: за природною висотою	висока	7	
18	Головне стебло: забарвлення	помірно зелене	2	
19	Головне стебло: міжвузля за довжиною	середні	5	
20	Головне стебло: за товщиною	середнє	2	
21	Головне стебло: борізки за глибиною	мілкі	1	
22	Головне стебло: серцевина в поперечному перерізі	відсутня або тонка	1	
23	Насіння: маса 1000 шт.	мала	2	
24	Насінина: забарвлення шкірки	помірно сіре	2	
25	Насінина: мармуровість	слабка	3	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності
Висота рослин, см – 290,0. Урожайність насіння, т/га – 2,1. ТГК не виявлено. Стабільність ознаки однодомності (вміст рослин плосконі), % – 0,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (*Fusarium* spp.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): конопляна блішка (*Psylliodes attenuata* Koch.) – 7; стебловий метелик (*Ostrinia nubilalis* Hb.) – 7.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 22041003 Назва сорту: Калімера КЛ **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

Володілець патенту (код): 912

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240850

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240967

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7	
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3	до середньої
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5	до довгого
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	довгі	7	
14	Квітка: ширина пелюсток	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	дуже довга	9	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7	
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3	
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,06	1,73
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,93	1,41
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,13	-0,32
+, - до усередненої урожайності, %		-6,3	-18,5
Довірчий інтервал, т/га		0,15	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб		105	98
Висота рослини, см		105,9	106,7
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		5,7	4,7
Вміст білка, %		23,5	23,5
Вміст олії, %		43,2	43,8
Вміст ерукової кислоти, %		0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %		0,8	0,8
Стійкість до вилягання, бал		7	8
Стійкість до обсіпання, бал		6	7
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		5	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		6	5
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		6	7
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 22041001 Назва сорту: КРЕЙЗІ КЛ **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912
Володілець патенту (код): 912
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240848
Дата пріоритету: 21.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024
Свідцтво про державну реєстрацію № 240965
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5	
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	короткий	3	до середнього
19	Стручок: довжина зубця	середній	5	
20	Стручок: довжина ніжки	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,06	1,73
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,97	1,37
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,09	-0,36
+, - до усередненої урожайності, %		-4,4	-20,8
Довірчий інтервал, т/га		0,15	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб		105	97
Висота рослини, см		101,3	100,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		5,4	4,7
Вміст білка, %		24	23,8
Вміст олії, %		43,8	44
Вміст ерукової кислоти, %		0	0,2
Вміст глюкозинолатів, %		0,8	0,7
Стійкість до вилягання, бал		7	8
Стійкість до обсіпання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		6	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		6	5
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		7	7
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 22041002 Назва сорту: ЛЕПОРЕЛЛО Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Володілець патенту (код): 912

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 Патент № 240849

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240966

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5	
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5	
19	Стручок: довжина зубця	середній	5	до довгого
20	Стручок: довжина ніжки	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,06	1,73
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,99	1,41
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,07	-0,32
+, - до усередненої урожайності, %		-3,4	-18,5
Довірчий інтервал, т/га		0,15	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб		105	98
Висота рослини, см		105,2	101,8
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		5,2	4,5
Вміст білка, %		24,3	25,1
Вміст олії, %		43,4	43,3
Вміст ерукової кислоти, %		0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %		0,8	0,8
Стійкість до вилягання, бал		7	7
Стійкість до обсіпання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		7	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	5
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		7	7
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 21039086 **Назва сорту:** 1043Л КЛП **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890**Володілець патенту (код):** 2890**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.12.2024 **Патент №** 240582**Дата пріоритету:** 17.12.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 15.01.2024**Свідство про державну реєстрацію №** 240046**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039069 **Назва сорту:** Амарок **Заявник (код):** 1265 **Власник сорту (код):** 1265

Володілець патенту (код): 1265

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.12.2024 **Патент №** 240661

Дата пріоритету: 28.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240979

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,58	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,99	3,42	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,51	-0,16	
+, - до усередненої урожайності, %	20,6	-4,5	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	72,3	75,2	
Діаметр кошика, см	15,2	16,4	
Висота рослини, см	169,7	177,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,7	7,9	
Тривалість періоду вегетації, діб	123	124	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	9	5	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	48	47,1	
Вміст білка, %	17,6	18,2	
Лушпинність, %	26,9	29,6	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039001 Назва сорту: АПС85 **Заявник (код):** 2440 **Володілець патенту (код):** 2440

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.12.2024 **Патент № 240837**

Дата пріоритету: 06.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	сильна	7	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,61	3,44	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,13	-0,07	
+, - до усередненої урожайності, %	5,2	-2,0	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	58,6	71,7	
Діаметр кошика, см	14,6	19,1	
Висота рослини, см	157,6	179,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,2	8,8	
Тривалість періоду вегетації, діб	118	119	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти вовчка, бал	6	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	43,6	46,4	
Вміст білка, %	16,4	16,6	
Лушпинність, %	27,2	29,3	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	5		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039004 Назва сорту: АПС94 Заявник (код): 2440 Володілець патенту (код): 2440

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.12.2024 Патент № 240838

Дата пріоритету: 06.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,60	3,57	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,12	0,06	
+, - до усередненої урожайності, %	4,8	1,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	55,3	69,5	
Діаметр кошика, см	14,2	19,7	
Висота рослини, см	149,3	167,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,5	8,4	
Тривалість періоду вегетації, діб	117	118	
Стійкість до вилягання, бал	6	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти вовчка, бал	4	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	42,5	43,2	
Вміст білка, %	16,9	16,4	
Лушпинність, %	32,7	27,6	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	3		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039101 Назва сорту: АПСФ77 **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

Володілець патенту (код): 2440

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.12.2024 **Патент №** 240834

Дата пріоритету: 22.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240977

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,72	3,41	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,24	-0,10	
+, - до усередненої урожайності, %	9,7	-2,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	63,5	65,1	
Діаметр кошика, см	13,7	18,8	
Висота рослини, см	151,3	174,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,2	8,8	
Тривалість періоду вегетації, діб	119	118	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти вовчка, бал	4	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	44,3	43,9	
Вміст білка, %	18,2	16,8	
Лушпинність, %	27,7	26	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	3		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039074 Назва сорту: Аркана **Заявник (код):** 1265 **Власник сорту (код):** 1265

Володілець патенту (код): 1265

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.12.2024 **Патент № 240662**

Дата пріоритету: 28.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240980

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,42	3,52	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,06	0,01	
+, - до усередненої урожайності, %	-2,4	0,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	54,9	66,3	
Діаметр кошика, см	13,8	18,1	
Висота рослини, см	145,3	167,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,7	8,3	
Тривалість періоду вегетації, діб	118	119	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	7	
Стійкість проти вовчка, бал	1	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,3	47,1	
Вміст білка, %	17,4	17,4	
Лушпинність, %	26,7	27,8	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	1		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039018 Назва сорту: Аркона Заявник (код): 2793 Власник сорту (код): 2793

Дата пріоритету: 07.04.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240894

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричневе	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,32	3,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,42	2,70	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,10	-0,68	
+, - до усередненої урожайності, %	4,3	-20,1	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	66,6	56,1	
Діаметр кошика, см	15,2	17,3	
Висота рослини, см	141,9	177,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,6	8,3	
Тривалість періоду вегетації, діб	110	114	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	4	6	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	46,5	47,5	
Вміст білка, %	17	16,5	
Лушпинність, %	28,3	26,4	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	6		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039047 Назва сорту: АРКОС **Заявник (код):** 2882 **Власник сорту (код):** 2882

Володілець патенту (код): 2882

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент № 240587**

Дата пріоритету: 08.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240780

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,93	3,33	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,45	-0,18	
+, - до усередненої урожайності, %	18,1	-5,1	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	63,9	71,8	
Діаметр кошика, см	14,9	17,9	
Висота рослини, см	151,1	170,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,5	7,9	
Тривалість періоду вегетації, діб	118	118	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	6	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	44,3	43,7	
Вміст білка, %	18	18	
Лушпинність, %	28,8	31,2	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039067 **Назва сорту:** Бамбус **Заявник (код):** 3096 **Володілець патенту (код):** 3096

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240810

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,58	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,66	3,64	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,18	0,06	
+, - до усередненої урожайності, %	7,3	1,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	56,3	66,4	
Діаметр кошика, см	13,9	18,5	
Висота рослини, см	167,6	179	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,8	8,9	
Тривалість періоду вегетації, діб	122	125	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	2	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,5	48,7	
Вміст білка, %	18,4	16,4	
Лушпинність, %	25,9	28,9	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	2		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039049 **Назва сорту:** БАРСЕЛЛОНА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240729

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240782

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,76	3,29	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,34	-0,24	
+, - до усередненої урожайності, %	14,0	-6,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	57,6	69,2	
Діаметр кошика, см	15,6	17,6	
Висота рослини, см	142,8	166,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,7	8,6	
Тривалість періоду вегетації, діб	108	111	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	51,2	52,1	
Вміст білка, %	15,5	14,9	
Лушпинність, %	25,4	25,2	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039053 Назва сорту: ВАЛЬКІРІЯ **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240730**

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240784

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,04	3,43	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,62	-0,10	
+, - до усередненої урожайності, %	25,6	-2,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	59	68,2	
Діаметр кошика, см	14,2	18	
Висота рослини, см	143,1	166,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7,6	
Тривалість періоду вегетації, діб	106	112	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	48,2	49,4	
Вміст білка, %	16,1	15,6	
Лушпинність, %	25,4	28,1	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039068 Назва сорту: Варді **Заявник (код):** 3091 **Володілець патенту (код):** 3091

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240811**

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,67	3,57	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,19	0,06	
+, - до усередненої урожайності, %	7,7	1,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	55,7	64,1	
Діаметр кошика, см	15	19,1	
Висота рослини, см	152,9	175,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8,4	
Тривалість періоду вегетації, діб	118	119	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	2	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	47,8	48,4	
Вміст білка, %	16,3	14,9	
Лушпинність, %	26,6	26,8	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	1		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039054 **Назва сорту:** ВІВАЛЛІТО КЛП **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240731

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240785

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно випукла	5	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,78	3,22	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,36	-0,31	
+, - до усередненої урожайності, %	14,9	-8,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	77	78,4	
Діаметр кошика, см	12,9	15,8	
Висота рослини, см	146,8	166,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,7	9	
Тривалість періоду вегетації, діб	107	112	
Стійкість до вилягання, бал	6	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	49	50,1	
Вміст білка, %	18,1	16,1	
Лушпинність, %	24,4	25,4	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	5		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039040 Назва сорту: ГЕНДАЛЬФ КЛП **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент № 240583**

Дата пріоритету: 28.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230568

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 22039075 Назва сорту:** Дайна **Заявник (код):** 2843 **Власник сорту (код):** 2843**Володілець патенту (код):** 2843**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 23.12.2024 **Патент №** 240836**Дата пріоритету:** 29.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 23.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240981**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,10	3,64	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,62	0,13	
+, - до усередненої урожайності, %	25,0	3,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	67,9	74,9	
Діаметр кошика, см	14,6	18,4	
Висота рослини, см	163,3	178	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,7	7,9	
Тривалість періоду вегетації, діб	120	120	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	9	7	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	48,8	47,8	
Вміст білка, %	17,2	16,6	
Лушпинність, %	25,5	27,9	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	8		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23039011 Назва сорту:** ЄС Аркада **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287**Володілець патенту (код):** 2287**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.12.2024 **Патент №** 240852**Дата пріоритету:** 16.01.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 26.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 241004**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,36	3,61	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,12	0,10	
+, - до усередненої урожайності, %	-4,8	2,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	62,9	68,6	
Діаметр кошика, см	14,7	17,9	
Висота рослини, см	145,6	175,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,5	8,1	
Тривалість періоду вегетації, діб	121	120	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	5	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47,1	47,6	
Вміст білка, %	18,3	16,1	
Лушпинність, %	26,2	28,1	
Блок (група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	5		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 23039015 **Назва сорту:** ЄС Бравус **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287**Володілець патенту (код):** 2287**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.12.2024 **Патент №** 240853**Дата пріоритету:** 16.01.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 26.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 241005**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,58	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,61	3,58	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,13	0,00	
+, - до усередненої урожайності, %	5,2	0,0	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	59,3	66,7	
Діаметр кошика, см	13,5	18,3	
Висота рослини, см	183,7	193,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,8	8,8	
Тривалість періоду вегетації, діб	125	129	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	7	
Стійкість проти вовчка, бал	1	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	45	45	
Вміст білка, %	20,4	19,2	
Лушпинність, %	28,6	29,5	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	1		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23039016 Назва сорту:** ЄС Діксон **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287**Володілець патенту (код):** 2287**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.12.2024 **Патент №** 240854**Дата пріоритету:** 16.01.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 26.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 241006**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	дуже великі	9	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,72	3,39	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,24	-0,12	
+, - до усередненої урожайності, %	9,7	-3,4	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	56,7	69,5	
Діаметр кошика, см	16	18,4	
Висота рослини, см	150,2	176,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,5	8,5	
Тривалість періоду вегетації, діб	118	118	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	5	
Стійкість проти вовчка, бал	5	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	46,7	47,2	
Вміст білка, %	17,5	15,6	
Лушпинність, %	27,3	29,1	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	5		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 22039055 **Назва сорту:** ЖЕРОНІМО СУ **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240829**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,67	2,93	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,25	-0,60	
+, - до усередненої урожайності, %	10,3	-17,0	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	62,4	69,1	
Діаметр кошика, см	13,3	15,9	
Висота рослини, см	153,7	179,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,3	7,8	
Тривалість періоду вегетації, діб	109	114	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	45,1	45,1	
Вміст білка, %	18,2	17,8	
Лушпинність, %	29,2	29,2	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23039021 Назва сорту:** Захисник **Заявник (код):** 1581 **Володілець патенту (код):** 1581**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2024 **Патент № 240651****Дата пріоритету:** 20.02.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика охоплює	не охоплює або дуже злегка	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cuman</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039008 Назва сорту: ІНСАН 266 КЛП Заявник (код): 2890 Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 Патент № 240590

Дата пріоритету: 13.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039014 Назва сорту: Інсан 277 СУ **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240591

Дата пріоритету: 13.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідцтво про державну реєстрацію № 230823

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039112 Назва сорту: Корунд **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Володілець патенту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент № 240650**

Дата пріоритету: 29.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240828

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,58	3,34	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,16	-0,19	
+, - до усередненої урожайності, %	6,6	-5,4	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	60,9	64,3	
Діаметр кошика, см	14,7	17,5	
Висота рослини, см	149,3	169	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,7	9	
Тривалість періоду вегетації, діб	108	113	
Стійкість до вилягання, бал	6	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	5	
Стійкість проти вовчка, бал	1	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	45,8	47,5	
Вміст білка, %	16,9	16,4	
Лушпинність, %	26,8	26,9	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	2		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039042 **Назва сорту:** ЛГ50449 СХ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240584

Дата пріоритету: 28.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.07.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240435

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 22039044 **Назва сорту:** ЛГ50489 CX **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Володілець патенту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.12.2024 **Патент №** 240585**Дата пріоритету:** 28.11.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.07.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240434**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039048 Назва сорту: ЛЕРОС КЛП **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240728

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240781

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,62	3,66	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,14	0,15	
+, - до усередненої урожайності, %	5,6	4,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	68,6	76,9	
Діаметр кошика, см	13,5	15,6	
Висота рослини, см	148,8	165,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	9	
Тривалість періоду вегетації, діб	116	119	
Стійкість до вилягання, бал	6	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	2	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	46,4	46,3	
Вміст білка, %	19	18,4	
Лушпинність, %	27,2	28,1	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	1		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039066 Назва сорту: Магнус **Заявник (код):** 3093 **Володілець патенту (код):** 3093

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240809**

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,71	3,52	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,23	0,01	
+, - до усередненої урожайності, %	9,3	0,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	53	57,2	
Діаметр кошика, см	15,3	18	
Висота рослини, см	145,4	164,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,5	8,8	
Тривалість періоду вегетації, діб	116	118	
Стійкість до вилягання, бал	6	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти вовчка, бал	1	7	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	7	9	
Вміст олії, %	46	47,7	
Вміст білка, %	18,6	15,9	
Лушпинність, %	27,8	28,8	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	1		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039057 Назва сорту: МАС 852СУ Заявник (код): 2720 Власник сорту (код): 2720

Дата пріоритету: 19.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240831

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,94	3,62	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,46	0,11	
+, - до усередненої урожайності, %	18,5	3,1	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	68,7	71,6	
Діаметр кошика, см	14,2	18,1	
Висота рослини, см	172,2	173,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8,5	
Тривалість періоду вегетації, діб	121	119	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	6	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	44,7	43,8	
Вміст білка, %	18,3	17,9	
Лушпинність, %	32,7	32,2	
Блок (група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039056 Назва сорту: МАС 900СУ Заявник (код): 2720 Власник сорту (код): 2720

Дата пріоритету: 19.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240830

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,68	3,48	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,26	-0,05	
+, - до усередненої урожайності, %	10,7	-1,4	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	65,1	72,1	
Діаметр кошика, см	15,2	18	
Висота рослини, см	165	192,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	8,5	
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	3	7	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	7	9	
Вміст олії, %	45,2	44,2	
Вміст білка, %	18,6	16,3	
Лушпинність, %	31	33,3	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	4		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039052 **Назва сорту:** H4X202 E **Заявник (код):** 1985 **Власник сорту (код):** 1985

Дата пріоритету: 22.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240783

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,29	3,67	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,19	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,97	3,06	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,68	-0,61	
+, - до усередненої урожайності, %	29,7	-16,6	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	54,7	55,4	
Діаметр кошика, см	15,5	18,1	
Висота рослини, см	146,2	168,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,2	9	
Тривалість періоду вегетації, діб	111	111	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	6	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	48	50,2	
Вміст білка, %	16,7	15,6	
Лушпинність, %	23,7	25,6	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	84,7	82,3	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039071 Назва сорту: Немея **Заявник (код):** 3094 **Володілець патенту (код):** 3094

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240812**

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,58	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,37	3,30	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,89	-0,28	
+, - до усередненої урожайності, %	35,9	-7,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	62	63,7	
Діаметр кошика, см	14,9	17,7	
Висота рослини, см	175,1	186,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	8,6	
Тривалість періоду вегетації, діб	124	125	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	5	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,2	50,1	
Вміст білка, %	17,2	16	
Лушпинність, %	27,4	29,1	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039061 **Назва сорту:** НЕРІДА АР **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240968

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,08	3,52	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,60	0,01	
+, - до усередненої урожайності, %	24,2	0,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	52,5	66,2	
Діаметр кошика, см	14,1	17,5	
Висота рослини, см	151,1	160	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,8	7,9	
Тривалість періоду вегетації, діб	118	118	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48	49,5	
Вміст білка, %	16,9	16,2	
Лушпинність, %	27,6	24,2	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039073 Назва сорту: Сабінус Заявник (код): 3201 Володілець патенту (код): 3201

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 Патент № 240813

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,55	3,71	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,13	0,18	
+, - до усередненої урожайності, %	5,4	5,1	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	58,9	71,2	
Діаметр кошика, см	14,2	17,7	
Висота рослини, см	144,7	174,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8,4	
Тривалість періоду вегетації, діб	108	112	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти вовчка, бал	2	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	7	9	
Вміст олії, %	48,7	49,2	
Вміст білка, %	18,6	17,4	
Лушпинність, %	25,6	25,8	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	2		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039046 Назва сорту: САЛАМАНКА **Заявник (код):** 2882 **Власник сорту (код):** 2882

Володілець патенту (код): 2882

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240586

Дата пріоритету: 08.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240779

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,04	3,07	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,56	-0,44	
+, - до усередненої урожайності, %	22,6	-12,5	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	62,8	65	
Діаметр кошика, см	14,3	17,2	
Висота рослини, см	152,2	171,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	9	
Тривалість періоду вегетації, діб	118	117	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	4	
Стійкість проти вовчка, бал	5	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,8	45	
Вміст білка, %	18,9	17	
Лушпинність, %	27,4	29,9	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	6		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039050 Назва сорту: Саяд **Заявник (код):** 2843 **Власник сорту (код):** 2843

Володілець патенту (код): 2843

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.12.2024 **Патент №** 240835

Дата пріоритету: 15.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240978

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Спійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	відсутня	1	
44	Спійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,88	3,20	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,40	-0,31	
+, - до усередненої урожайності, %	16,1	-8,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	62,5	65,4	
Діаметр кошика, см	15,2	16,9	
Висота рослини, см	149	169,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,2	8,1	
Тривалість періоду вегетації, діб	117	118	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	6	
Стійкість проти вовчка, бал	5	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	46,9	47,5	
Вміст білка, %	19,1	17,2	
Лушпинність, %	26,2	28,7	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	5		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039062 Назва сорту: СУВОРА Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240832

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,72	3,63	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,24	0,12	
+, - до усередненої урожайності, %	9,7	3,4	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	60,4	63,2	
Діаметр кошика, см	15	17,8	
Висота рослини, см	155,7	169,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,7	8,4	
Тривалість періоду вегетації, діб	120	119	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	49,3	50,6	
Вміст білка, %	17,5	16,7	
Лушпинність, %	26,1	25,3	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039064 Назва сорту: СУНАРІС Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240833

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,24	3,29	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,82	-0,24	
+, - до усередненої урожайності, %	33,9	-6,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	62,9	67,7	
Діаметр кошика, см	15	17,2	
Висота рослини, см	160,4	180,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,7	9	
Тривалість періоду вегетації, діб	109	114	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,4	48,7	
Вміст білка, %	17,5	15,1	
Лушпинність, %	25,8	27,5	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039060 Назва сорту: ХАЙСАН182IT **Заявник (код):** 2834 **Власник сорту (код):** 2554

Володілець патенту (код): 2554

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент № 240588**

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240786

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,12	3,40	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	-0,11	
+, - до усередненої урожайності, %	25,8	-3,1	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	60,3	60,7	
Діаметр кошика, см	15	17,8	
Висота рослини, см	153,2	169,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,5	8,3	
Тривалість періоду вегетації, діб	118	118	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	9	5	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	46,7	46,3	
Вміст білка, %	16,8	16,1	
Лушпинність, %	26,4	30	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939130 Назва сорту: 211СУ Заявник (код): 2440 Власник сорту (код): 2440

Володілець патенту (код): 2440

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.12.2024 Патент № 240839

Дата пріоритету: 18.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240982

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939001 Назва сорту: 422PIMI **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

Володілець патенту (код): 2440

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.12.2024 **Патент №** 240841

Дата пріоритету: 06.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240987

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939086 Назва сорту: AP 008 A **Заявник (код):** 1265 **Власник сорту (код):** 1265

Володілець патенту (код): 1265

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.12.2024 **Патент № 240665**

Дата пріоритету: 28.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240986

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	сильно загнуте до задньої сторони кошика	5	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939079 Назва сорту: AP 008 Б **Заявник (код):** 1265 **Власник сорту (код):** 1265

Володілець патенту (код): 1265

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.12.2024 **Патент №** 240664

Дата пріоритету: 28.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240985

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939046 Назва сорту: АТ2721 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240732**

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240901

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23939053 Назва сорту:** АТ3717 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783**Дата пріоритету:** 23.11.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2024**Свідство про державну реєстрацію № 240911****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939152 Назва сорту: Б96 Заявник (код): 2267 Власник сорту (код): 2267

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240896

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939073 Назва сорту: БА2850 **Заявник (код):** 3096 **Володілець патенту (код):** 3096

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240815**

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939074 Назва сорту: БС8501 **Заявник (код):** 3096 **Володілець патенту (код):** 3096

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240816**

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	малий	3	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939075 Назва сорту: BA2160 **Заявник (код):** 3091 **Володілець патенту (код):** 3091

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240817**

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939077 Назва сорту: BX 2101 B **Заявник (код):** 2548 **Власник сорту (код):** 2548

Володілець патенту (код): 2548

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240804

Дата пріоритету: 28.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240969

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	темно-коричневе	6	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939089 Назва сорту: BX 2603 A **Заявник (код):** 2548 **Власник сорту (код):** 2548

Володілець патенту (код): 2548

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240805

Дата пріоритету: 28.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240970

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939057 **Назва сорту:** EX701 x MX702 **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Володілець патенту (код): 2267

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240601

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240904

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939154 Назва сорту: EX820 **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240897

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939063 Назва сорту: EX908 **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Володілець патенту (код): 2267

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент № 240606**

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240909

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939060 Назва сорту: EX993 **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Володілець патенту (код): 2267

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240603

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240906

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939019 Назва сорту: ЄС 121 **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287

Володілець патенту (код): 2287

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240857

Дата пріоритету: 22.06.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241009

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	сильна	7	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка увігнутий	2	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939017 Назва сорту: ЄС 421 **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287

Володілець патенту (код): 2287

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240855

Дата пріоритету: 19.06.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024

Свідство про державну реєстрацію № 241007

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cuman</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939018 Назва сорту: ЄС 522 **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287

Володілець патенту (код): 2287

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент № 240856**

Дата пріоритету: 19.06.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241008

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939049 Назва сорту: ЄС-122 **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287

Володілець патенту (код): 2287

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240864

Дата пріоритету: 06.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 241015

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	темно-коричневе	6	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939043 Назва сорту: ЄС-211 **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287

Володілець патенту (код): 2287

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент № 240858**

Дата пріоритету: 06.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241010

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939045 Назва сорту: ЄС-212 **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287

Володілець патенту (код): 2287

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240860

Дата пріоритету: 06.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 241012

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939046 Назва сорту: ЄС-311 **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287

Володілець патенту (код): 2287

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240861

Дата пріоритету: 06.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 30.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241029

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939044 Назва сорту: ЄС-312 **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287

Володілець патенту (код): 2287

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240859

Дата пріоритету: 06.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 241011

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939048 Назва сорту: ЄС-422 **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287

Володілець патенту (код): 2287

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент № 240863**

Дата пріоритету: 06.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939047 Назва сорту: ЄС-521 **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287

Володілець патенту (код): 2287

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240862

Дата пріоритету: 06.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241013

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939022 Назва сорту: Л71234МІОА **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240596

Дата пріоритету: 28.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231044

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	малі	3	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939055 Назва сорту: ЛЦ166AIP **Заявник (код):** 2743 **Власник сорту (код):** 2743

Володілець патенту (код): 2743

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240592

Дата пріоритету: 10.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240834

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939082 **Назва сорту:** МГ8372 **Заявник (код):** 3093 **Володілець патенту (код):** 3093

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240821

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939083 Назва сорту: HE9706 **Заявник (код):** 3094 **Володілець патенту (код):** 3094

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240822**

Дата пріоритету: 28.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939078 Назва сорту: НМ4600 **Заявник (код):** 3094 **Володілець патенту (код):** 3094

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240819**

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939080 Назва сорту: HC4754 **Заявник (код):** 3093 **Володілець патенту (код):** 3093

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240820**

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939077 Назва сорту: НУ6433 **Заявник (код):** 3201 **Володілець патенту (код):** 3201

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент № 240818**

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939002 Назва сорту: П991Р **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

Володілець патенту (код): 2440

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.12.2024 **Патент №** 240842

Дата пріоритету: 06.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240988

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939024 Назва сорту: Р13СЛ1МІО **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Володілець патенту (код): 1435

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240598

Дата пріоритету: 28.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.01.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240003

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	темно-коричневе	6	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939020 Назва сорту: P14B34МЖІ **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Володілець патенту (код): 1435

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240594

Дата пріоритету: 28.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.01.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240001

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939021 Назва сорту: P8035M2ЖК **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Володілець патенту (код): 1435

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240595

Дата пріоритету: 28.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240898

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	малий	3	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939072 Назва сорту: РД8413 **Заявник (код):** 3091 **Володілець патенту (код):** 3091

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240814

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	ланцетна	1	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика охоплює	не охоплює або дуже злегка	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	малий	3	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939054 Назва сорту: РТ7721 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240734**

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240903

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939053 Назва сорту: PT7821 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240733

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідство про державну реєстрацію № 240902

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939016 Назва сорту: РФ1711СУ **Заявник (код):** 2743 **Власник сорту (код):** 2743

Володілець патенту (код): 2743

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240593

Дата пріоритету: 11.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240836

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	малий	3	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939150 Назва сорту: PX529 **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240895

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричневе	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939061 Назва сорту: PX598 **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Володілець патенту (код): 2267

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240604

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240907

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика охоплює	не охоплює або дуже злегка	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939064 Назва сорту: PX738СУЛ **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Володілець патенту (код): 2267

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240607

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240910

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939026 Назва сорту: PX766СУЛ **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Володілець патенту (код): 2267

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240600

Дата пріоритету: 08.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240900

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939062 Назва сорту: PX788 **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Володілець патенту (код): 2267

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240605

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240908

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cuman</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939058 Назва сорту: PX790СУЛ **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Володілець патенту (код): 2267

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240602

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240905

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939110 Назва сорту: РХА470 **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

Володілець патенту (код): 2440

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.12.2024 **Патент №** 240840

Дата пріоритету: 22.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240983

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка увігнутий	2	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939084 Назва сорту: СБ5100 Заявник (код): 3201 Володілець патенту (код): 3201

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 Патент № 240823

Дата пріоритету: 27.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939076 Назва сорту: СВ 4 В **Заявник (код):** 1265 **Власник сорту (код):** 1265

Володілець патенту (код): 1265

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.12.2024 **Патент №** 240663

Дата пріоритету: 28.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідство про державну реєстрацію № 240984

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939023 Назва сорту: СФ1561М2ІА **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Володілець патенту (код): 1435

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент № 240597**

Дата пріоритету: 28.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.01.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240002

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	сильна	7	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939059 Назва сорту: TPC5570P **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

Володілець патенту (код): 2720

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.11.2024 **Патент №** 240528

Дата пріоритету: 19.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240837

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	світло-жовте	2	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cuman</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939025 Назва сорту: Ф18БДЗМСА **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Володілець патенту (код): 1435

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.12.2024 **Патент №** 240599

Дата пріоритету: 28.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240899

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939009 Назва сорту: ФА718ЛС05 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240660

Дата пріоритету: 20.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240794

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939067 Назва сорту: ФА730ЛС05 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240655

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240789

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939069 Назва сорту: ФР410Л300 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240657

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240791

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939071 Назва сорту: ФР84229 **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959

Володілець патенту (код): 1959

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент № 240659**

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240793

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	малі	3	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939068 Назва сорту: ФР842ЛС23 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240656

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240790

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939070 Назва сорту: ФС74221 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240658

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240792

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939016 Назва сорту: Х 66 Б **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Володілець патенту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240652

Дата пріоритету: 08.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240835

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939066 Назва сорту: ЮР408ЛН00 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент №** 240654

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240788

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	малий	3	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939065 Назва сорту: ЮР603ЛС01 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.12.2024 **Патент № 240653**

Дата пріоритету: 26.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240787

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БУРЯК

Буряк цукровий



Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 22069012 Назва сорту: БТС 8835 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024
Свідectvo про державну реєстрацію № 240805
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	до середнього
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3	до середнього
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	до середньої
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		13,25	11,91
Збір цукру, т/га		17,55	18,61
+, - до усередненого збору цукру, т/га		4,30	6,70
+, - до усередненого збору цукру, %		32,5	56,3
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,29
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		68,59	65,78
Урожайність, т/га		81,82	83,88
+, - до усередненої урожайності, т/га		13,23	18,10
+, - до усередненої урожайності, %		19,3	27,5
Довірчий інтервал, т/га		0,81	1,23
Цукристість, %		21,7	22
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		79,3	81,1
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		3	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 22069011 Назва сорту: БТС СМАРТ 1215 Н Заявник (код): 1974 Власник сорту (код): 1974

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240804

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		13,25	11,91
Збір цукру, т/га		15,91	14,09
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,66	2,18
+, - до усередненого збору цукру, %		20,1	18,3
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,29
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		68,59	65,78
Урожайність, т/га		79,40	73,20
+, - до усередненої урожайності, т/га		10,81	7,42
+, - до усередненої урожайності, %		15,8	11,3
Довірчий інтервал, т/га		0,81	1,23
Цукристість, %		20	19,3
Придатність до механізованого збирання, бал		7	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		81	67,6
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 22069010 Назва сорту: БТС СМАРТ 3525 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024
Свідцтво про державну реєстрацію № 240803
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	до довгого
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	до великого
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	до довгої
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		13,25	11,91
Збір цукру, т/га		15,18	15,02
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,93	3,11
+, - до усередненого збору цукру, %		14,6	26,1
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,29
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		68,59	65,78
Урожайність, т/га		76,01	74,89
+, - до усередненої урожайності, т/га		7,42	9,11
+, - до усередненої урожайності, %		10,8	13,8
Довірчий інтервал, т/га		0,81	1,23
Цукристість, %		20	20
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		85,3	73
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		3	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 23069012 Назва сорту: СМАРТ АМАЛЬТЕЯ КВС **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.12.2024 **Патент № 240828**

Дата пріоритету: 15.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	циліндрично-конічна	4	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КОРМОВІ

Сорго суданське
Сорго цукрове



Вид: Сорго суданське *Sorghum sudanense* (Piper.) Stapf

Заявка № 22227001 Назва сорту: Скарб Степу **Заявник (код):** 2706 **Власник сорту (код):** 2706

Володілець патенту (код): 2706

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240689

Дата пріоритету: 24.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240912

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля	слабка	3	
2	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	слабка	3	
3	Рослина: кількість бічних продуктивних пагонів	мала	2	
4	Листок: зелене забарвлення	світле	2	
5	Листок: забарвлення центральної жилки	біле	1	
6	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	мала	3	
7	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
8	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
9	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Приймочка: забарвлення	жовте	3	
11	Приймочка: за довжиною	середня	5	
12	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	довга	7	
13	Квітка: здатність до самозапилення	помірна	2	
14	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	жовто-зелене	3	
15	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	нещільна	3	
16	Нижня квіткова луска: остиг за довжиною	довгий	7	
17	Сухі тичинки: забарвлення	помаранчеве	3	
18	Рослина: за довжиною	надзвичайно довга	15	
19	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням флагового листка)	малий	3	
20	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	середня	5	
21	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	вузька	3	
22	Волоть: за довжиною (без шийки)	довга	7	
23	Волоть: шийка за довжиною	довга	7	
24	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	довгі	7	
25	Волоть: за щільністю (за досягання)	нещільна	3	
26	Волоть: положення найширшої частини	дуже низьке	1	
27	Колоскова луска: забарвлення (за досягання)	світло-коричневе	4	
28	Колоскова луска: за довжиною	дуже довга	9	
29	Зернівка: забарвлення (за досягання)	світло-коричневе	7	
30	Маса 1000 зерен	мала	3	
31	Зернівка: форма зі спинки	широкоеліптична	2	
32	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
33	Зерно: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
34	Зернівка: тип ендосперму	склоподібний	3	
35	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	2	
36	Рослина: чутливість до фотоперіодизму	відсутня	1	
37	Зернівка: розмір зародка	ознака не визначалась	0	
38	Зернівка: поверхня, вкрита насіннєвою шкіркою	ознака не визначалась	0	
39	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
40	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	ознака не визначалась	0	
41	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	ознака не визначалась	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 2,9. Урожайність зеленої маси / збір сухої речовини, т/га – 48. Тривалість періоду від сходів до укісної стиглості, діб – 52. Тривалість періоду від сходів до збиральної стиглості насіння, діб – 115. Кількість укосів, шт. – 2. Поживність зеленої маси, к. од./кг – 20. Вміст в зеленій масі, %: цукру – 17; білка – 2,9; клітковини – 6,9. Холодостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання зерна, бал (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз (*Helminthosporium turcicum* Pass.) – 8; бактеріоз (*Pseudomonas andropogoni* Stapp.) – 7; летюча сажка (*Sorosporium Reilianum* McAlp. f. *sorghii* Geschele) – 9; вкрита сажка (*Sphacelotheca sorghi* Clint.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці (*Anoecia corni* F., *Tetraneura ulmi* L.) – 8; совки (*Noctuidae*) – 9; стебловий метелик (*Ostrinia nubilalis* Hb.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench
Заявка № 22241001 Назва сорту: Ботанічний **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Володілець патенту (код): 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.12.2024 **Патент №** 240832
Дата пріоритету: 26.07.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024
Свідцтво про державну реєстрацію № 241016
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля	слабка	3	
2	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	слабка	3	
3	Рослина: кількість бічних продуктивних пагонів	мала	2	
4	Листок: зелене забарвлення	світле	2	
5	Листок: забарвлення центральної жилки	біле	1	
6	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	середня	5	
7	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
8	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння – кінець цвітіння)	слабка	3	
9	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
10	Приймочка: забарвлення	жовте	3	
11	Приймочка: за довжиною	довга	7	
12	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	довга	7	
13	Квітка: здатність до самозапилення	сильна	3	
14	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	жовте	5	
15	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	помірно щільна	5	
16	Нижня квіткова луска: остию за довжиною	дуже довгий	9	
17	Сухі тичинки: забарвлення	червоне	5	
18	Рослина: за довжиною	надзвичайно довга	15	
19	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням флагового листка)	малий	3	
20	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	середня	5	
21	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
22	Волоть: за довжиною (без шийки)	довга	7	
23	Волоть: шийка за довжиною	коротка	3	
24	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	короткі	3	
25	Волоть: за щільністю (за досягання)	помірно щільна	5	
26	Волоть: положення найширшої частини	дуже високе	5	
27	Колоскова луска: забарвлення (за досягання)	чорне	7	
28	Колоскова луска: за довжиною	довга	7	
29	Зернівка: забарвлення (за досягання)	помаранчеве	5	
30	Маса 1000 зерен	мала	3	
31	Зернівка: форма зі спинки	вузькоеліптична	1	
32	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
33	Зерно: вміст таніну	ознака не визначається	0	
34	Зернівка: тип ендосперму	повністю склоподібний	1	
35	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	помаранчеве	3	
36	Рослина: чутливість до фотоперіодизму	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності
Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 3,2. Урожайність зеленої маси, т/га – 67. Вміст сухої речовини, % – 18. Вміст цукру в зеленій масі, % – 14,5; білка – 9,0; клітковини – 29,5. Група стиглості – середньостиглий. Стійкість до вилягання, балів (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): летюча сажка – 1; вкрита сажка – 1.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

*Баклажан
Васильки справжні
Кабачок
Капуста білоголова
Кріп пахучий
Кукурудза цукрова
Огірок посівний
Перець однорічний (солодкий)
Помідор їстівний*



Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 24093003 Назва сорту: Ден **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240667

Дата пріоритету: 01.04.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240800

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	сильне	7	
3	Рослина: габітус	прямостоячий	1	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	середнє	5	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
8	Стебло: опушення	слабке	3	
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	середній	5	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	сильна	7	
16	Плід: за довжиною	середній	5	
17	Плід: максимальний діаметр	середній	5	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	мале	3	
19	Плід: основна форма	грушоподібна	4	
20	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
21	Плід: верхівка	загострена	4	
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	відсутня або дуже мілка	1	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	дуже сильна	9	
26	Плід: глянуватість (як для 24)	слабка	3	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	середня	5	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	слабка	3	
35	Плід: розмір чашечки	середній	5	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	сильна	7	
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	слабка	3	
40	Плід: забарвлення м'якоті	білувате	1	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	коричнєве	4	
42	Час початку цвітіння	ранній	3	
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 46. Період від сівби до початку достигання, діб – 75. Період плодоношення, діб – 23. Вміст сухої речовини в плодах, % – 8,3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 24093002 Назва сорту: Джаз **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240666**

Дата пріоритету: 29.03.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240799

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилія	помірне	5	
3	Рослина: габітус	пряmostоячий	1	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	середнє	5	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
8	Стебло: опушення	слабке	3	
9	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Сущвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	великий	7	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	сильна	7	
16	Плід: за довжиною	середній	5	
17	Плід: максимальний діаметр	великий	7	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	мале	3	
19	Плід: основна форма	куляста	1	
20	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
21	Плід: верхівка	приплюснута	2	
22	Плід: витімка рубця приймочки маточки за глибиною	мілка	3	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	сильна	7	
26	Плід: глянуватість (як для 24)	сильна	7	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	слабка	3	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	довга	7	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	слабка	3	
35	Плід: розмір чашечки	великий	7	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	дуже сильна	9	
38	Плід: шипуватість чашечки	слабка	3	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	помірна	5	
40	Плід: забарвлення м'якоті	білувате	1	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	жовте	1	
42	Час початку цвітіння	ранній	3	
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 60. Період від сівби до початку досягання, діб – 65. Період плодоношення, діб – 20. Вміст сухої речовини в плодах, % – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 24093005 Назва сорту: Мірінда **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240669

Дата пріоритету: 29.03.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240802

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	слабке	3	
3	Рослина: габітус	пряmostоячий	1	
4	Рослина: за висотою	висока	7	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	середнє	5	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Стебло: опушення	слабке	3	
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	середній	5	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5	
16	Плід: за довжиною	середній	5	
17	Плід: максимальний діаметр	малий	3	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	велике	7	
19	Плід: основна форма	циліндрична	7	
20	Плід: розмір рубця маточки	дуже малий	1	
21	Плід: верхівка	приплюснута	2	
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	відсутня або дуже мілка	1	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	сильна	7	
26	Плід: глянуватість (як для 24)	помірна	5	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	довга	7	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	відсутнє	1	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	ознака не визначається	0	
35	Плід: розмір чашечки	великий	7	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	ознака не визначається	0	
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	помірна	5	
40	Плід: забарвлення м'якоті	білувате	1	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	коричнєве	4	
42	Час початку цвітіння	середній	5	
43	Час фізіологічної стиглості	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 45. Період від сівби до початку достигання, діб – 65. Період плодоношення, діб – 20.

Вміст сухої речовини в плодах, % – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 24093004 Назва сорту: Ріко **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240668**

Дата пріоритету: 29.03.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240801

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	ознака не визначається	0	
3	Рослина: габітус	розлогий	5	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	середнє	5	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Стебло: опушення	слабке	3	
9	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	середній	5	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5	
16	Плід: за довжиною	короткий	3	
17	Плід: максимальний діаметр	середній	5	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	мале	3	
19	Плід: основна форма	грушоподібна	4	
20	Плід: розмір рубця маточки	середній	5	
21	Плід: верхівка	округла	3	
22	Плід: витімка рубця приймочки маточки за глибиною	мілка	3	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	помірна	5	
26	Плід: глянуватість (як для 24)	сильна	7	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	наявна	9	
29	Плід: помітність смуг	сильна	7	
30	Плід: щільність смуг	помірна	5	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	довга	7	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	слабка	3	
35	Плід: розмір чашечки	великий	7	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	ознака не визначається	0	
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	помірна	5	
40	Плід: забарвлення м'якоті	білувате	1	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	вохристе	3	
42	Час початку цвітіння	ранній	3	
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 47. Період від сівби до початку достигання, діб – 85. Період плодоношення, діб – 20. Вміст сухої речовини в плодах, % – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Васильки справжні *Ocimum basilicum* L.
Заявка № 24464001 Назва сорту: Віолет Кінг **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429
Володілець патенту (код): 2429
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240670
Дата пріоритету: 29.03.2024
Дата державної реєстрації майнового права поширення: 11.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240806
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	проміжний	2	
2	Рослина: за загальною висотою	середня	5	
3	Рослина: за щільністю	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
6	Стебло: опушення	відсутнє	1	
7	Стебло: кількість квітконосів (за повного цвітіння)	більше трьох	3	
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	3	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення верхнього боку	наявне	9	
12	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення верхнього боку	сильна	7	
13	Листкова пластинка: поширення антоціанового забарвлення	по всій поверхні	3	
14	Тільки для сортів без антоціанового забарвлення. Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
15	Листкова пластинка: глянсуватість	помірна	5	
16	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листкова пластинка: профіль поперечного перерізу	випуклий	1	
18	Листкова пластинка: зазубленість краю	наявна	9	
19	Листкова пластинка: глибина зазубленості	помірна	5	
20	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
21	Черешок: за довжиною	середній	5	
22	Квітконос: середня довжина міжвузля (наприкінці цвітіння)	середня	5	
23	Квітконос: за загальною довжиною (наприкінці цвітіння)	середній	5	
24	Квітконос: опушення приквітків	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення віночка	темно-фіолетове	3	
26	Квітка: забарвлення приймочки маточки	світло-фіолетове	2	
27	Час початку цвітіння (10% рослин, що цвітуть)	пізній	7	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності
Урожайність надземної маси, т/га – 8. Урожайність насіння, кг/га – 5. Маса 1000 насінин, г – 2,3. Тривалість періоду вегетації, діб – 60. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Вміст ефірної олії, % – 1,2; ліналолу, % – 45.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр

Вид: Васильки справжні *Ocimum basilicum* L.

Заявка № 24464002 Назва сорту: Грін Дом **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240671

Дата пріоритету: 29.03.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240807

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	проміжний	2	
2	Рослина: за загальною висотою	середня	5	
3	Рослина: за щільністю	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
6	Стебло: опушення	відсутнє	1	
7	Стебло: кількість квітконосів (за повного цвітіння)	більше трьох	3	
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	3	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення верхнього боку	відсутнє	1	
12	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення верхнього боку	ознака не визначається	0	
13	Листкова пластинка: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
14	Тільки для сортів без антоціанового забарвлення. Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: глясуватість	сильна	7	
16	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листкова пластинка: профіль поперечного перерізу	випуклий	1	
18	Листкова пластинка: зазубленість краю	відсутня	1	
19	Листкова пластинка: глибина зазубленості	ознака не визначається	0	
20	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
21	Черешок: за довжиною	середній	5	
22	Квітконос: середня довжина міжвузля (наприкінці цвітіння)	середня	5	
23	Квітконос: за загальною довжиною (наприкінці цвітіння)	середній	5	
24	Квітконос: опушення приквітків	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення віночка	біле	1	
26	Квітка: забарвлення приймочки маточки	біле	1	
27	Час початку цвітіння (10% рослин, що цвітуть)	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність надземної маси, т/га – 9. Урожайність насіння, кг/га – 6. Маса 1000 насінин, г – 2,1. Тривалість періоду вегетації, діб – 50. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Вміст ефірної олії, % – 1,1; ліналолу, % – 47.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov**Заявка №** 24148009 **Назва сорту:** Золотий Дракон **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236**Володілець патенту (код):** 3236**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.12.2024 **Патент №** 240824**Дата пріоритету:** 11.09.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240935**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	широкоеліптична	3	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галузнення	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галузнення	помірний	5	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	пряме	1	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
13	Листкова пластинка: розсіченість	мілка	3	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	слабка	3	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	мала	3	
17	Черешок: за довжиною	короткий	3	
18	Черешок: кількість шипів	мала	3	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	ознака не визначається	0	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	жовте	3	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	сильна	7	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: борізки	відсутні	1	
47	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	дуже слабкий	1	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смуг і смуг)	жовте	3	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	сильна	7	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Плід: смужки на боріздках	ознака не визначається	0	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	відсутня	1	
58	Плід: розмір основних плям	ознака не визначається	0	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	ознака не визначається	0	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	дуже коротка	1	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	слабка	3	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	відсутня	1	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	жовте	4	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	помірна	5	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	ознака не визначається	0	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	білувате	1	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 57. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 47. Товарність, % – 96. Вміст сухої речовини, % – 6,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 6; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 7; фузаріозне в'янення (*Fusarium niveum* E.Sm.) – 7; вірусні хвороби – 6.

Географічні та зональні рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov**Заявка №** 24148010 **Назва сорту:** ТІГРЕТТО ді ІТАЛІЯ **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236**Володілець патенту (код):** 3236**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.12.2024 **Патент №** 240825**Дата пріоритету:** 11.09.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240936**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	слабка	3	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галузнення	відсутнє	1	
6	Рослина: ступінь галузнення	дуже слабкий	1	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначається	0	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: кількість шипів	велика	7	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	ознака не визначається	0	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	зелене	4	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	помірна	5	
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: борізки	відсутні	1	
47	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабкий	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	зелене	4	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	сильна	7	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Плід: смужки на борізках	наявні	9	
55	Плід: забарвлення смужок на борізках	темно-зелені	1	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	наявна	9	
58	Плід: розмір основних плям	великий	7	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	наявне	9	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	помірна	5	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	однокольорові смужки	3	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	сильна	7	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	відсутня	1	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	зелене	6	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	зелене	5	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	білувате	1	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 59. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 42. Товарність, % – 92. Вміст сухої речовини, % – 5,8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 7; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 6; фузаріозне в'янення (*Fusarium niveum* E.Sm.) – 6; вірусні хвороби – 5.

Географічні та зональні рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 24096006 Назва сорту: Вірджинія **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240672

Дата пріоритету: 29.03.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240808

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	великий	7	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлоге	5	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	широкоюяцеподібна	2	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	опуклий	3	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	малий	3	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	частково покритий	2	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	дуже ранній	1	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5	
35	Чоловіча стерильність	відсутня	1	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Період від сівби до початку досягання, діб – 45. Лежкість, балів (1–9) – 8. Вміст вітаміну С, мг % – 65; загального цукру, % – 4,7; сухої речовини, % – 8,5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 9; бактеріоз судинний – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Кріп пахучий *Anethum graveolens* L.

Заявка № 24125003 Назва сорту: Брум **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240673

Дата пріоритету: 29.03.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240809

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3–5 листків)	напівпряме	3	
3	Рослина: щільність листків	щільна	7	
4	Рослина: кількість первинних гілочок	середня	5	
5	Рослина: за висотою	середня	5	
6	Стебло: головне стебло за довжиною	середнє	5	
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	середній	5	
8	Стебло: блакитний відтінок	відсутній	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Стебло: восковий наліт	слабкий	3	
11	Листок: форма	ромбічна	2	
12	Листок: частки за щільністю	помірно щільні	5	
13	Листок: кінцеві частки за шириною	вузькі	3	
14	Листок: за довжиною	довгий	7	
15	Листок: за шириною	середній	5	
16	Листок: блакитний відтінок	відсутній	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
18	Листок: восковий наліт	помірний	5	
19	Головний зонтик: діаметр	середній	5	
20	Головний зонтик: кількість променів	середня	5	
21	Час появи головного зонтика	ранній	3	
22	Час початку цвітіння	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність надземної маси, т/га – 2,8. Урожайність насіння, т/га – 1,2. Маса 1000 насінин, г – 1,4. Тривалість періоду вегетації, діб – 105. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Вміст в насінні ефірної олії, % – 3,0. Вміст в зеленій масі вітаміну С, мг/100 г – 200. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса (*Plasmopara ni-vea* Schrot) – 8; септоріоз (*Puccinia petroselinii* (DC.) Lindr.) – 8; бактеріальна плямистість (*Bacillus petroselinii* Desm.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 23103004 Назва сорту: ДРАЙВЕР Р **Заявник (код):** 2662 **Власник сорту (код):** 2662

Володілець патенту (код): 2662

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 **Патент №** 240808

Дата пріоритету: 15.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240976

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	до похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 22. Група стиглості: середня – 2. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 65. Вміст загального цукру, % – 19. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 7; сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 7; сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 7; фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 23103003 Назва сорту: P03I Заявник (код): 2662 Власник сорту (код): 2662

Володілець патенту (код): 2662

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2024 Патент № 240807

Дата пріоритету: 15.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240975

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки у просторі	сильно похиле	7	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	два	2	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовтувато-біле	2	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 19,5. Група стиглості: рання – 1. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 50. Вміст загального цукру, % – 21. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 7; сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 8; сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 7; фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 24110008 Назва сорту: ДВА ВЕСЕЛИХ КУМА **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.12.2024 **Патент №** 240826
Дата пріоритету: 04.07.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024
Свідцтво про державну реєстрацію № 240964
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	наявна	9	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	довга	7	
4	Листкова пластинка: положення	поникле	3	
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	сильна	7	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	моноеційність	1	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 3 або 4	5	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	чорне	2	
16	Партенокарпія	відсутня	1	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	велике	7	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	гостра	2	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	гостра	1	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	помірна	2	
28	Плід: борозенки	наявні	9	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0	
31	Плід: тип покриву	волоски і шипики	2	
32	Плід: покрив за щільністю	щільний	7	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	ознака не визначається	0	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	великий	7	
36	Плід: смужки за довжиною	довгі	7	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	помірний	5	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	оранжеве	4	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	ознака не визначалась	0	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошністої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	помірно стійкий	2	
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i>) (CGMMV)	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності
Загальна врожайність, т/га – 51. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,8. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 47. Тривалість періоду плодоношення, діб – 21.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 24113006 Назва сорту: Колът **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240679

Дата пріоритету: 29.03.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240818

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначалась	0	
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Рослина: за висотою	середня	5	
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1	
17	Листок: форма поперечного перерізу	опукла	7	
18	Листок: глясуватість	слабка	3	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюсток	відсутнє	1	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зеленувато-біле	1	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	трикутна	7	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	еліптична	1	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	сильна	7	
35	Плід: глясуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0	
38	Плід: форма верхівки	загострена	2	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	милкі	3	
40	Плід: кількість долей	переважно дві	1	
41	Плід: м'якість за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсичин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час досягання	дуже ранній	1	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	наявна	9	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 55. Тривалість періоду до досягання, діб – 50. Товщина стінки плоду, мм – 8. Середня маса плоду, г – 160. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 90; загального цукру, % – 5; клітковини, % – 1; сухої речовини, % – 5,5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 24113007 Назва сорту: Ліра Спарк **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429
Володілець патенту (код): 2429
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240680
Дата пріоритету: 01.04.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240819
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: за довжиною стебла	довга	7	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначалась	0	
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Рослина: за висотою	висока	7	
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
14	Листок: форма	широкоеліптична	3	
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глясуватість	слабка	3	
19	Квітконіжка: положення	поникле	3	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє	1	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	сильна	7	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	довгий	7	
26	Плід: діаметр	малий	3	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	трикутна	7	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	еліптична	1	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	сильна	7	
35	Плід: глясуватість	сильна	7	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0	
38	Плід: форма верхівки	загострена	2	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	відсутні або дуже мілкі	1	
40	Плід: кількість долей	переважно дві	1	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсичин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5	
47	Час досягання	ранній	3	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	наявна	9	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності
Товарна врожайність, т/га – 63. Тривалість періоду до досягання, діб – 60. Товщина стінки плоду, мм – 7. Середня маса плоду, г – 190. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 85; загального цукру, % – 4,5; клітковини, % – 1; сухої речовини, % – 5,5.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 24113003 Назва сорту: Оранж Босс **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240676

Дата пріоритету: 29.03.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240815

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначалась	0	
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Рослина: за висотою	середня	5	
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	широкоеліптична	3	
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глясуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюсток	відсутнє	1	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	сильна	7	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досягання)	оранжеве	2	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	сильна	7	
35	Плід: глясуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4	
41	Плід: м'якість за товщиною	товста	7	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5	
47	Час досягання	середній	5	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	наявна	9	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 65. Тривалість періоду до досягання, діб – 60. Товщина стінки плоду, мм – 10. Середня маса плоду, г – 250. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 85; загального цукру, % – 4,5; клітковини, % – 1; сухої речовини, % – 5,5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 24113004 Назва сорту: Ред Булл Спарк **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429
Володілець патенту (код): 2429
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240677
Дата пріоритету: 29.03.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240816
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначалась	0	
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Рослина: за висотою	середня	5	
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
14	Листок: форма	широкоеліптична	3	
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1	
17	Листок: форма поперечного перерізу	опукла	7	
18	Листок: глясуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє	1	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	дуже сильна	9	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	середній	5	
26	Плід: діаметр	дуже великий	9	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	1	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	сильна	7	
35	Плід: глясуватість	сильна	7	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0	
38	Плід: форма верхівки	дуже увігнута	5	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	переважно чотири і більше	5	
41	Плід: м'якоть за товщиною	товста	7	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсичин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ознака не визначалась	0	
47	Час досягання	середній	5	
48,1	Стійкість проти Tobacco Mosaic Virus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobacco Mosaic Virus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість проти Tobacco Mosaic Virus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	наявна	9	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності
Товарна врожайність, т/га – 70. Тривалість періоду до досягання, діб – 70. Товщина стінки плоду, мм – 12. Середня маса плоду, г – 300. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 95; загального цукру, % – 5,3; клітковини, % – 1; сухої речовини, % – 6.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 24113005 Назва сорту: Стріт **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240678

Дата пріоритету: 29.03.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240817

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	довга	7	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначалась	0	
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Рослина: за висотою	висока	7	
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
14	Листок: форма	широкоеліптична	3	
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глясуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	поникле	3	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюсток	відсутнє	1	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	сильна	7	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	сильна	7	
35	Плід: глясуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3	
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4	
41	Плід: м'якість за товщиною	товста	7	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсичин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час досягання	ранній	3	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	наявна	9	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 65. Тривалість періоду до досягання, діб – 55. Товщина стінки плоду, мм – 10. Середня маса плоду, г – 260. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 90; загального цукру, % – 5; клітковини, % – 1; сухої речовини, % – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115023 Назва сорту:** Блейз **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429**Володілець патенту (код):** 2429**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240685**Дата пріоритету:** 01.04.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240824**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	дуже малий	1	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	наявна	9	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	дуже висока	9	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 85. Вміст каротину, мг % – 21; сухої речовини в плоді, % – 4,9; вітаміну С, мг % – 23,9; загального цукру, % – 3,1. Загальна кислотність, % – 0,29. Маса товарного плоду, г – 45. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 95. Тривалість періоду плодоношення, діб – 35.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115021 Назва сорту:** Джордано **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429**Володілець патенту (код):** 2429**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240683**Дата пріоритету:** 01.04.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240822**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	коричневе	6	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	коричневе	6	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	наявна	9	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	відсутня	1	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	наявна	9	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 95. Вміст каротину, мг % – 19; сухої речовини в плоді, % – 4,7; вітаміну С, мг % – 23,6; загального цукру, % – 3,4. Загальна кислотність, % – 0,27. Маса товарного плоду, г – 210. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 105. Тривалість періоду плодоношення, діб – 35.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115019 Назва сорту:** Ельза **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429**Володілець патенту (код):** 2429**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240681**Дата пріоритету:** 01.04.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240820**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціяція (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	куста (видовжена)	4	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругла	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	тільки дві	1	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	відсутня	1	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	наявна	9	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	наявна	9	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	відсутня	1	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 75. Вміст каротину, мг % – 20; сухої речовини в плоді, % – 4,7; вітаміну С, мг % – 23,8; загального цукру, % – 3,3. Загальна кислотність, % – 0,28. Маса товарного плоду, г – 125. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 100. Тривалість періоду плодоношення, діб – 35.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115022 Назва сорту:** Єллоу Пешен **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429**Володілець патенту (код):** 2429**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240684**Дата пріоритету:** 01.04.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240823**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	пряме	1	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругласта	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	оранжеве	3	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	оранжеве	3	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	наявна	9	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 95. Вміст каротину, мг % – 20; сухої речовини в плоді, % – 4,8; вітаміну С, мг % – 22,9; загального цукру, % – 3,3. Загальна кислотність, % – 0,28. Маса товарного плоду, г – 250. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 100. Тривалість періоду плодоношення, діб – 37.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка №** 24115026 **Назва сорту:** IC 1510 **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429**Володілець патенту (код):** 2429**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240688**Дата пріоритету:** 01.04.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.12.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240827**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	вузький	3	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	кустаста (видовжена)	4	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насінневих камер	більше шести	5	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	відсутня	1	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	відсутня	1	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	наявна	9	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	наявна	9	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 85. Вміст каротину, мг % – 21; сухої речовини в плоді, % – 4,6; вітаміну С, мг % – 23,3; загального цукру, % – 3,4. Загальна кислотність, % – 0,26. Маса товарного плоду, г – 45. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 95. Тривалість періоду плодоношення, діб – 35.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115025 Назва сорту:** Оранж Плам **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429**Володілець патенту (код):** 2429**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240687**Дата пріоритету:** 01.04.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240826**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	кустаста (видовжена)	4	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	оранжеве	3	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	оранжеве	3	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	відсутня	1	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	відсутня	1	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 75. Вміст каротину, мг % – 20; сухої речовини в плоді, % – 4,8; вітаміну С, мг % – 24,1; загального цукру, % – 3,3. Загальна кислотність, % – 0,26. Маса товарного плоду, г – 120. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 100. Тривалість періоду плодоношення, діб – 35.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115020 Назва сорту:** Ремембе **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429**Володілець патенту (код):** 2429**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240682**Дата пріоритету:** 01.02.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240821**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	кустаста (видовжена)	4	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	тільки дві	1	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	оранжеве	3	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	оранжеве	3	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	наявна	9	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	відсутня	1	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	наявна	9	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 87. Вміст каротину, мг % – 22; сухої речовини в плоді, % – 4,7; вітаміну С, мг % – 23,8; загального цукру, % – 3,3. Загальна кислотність, % – 0,27. Маса товарного плоду, г – 120. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 95. Тривалість періоду плодоношення, діб – 35.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115024 Назва сорту:** Солідо Спарк **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429**Володілець патенту (код):** 2429**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент №** 240686**Дата пріоритету:** 01.04.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240825**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно галузисте	3	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насінневих камер	більше шести	5	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	оранжеве	3	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	оранжеве	3	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	відсутня	1	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 95. Вміст каротину, мг % – 22; сухої речовини в плоді, % – 4,7; вітаміну С, мг % – 24,0; загального цукру, % – 3,2. Загальна кислотність, % – 0,26. Маса товарного плоду, г – 220. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 90. Тривалість періоду плодоношення, діб – 35.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

Абрикос звичайний
Ліщина звичайна
Суниця садова



Вид: Абрикос звичайний *Prunus armeniaca* L.

Заявка № 24256002 Назва сорту: Бержерон 1 **Заявник (код):** 3218 3241 **Власник сорту (код):** 3218 3241

Дата пріоритету: 14.10.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240932

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	середня	5	
2	Дерево: габітус	від прямого до розлогого	3	
3	Дерево: ступінь галуження	помірний	5	
4	Дерево: розподіл квіткових бруньок	порівну на шпорках і однорічних пагонах	2	
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період швидкого росту)	слабке	3	
6	Однорічний пагін: забарвлення з-під сонячного боку	пурпурово-коричневе	3	
7	Однорічний пагін: розмір основи бруньки	середній	5	
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
10	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
12	Листкова пластинка: форма основи	зрізана	3	
13	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	тупий	3	
14	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	середній	5	
15	Листкова пластинка: форма краю	двічі городчаста	2	
16	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
17	Листкова пластинка: профіль поперечного перерізу	увігнутий	2	
18	Черешок: за довжиною	середній	5	
19	Листок: відношення довжина листкової пластинки / довжина черешка	середнє	5	
20	Черешок: за товщиною	середній	5	
21	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	сильне	7	
22	Черешок: переважаюча кількість нектарників	два-три	2	
23	Черешок: розмір нектарників	малий	3	
24	Квітка: діаметр	середній	5	
25	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	на одному рівні	2	
26	Пелюстка: форма (за винятком нігтики)	округла	2	
27	Пелюстка: забарвлення нижнього боку	світло-рожеве	2	
28	Плід: розмір	великий	7	
29	Плід: форма (вигляд з боку)	яйцеподібна	2	
30	Плід: форма (вигляд з черевця)	яйцеподібна	2	
31	Плід: за висотою	середній	5	
32	Плід: за шириною (вигляд з боку)	середній	5	
33	Плід: за шириною (вигляд з черевця)	середній	5	
34	Плід: відношення висота / ширина (вигляд з черевця)	велике	7	
35	Плід: відношення ширина (вигляд з боку) / ширина (вигляд з черевця)	середнє	5	
36	Плід: симетрія (вигляд з черевця)	асиметричний	2	
37	Плід: шов	запалий	3	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5	
39	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
40	Плід: шпичак	відсутній	1	
41	Плід: поверхня	гладенька	1	
42	Плід: опушення	наявне	9	
43	Лише сорти без опушення. Плід: глянуватість	ознака не визначається	0	
44	Плід: основне забарвлення шкірки	світло-оранжеве	5	
45	Плід: відносна площа основного забарвлення	велика	7	
46	Плід: відтінок основного забарвлення	червоний	2	
47	Плід: інтенсивність основного забарвлення	середня	5	
48	Плід: характер основного забарвлення	щільний рум'янець	2	
49	Плід: забарвлення м'якоті	світло-оранжеве	4	
50	Плід: текстура м'якоті	груба	3	
51	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
52	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки	велике	7	
53	Плід: зростання кісточки із м'якоттю	відсутнє або дуже слабке	1	
54	Кісточка: форма (вигляд з боку)	еліптична	3	
55	Ядро: гіркота	відсутня або слабка	1	
56	Час початку цвітіння	пізній	7	
57	Час початку достигання плодів	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 32,0. Середній урожай з дерева, кг – 45,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 11,0; загального цукру, % – 10,2; пектинових речовин, % – 0,71; сухих розчинних речовин у плодах, % – 12,1; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 68,0. Загальна кислотність, % – 0,75. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7; моніліальний опік – 7; парша – 7; клястероспоріоз – 7. Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): попелиця – 7; кісточкова муха – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Група стиглості – сс. Напрямок використання – ун. Транспортальність, бал (1–9) – 7. Схема садіння, м – 4,5 x 2,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Абрикос звичайний *Prunus armeniaca* L.**Заявка № 24256003 Назва сорту:** Перла 1 **Заявник (код):** 3218 3241 **Власник сорту (код):** 3218 3241**Дата пріоритету:** 14.10.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240933****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	середня	5	
2	Дерево: габітус	від прямого до розлогого	3	
3	Дерево: ступінь галузнення	помірний	5	
4	Дерево: розподіл квіткових бруньок	порівну на шпорках і однорічних пагонах	2	
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період швидкого росту)	слабке	3	
6	Однорічний пагін: забарвлення з-під сонячного боку	пурпурово-коричнєве	3	
7	Однорічний пагін: розмір основи бруньки	середній	5	
8	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
9	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
10	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
12	Листкова пластинка: форма основи	зрізана	3	
13	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	сильно тупий	4	
14	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3	
15	Листкова пластинка: форма краю	двічі городчаста	2	
16	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
17	Листкова пластинка: профіль поперечного перерізу	увігнутий	2	
18	Черешок: за довжиною	середній	5	
19	Листок: відношення довжина листкової пластинки / довжина черешка	середнє	5	
20	Черешок: за товщиною	тонкий	3	
21	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	помірне	5	
22	Черешок: переважаюча кількість нектарників	два-три	2	
23	Черешок: розмір нектарників	малий	3	
24	Квітка: діаметр	середній	5	
25	Квітка: положення прийомочки відносно пиляків	на одному рівні	2	
26	Пелюстка: форма (за винятком нігтики)	округла	2	
27	Пелюстка: забарвлення нижнього боку	світло-рожеве	2	
28	Плід: розмір	великий	7	
29	Плід: форма (вигляд з боку)	еліптична	4	
30	Плід: форма (вигляд з черевця)	еліптична	4	
31	Плід: за висотою	середній	5	
32	Плід: за шириною (вигляд з боку)	середній	5	
33	Плід: за шириною (вигляд з черевця)	середній	5	
34	Плід: відношення висота / ширина (вигляд з черевця)	середнє	5	
35	Плід: відношення ширина (вигляд з боку) / ширина (вигляд з черевця)	середнє	5	
36	Плід: симетрія (вигляд з черевця)	симетричний	1	
37	Плід: шов	злегка запалий	2	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5	
39	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
40	Плід: шпичак	відсутній	1	
41	Плід: поверхня	гладенька	1	
42	Плід: опушення	наявне	9	
43	Лише сорти без опушення. Плід: глясуватість	ознака не визначається	0	
44	Плід: основне забарвлення шкірки	світло-оранжеве	5	
45	Плід: відносна площа основного забарвлення	середня	5	
46	Плід: відтінок основного забарвлення	червоний	2	
47	Плід: інтенсивність основного забарвлення	середня	5	
48	Плід: характер основного забарвлення	щільний рум'янець	2	
49	Плід: забарвлення м'якоті	світло-оранжеве	4	
50	Плід: текстура м'якоті	проміжна	2	
51	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
52	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки	велике	7	
53	Плід: зростання кісточки із м'якоттю	слабке	3	
54	Кісточка: форма (вигляд з боку)	еліптична	3	
55	Ядро: гіркота	відсутня або слабка	1	
56	Час початку цвітіння	середній	5	
57	Час початку достигання плодів	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 35,0. Середній урожай з дерева, кг – 31,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 10,8; загального цукру, % – 10,2; пектинових речовин, % – 0,69; сухих розчинних речовин у плодах, % – 11,9; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 79,0. Загальна кислотність, % – 0,78. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7; моніліальний опік – 7; парша – 7; клястероспоріоз – 7. Стійкість до заселення (пошкодження) шкідликами, балів (1–9): попелиця – 7; кісточкова муха – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Група стиглості – сс. Напрямок використання – ун. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Схема садіння, м – 4,5 x 2,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ліщина звичайна *Corylus avellana* L.

Заявка № 24543002 Назва сорту: Мортарелла **Заявник (код):** 2709 **Підтримувач сорту (код):** 2709

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.12.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	5	
3	Рослина: щільність розміщення гілок	щільна	7	
4	Рослина: тенденція до утворення кореневих паростків	помірна	5	
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: опушення	слабке	3	
7	Однорічний пагін: щільність (кількість) сочевичок	помірна	5	
8	Вегетативна брунька: форма	яйцеподібна	2	
9	Вегетативна брунька: забарвлення	червонувато-зелене	2	
10	Час розпускання вегетативних бруньок	пізній	7	
11	Чоловіче суцвіття: за довжиною	середнє	5	
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	рожево-коричнєве	2	
13	Приймочка: забарвлення	червоне	2	
14	Час цвітіння чоловічих квіток	пізній	7	
15	Час цвітіння жіночих квіток	пізній	7	
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	одночасно	2	
17	Листкова пластинка: за формою	округла	3	
18	Листкова пластинка: за розміром	велика	7	
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	5	
20	Черешок: за довжиною	середній	5	
21	Черешок: опушення	помірне	5	
22	Обгортка: стиснутість	наявна	9	
23	Обгортка: довжина порівняно з довжиною плоду	довша	7	
24	Обгортка: зазубленість	помірна	5	
25	Обгортка: зубчастість зазублення	помірна	5	
26	Обгортка: основа за товщиною	помірна	5	
27	Обгортка: опушення	наявне	9	
28	Обгортка: щільність опушення	нещільна	3	
29	Обгортка: зрощення покривних листків	з обох боків	3	
30	Супліддя: переважаюча кількість горіхів	більше чотирьох	5	
31	Горіх: розмір	малий	3	
32	Горіх: форма	видовжена	4	
33	Плід: форма в поперечному перерізі	прямокутна	4	
34	Горіх: забарвлення	світло-коричнєве	2	
35	Горіх: кількість смужок на шкаралупі	середня	5	
36	Плід: форма верхівки	широкозагострена	2	
37	Горіх: верхівка	слабко помітна	3	
38	Горіх: розмір рубчика маточки	середній	5	
39	Горіх: опушення верхівки	слабке	3	
40	Горіх: розмір базального рубчика	середній	5	
41	Горіх: вигин базального рубчика	опуклий	3	
42	Плід: подвоєне ядро	наявне	9	
43	Ядро: розмір	малий	3	
44	Ядро: форма	короткоциліндрична	3	
45	Ядро: форма у поперечному перерізі	еліптична	1	
46	Ядро: форма верхівки	гостра	1	
47	Ядро: форма основи	заокруглена	2	
48	Ядро: бічний жолобок	наявний	9	
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	слабко закорковіла	3	
50	Ядро: внутрішня порожнина	велика	7	
51	Час достигання	від раннього до середнього	4	
52	Горіх: зростання обгортки з плодом (після обпадання)	середнє	5	
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	середній	5	
54	Час обпадання листків	пізній	7	
55	Ядро: наявність клітковини	помірне	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 2,6. Середній урожай з куща, кг – 4,9. Середня маса плоду, г – 2,17. Легкість видалення ядра, бал – 7. Виповненість ядра горіха, бал – 8. Вихід ядра, % – 45,6. Вміст жиру, % – 64,1; білка, % – 13,8; вуглеводів, % – 6,1. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 7; чорна плямистість – 7; плодова гниль – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ліщина звичайна *Corylus avellana* L.**Заявка №** 24543001 **Назва сорту:** Тонда ді Джіффоні **Заявник (код):** 2709 **Підтримувач сорту (код):** 2709**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 17.12.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	5	
3	Рослина: щільність розміщення гілок	помірна	5	
4	Рослина: тенденція до утворення кореневих паростків	сильна	7	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: опушення	сильне	7	
7	Однорічний пагін: щільність (кількість) сочевичок	сильна	7	
8	Вегетативна брунька: форма	куляста	3	
9	Вегетативна брунька: забарвлення	червонувато-зелене	2	
10	Час розпускання вегетативних бруньок	ранній	3	
11	Чоловіче суцвіття: за довжиною	коротке	3	до середнього
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	рожево-коричневе	2	
13	Приймочка: забарвлення	пурпурово-червоне	3	
14	Час цвітіння чоловічих квіток	від дуже раннього до раннього	2	
15	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	одночасно	2	
17	Листкова пластинка: за формою	округла	3	
18	Листкова пластинка: за розміром	велика	7	
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	сильне	7	
20	Черешок: за довжиною	короткий	3	
21	Черешок: опушення	сильне	7	
22	Обгортка: стиснутість	відсутня	1	
23	Обгортка: довжина порівняно з довжиною плоду	довша	7	
24	Обгортка: зазубленість	сильна	7	
25	Обгортка: зубчастість зазублення	помірна	5	
26	Обгортка: основа за товщиною	товста	7	
27	Обгортка: опушення	наявне	9	
28	Обгортка: щільність опушення	щільна	7	
29	Обгортка: зрощення покривних листків	з одного боку	2	
30	Супліддя: переважаюча кількість горіхів	два або три	3	
31	Горіх: розмір	середній	5	
32	Горіх: форма	куляста	1	
33	Плід: форма в поперечному перерізі	округла	2	
34	Горіх: забарвлення	коричневе	3	
35	Горіх: кількість смужок на шкаралупі	середня	5	
36	Плід: форма верхівки	тупа	3	
37	Горіх: верхівка	слабко помітна	3	
38	Горіх: розмір рубчика маточки	середній	5	
39	Горіх: опушення верхівки	слабке	3	
40	Горіх: розмір базального рубчика	малий	3	
41	Горіх: вигин базального рубчика	плоскатиий	2	
42	Плід: подвоєне ядро	відсутнє	1	
43	Ядро: розмір	середній	5	
44	Ядро: форма	куляста	1	
45	Ядро: форма у поперечному перерізі	округла	2	
46	Ядро: форма верхівки	гостра	1	
47	Ядро: форма основи	плеската	3	
48	Ядро: бічний жолобок	наявний	9	
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	помірно закорковіла	5	
50	Ядро: внутрішня порожнина	велика	7	
51	Час достигання	середній	5	
52	Горіх: зростання обгортки з плодом (після обпадання)	сильне	7	
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	середній	5	
54	Час обпадання листків	пізній	7	
55	Ядро: наявність клітковини	помірне	5	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 2,8. Середній урожай з куша, кг – 5,25. Середня маса плоду, г – 2,5. Легкість видалення ядра, бал – 8. Виповненість ядра горіха, бал – 8. Вихід ядра, % – 42,0. Вміст жиру, % – 64,1; білка, % – 13,8; вуглеводів, % – 6,1. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіховий довгоносик – 5; попелиця – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; чорна плямистість – 7; плодова гниль – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.

Заявка № 24294007 Назва сорту: ФЛ 16 78 109 **Заявник (код):** 2820 **Власник сорту (код):** 1282

Володілець патенту (код): 1282

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.12.2024 **Патент №** 240845

Дата пріоритету: 04.10.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240914

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: щільність розміщення листків	середня	5	
3	Рослина: сила росту	слабка	3	до середньої
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	велика	7	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	слабке	3	до помірного
7	Вуса: щільність опушення	середня	5	
8	Листок: розмір	малий	3	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	4	
10	Листок: пухирчатість	відсутня або слабка	1	
11	Листок: глянуватість	помірна	2	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	набагато довша	4	
14	Верхівковий листочок: форма основи	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма краю	від зубчастої до городчастої	2	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: положення волосків	горизонтальне	3	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Суцвіття: кількість квіток	мала	3	до середньої
21	Квітконіжка: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
22	Квітка: діаметр	малий	3	до середнього
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	торкаються	2	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	менший	1	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	коротша	2	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	середній	5	
30	Плід: форма	серцеподібна	3	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	відсутня або дуже мала	1	до малої
32	Плід: забарвлення	білувато-жовте	1	
33	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірний	2	
34	Плід: глянуватість	помірна	2	
35	Плід: нерівність поверхні	відсутня або слабо виражена	1	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	відсутня або дуже вузька	1	до вузької
37	Плід: положення сім'янок	заглиблене	1	
38	Плід: положення чашечки	заглиблене	1	
39	Плід: положення чашолистків	горизонтальне	2	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	дещо менший	2	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	слабке	3	до помірного
42	Плід: твердість	помірна	5	до твердої
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	білувате	1	
44	Плід: забарвлення серцевини	білувате	1	
45	Плід: повітряна комірка	відсутня або дуже мала	1	
46	Час початку цвітіння	ранній	3	
47	Час початку достигання плодів	ранній	3	
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 26,8. Середня маса ягоди, г – 18,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 60,0; загального цукру, % – 9,8; пектинових речовин, % – 0,6; сухих розчинних речовин, % – 7,2; фенольних сполук, мг/100 г сирової маси – 56,3. Загальна кислотність, % – 0,51. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 5; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 6; бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 5; біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 5. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 6; суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 6. Зимостійкість, бал (1–9) – 6. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 5. Стійкість квіток до пізньовесняних заморозків, бал (1–9) – 5. Ремонтантність: відсутня – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 4. Група достигання: рання – 2. Транспортальність ягід, бал (1–9) – 6. Схема садіння, м – 1,22 x 0,19. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

ДЕКОРАТИВНІ ТА ЛІКАРСЬКІ

*Первоцвіт
Півонія
Хризантема*



Вид: Первоцвіт *Primula L.*

Заявка № 24680002 Назва сорту: Вишиванка Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Володілець патенту (код): 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 Патент № 240675

Дата пріоритету: 01.08.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241002

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою (включаючи суцвіття)	середня	5	
2	Рослина: опушення	слабке	3	
3	Рослина: борошнистий наліт	відсутній	1	
4	Кореневище: щільність за наростанням	середнє	5	
5	Листок: наявність черешка	наявний	9	
6	Черешок: за довжиною	короткий	3	
7	Черешок: крилатість	наявна	9	
8	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня, або дуже слабка	1	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: форма	лопатоподібна	3	
12	Листкова пластинка: форма основи	втягнута	5	
13	Листкова пластинка: за глибиною виїмки	цілокрая	1	
14	Листкова пластинка: форма краю	зубчаста	2	
15	Листкова пластинка: форма краю за глибиною	мілька	3	
16	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня	1	
17	Листкова пластинка: закручування краю	відсутнє	1	
18	Листкова пластинка: ступінь зморшкуватості	слабка	3	
19	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
20	Листкова пластинка: глясоватість	відсутня	1	
21	Суцвіття: тип	напівкулястий зонтик	2	
22	Суцвіття (поодинокі квітки): положення відносно листків	високо підняте над листками	3	
23	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
24	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: за діаметром	середнє	5	
25	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: кількість квіток	велика	7	
26	Поодинокі квітки: кількість на рослину	ознака не визначається	0	
27	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: кількість на рослину	середня	5	
28	Квітконос: положення	пряме	1	
29	Квітконос: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3	
30	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Квітка: наявність квітконіжки	наявна	9	
31	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
32	Квітка: діаметр віночка	середній	5	
33	Квітка: за типом	проста	1	
34	Чашечка: за формою	трубчаста	2	
35	Чашечка: за ступенем розсіченості	лопатева	3	
36	Чашечка: забарвлення	зелене	1	
37	Чашечка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
38	Чашолистик: за формою	ланцетний	1	
39	Лише для сортів, що мають простий тип квітки. Віночок: кількість пелюсток	мала	3	
40	Лише для сортів, що мають махровий тип квітки. Віночок: за щільністю пелюсток	ознака не визначається	0	
41	Віночок: форма відгину	блюдеподібна	1	
42	Лише для сортів, що мають простий тип квітки. Віночок: положення пластинки пелюстки одна відносно одної	дотичне	2	
43	Віночок: форма пластинки пелюстки	оберненойцеподібна	5	
44	Віночок: хвилястість пластинки пелюстки	відсутня	1	
45	Віночок: форма краю пластинки пелюстки	з середньою виїмкою	3	
46	Віночок: хвилястість краю пластинки пелюстки	відсутній	1	
47	Віночок: основне забарвлення внутрішнього боку пластинки пелюстки	фіолетове	28	RHS 078A
48	Віночок: основне забарвлення зовнішнього боку пластинки пелюстки (тільки для сортів в яких чітко відрізняється забарвлення зовнішнього і внутрішнього боку пластинки пелюстки)	ознака не визначається	0	
49	Віночок: бархатистість поверхні внутрішнього боку пластинки пелюстки	наявна	9	
50	Віночок: наявність вічка	наявне	9	
51	Віночок: вічко за розміром	мале	3	
52	Віночок: форма вічка	кутаста	4	
53	Віночок: забарвлення вічка	жовто-оранжеве	13	RHS 014A
54	Віночок: мазок у центрі вічка	відсутній	1	
55	Віночок: наявність ореолу	наявний	9	
56	Віночок: розмір ореолу	середній	5	
57	Віночок: форма краю ореолу	розмита	2	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
58	Віночок: забарвлення ореолу	світло-синьо-фіолетове	30	RHS 076D
59	Лише для сортів з двома кольорами пластинки пелюстки. Віночок: поширення вторинного забарвлення внутрішнього боку пластинки пелюстки	ознака не визначається	0	
60	Лише для сортів з двома кольорами пластинки пелюстки. Віночок: вторинне забарвлення пластинки пелюстки	ознака не визначається	0	
61	Віночок: фестон	відсутній	1	
62	Віночок: забарвлення фестона	ознака не визначається	0	
63	Віночок: цятка	наявні багато	3	
64	Віночок: забарвлення цятки (цяток)	світло-синьо-фіолетове	30	RHS 076D
65	Віночок: наявність облямівки	відсутня	1	
66	Віночок: забарвлення облямівки	ознака не визначається	0	
67	Рослина: за феноритмотипом	літньо-зимовозелена	2	
68	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
69	Рослина: наявність повторного цвітіння	відсутнє	1	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 96. Висота рослини, см – 18,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 360. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 22. Тривалість періоду цвітіння, діб – 38. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: відсутнє – 1. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Первоцвіт *Primula L.***Заявка № 24680001 Назва сорту:** Сутінки **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348**Володілець патенту (код):** 348**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент № 240674****Дата пріоритету:** 01.08.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 26.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію № 241001****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою (включаючи суцвіття)	низька	3	
2	Рослина: опушення	відсутнє, або дуже слабе	1	
3	Рослина: борошнистий наліт	відсутній	1	
4	Кореневище: щільність за наростанням	середнє	5	
5	Листок: наявність черешка	наявний	9	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Черешок: крилатість	наявна	9	
8	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: форма	лопатоподібна	3	
12	Листкова пластинка: форма основи	втягнута	5	
13	Листкова пластинка: за глибиною виїмки	цілокрая	1	
14	Листкова пластинка: форма краю	зубчаста	2	
15	Листкова пластинка: форма краю за глибиною	мілька	3	
16	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня	1	
17	Листкова пластинка: закручування краю	наявне	9	
18	Листкова пластинка: ступінь зморщуватості	слабка	3	
19	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
20	Листкова пластинка: глясуватість	відсутня	1	
21	Суцвіття: тип	поодинокі квітки	1	
22	Суцвіття (поодинокі квітки): положення відносно листків	виступає над листками	2	
23	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: за діаметром	ознака не визначається	0	
25	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: кількість квіток	ознака не визначається	0	
26	Поодинокі квітки: кількість на рослину	дуже велика	9	
27	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: кількість на рослину	ознака не визначається	0	
28	Квітконос: положення	розлоге	5	
29	Квітконос: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5	
30	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Квітка: наявність квітконіжки	ознака не визначається	0	
31	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Квітконіжка: за довжиною	ознака не визначається	0	
32	Квітка: діаметр віночка	великий	7	
33	Квітка: за типом	проста	1	
34	Чашечка: за формою	трубчаста	2	
35	Чашечка: за ступенем розсіченості	лопатева	3	
36	Чашечка: забарвлення	пурпурово-зелене	2	
37	Чашечка: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
38	Чашолистик: за формою	ланцетний	1	
39	Лише для сортів, що мають простий тип квітки. Віночок: кількість пелюсток	мала	3	
40	Лише для сортів, що мають махровий тип квітки. Віночок: за щільністю пелюсток	ознака не визначається	0	
41	Віночок: форма відгину	блюцеподібна	1	
42	Лише для сортів, що мають простий тип квітки. Віночок: положення пластинки пелюстки одна відносно одної	дотичне	2	
43	Віночок: форма пластинки пелюстки	округла	2	
44	Віночок: хвилястість пластинки пелюстки	відсутня	1	
45	Віночок: форма краю пластинки пелюстки	з середньою виїмкою	3	
46	Віночок: хвилястість краю пластинки пелюстки	відсутній	1	
47	Віночок: основне забарвлення внутрішнього боку пластинки пелюстки	фіолетове	28	RHS 081A
48	Віночок: основне забарвлення зовнішнього боку пластинки пелюстки (тільки для сортів в яких чітко відрізняється забарвлення зовнішнього і внутрішнього боку пластинки пелюстки)	ознака не визначається	0	
49	Віночок: бархатистість поверхні внутрішнього боку пластинки пелюстки	наявна	9	
50	Віночок: наявність вічка	наявне	9	
51	Віночок: вічко за розміром	мале	3	
52	Віночок: форма вічка	еліптична	3	
53	Віночок: забарвлення вічка	жовте	11	RHS 007A
54	Віночок: мазок у центрі вічка	відсутній	1	
55	Віночок: наявність ореолу	наявний	9	
56	Віночок: розмір ореолу	малий	3	
57	Віночок: форма краю ореолу	дуже розмита	3	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
58	Віночок: забарвлення ореолу	світло-синьо-фіолетове	30	RHS 076D
59	Лише для сортів з двома кольорами пластинки пелюстки. Віночок: поширення вторинного забарвлення внутрішнього боку пластинки пелюстки	ознака не визначається	0	
60	Лише для сортів з двома кольорами пластинки пелюстки. Віночок: вторинне забарвлення пластинки пелюстки	ознака не визначається	0	
61	Віночок: фестон	відсутній	1	
62	Віночок: забарвлення фестона	ознака не визначається	0	
63	Віночок: цятка	наявна одна	2	
64	Віночок: забарвлення цятки (цяток)	світло-синьо-фіолетове	30	RHS 076D
65	Віночок: наявність облямівки	відсутня	1	
66	Віночок: забарвлення облямівки	ознака не визначається	0	
67	Рослина: за феноритмотипом	літньо-зимовозелена	2	
68	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
69	Рослина: наявність повторного цвітіння	відсутнє	1	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 96. Висота рослини, см – 12,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 360. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 14. Тривалість періоду цвітіння, діб – 30. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: відсутнє – 1. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Півонія *Paeonia* L.

Заявка № 24329003 Назва сорту: Квітка Ксенія **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Володілець патенту (код): 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.12.2024 **Патент №** 240847

Дата пріоритету: 16.08.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 241003

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	2	
3	Стебло: наявність антоціанового забарвлення	відсутнє	1	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
6	Листок: хвилястість краю листової пластинки	відсутня або дуже слабка	3	
7	Листок: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
8	Квітка: за типом	повна	3	
9	Квітка: кількість пелюсток	велика	7	
10	Тільки для сортів з японською формою квітки: видозміна тичинок за формою	ознака не визначається	0	
11	Квітка: діаметр	середній	5	
12	Квітка: за профілем	висока сферична (видовжена)	3	
13	Квітка: кількість на стеблі	декілька	2	
14	Квітка: група кольорів	рожева	2	
15	Пелюстка крайова: забарвлення	синьо-рожеве	19	RHS 065A
16	Пелюстка центральна: забарвлення	синьо-рожеве	19	RHS 065A
17	Пелюстка центральна: за шириною	середня	5	
18	Пелюстка крайова: за ступенем розсіченості краю	двічізарубчаста	2	
19	Пелюстка центральна: за ступенем розсіченості краю	двічінадрізана	5	
20	Квітка: стійкість забарвлення до вигорання	середня	2	
21	Квітка: аромат	слабкий	3	
22	Квітка: тичинки	наявні	9	
23	Тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	кремове	1	
24	Квітка: маточки	відсутні	1	
25	Маточка: домінуюче забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
26	Маточка: опушення	ознака не визначається	0	
27	Плодоношення	відсутнє	1	
28	Час початку цвітіння	середньоранній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Декоративність, бал (11–99) – 98. Життєва форма: трав'яниста – 1. Висота рослини, см – 90,0. Діаметр квітки, см – 18,0. Тривалість періоду цвітіння рослини, дів – 7. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 5. Морозостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): оленка волохата – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема *Chrysanthemum* L.**Заявка № 24337002 Назва сорту:** Мальвіна **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348**Володілець патенту (код):** 348**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2024 **Патент № 240690****Дата пріоритету:** 17.05.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 26.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію № 241017****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напіввертикальна	2	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галузнення	помірна	5	
5	Стебло: забарвлення	зелене	1	
6	Прилисток: розмір	малий	3	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	коротка	5	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середній	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	мілке	3	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	паралельні	2	
15	Листок: переважаюча форма основи	зрізана	4	
16	Листок: глянуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	мала	3	
22	Край листка: надрізи за глибиною	середні	5	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	велика	7	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	фіолетове	28	RHS 080A
30	Кошик: тип	напівповний	3	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	анемоноподібний	2	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	високий	7	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	мала	3	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	мала	3	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	ознака не визначається	0	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	язичковий	1	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	горизонтальне	5	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	гладенька, рівна	1	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	середня	5	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	слабко увігнутий	5	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко закручені донизу	5	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна половина	2	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	ознака не визначається	0	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	загнута всередину	1	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна половина	5	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	помірний	5	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	вигнута	3	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
58	Язичкова квітка: за довжиною	середня	5	
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	фіолетове	28	RHS 075B
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	фіолетове	28	RHS 077D
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	фіолетове	28	RHS 077D
74	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	великий	7	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	великий	7	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	фіолетове	28	RHS 075A
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	фіолетове	28	RHS 075A
85	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: тип	трубчастий	2	
86	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: за довжиною	середня	5	
87	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: забарвлення	фіолетове	28	RHS 075C
88	Група реакції (вищівування за контрольованою тривалістю дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:**– показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 75,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 180. Діаметр суцвіття (кошика), см – 7,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 37. Декоративність, бал (11–99) – 98. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 65. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 7; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 8; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 7; попелиця (*Aphididae*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Хризантема *Chrysanthemum* L.
Заявка № 24337004 Назва сорту: Циганочка **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Володілець патенту (код): 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент №** 240691
Дата пріоритету: 17.05.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 241018
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	вертикальна	1	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галузження	щільна	7	
5	Стебло: забарвлення	зелене	1	
6	Прилисток: розмір	малий	3	
7	Черешок: положення	вертикальне	1	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	коротка	5	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	короткий	3	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	коротка	3	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	глибоке	7	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	розходяться	1	
15	Листок: переважаюча форма основи	гостра	1	
16	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	2	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів <i>Chrysanthemum</i> x <i>morifolium</i> . Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів <i>Chrysanthemum</i> x <i>morifolium</i> . Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів <i>Chrysanthemum</i> x <i>morifolium</i> . Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	глибокі	7	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	велика	7	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	коричнево-червоне	25	RHS 182C
30	Кошик: тип	напівповний	3	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	анемоноподібний	2	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	високий	7	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	середня	5	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	середня	5	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	ознака не визначається	0	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	два	2	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	трубчастий	4	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	язичковий	1	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	висхідне	3	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	гладенька, рівна	1	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	середня	5	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	сильно увігнутий	3	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко закручені донизу	5	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	дистальні три четвертини	5	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	сплющений	3	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	вигнута	3	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальні три четвертини	7	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	слабкий	3	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
58	Язичкова квітка: за довжиною	середня	5	
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	коричнево-червоне	25	RHS 180C
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	коричнево-пурпурове	26	RHS 184B
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	коричнево-пурпурове	26	RHS 184B
74	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	великий	7	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	великий	7	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пелючків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пелючків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пелючків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пелючків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пелючків	коричнево-червоне	25	RHS 182C
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пелючків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пелючків	коричнево-червоне	25	RHS 182C
85	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: тип	пелюсткоподібний	5	
86	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: за довжиною	середня	5	
87	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: забарвлення	коричнево-пурпурове	26	RHS 183D
88	Група реакції (вирушування за контрольованою тривалістю дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 60,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 120. Діаметр суцвіття (кошика), см – 5. Тривалість цвітіння рослини, діб – 37. Декоративність, бал (11–99) – 96. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 60. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 7; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 8; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 7; попелиця (*Aphididae*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

**Результати досліджень, які надані безпосередньо заявником
відповідно до пункту 2.3 статті 12 Закону України
«Про охорону прав на сорти рослин»**

Горох посівний (зерновий)

Картопля

Кукурудза звичайна

Пшениця м'яка (озима)

Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)

Ріпак (озимий)

Соя культурна

Ячмінь звичайний (ярий)



Описи сортів рослин та показники господарської придатності

Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 22023002 **Назва сорту:** Іконік **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.02.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240121

Орган, що провів випробовування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	дуже велика	9	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (ozn. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	від помірної до сильної	6	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	вузький	3	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	від середньої до довгої	6	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	від помірної до щільної	6	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	від широкого до дуже широкого	8	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
30	Квітка: хвилястість паруса	ознака не визначалась	0	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	загострена	1	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	довга	7	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	довга	7	
36	Квітконос: кількість приквітков	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	короткий	3	
38	Біб: за шириною	вузький	3	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (ozn. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насінневих зачатків	мала	3	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насіннина: форма	еліптична	1	
49	Насіннина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насіннини і простим типом крохмальних зерен. Насіннина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насіннинами із складним типом крохмальних зерен. Насіннина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насіннина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: мармуровість насінневої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: фіолетові чи рожеві плями на насінневій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насіннина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінневої шкірки	1	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	ознака не визначалась	0	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	5,9
2	Вміст білка, %	28,3
3	Тривалість періоду вегетації, діб	125
4	Придатність до механізованого збирання, бал (1–9)	9
5	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кореневі гнилі (<i>Pythium de Baryanum</i> Hesse, <i>Botrytis cinerea</i> Pers., <i>Hypochnus solani</i> Prill. et Del.)	7
6	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (<i>Peronospora pisi</i> Syd.)	6
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (<i>Ascochyta pisi</i> Libert.)	7
8	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (<i>Bruchus pisorum</i> L.)	6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.
Заявка № 23088008 Назва сорту: Мікадо **Заявник (код):** 723 **Власник сорту (код):** 723
Дата пріоритету: 31.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230577
Орган, що провів випробовування: Naktuinbouw
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	від середнього до великого	6	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	від малої до середньої	4	
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	від слабкого до помірного	4	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	багато	7	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	від коротких до середніх	4	
12	Рослина: тип розвитку	листяний	3	
13	Рослина: габітус	від напіврозлогого до розлогого	6	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
15	Листок: загальний розмір	від середнього до великого	6	
16	Листок: за відкритістю	від закритого до проміжного	2	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	від світлого до помірного	4	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Друга пара бічних листочків: за шириною	від вузьких до середніх	4	
21	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	від прояву відсутні або дуже рідко до прояву рідко	2	
22	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
23	Рослина: за висотою	висока	7	
24	Рослина: яскравість цвітіння	обрідне	3	
25	Суцвіття: розмір	малий	3	
26	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
27	Віночок квітки: розмір	від малого до середнього	4	
28	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
31	Рослина: час досягання	дуже ранній	1	
32	Бульба: форма	короткоовальна	2	
33	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
34	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
35	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
36	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
37	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	відсутнє або дуже слабке	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	60,1
2	Середня маса товарної бульби, г	125
3	Тривалість періоду вегетації, діб	100
4	Посухостійкість, бал (1–9)	7
5	Лежкість, %	90
6	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофтороз (<i>Phytophthora infestans</i> D.B.)	5
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вірусні захворювання	8 (virus Y)
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): рак (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb) Perc.)	1
9	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): колорадський жук (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say)	4
10	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): картопляна нематода (<i>Nematoda</i>)	1
11	Вміст сухої речовини, %	16,9
12	Вміст крохмалю, %	11,2
13	Напрямок використання	стл
14	Товарність, %	90
15	Вміст редукованих цукрів, %	0,00

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.
Заявка № 23088005 Назва сорту: Пондус **Заявник (код):** 723 **Власник сорту (код):** 723
Дата пріоритету: 31.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023
Свідцтво про державну реєстрацію № 230574
Орган, що провів випробовування: Naktuinbouw
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	від середнього до великого	6	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	від помірної до сильної	6	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	від слабкого до помірного	4	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листяний	3	
13	Рослина: габітус	від напіврозлогого до розлогого	6	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
15	Листок: загальний розмір	від середнього до великого	6	
16	Листок: за відкритістю	від закритого до проміжного	2	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	від помірного до сильного	6	
18	Листок: зелене забарвлення	від світлого до помірного	4	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
21	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1	
24	Рослина: рясність цвітіння	від обрідного до помірного	4	
25	Суцвіття: розмір	від малого до середнього	4	
26	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
27	Віночок квітки: розмір	середній	5	
28	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
29	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
30	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
31	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	
32	Бульба: форма	овальна	3	
33	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
34	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
35	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
36	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	64,9
2	Середня маса товарної бульби, г	120
3	Тривалість періоду вегетації, діб	90
4	Посухостійкість, бал (1–9)	7
5	Лежкість, %	70
6	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофтороз (<i>Phytophthora infestans</i> D.B.)	5
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вірусні захворювання	7 (virus Y)
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): рак (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb) Perc.)	9 (WR1, WR6)
9	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): колорадський жук (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say)	4
10	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): картопляна нематода (<i>Nematoda</i>)	9 (Ro1, Ro4)
11	Вміст сухої речовини, %	17,6
12	Вміст крохмалю, %	11,9
14	Товарність, %	90
13	Напрямок використання	стл
15	Вміст редукованих цукрів, %	0,00

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.
Заявка № 23088007 Назва сорту: Ред Буллет **Заявник (код):** 723 **Власник сорту (код):** 723
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230576
Орган, що провів випробовування: Naktuinbouw
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	від слабкого до помірного	4	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	від слабкого до помірного	4	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	від середньої кількості до прояву багато	6	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	від прямого до напіврозлогого	4	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	від помірного до сильного	6	
15	Листок: загальний розмір	від середнього до великого	6	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	від слабкого до помірного	4	
18	Листок: зелене забарвлення	від світлого до помірного	4	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	від помірного до сильного	6	
20	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
21	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
22	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
23	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
24	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7	
25	Суцвіття: розмір	середній	5	
26	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	від слабкого до помірного	4	
27	Віночок квітки: розмір	середній	5	
28	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	від слабкої до помірної	4	
29	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
30	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	мале	3	
31	Рослина: час досягання	від середнього до пізнього	6	
32	Бульба: форма	овальна	3	
33	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
34	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
35	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
36	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
37	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	69,5
2	Середня маса товарної бульби, г	115
3	Тривалість періоду вегетації, діб	110
4	Посухостійкість, бал (1–9)	7
5	Лежкість, %	85
6	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофтороз (<i>Phytophthora infestans</i> D.B.)	6
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вірусні захворювання	6 (virus Y)
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): рак (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb) Perc.)	9 (WR1)
9	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): колорадський жук (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say)	4
10	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): картопляна нематода (<i>Nematoda</i>)	1
11	Вміст сухої речовини, %	19,6
12	Вміст крохмалю, %	13,9
13	Напрямок використання	стл
14	Товарність, %	90
15	Вміст редукованих цукрів, %	0,00

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 24009077 Назва сорту: Альпедро **Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240990
Орган, що провів випробовування: Bundesamt fur Ernährungssicherheit, AT
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	від помірного до сильного	6	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
5	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
6	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
7	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
10	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
11	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	від прямого до ледь похилого	2	
12	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	від середньої кількості до великої	6	
13	Качан: час появи шовку	пізній	7	
14	Качан: антоціанове забарвлення шовку	від відсутнього або дуже слабого до слабого	2	
15	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
16	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
17	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	від довгої до дуже довгої	8	
20	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
21	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
22,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
23	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
24	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
25	Качан: ніжка за довжиною	від короткої до середньої	4	
26	Качан: за довжиною	довгий	7	
27	Качан: діаметр (посередині)	від середнього до великого	6	
28	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
29	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
34	Качан: тип зернівки	розлусний	7	
36	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
37	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
39	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	від помірного до сильного	6	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	10,6
2	ФАО	330
3	Вихід зерна, %	81
4	Вміст крохмалю, %	74,3
5	Вміст білка, %	9,5
6	Висота рослини, см	280
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	130
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	8
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenweb. et Reinking)	7
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 24009079 Назва сорту: Апріоло **Заявник (код):** 2011

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240992

Орган, що провів випробовування: Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, CZ

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	від середньої до довгої	6	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	від короткої до середньої	4	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	11,2
2	ФАО	240
3	Вихід зерна, %	82
4	Вміст крохмалю, %	74,6
5	Вміст білка, %	8,2
6	Висота рослини, см	278
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	122
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	7
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenweb. et Reinking)	7
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 24009063 Назва сорту: ГУ0739 **Заявник (код):** 1329 **Власник сорту (код):** 1329
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240554
Орган, що провів випробовування: Executive agency for variety testing, field inspection and seed control, Bulgaria
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	від помірно похилого до сильно похилого	6	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	від помірного до сильного	6	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	від ледь похилого до помірно похилого	4	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	від малої до середньої кількості	4	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	від слабкого до помірного	4	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	дуже довга	9	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже довга	9	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	від довгої до дуже довгої	8	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	від довгої до дуже довгої	8	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	від малого до середнього	4	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	від середньої до довгої	6	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	9,52
2	ФАО	240
3	Вихід зерна, %	84
4	Вміст крохмалю, %	65,4
5	Вміст білка, %	11,4
6	Висота рослини, см	220
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	94
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	8
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	9
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	7
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	9
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenweb. et Reinking)	9
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспориоз	8
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 24009065 Назва сорту: ГУ1083 **Заявник (код):** 1329 **Власник сорту (код):** 1329

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240556

Орган, що провів випробовування: Executive agency for variety testing, field inspection and seed control, Bulgaria

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	від помірно похилого до сильно похилого	6	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	від малого до середнього	4	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	від відсутнього або дуже слабого до слабого	2	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	від нещільного до середньої щільності	4	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	дуже довга	9	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже довга	9	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	від широкої до дуже широкої	8	
27	Качан: ніжка за довжиною	від довгої до дуже довгої	8	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	від великого до дуже великого	8	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	від середньої до великої	6	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	12,5
2	FAO	480
3	Вихід зерна, %	87
4	Вміст крохмалю, %	69,6
5	Вміст білка, %	9,9
6	Висота рослини, см	264
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	106
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	9
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	9
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenweb. et Reinking)	8
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	8
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 24009062 Назва сорту: ГУ2042 **Заявник (код):** 1329 **Власник сорту (код):** 1329
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240553
Орган, що провів випробовування: Executive agency for variety testing, field inspection and seed control, Bulgaria
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	від помірно похилого до сильно похилого	6	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	від середнього до великого	6	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	від великої до дуже великої	8	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	від слабкого до помірного	4	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	від помірного до сильного	6	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	від середньої до довгої	6	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	від середньої до довгої	6	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	від малого до середнього	4	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	від помірного до сильного	6	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	8,2
2	ФАО	180
3	Вихід зерна, %	83
4	Вміст крохмалю, %	64,2
5	Вміст білка, %	11,7
6	Висота рослини, см	178
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	74
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	8
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	9
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenweb. et Reinking)	9
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспориоз	8
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 24009064 Назва сорту: ГУ2063 Заявник (код): 1329 Власник сорту (код): 1329

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240555

Орган, що провів випробовування: Executive agency for variety testing, field inspection and seed control, Bulgaria

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	сильно похиле	7	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	від помірно похилого до сильно похилого	6	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	велика	7	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	від нещільного до середньої щільності	4	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	від середньої до широкої	6	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	від середнього до великого	6	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	від середньої до великої	6	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	від слабкого до помірного	4	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	9,1
2	ФАО	180
3	Вихід зерна, %	82
4	Вміст крохмалю, %	62,9
5	Вміст білка, %	11,4
6	Висота рослини, см	190
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	89
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	7
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	9
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenweb. et Reinking)	9
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	9
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 23009021 Назва сорту: ГУ3378 **Заявник (код):** 1329 **Власник сорту (код):** 1329
Дата пріоритету: 16.03.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.07.2024
Свідчення про державну реєстрацію № 240456
Орган, що провів випробовування: Executive agency for variety testing, field inspection and seed control, Bulgaria
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	лопатоподібна	5	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	від прямого до ледь похилого	2	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	від відсутнього або дуже слабого до слабого	2	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	від відсутнього або дуже слабого до слабого	2	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	від середньої до довгої	6	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	від середньої до довгої	6	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	11,67
2	ФАО	380
3	Вихід зерна, %	86
4	Вміст крохмалю, %	68,7
5	Вміст білка, %	10,6
6	Висота рослини, см	233
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	98
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	8
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	9
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	9
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	9
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenweb. et Reinking)	9
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	9
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 24009061 Назва сорту: ГУ8361 **Заявник (код):** 1329 **Власник сорту (код):** 1329

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240552

Орган, що провів випробовування: Executive agency for variety testing, field inspection and seed control, Bulgaria

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	сильно похиле	7	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	від відсутнього або дуже слабого до слабого	2	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	від помірного до сильного	6	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	сильно похиле	7	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	від середньої кількості до великої	6	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	від відсутнього або дуже слабого до слабого	2	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	від довгої до дуже довгої	8	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	від середньої до довгої	6	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти	від малого до середнього	4	
26	Листок: пластинка за шириною	від середньої до широкої рослини	6	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже довга	9	
28	Качан: за довжиною	від середнього до довгого	6	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	від середньої до великої	6	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	червоно-оранжеве	6	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	9,8
2	ФАО	220
3	Вихід зерна, %	83
4	Вміст крохмалю, %	65,2
5	Вміст білка, %	11,1
6	Висота рослини, см	248
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	101
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	8
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	7
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	9
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenweb. et Reinking)	9
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспориоз	8
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 24009080 Назва сорту: Сурінго **Заявник (код):** 2011
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240993
Орган, що провів випробовування: Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic, SK
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	від дуже малого до малого	2	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	від відсутнього або дуже слабого до слабого	2	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	від прямого до ледь похилого	2	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	від помірного до сильного	6	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	від середньої до довгої	6	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	від середньої до широкої	6	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	від середньої до великої	6	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	10,5
2	ФАО	230
3	Вихід зерна, %	82
4	Вміст крохмалю, %	73,6
5	Вміст білка, %	7,9
6	Висота рослини, см	284
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	129
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	7
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenweb. et Reinking)	7
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспориоз	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 24009078 Назва сорту: Таррако **Заявник (код):** 2011

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240991

Орган, що провів випробовування: Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, CZ

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	від прямого до ледь похилого	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	від прямого до ледь похилого	2	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	від середньої до довгої	6	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	від середньої до довгої	6	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	від довгої до дуже довгої	8	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	від великого до дуже великого	8	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	від середнього до довгого	6	
29	Качан: діаметр (посередині)	від середнього до великого	6	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	від малої до середньої	4	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	11,2
2	ФАО	260
3	Вихід зерна, %	82
4	Вміст крохмалю, %	74,8
5	Вміст білка, %	8,2
6	Висота рослини, см	287
7	Висота прикріплення нижнього розвинутого (з зерном) качана, см	140
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	8
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenweb. et Reinking)	7
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспориоз	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 22012008 Назва сорту: БГ Уніголд **Заявник (код):** 2866 **Власник сорту (код):** 2866
Дата пріоритету: 09.02.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230422
Орган, що провів випробовування: Croatian Agency for Agriculture and Food, HR
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	від напівпрямого до напіврозлогого	4	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	від дуже малої до малої	2	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	від помірного до сильного	6	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	від сильного до дуже сильного	8	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	від низької до середньої	4	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	від середнього до довгого	6	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене з наявністю другої вершини	5	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже довгий	9	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	7	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	дуже темне	9	
26	Тип розвитку	озимий	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	11,4
2	Висота рослини, см	72
3	Вегетаційний період, діб	215
4	Маса 1000 зерен, г	39
5	Зимостійкість, балів (1–9)	7
6	Критична температура вимерзання, °C	-17
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	9
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	79
10	Вміст білка, %	11,9
11	Вміст сирової клейковини, %	24,8
12	Показник альвеографа (W), о. а.	245
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	355
14	Напрямок використання	зерн
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	9
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	9
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа	8
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лійниа або стеблова іржа	9
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	7
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	7
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	8
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	9
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 24900003 Назва сорту: TA21BВ026 Заявник (код): 2597 Власник сорту (код): 2597

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.07.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240436

Орган, що провів випробовування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
2	Зернівка: забарвлення у фенолі	від темного до дуже темного	8	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
4	Рослина: габітус (форма куща)	від напіврозлогого до розлогого	6	
5	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на півхві	дуже сильний	9	
9	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	дуже сильний	9	
10	Колос: восковий наліт	сильний	7	
11	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
12	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
13	Рослина: за висотою (стебло і колос)	від низької до середньої	4	
14	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
17	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
18	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
19	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
20	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
22	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
23	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
24	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	від середнього до довгого	6	
25	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	від ледь зігнутого до середньо зігнутого	4	
26	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
27	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 24900004 Назва сорту: ТБ21БВ326 **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.07.2024

Свідectво про державну реєстрацію № 240437

Орган, що провів випробовування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
2	Зернівка: забарвлення у фенолі	від темного до дуже темного	8	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	від дуже слабкого до слабкого	2	
4	Рослина: габітус (форма куща)	від напіврозлогого до розлогого	6	
5	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
9	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	дуже сильний	9	
10	Колос: восковий наліт	сильний	7	
11	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
12	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
13	Рослина: за висотою (стебло і колос)	від низької до середньої	4	
14	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
15	Колос: за щільністю	від нещільного до середнього	4	
16	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	від довгого до дуже довгого	8	
17	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
18	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
19	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
20	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
22	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
23	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене з наявністю другої вершини	5	
24	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	від середнього до довгого	6	
25	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	від ледь зігнутого до середньо зігнутого	4	
26	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
27	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 21040058 Назва сорту: ДЕСПІНА **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230451
Орган, що провів випробовування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	від помірної до сильної	6	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	від середньої до великої	6	
7	Листок: зубчастість краю	від помірного до сильного	6	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	від довгого до дуже довгого	8	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	дуже довгий	9	

Показники господарської придатності, за інформацією наданою заявником

№ п/п	Показник	Значення
1	Урожайність насіння (за стандартної вологості 12%), т/га	4,1
2	Вміст ерукової кислоти, %	0
3	Вміст глюкозинолатів, %	17,2
4	Вміст олії, %	42,8
5	Вміст білка, %	21,3
6	Зимостійкість, балів (1–9)	8
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	8
8	Стійкість до обсіпання, балів (1–9)	9
9	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
10	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз	7
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз	8
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): альтернаріоз	8
13	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): квіткоїд	9
14	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): пильщик	8
15	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): хрестоцвіті блішки	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24040054 Назва сорту: КВС МЕРІНОС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.07.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240443
Орган, що провів випробовування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
8	Листок: частки	наявні	9	
9	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	від середньої до великої	6	
10	Листок: зубчастість краю	від помірного до сильного	6	
11	Рослина: час початку цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
16	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	від короткої до середньої	4	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	дуже короткий	1	
19	Стручок: носик за довжиною	дуже короткий	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність насіння (за стандартної вологості 12%), т/га	5,32
2	Вміст ерукової кислоти, %	<0,2
3	Вміст глюकोзинолатів, %	0,57
4	Вміст олії, %	48,1
5	Вміст білка, %	17,3
6	Зимостійкість, балів (1–9)	7
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	7
8	Стійкість до обсіпання, балів (1–9)	9
9	Стійкість до посухи, балів (1–9)	9
10	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз	9
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз	7
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): альтернаріоз	7
13	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): квіткоїд	7
14	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): пильщик	7
15	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): хрестоцвітї блішки	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 24045036 Назва сорту: Алгебра **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564
Дата пріоритету: 22.11.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240929
Орган, що провів випробовування: Bundesamt für Ernährungssicherheit, AT
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	висока	7	
7	Листок: пухирчастість	від помірної до сильної	6	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від середнього до пізнього	6	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	4,8
2	Вегетаційний період, днів	108
3	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	6
4	Стійкість до обсіпання, балів (1–9)	8
5	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
6	Висота прикріплення нижнього бобу, см	15
7	Стійкість до хвороб, балів (1–9): аскохітоз	8
8	Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз	7
9	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
10	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): бобова вогнівка	8
11	Вміст олії в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	21
12	Вміст білка в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	42,3
13	Напрямок використання	х, корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 24045037 Назва сорту: Арієтта **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564
Дата пріоритету: 22.11.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 30.12.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 241033
Орган, що провів випробовування: Bundesamt fur Ernährungssicherheit, AT
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	сильна	7	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	від середнього до великого	6	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	від помірної до сильної	6	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягання	дуже ранній	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	4,3
2	Вегетаційний період, діб	94
3	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	8
4	Стійкість до обсіпання, балів (1–9)	8
5	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
6	Висота прикріплення нижнього бобу, см	13
7	Стійкість до хвороб, балів (1–9): аскохітоз	7
8	Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз	8
9	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	7
10	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): бобова вогнівка	8
11	Вміст олії в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	22,3
12	Вміст білка в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	42,1
13	Напрямок використання	корм, х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 23020005 Назва сорту: СБ Скорє **Заявник (код):** 1797 **Власник сорту (код):** 1797
Дата пріоритету: 20.11.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 231182
Орган, що провів випробовування: Управління Данії з питань вирощування рослин
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	від напіврозлогого до розлогого	6	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	від сильного до дуже сильного	8	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7	
10	Колос: восковий наліт	від сильного до дуже сильного	8	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	від нещільного до середнього	4	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	від середнього до великого	6	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	від короткого до середнього	4	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	від малого до середнього	4	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	сильна	7	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борідки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	ярий	3	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,9
2	Тривалість періоду вегетації, діб	130
3	Висота рослини, см	85
4	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	9
5	Стійкість до обсіпання, балів (1–9)	9
6	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
7	Придатність до механізованого збирання, балів (1–9)	9
8	Вміст білка, %	11
9	Маса 1000 зерен, г	55
10	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	9
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): гельмінтоспоріоз	9
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
13	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
14	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): п'явиця	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 22020007 Назва сорту: Стінг **Заявник (код):** 2657 **Власник сорту (код):** 1223
Дата пріоритету: 24.01.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.01.2024
Свідцтво про державну реєстрацію № 240055
Орган, що провів випробовування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Зернівка: забарвлення алейронового шару	білясте	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
4	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	від сильного до дуже сильного	8	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від раннього до середнього	4	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від сильного до дуже сильного	8	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7	
10	Колос: восковий наліт	помірний	5	
11	Колос: положення в просторі	від напівпрямого до горизонтального	4	
12	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірна	5	
13	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
14	Колос: кількість рядів	два	1	
15	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундиментарний	1	
17	Колос: форма	циліндрична	5	
18	Колос: за щільністю	середній	5	
19	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
20	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	від довгого до дуже довгого	8	
21	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	від короткого до середнього	4	
22	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
23	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
24	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
27	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
28	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,5
2	Тривалість періоду вегетації, діб	131
3	Висота рослини, см	74
4	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	7
5	Стійкість до обсіпання, балів (1–9)	7
6	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
7	Придатність до механізованого збирання, балів (1–9)	9
8	Вміст білка, %	10,2
9	Маса 1000 зерен, г	54,3
10	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	7
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): гельмінтоспоріоз	7
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	7
13	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	7
14	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): п'явиця	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості

Other notifications

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту

List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Address
273	Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С. May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина Samanli Mahallesi Yigitler Caddesi No:28 Yildirim 16280 Bursa, Turkey
337	Київська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут землеробства Української академії аграрних наук» Kyivska doslidna stantsiia Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva Ukrainsoi akademii ahrarnykh nauk»	С. Литвинівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07334 S. Lytvynivka, Vyshhorodskyi r-n, Kyivska obl., 07334
345	Національний науковий центр «Інститут землеробства Української академії аграрних наук» Natsionalnyi naukovi tsestr «Instytut zemlerobstva Ukrainsoi akademii ahrarnykh nauk»	08162, вул. Машинобудівників 2-б, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. 08162, vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt Chabany, Kyievo-Sviatoshymskyi r-n, Kyivska obl.
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Садово-Ботанічна, 1, м. Київ, 01014 vul. Sadovo-Botnichna, 1, m. Kyiv, 01014
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
793	ЛІМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
806	Євраліс Семанс Euralis Semences	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire Авеню Гастон Фоебюс, 64231 Лескар Седекс, Франція Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
844	Монсанто Технологі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800Н; бульвар Ліндберґ, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
912	Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліті, Хольцез, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
1105	ДАНКО Годовла Рослін Сп. з о.о. DANKO Hodowla Roslin Sp. z. o. o.	Choryn, 64000, Koscan, Polska, +48226463791, +486460111 Choryn, 64-005, Racot, Polska +48226463791, +486460111
1265	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Агро-Ритм» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-vyrobnyche pidpriemstvo «Ahro-Rytm»	вул. Степова 20, с. Солтанівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66521 vul. Stepova 20, s. Soltanivka, Liubashivskyi r-n, Odeska obl., 66521
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1498	Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд Ко КГ Probstdorfer Saatzzucht Ges.m.b.H & Co KG	Parking 12, 1010 Vienna, Austria Parking 12, 1010 Vienna, Austria
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslынnytstva im. V.IA. IUr'ieva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128 pr. Moskovskyi, 142, m. Kharkiv, 61128
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukovi tsestr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, смт Чабани, Фастівський р-н, Київська обл., 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt Chabany, Fastivskyi r-n, Kyivska obl., 08162
1658	Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Оброшине, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115 s. Obroshyne, Pustomyativskyi r-n, Lvivska obl., 81115
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1702	Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України Instytut oliynykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1 70417, Zaporizka obl., Zaporizkyi r-n, s. Soniachne, vul. Instytutaska, 1
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхеместер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Рю Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1974	Бетасід ГмбХ Betaseed GmbH	Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany

Код Code	Назва Name	Адреса Address
1985	НУСІД ЮРОП ЛТД. NUSEED EUROPE LTD.	5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way 5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way
1990	Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Nosivska selektsiino-doslidna stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівський район, Чернігівська область, 17131 vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivskyi raion, Chernihivska oblast, 17131
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2020	ХМ.КЛОЗ HM.CLAUSE	Rue Louis Sallant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France Rue Louis Sallant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2086	Хазера Сідз Б.В. Hazera Seeds B.V.	Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands
2226	КОРА СІДС С.Р.Л. CORA SEEDS S.R.L.	Via Boscone, 1765/A, 47522 CESENA (FC), Italy Via Boscone, 1765/A, 47522 CESENA (FC), Italy
2264	Норт Американ Планта Джентікс North American Plant Genetics	19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada 19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada
2267	Хібрісол, С. Л. Hibrisol, S. L.	C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain
2287	Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросем» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «IEvrosem»	вул. Академіка Заболотного, буд. 154 Д, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 154 D, m. Kyiv, 03143
2429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СПАРК СІДС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «SPARK SIDZ»	проспект Маршала Жукова, буд. 47/3, Київський р-н, м. Одеса, 65114 prospekt Marshala Zhukova, bud. 47/3, Kyivskyi r-n, m. Odesa, 65114
2430	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут органічного землеробства» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Instytut orhanichnoho zemlerobstva»	вул. Космонавтів, 9, м. Глобине, Полтавська обл., 39000 vul. Kosmonavtiv, 9, m. Hlobyne, Poltavska obl., 39000
2440	АПСОВСЕМЕНТИ С.П.А. APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2548	ПрАТ «Екопрод» PrAT «EkoProd»	вул. Центральна, 6-В, м. Волноваха, Донецька обл., 85700 vul. Tsentralna, 6-V, m. Volnovakha, Donetska obl., 85700
2584	Жермікопа Брідінг САС Germicopa Breeding SAS	1 allée Loeiz Herrieu, 29334 Quimper SEDEX, France 1 allée Loeiz Herrieu, 29334 Quimper SEDEX, France
2621	ЗКІ ЗОЛДСЕГТЕРМЕСЗТЕСІ КУТАТО ІНТЕЗЕТ ЗРТ ZKI ZOLDSEGTHERMESZTESI KUTATO INTEZET ZRT	6000. Kecskemet, Meszoly u.6. 6000. Kecskemet, Meszoly u.6.
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2644	Сингента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2662	ХМ.КЛОЗ, Інк. HM.CLAUSE, Inc.	260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618 260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618
2706	Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Donetska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Захисників України, буд. 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307 vul. Zakhysnykiv Ukrainy, bud. 1, m. Pokrovsk, Donetska oblast, 85307
2709	ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛІТА» PRYVATNE ORENDNE PLEMINNE PIDPRYIEMSTVO «ELITA»	вул. Стефаника, 7, м. Тетіїв, Тетіївський р-н, Київська область, 09800 vul. Stefanyka, 7, m. Tetiiv, Tetiivskyi r-n, Kyivska oblast, 09800
2710	Хазера Сідс Лтд Hazera Seeds Ltd	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim 79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2726	РВА Райффайзен Варє Австрія АГ RWA Raiffeisen Ware Austria AG	Вінербергштрассе 3, 1100 Відень, Австрія, ФН 159839х WienerbergstrateBe 3, 1100 Wien, Austria, FN 159839h
2742	Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІКС Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «KhIKS Ukraina»	вул. Гурджанська, буд. 5, м. Синельникове, Дніпропетровська обл., 52500 vul. Hurdzhuanska, bud. 5, m. Synelnykove, Dnipropetrovska obl., 52500
2743	ДОНАУ СААТ СРЛ DONAU SAAT SRL	Str. Jean Monnet, nr.35, bl.35, Ap.1, Sector 1, 011956 Bucarest, Romania Str. Jean Monnet, nr.35, bl.35, Ap.1, Sector 1, 011956 Bucarest, Romania
2762	Товариство з обмеженою відповідальністю «КМК АГРО» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «KMK AHRO»	вул. Балківська, 120/1, оф. 401, м. Одеса, 65005 vul. Balkivska, 120/1, of. 401, m. Odesa, 65005
2788	СОУТЕК С.Р.Л. SOYTEK S.R.L.	Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County
2793	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агронасінняпром» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahronasinniaprom»	вул. Северина Потоцького, 38-А, кімн. 42, м. Харків, 61075 vul. Severyna Pototskoho, 38-A, kimn. 42, m. Kharkiv, 61075
2816	Беррітек С.Р.Л. Berytech S.R.L.	вул. Піаджі, 10, м. Базель-ді-Піне, ІТ-38042, Італія via Piagi 10, Baselga di Pine, IT-38042, Italy
2820	Флорида Фаундейшн Сід Прод'юсерз, Інк. Florida Foundation Seed Producers, Inc.	3913 Highway 71 Marianna, Florida 32446, USA 3913 Highway 71 Marianna, Florida 32446, USA

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2834	Адванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis 6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis
2843	ТОВ «ВОС ГРУП» TOV «VOS HRUP»	вул. Роганська, будинок 130/2, квартира 89, місто Харків, Харківська обл. vul. Rohanska, budynok 130/2, kvartyra 89, misto Kharkiv, Kharkivska obl.
2863	ГДМ Хангері Кфт. GDM Hungary Kft.	1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary 1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary
2873	ТОВ «Бонсідс» TOV «Bonsids»	вул. Ломоносова, 26/20, м. Київ, 03022 vul. Lomonosova, 26/20, m. Kyiv, 03022
2882	ТОВ «Грано Де Оро Україна» TOV «Hrano De Oro Ukraina»	вул. Чорновола, 41, смт Катеринопіль, Черкаська обл., 20501, Україна vul. Chornovola, 41, smt Katerynopil, Cherkaska obl., 20501, Ukraina
2890	Лідеа Франсе САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3091	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕБЕДИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «LEBEDYNSKA AHRARNA KOMPANIYA»	вул. Добровольців, буд. 63А, м. Шпола, Звенигородська р-н, Черкаська обл., 20603 vul. Dobrovoltsiv, bud. 63A, m. Shpola, Zvenyhorodska r-n, Cherkaska obl., 20603
3093	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОЗЕМ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AHROZEM»	вул. Василенка, буд. 19, смт. Есмань, Шосткинський р-н, Сумська обл., 41432 vul. Vasilenka, bud. 19, smt. Esman, Shostkynskiy r-n, Sumska obl., 41432
3094	Товариство з обмеженою відповідальністю «Білопільська Аграрна Компанія» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Bilopil'ska Ahrarna Kompaniya»	вул. Рябоконь братів, буд. 1, смт Миколаївка, Сумський р-н, Сумська обл., 41854 vul. Riabokon brativ, bud. 1, smt Mykolaivka, Sumskiy r-n, Sumska obl., 41854
3096	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропроект Княжа» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahroproekt Kniazha»	вул. Нахімова, буд. 63-А, м. Шпола, Звенигородський р-н, Черкаська обл., 20603 vul. Nakhimova, bud. 63-A, m. Shpola, Zvenyhorodskiy r-n, Cherkaska obl., 20603
3201	Приватне сільськогосподарське підприємство «Веселий Хутір» Pryvatne silskohospodarske pidpriyemstvo «Veselyi Khutir»	вул. Благівісна, будинок 13, с. Веселий Хутір, Золотоніський р-н, Черкаська обл., 19923 vul. Blahovisna, budynok 13, s. Veselyi Khutir, Zolotoniskiy r-n, Cherkaska obl., 19923
3215	Товариство з обмеженою відповідальністю «ШИПШИНА УКРАЇНИ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «ShYPShYNA UKRAINY»	вул. Театральна, буд.5, оф.101, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49047 vul. Teatralna, bud.5, of.101, m. Dnipro, Dnipropetrovska obl., 49047
3218	Ярмолюк Іван Савич Yarmoliuk Ivan Savych	вул. Нагорна, 23 а, с. Хутірське, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., 51822, Україна vul. Nahorna, 23 a, s. Khutir'ske, Dniprovskiy r-n, Dnipropetrovska obl., 51822, Ukraina
3236	Вовк Жанна Миколаївна Vovk Zhanna Mykolaivna	вул. Л. Вольгемут, 4, кв. 165, м. Київ, 03194 vul. L. Volhemut, 4, kv. 165, m. Kyiv, 03194
3241	Будзинський Олександр Сергійович Budzynskiy Oleksandr Serhiiovych	просп. Ювілейний, 23 А, кв. 30, м. Запоріжжя, 69097 prosp. IUVileinyi, 23 A, kv. 30, m. Zaporizhzhia, 69097
3247	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛАНТЕКС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «PLANTEKS»	вул. Малиновського 23, с. Микулинці, Вінницька область, Літинський р-н, 22353 vul. Malynovskoho 23, s. Mykulyntsi, Vinnytska oblast, Litynskiy r-n, 22353
3356	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОЛОКА-СІДС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «TOLOKA-SIDS»	пров. Спортивний, буд. 13 В, м. Полтава, Полтавська обл., 36014 prov. Sportyvnyi, bud. 13 V, m. Poltava, Poltav'ska obl., 36014
3373	БОРД ОФ ТРАСТІЗ ОФ МІЧІГАН СТЕЙТ ЮНІВЕРСІТІ BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN STATE UNIVERSITY	450 Administration Building, East Lansing, Michigan 48824, USA 450 Administration Building, East Lansing, Michigan 48824, USA
3374	Терравеста Ешурд Енерджи Кропс Лімітед Terravesta Assured Energy Crops Limited	826 Велика Британія/12 Тентеркрофт стріт, Лінкольн, LN5 7 DB UK 826 Great Britain/12 Tentercroft Street, Lincoln, LN5 7 DB UK
3376	Познанська Годовла Рослін сп. з о.о. Poznanska Hodowla Roslin Sp. z o.o.	ul. Kasztanowa 5 63-004 Tulce Poland ul. Kasztanowa 5 63-004 Tulce Poland
3377	Церасина ГмбХ Cerasina GmbH	Kummertsweiler 13, D-88079 Kressbronn, Germany (DE) Kummertsweiler 13, D-88079 Kressbronn, Germany (DE)
3383	Безотосна Мар'яна Ігорівна Bezotosna Mari'ana Ihorivna	вул. Шишманова, 5/2, м. Львів, 79000 vul. Shyshmanova, 5/2, m. Lviv, 79000
3384	КВС Веджітеблз Б. В. KWS Vegetables B. V.	Бронланд 10, 6708 ВГ Вагенінген, Нідерланди Bronland 10, 6708 WH Wageningen, the Netherlands

Загальноживані скорочення термінів
Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальноживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин, П – підтримувач.	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder’s Rights), NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), AC – Plant Variety Authorship Certificate, M – Maintainer.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся,	П – Woodlands,
Л – Лісостеп,	Л – Forest-Steppe,
С – Степ,	С – Steppe,
ЗГр – захищений ґрунт.	ЗГр – covered ground.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками
Кукурудза звичайна

Група стиглості	ФАО	Тривалість періоду вегетації, діб
1 Ранньостигла	150–199	91–105
2 Середньоранньостигла	200–299	106–120
3 Середньостигла	300–399	121–130
4 Середньопізня	400–499	131–140

Соняшник однорічний
2 Ранньостиглий: 101–115 діб
3 Середньоранньостиглий: 116–125 діб
4 Середньостиглий: понад 125 діб
6 Високоолеїновий (ранньостиглий: 101–115 діб)

Ріпак (ярий, озимий)
1 Низькоеруковий

Сорго звичайне (двокольорове)
4 Ранньостиглий (до 100 діб)

Соя культурна
6 Ранньостиглий (91–110 діб)
7 Середньостиглий (111–130 діб)

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрямок використання
пер переробка
зерн зерновий
олн олійний
ВОЛ високоолеїновий
техн технічний
ун універсального призначення
свж споживання у свіжому вигляді
овоч овочевий

озл озеленення
корм кормовий
н насіння

Характеристика 2 – Група стиглості

ср середньоранній
сс середньостиглий
рс ранньостиглий
рсдн ранньосередній

Характеристика 3 – Якість

сбіл середньобілковий
вл високоолійний
сл середньоолійний

Характеристика 4 – Метод створення

СЗ самозапилення
П перехресне запилення
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Возна Т. Г., Гайдай А. О., Коляденко С. С., Лашук С. О.,
Мажуга К. М., Пальчиковська А. В., Сиплива Н. О.,
Тиха Н. В., Худолій Л. В., Шкапенко Є. А.

Офіційні описи
та показники
господарської
придатності підготували: Гринів С. М., Ільченко Я. В., Києнко З. Б., Курочка Н. В.,
Матус В. М., Михайлик С. М., Носуля А. М., Руденко О. А.,
Свинарчук О. В., Симоненко Н. В., Смутьська І. В.,
Сонець Т. Д., Таганцова М. М.

Описи та показники
господарської придатності
підготували: Баліцька Л. М., Дудка Т. В., Ільченко Я. В., Курочка Н. В.,
Михайлик С. М., Руденко О. А., Свинарчук О. В.,
Симоненко Н. В., Сонець Т. Д., Таганцова М. М.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 14.01.2025

Дата друку

Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Officina.

Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..

Тираж 25 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.

21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.

Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043

e-mail: info@tvoru.com.ua

<http://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» –
офіційне видання, що містить офіційні відомості
щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211