

**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ**
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
**УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН**
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

11
2025



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Ідентифікатор медіа
R30-01983

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 11, 2025

Головний редактор **Editor-in-chief**

Редакційна колегія

Мельник С. І.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board

S. Melnyk
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavliuk
(executive secretary)



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Шутенко Т. О. T. Shutenko
Тиха Н. В. N. Tykha
Гринів С. М. S. Gryniv
Линчак Н. Б. N. Lynchak
Сиплива Н. О. N. Syplyva
Стариченко Є. М. Y. Starychenko
Хоменко Т. М. T. Khomenko

11

2025

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2025

УДК 347.77:633(055)

0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2025. Вип. 11. 260 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Відомості, внесені до Реєстру заявок	5
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд	5
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	7
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок	8
Відомості щодо зміни назви сорту рослин	9
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин	10
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин	11
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	13
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	13
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати	16
Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин	18
Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	25
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	26
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	26
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати	31
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати	33
Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту	34
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	46
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні	47
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	47
Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи	54
Сільськогосподарські:	
злаки	54
<i>Кукурудза звичайна</i>	55
Альбом	55
ПС 310	57
РЖТ ПЕТЕРККСОН	58
РЖТ ПІНККФЛОЙД	60
СТАЙН 9310	62
Стар Сідс Деві С 380	64
Стар Сідс Лена С 360	66
Стар Сідс С 280	68
Стар Сідс С 310	70
Стар Сідс С 320	72
Стар Сідс С 330	73
Стар Сідс С 350	74
<i>Кукурудза звичайна – батьківський компонент</i>	76
1ПГИЛ72	76
ГВМ 28023	77
ГВМ 31023	78
ГВМ 32023	79
ГВМ 35023	80
ГВМ 36023	81
ГВМ 38023	82
ГВФ 28023	83
ГВФ 31023	84
ГВФ 32023	85
ГВФ 33023	86
ГВФ 35023	87
ГВФ 38023	88
КВ 1ФФ1925	89
КВ 5ФЛ5068	90
КВ 6ЕЙ0128	91
КВ 6ЕЙ0147	92
КВ 6ФД0064	93
КВ 6ФЮ2022	94
КВ 6ФЮ2111	95
КВ 6ФЮ2257	96
КВ 9ФЮ2154	97
КВ 9ФЮ216	98
КВСЕК 549	99
ПХ1ТДЦ	100
ПХ2ДИМ	101
ПХ2ТРФ	102
Р17106	103
Р19009ЦМС	104
Р21022	105
Р22019	106
Р22023	107
ФСАКС3657С	108
Пшениця м'яка (дворучка)	109
ЛІД КАЛІНДА	109
Пшениця м'яка (озима)	110
Блеквіт	110
ЛІД МАКУМБА	112
ЛІД САРАБАНД	113
Ліпперт	114
СОНАТІН КС	116
Стеліан	117
Пшениця м'яка (яра)	119
Елая	119
Тритикале (озиме)	120
МІП Ренесанс	120
Фродо Поліський	121
Ячмінь звичайний (озимий)	122
Імператор	122
Сільськогосподарські: бобові	123
Горох посівний (зерновий)	124
ЛГ КОРВЕТ	124
Квасоля звичайна (зернова)	125
Боберан	125
Соя культурна	126
Аннабелла	126
Аурікула	127
САНКАРА	128
СІБЕЛЛА	129
СКВАДРА	130
Сільськогосподарські: круп'яні	131
Сорго звичайне (двокольорове)	132
РЖТ АРМСТРОНГ	132
РЖТ ФІГГАРО	133

Сільськогосподарські:					
олійні та прядивні	134	X13241P	177	Максідор	205
Ріпак (озимий)	135	X30014A	178	Кріп пахучий	206
Воллі	135			Беллі	206
ПТ325	136			Помідор їстівний	207
Соняшник однорічний	137	Сільськогосподарські:		Корнаті	207
БОХЕМ	137	картопля	179	Орагіо	209
Кадіз	139	Картопля	180	Родіум	211
КАСПЕРЕС	141	Либідь	180	Сан Блас	213
КВС АДЕМЕС СУ	142	Норман	181	СОЛВЕТ	215
Клаус	144	Шедевр	182	Фарасан	217
Корсин	146	Сільськогосподарські:		Формоза	219
ЛЛЮДВІГ	148	овочеві	183	Фрейзер Парадайз	221
Лорка Грано	150	Боби кормові	184	Шівіос	223
ОДІН	152	Хоростківські	184	Салат посівний	
П6ЗЛЕ193	154	Буряк столовий	185	головчастий	225
П6ЗЛЛ209	156	Бордо 237	185	Металія	225
П64ГЕ233	158	Делікатесний	186	Салат посівний ромен	227
П64ЛП196	160	Конар	187	Одона	227
ПС-115Е	162	Мармеладка	188	Ольгада	228
СИ МАГІСТЕР	164	Овочевий скарб	189	Цибуля городня	229
Холіб КЛП	166	Чарівниця	190	Редеско	229
Соняшник однорічний –		Гарбуз звичайний	191		
батьківський		ВОРТИ ГОБЛІН	191	Плодові та ягідні	230
компонент	167	КЕМОН	193	Ліщина звичайна	231
15051	167	Пабло	195	ПолліО	231
33568	167	Диня звичайна	197	Суниця садова	232
АТ1620	168	Романостар	197	Єнка	232
АТ2120	169	Кабачок	199	Яблуня домашня	233
МР012223	170	БОЛОНЬЄЗЕ	199	ІНОГО	233
МР079063	171	Інесса	201	ІНОБІ	234
РТ8522	172	Капуста білоголова	203		
РТ8822	173	Кентуккі	203	Декоративні та лікарські	235
ТРІ5564Р	174	Квасоля звичайна		Тютюн справжній	236
ТРС5430Р	175	(овочева)	204	Тернопільський 14	236
	176	Контендер	204		
Описи сортів рослин та показники господарської придатності					237
Буряк цукровий	238	МАРСУПІАЛ СМАРТ	244	ОРЕС	248
АГАМА СМАРТ	238	Картопля	245	ПОЛБЕН	249
АСПЕН	239	Пріська	245	ТІБЕН	250
ВАКІТА СМАРТ	240	Пшениця м'яка (озима)	246	ТІСЕЛ	251
ГАЛАГО	241	Вольтаж	246	Ячмінь звичайний	
КАПРА СМАРТ	242	Смородина чорна	247	(ярий)	252
МАНАТІ СМАРТ	243	ГОФЕРТ	247	НОС Гамбіт	252
Інші відомості					253
Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин					253
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту					254
Загальнозживані скорочення термінів					259

Відомості, внесені до Реєстру заявок Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд
Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
2025020011	22.10.2025	Ельбар Elbar	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Нежбірська Людмила Іванівна Корнійчук Олександр Васильович Самолій Світлана Іванівна Маренюк Олександр Борисович Дорошук Василь Олексійович
2025020014	29.10.2025	Витвір Vytvir	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вискуб Роман Станіславович Вінюков Олександр Олександрович Удовиченко Світлана Миколаївна Уваров Микола Леонідович Вінюкова Ольга Борисівна
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
2025039003	01.01.2025	ЄЛЛО КЛП YELLO CLP	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Charte
2025039068	23.09.2025	Тернер Terner	3243	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Калініченко Артем Олександрович
2025039073	24.10.2025	Равін Ravin	736 3204	РС, АС NLI, AC	Maria Joita-Pacureanu Бабич Вікторія Олегівна Парій Ярослав Федорович
2025039075	29.10.2025	РТК24Г RTK24G	3422	РС NLI	
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
2025088019	13.03.2025	Харрієр Harrier	2093	РС NLI	
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
2025106009	06.11.2025	Коррадо Corrado	2086	РС NLI	
2025106010	06.11.2025	Пресет Preset	2086	РС NLI	
2025106011	06.11.2025	Акадо Akado	2086	РС NLI	
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean					
2025127004	10.10.2025	Процессор Processor	1163	П М	
Цибуля багатоярусна <i>Allium proliferum</i> Schrad. Egyptian Onion					
2025141002	26.09.2025	Говерла Hoverla	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кондратенко Сергій Іванович Позняк Олександр Васильович Пальонко Олег Васильович
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover					
2025155001	30.07.2025	УНО UNO	3424	РС NLI	Roberto Guarnieri
Конюшина біла (повзуча) <i>Trifolium repens</i> L. White Clover					
2025157001	30.07.2025	СИМОНЕ SIMONE	3424	РС NLI	Roberto Guarnieri
Пажитниця багатоквіткова <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Italian Ryegrass					
2025221001	11.08.2025	ТЕАННА TEANNA	3424	РС NLI	Roberto Guarnieri
2025221002	19.08.2025	ХЕЛЛЕН HELLEN	3424	РС NLI	Roberto Guarnieri
Персик звичайний <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Peach					
2025259002	29.10.2025	Кріспсан Crispsun	3438	РС NLI	Maillard Arsene Maillard Laurence

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Яблуня домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
2025263006	13.10.2025	Даліклас Daliclass	3436 3540	PC NLI	
Мигдаль звичайний <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb. Almond					
2025285002	30.10.2025	ГУАРА GUARA	2776	П М	
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine					
2025304007	12.09.2025	АРРАСЬОРТИУ ARRATHIRTYTWO	3433	ПС, АС PBR, АС	Shachar Karniel
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard					
2025380003	30.07.2025	ЕЛЕНДІЛ ELENDIL	3424	PC NLI	Roberto Guarnieri
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce					
2025546004	26.09.2025	Промінь Promin	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	Кондратенко Сергій Іванович Позняк Олександр Васильович Чабан Леся Василівна
Чорнушка дамаська <i>Nigella damascena</i> L. Devil-in-a-bush					
2025548001	28.05.2025	Мавка Mavka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	Рахметов Джамал Бахлулович Газнюк Марія Олександрівна Шанайда Марія Іванівна Корабльова Ольга Анатоліївна
Лопух справжній <i>Arctium lappa</i> L.					
2025643001	25.09.2025	Іменинник Imenyunnyk	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	Позняк Олександр Васильович Пальонко Олег Васильович Кондратенко Сергій Іванович
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
2025909087	28.07.2025	ГУ51593 GW51593	3428	PC NLI	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
2025939072	11.09.2025	AR0110B AR0110B	3432	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	Павленко Роман Павлович Дорохов Антон Вікторович

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
Кукурудза звичайна Maize, Corn					
24009075	22.11.2024	ЕС АЙЛЕНДЕР ES ISLANDER	а: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	17.11.2025
Ріпак (ярий) Rape Seed (Spring)					
20041003	21.12.2020	Спрінг Міракл Spring Miracle	а: 1626 2712 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	06.11.2025
Овес голозерний Naked Oat					
2025520001	14.11.2025	Веган Носівський Vegan Nosivskiy	а: 1990 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	24.11.2025

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до листа Міністерства економіки, до-
вкілля та сільського господарства України «Про по-
годження внесення змін» від 06.11.2025 № 7031-
06/75635-08 унесено зміни до документів заявки сор-

ту сої культурної СВХ23Т00С47 (заявка № 24045001),
додавши позначення «SV170275Z-19-22» селекційного
коду у розділі 3 Заяви про визнання прав на сорт та
Технічної анкети сорту.

Відомості щодо зміни назви сорту рослин

Notifications of changing plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
22009050	2715	ІНДЕМ1316	Байлі Bailey
23009048	1688	ІНДЕМ1316	Байлі Bailey

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn				
21009107	844	07.11.2025	ДКС3047	САГСИ SAGSI
22009092	844	07.11.2025	ЕІ3527	ДКС3557 DKC3557
23009077	844	07.11.2025	ЕІ4160	ДКС4150 DKC4150
23009078	844	07.11.2025	ЕВ4252	ДКС4335 DKC4335
23009080	844	07.11.2025	ЕІ4157	ДКС4151 DKC4151
23009089	844	07.11.2025	ЕІ4748	ДКС4758 DKC4758
23009092	844	07.11.2025	ЕІ3205	ДКС3152 DKC3152
23009093	844	07.11.2025	ЕІ4689	ДКС4756 DKC4756
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)				
21022006	1626	07.11.2025	Фродо	Фродо Поліський Frodo Poliskyi
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower				
2025039023	736 3204	07.11.2025	Альто	В5С310 V5S310
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean				
24045001	2061	18.11.2025	СВХ23Т00С47	Рокстон Roxton

Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
2025009086	1688	06.11.2025	Санап Sunip
24009109	844	18.11.2025	ДКС4255
24009110	844	24.11.2025	ДКС4255 ДКС4952 ДКС4952
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
2025039064	3432	06.11.2025	Вілама Vilama
2025039065	3432	06.11.2025	Віналь Vinal
2025039067	3243	06.11.2025	Далвер Dalver
2025039071	2537	10.11.2025	Валпараізо КЛП Valparaiso CLP
2025039072	1688	06.11.2025	Галлаксі СУ Gallaxy SU
2025039075	3422	17.11.2025	ПТК24Г PTK24G
23039026	2551	18.11.2025	АМ КЛП 25 AM KLP 25
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean			
23045023	1669	20.11.2025	Родзинка Rodzynka
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet			
2025069003	1974	18.11.2025	БТС СМАРТ 2040 Н BTS SMART 2040 N
2025069004	1974	18.11.2025	БТС СМАРТ 6655 Н BTS SMART 6655 N
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion			
2025106009	2086	24.11.2025	Коррадо Corrado
2025106010	2086	24.11.2025	Пресет Preset
2025106011	2086	24.11.2025	Акадо Akado
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato			
2025115018	840	06.11.2025	Сан Блас San Blas
2025115019	840	06.11.2025	Шівіос Shivios
2025115022	1730	06.11.2025	Санпавел Sanpavel
2025115024	1730	07.11.2025	Санпірло Sanpirlo
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean			
2025127001	1163	06.11.2025	Контендер Contender
2025127003	1163	06.11.2025	Максідор Maxidor
Цибуля багатоярусна <i>Allium proliferum</i> Schrad. Egyptian Onion			
2025141001	1708	06.11.2025	Борзенка Borzenka
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash			
2025148010	1163	06.11.2025	Дженовезе Genovese
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover			
2025155001	3424	18.11.2025	УНО UNO

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Конюшина біла (повзуча) <i>Trifolium repens</i> L. White Clover			
2025157001	3424	18.11.2025	CIMONE SIMONE
Пажитниця багатоквіткова <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Italian Ryegrass			
2025221001	3424	18.11.2025	TEANNA TEANNA
2025221002	3424	18.11.2025	HELLEN HELLEN
Персик звичайний <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Peach			
2025259002	3438	24.11.2025	Кріспсан Crispsun
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard			
2025380003	3424	18.11.2025	ЕЛЕНДІЛ ELENDIL
Салат посівний стебловий <i>Lactuca sativa</i> var. <i>L. angustana</i> L.H. Bailey Chinese Lettuce			
2025518001	1708	06.11.2025	Кіборг Kiborh
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce			
2025546004	1708	20.11.2025	Промінь Promin
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula			
2025680004	348	06.11.2025	Ююша Yuiusha
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component			
2025909087	3428	06.11.2025	ГУ51593 GW51593
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component			
2025915002	1581	06.11.2025	ІР Княгиня БК IR Княгиня ВК
2025915003	2313	06.11.2025	Р 3982 R 3982
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component			
2025939071	3432	06.11.2025	АР0408Б AR0408В
2025939074	3243	06.11.2025	АБ12Р AB12R
2025939076	2715	06.11.2025	7ПФКВ09А 7PFQW09A

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
23012002	09.01.2023	250309	13.11.2025	09.01.2023	СОНАТІН КС SONATINE CS	2890	
23012009	06.04.2023	250296	06.11.2025	06.04.2023	Блеквіт Blekvit	2783	
24012018	18.06.2024	250310	13.11.2025	18.06.2024	ЛІД САРАБАНД LID SARABAND	2890	
24012020	18.06.2024	250311	13.11.2025	18.06.2024	ЛІД МАКУМБА LID MACUMBA	2890	
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)							
24013002	19.08.2024	250344	27.11.2025	19.08.2024	Елая Elaya	2011	
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum							
23018004	20.11.2023	250365	27.11.2025	20.11.2023	РЖТ АРМСТРОНГГ RGT ARMSTRONGG	1783	
23018005	20.11.2023	250366	27.11.2025	20.11.2023	РЖТ ФІГГАРО RGT FIGGARO	1783	
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)							
23019002	06.04.2023	250298	06.11.2025	06.04.2023	Імператор Imperator	2783	
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)							
21022006	05.08.2021	250312	20.11.2025	05.08.2021	Фродо Поліський Frodo Poliskyi	1626	
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea							
2025023003	10.02.2025	250315	27.11.2025	10.02.2025	ЛГ КОРВЕТ LG CORVET	793	
Квасоля звичайна (зернова) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean							
23025003	18.12.2023	250302	13.11.2025	18.12.2023	Боберан Boberan	2260	
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
23039052	23.11.2023	250346	27.11.2025	23.11.2023	БОХЕМ ВОНЕМ	1783	
23039053	23.11.2023	250347	27.11.2025	23.11.2023	ЛЛЮДВІГ LLUDWIG	1783	
23039054	23.11.2023	250348	27.11.2025	23.11.2023	ОДІН ODYN	1783	
23039056	23.11.2023	250349	27.11.2025	Холіб КЛП 1783	Holib CLR		
23039082	26.12.2023	250350	27.11.2025	26.12.2023	КАСПЕРЕС KASPERES	1219	
23039086	27.12.2023	250351	27.11.2025	27.12.2023	КВС АДЕМЕС СУ KWS ADEMES SU	2649	
24039004	10.01.2024	250352	27.11.2025	10.01.2024	СИ МАГІСТЕР SY MAGISTER	1219	
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)							
24040038	04.06.2024	250345	27.11.2025	04.06.2024	Воллі Wally	2011	
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean							
23045013	27.09.2023	250367	27.11.2025	27.09.2023	Аурикула Auricula	2011	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
23045019	20.11.2023	250368	27.11.2025	20.11.2023	СІБЕЛЛА SIBELLA	1783	
23045020	20.11.2023	250369	27.11.2025	20.11.2023	САНКАРА SANKARA	1783	
23045021	20.11.2023	250370	27.11.2025	20.11.2023	СКВАДРА SQUADRA	1783	
24045012	06.02.2024	250371	27.11.2025	06.02.2024	Аннабелла Annabella	1564	
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato							
23088002	08.02.2023	250301	13.11.2025	08.02.2023	Норман NORMAN	2660	
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage							
24096004	12.02.2024	250295	06.11.2025	12.02.2024	Кентуккі Kentukki	2429	
Пшениця м'яка (дворучка) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (spring and winter compatible)							
24012019	18.06.2024	250308	13.11.2025	18.06.2024	ЛІД КАЛІНДА LID CALINDA	2890	
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin							
24150001	02.02.2024	250294	06.11.2025	02.02.2024	Пабло Pablo	2011	
Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Apricot							
24256002	14.10.2024	250299	13.11.2025	14.10.2024	Бержерон 1 Bergeron 1	3218 3241	бюлетень, випуск 12, 2024
24256003	14.10.2024	250300	13.11.2025	14.10.2024	Перла 1 Perla 1	3218 3241	бюлетень, випуск 12, 2024
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple							
2025263002	28.02.2025	250313	20.11.2025	28.02.2025	ІНОГО INOGO	3403	
2025263003	28.03.2025	250314	20.11.2025	28.03.2025	ІНОБІ INOBI	3412 3403	
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry							
2025294001	06.01.2025	250372	27.11.2025	06.01.2025	Каденза Cadenza	2885	бюлетень, випуск 10, 2025
2025294003	26.02.2025	250373	27.11.2025	26.02.2025	Єнкка Jenkka	2885	
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce							
23546002	13.11.2023	250297	06.11.2025	13.11.2023	Одона Odon	1730	
Підщепи сливи <i>Prunus</i> L. Plum Rootstocks							
24588002	04.10.2024	250307	13.11.2025	04.10.2024	ВанКло WanClo	3218 3241	бюлетень, випуск 11, 2024
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
19909070	01.02.2019	250303	13.11.2025	01.02.2019	ПХ1ТДЦ PH1TDC	1688	
21909100	19.10.2021	250304	13.11.2025	19.10.2021	ПХ2ТРФ PH2TRF	1688 1690	
21909103	19.10.2021	250305	13.11.2025	19.10.2021	ПХ2ДИМ PH2DIM	1690	
23909080	21.08.2020	250306	13.11.2025	21.08.2020	РН2ДУМ 1ПГИЛ72 1PGYL72	1690	
23909084	20.11.2023	250316	27.11.2025	20.11.2023	Р19009ЦМС R19009CMS	1783	
23909085	20.11.2023	250317	27.11.2025	20.11.2023	Р22023 R22023	1783	
23909086	20.11.2023	250318	27.11.2025	20.11.2023	Р22019 R22019	1783	
23909089	20.11.2023	250319	27.11.2025	20.11.2023	Р21022 R21022	1783	
23909118	06.12.2023	250320	27.11.2025	06.12.2023	КВ 6ФЮ2022 KW 6FQ2022	2649	
23909119	06.12.2023	250321	27.11.2025	06.12.2023	КВ 6ФД0064 KW 6FD0064	2649	

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
23909120	06.12.2023	250322	27.11.2025	06.12.2023	KВ 6ФЮ2111 KW 6FQ2111	2649	
23909121	06.12.2023	250323	27.11.2025	06.12.2023	KВ 6ФЮ2257 KW 6FQ2257	2649	
23909122	06.12.2023	250324	27.11.2025	06.12.2023	KВ 6ЕЙ0147 KW 6EY0147	2649	
23909123	06.12.2023	250325	27.11.2025	06.12.2023	KВ 1ФФ1925 KW 1FF1925	2649	
23909124	06.12.2023	250326	27.11.2025	06.12.2023	KВСЕК 549 KWSEK 549	2649	
23909125	06.12.2023	250327	27.11.2025	06.12.2023	KВ 6ЕЙ0128 KW 6EY0128	2649	
23909126	06.12.2023	250328	27.11.2025	06.12.2023	KВ 5ФЛ5068 KW 5FL5068	2649	
23909129	06.12.2023	250329	27.11.2025	06.12.2023	KВ 9ФЮ2154 KW 9FQ2154	2649	
23909130	06.12.2023	250330	27.11.2025	06.12.2023	KВ 9ФЮ2161 KW 9FQ2161	2649	
23909146	29.12.2023	250331	27.11.2025	29.12.2023	ГВМ 36023 HVM 36023	3244	
23909147	29.12.2023	250332	27.11.2025	29.12.2023	ГВФ 35023 HVF 35023	3244	
23909150	29.12.2023	250333	27.11.2025	29.12.2023	ГВМ 28023 HVM 28023	3244	
23909151	29.12.2023	250334	27.11.2025	29.12.2023	ГВМ 32023 HVM 32023	3244	
23909152	29.12.2023	250335	27.11.2025	29.12.2023	ГВМ 35023 HVM 35023	3244	
23909153	29.12.2023	250336	27.11.2025	29.12.2023	ГВМ 38023 HVM 38023	3244	
23909154	29.12.2023	250337	27.11.2025	29.12.2023	ГВМ 31023 HVM 31023	3244	
23909155	29.12.2023	250338	27.11.2025	29.12.2023	ГВФ 28023 HVF 28023	3244	
23909156	29.12.2023	250339	27.11.2025	29.12.2023	ГВФ 31023 HVF 31023	3244	
23909157	29.12.2023	250340	27.11.2025	29.12.2023	ГВФ 32023 HVF 32023	3244	
23909158	29.12.2023	250341	27.11.2025	29.12.2023	ГВФ 38023 HVF 38023	3244	
23909162	29.12.2023	250342	27.11.2025	29.12.2023	ГВФ 33023 HVF 33023	3244	
24909114	02.12.2024	250343	27.11.2025	02.12.2024	P17106 R17106	1783	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus L.</i>							
Sunflower – parental component							
22939018	20.11.2022	250353	27.11.2025	20.11.2022	X13241P H13241R	2649	
23939040	23.10.2023	250354	27.11.2025	23.10.2023	ТФС5438Б TFC5438B	2720	бюлетень, випуск 7, 2024
23939041	23.10.2023	250355	27.11.2025	23.10.2023	ТРІ5032Р TRI5032R	2720	бюлетень, випуск 7, 2024
23939054	07.12.2023	250356	27.11.2025	07.12.2023	ТРІ5564Р TRI5564R	2720	
23939071	27.12.2023	250357	27.11.2025	27.12.2023	МР079063 MR079063	2649	
23939072	27.12.2023	250358	27.11.2025	23.12.2023	МР012223 MR012223	2649	
23939073	27.12.2023	250359	27.11.2025	27.12.2023	X30014А H30014А	2649	
24939050	02.12.2024	250360	27.11.2025	02.12.2024	АТ2120 AT2120	1783 1783	
24939051	02.12.2024	250361	27.11.2025	02.12.2024	РТ8522 RT8522	1783	
24939052	02.12.2024	250362	27.11.2025	02.12.2024	РТ8822 RT8822	1783	
2025939004	01.01.2025	250363	27.11.2025	01.01.2025	АТ1620 AT1620	1783	
2025939029	17.01.2025	250364	27.11.2025	17.01.2025	ТРС5430Р TRC5430R	2720	

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)					
23011001	13.12.2023	250263	Ерлбек Erlbek	1797	04.11.2025
24011002	26.04.2024	250211	Платін Platin	1223	12.11.2025
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
23012009	06.04.2023	250296	Блеквіт Blekvit	2783	25.11.2025
23012010	11.04.2023	250229	ЛГ ТОМЙОЛЬ LG TOMJOL	793	20.11.2025
23012029	04.08.2023	250166	Динаміт Dynamite	880 2616	14.11.2025
23012030	04.08.2023	250167	Нетта Netta	880 2616	14.11.2025
23012037	08.09.2023	250239	ЛГ РОЗАРКА LG ROZARKA	793	20.11.2025
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
23019002	06.04.2023	250298	Імператор Imperator	2783	25.11.2025
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
2025020002	27.01.2025	250273	Тімбер Timber	1797	04.11.2025
Квасоля звичайна (зернова) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean					
23025003	18.12.2023	250302	Боберан Boberan	2260	18.11.2025
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
23040004	11.04.2023	250156	ЛГ КЕЛЬВІН КЛ LG CALVIN CL	793	20.11.2025
23040006	11.04.2023	250157	ЛГ АДАПТ LG ADAPT	793	20.11.2025
23040007	10.04.2023	250243	Інвігор 2070 Invigor 2070	3415	04.11.2025
23040009	11.04.2023	250158	ЛГ АБЕНГЕР LG AVENGER	793	20.11.2025
Горох посівний (овочевий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea, Garden Pea					
20095005	17.12.2020	250192	ЛАРАНГО LARANGO	1219	21.11.2025
24095002	12.02.2024	250283	Меґасайз Megasaiz	2429	13.11.2025
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
24096004	12.02.2024	250295	Кентуккі Kentukki	2429	13.11.2025
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot					
23109006	26.12.2023	250276	Бабусині смаколики Babusyni smakolyky	3236	04.11.2025
24109001	07.02.2024	250277	Ласощі для гномів Lasoshchi dlia hnomiv	3236	04.11.2025
24109002	29.02.2024	250278	НЯМ-НЯМ NIAM-NIAM	3236	04.11.2025
24109003	29.02.2024	250279	ОСИННІЙ ГІГАНТ OSINNII HIHANT	3236	04.11.2025
24109004	06.03.2024	250280	Хрусткий Сніданок Khrustkyi Snidanok	3236	04.11.2025
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin					
24150001	02.02.2024	250294	Пабло Pablo	2011	12.11.2025
Льон звичайний (ярий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed					
2025243004	24.01.2025	250286	Річесс Richess	2865	04.11.2025

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Aricot					
24256002	14.10.2024	250299	Бержерон 1 Bergeron 1	3218 3241	19.11.2025
24256003	14.10.2024	250300	Перла 1 Perla 1	3218 3241	19.11.2025
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose					
2025339001	28.05.2025	250293	Крапля Сонця Kraplia Sontsia	348	12.11.2025
Ельшольція Стаунтона <i>Elsholzia stauntonii</i> Benth. Elsholzia					
24449001	11.10.2024	250201	Вереснева красуня Veresneva krasunia	348	12.11.2025
Деревій майже звичайний <i>Achillea submillefolium</i> Klok. et Krytzka Achillea					
2025499001	01.01.2025	250200	Козацький Kozatskyi	348	12.11.2025
Підщепи сливи <i>Prunus</i> L. Plum Rootstocks					
24588002	04.10.2024	250307	ВанКло WanClo	3218 3241	19.11.2025
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (parental component)					
23900009	22.08.2023	250212	TR23UB646 TR23UW646	2597	04.11.2025
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
19909070	01.02.2019	250303	ПХ1ТДЦ PH1TDC	1688	18.11.2025
21909100	19.10.2021	250304	ПХ2ТРФ PH2TRF	1688 1690	18.11.2025
21909103	19.10.2021	250305	ПХ2ДИМ PH2DYM	1690	18.11.2025
23909080	21.08.2020	250306	1ПГИЛ72 1PGYL72	1690	18.11.2025
23909113	05.12.2023	250148	PBI589 RVI589	793	20.11.2025
23909114	05.12.2023	250149	КЮІБ54ФФ QIB54FF	793	20.11.2025
23909127	05.12.2023	250150	КЮІБ55ФФ QIB55FF	793	20.11.2025

Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on revalidation of intellectual property rights to plant varieties

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації відновлення права Registration date of renewing right	Підстава On the basis of
Жито <i>Secale cereale</i> L. Rye				
0863	Хамарка Khamarka	404	07.11.2025	Наказ Мінекономіки від 07.11.2025 № 1167
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Corn, Maize				
140468	Меркур F1 Merkur F1	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
160807	30M 30M	844	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
170786	23M 23M	844	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
180360	СВ1514СК SV1514SK	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
190808	СВ1446СД SV1446SD	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
210078	Мессенджер Messenger	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
211129	Абріса Abrisa	2658	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
211130	Дорлен Dorlen	2658	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
211144	ГС20М HS20M	2658	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
211145	ГС20АБ HS20AB	2658	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
211146	ГС20ДБ HS20DB	2658	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240459	Артуа Artua	2629	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240460	Сарта Sarta	2629	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240461	Мартиника Martyuka	2629	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240462	ВЛ 627 В VL 627 V	2629	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240463	ВЛ 633 В VL 633 V	2629	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240464	СМ 434 А SM 434 A	2629	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240465	СМ 472 А SM 472 A	2629	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240466	СМ 323 А SM 323 A	2629	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240467	ВЛ 622 В VL 622 V	2629	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
Пшениця м'яка <i>Triticum aestivum</i> L. Wheat, Soft Wheat, Bread Wheat				
0411	Дріада 1 Driada 1	1123	07.11.2025	Наказ Мінекономіки від 07.11.2025 № 1167
10792	Ярославна Yaroslavna	1123 409	07.11.2025	Наказ Мінекономіки від 07.11.2025 № 1167
10793	Кірена Kirena	1123	07.11.2025	Наказ Мінекономіки від 07.11.2025 № 1167
140612	Кларіса Klarisa	1123	07.11.2025	Наказ Мінекономіки від 07.11.2025 № 1167
190515	Генічанка Henichanka	1123	07.11.2025	Наказ Мінекономіки від 07.11.2025 № 1167
200787	Арабатка Arabatka	1123	07.11.2025	Наказ Мінекономіки від 07.11.2025 № 1167
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Eggplant, Aubergine				
140758	Шеріл Cheryl	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220543	СВ1574ЕВ SV1574EV	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
Диня посівна, диня звичайна <i>Melo sativus</i> Sager.ex M.Roem Melon				
140760	Рікура Ricura	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації відновлення права Registration date of renewing right	Підстава On the basis of
150849	Бравура Bravura	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
170761	Карібб'ян Кінг Caribbean King	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
190732	Месура Mesura	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
190733	Санвісенте Sanvicente	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
190734	Долсура Dolsura	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
200635	Каліна Kalyna	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220386	Тарбо Tagbo	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220545	ВІФАК WIFAK	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220546	ЕЧАРКІА ECHARKIA	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>giramontia</i> Duch. Marrow squash, Pumpkin				
180064	СВ8575ЯЛ SV8575YL	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220550	СВ2987ЯЛ SV2987YL	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
240224	Кефрен Kefren	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon				
150175	Баронеса Baronessa	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
150462	Бонта F1 Bonta F1	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180072	Титанія Titania	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
200025	Морган Morhan	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220418	Тропікал Саншайн Tropical Sunshine	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220551	РЕД ХЕВЕН RED HEAVEN	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220552	ЕКІНОКС EKINOX	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
230811	СВ3807ВТ SV3807WT	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
230812	ГРІН ДЖАР GREEN JAR	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
Капуста <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> (L.) alba DC. White Cabbage				
150466	Ред Дінасті F1 Red Dynasty F1	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170310	СВ3336ЖБ SV3336JB	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170311	Ларсія Larsia	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170768	Форталеза Fortaleza	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180078	Рapidіон Rapidion	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180083	СВ1002БЛ SV1002BL	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
190739	Галватрон Galvatron	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
190740	СВ3404ЖЛ SV3404JL	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
190742	СВ5818АЦ SV5818AC	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200029	Ов'ндолі Ovindoli	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220553	ВАЙТЕКС WHITEX	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
Морква посівна <i>Daucus sativus</i> (Hoffm.) Roehl. Carrot				
170510	СВ1140ДН SV1140DN	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації відновлення права Registration date of renewing right	Підстава On the basis of
200240	Лес Сантаес Les Saintes	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
210494	Карлано Carlano	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220558	АБРАЗО ABRAZO	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220559	КАРРУБА CARRUBA	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220560	КАРІБОУ CARIBOU	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber, Gherkin				
130001	Ленара Lenare	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
130002	Чайковський Chaikovskiy	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 13.12.2019 № 675
130002	Чайковський Chaikovskiy	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
140471	Мева Mewa	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
150905	СВ4097ЦВ SV4097CV	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
150910	Кантара Santara	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
170175	Мадрилен Madrilene	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170811	Монісія Monisia	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180391	Ліст Liszt	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
190842	Квінтус Quintus	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200247	Мадейра Madeira	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200651	Ілонара Ilonara	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220561	Жозефіно Josefino	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220600	Местана Mestana	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
230308	Ельвінара Elvinara	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
230440	Валігора Valigora	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
230823	БРАНДИНО BRANDINO	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
Перець гіркий однорічний <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Capsicum, Chili				
170179	Фабріс Fabris	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
170180	Портека Porteca	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
170186	ДСП 7054 DSP 7054	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170522	Аріадні Ariadni	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200249	Сардінеро Sardinero	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200250	Раптор Raptor	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200251	Декстер Dexter	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220484	Балканіка Balcanica	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220526	Топгір Topgear	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220527	Бурабелла Burabella	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220528	Мерсіса Mersisa	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220811	Йокаріно Yocarino	1730	07.11.2025	Наказ Мінекономіки від 07.11.2025 № 1167
220812	Чоколоні Chocolony	1730	07.11.2025	Наказ Мінекономіки від 07.11.2025 № 1167

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації відновлення права Registration date of renewing right	Підстава On the basis of
230312	Капіроссі Capirossi	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
230318	Агостіні Agostini	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
Помідор їстівний <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomato				
140427	Томімару Мучоо Tomimaru Muchoo	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
140429	Старбак Starbuck	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
140430	Мерліс Merlice	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
140431	Форонті Foronti	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
140487	Елегро F1 Elegro F1	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
140488	Мірсіні F1 Mirsini F1	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
140491	Махітос Mahitos	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
140492	Дофу Doufu	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
140495	Аттія Attiya	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
150544	Мелодія F1 Melodiya F1	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
150759	Аламїна Alamina	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
150916	Тореро Togero	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
150917	Матіас Matias	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
150918	Ігідо Yigido	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
150919	Рок Roque	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
150923	Прунус Prunus	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
150924	ДР0141ТХ DR0141TX	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170200	Мей Шуаї Mei Shuai	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170201	Партова Partova	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170211	Матіссімо Matissimo	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170535	Компак Compact	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170536	ЯГ 8810 JAG 8810	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170537	Корвінус Corvinus	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170540	СВ8320ТД SV8320TD	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180414	СВ8840ТМ SV8840TM	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180417	Зульфїя Zulfia	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
180420	Васанта Vasanta	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
180421	СВ1491ТМ SV1491TM	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180422	Белларїва Bellariva	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180452	Етерей Etereï	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180453	Севанс Sevance	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180454	Рестлер Wrestler	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180937	АВ 0311 AV 0311	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180938	СВ3725ТЧ SV3725TH	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації відновлення права Registration date of renewing right	Підстава On the basis of
180939	Мануса Manusa	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
190870	Волантіс Volantis	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
190871	Бесуго Besuto	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
190872	Армаро Armaro	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
190875	Плумола Plumola	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
200252	Сентоса Sentosa	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200254	ПІНКІД PINKID	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200255	Страбена Strabena	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200256	Фуджімару Fujimaru	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200257	Джорней Journey	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200258	Компліс Complice	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
210896	Накаумі Nakaumi	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220407	Анненфельд Annenfeld	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220530	Наргіза Nargiza	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220563	АНТЕЛАІСІ ANTELAISI	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220564	ЙЕЛОРІТА YELORITA	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220565	ТОРЕЛІНО TORELINO	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
230319	Масумі Masumi	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
230330	Алазія Alasia	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
230827	ХАКІМАРУ HAKUMARU	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
240185	Амеліозо Amelioso	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240186	Лусіозо Lucioso	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240187	Кумбулу Kumbulu	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240188	Валеріозо Valerioso	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240189	Рексозо Rexoso	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240519	Редсонні Redsonny	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240527	Хайрул Hyrule	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Potato Onion, Tree Onion, Egyptian Onion				
170732	ПХ 07713119 PX 07713119	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
170733	СВ6646НВ SV6646NW	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180800	Міссісіппі Mississippi	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
190981	Міністер Minister	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
200482	Поконо Rosono	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
210137	Сакраменто Sacramento	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
210138	Міннесота Minnesota	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
210139	Ред Флойд Red Floyd	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220591	КОДАЛ CODAL	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації відновлення права Registration date of renewing right	Підстава On the basis of
220592	РЕД НУГЕНТ RED NUGENT	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
220593	САДДЛБЕК SADDLEBACK	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
230837	АЛМАНЗОРО ALMANZORO	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Head Lettuce				
140533	Руксай Rouxai	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
150574	Сталліон Stallion	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
150928	Аквіно Aquino	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
170237	Ясперінас Jasperinas	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
170238	Отілі Othilie	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
170831	Патішн Partition	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
180564	СВ4896ЛЦ SV4896LC	3381	24.11.2025	Наказ Мінекономіки від 24.11.2025 № 1668
180576	Ксандра Xandra	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
180577	Сатурдай Saturdai	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
180578	Експертайз Expertise	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
180904	Мерлінас Merlinas	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
190926	Ікебанас Ikebanas	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
190928	Томбело Tombelo	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
190931	Атмос Athmos	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
190932	Ландау Landau	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
190933	Лалік Laliqie	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
191009	Ізанас Izanas	1730	17.11.2025	Наказ Мінагрополітики від 15.10.2024 № 3979
191009	Ізанас Izanas	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
191010	Асмера Asmara	1730	17.11.2025	Наказ Мінагрополітики від 15.10.2024 № 3979
191010	Асмера Asmara	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
191015	Турінус Thurinus	1730	17.11.2025	Наказ Мінагрополітики від 15.10.2024 № 3979
191015	Турінус Thurinus	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
200298	Екстемп Extemp	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
200299	Кодекс Codex	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
200668	Орбітал Orbital	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
200671	Дюнан Dunand	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
210571	Култард Coulthard	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
211029	Лімасол Limassol	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
211030	Дзанарді Zanardi	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220508	Афіліон Aphyllion	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220633	Скамандер Scamander	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
220816	Рабелло Rabello	1730	07.11.2025	Наказ Мінекономіки від 07.11.2025 № 1167
230320	Лісбоа Lisboa	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації відновлення права Registration date of renewing right	Підстава On the basis of
240101	Сенсібел Cencibel	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
240193	Самантін Samantine	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
Селера листовка <i>Arium graveolens</i> L. var. <i>secalinum</i> Alef. Celery, Celeriac				
190935	Мерга Merga	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
Цикорій салатний (ендивій) <i>Cichorium endivia</i> L. Endive				
180805	Анконі Anconi	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
Дворядник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)				
191004	Темісто Themisto	1730	17.11.2025	Наказ Мінагрополітики від 15.10.2024 № 3979
191004	Темісто Themisto	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437
191005	Сіноп Sinope	1730	17.11.2025	Наказ Мінагрополітики від 15.10.2024 № 3979
191005	Сіноп Sinope	1730	17.11.2025	Наказ Мінекономіки від 17.11.2025 № 1437

Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин Other notifications as listed in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відповідно до наказу Міністерства економіки, до-
вкілля та сільського господарства України від 24 лис-
топада 2025 року № 1667 «Про внесення змін до ві-
домостей, що містяться в Державному реєстрі сортів
рослин, придатних для поширення в Україні, та Держ-
жавному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено

зміну до відомостей, що містяться в Державному реє-
стрі патентів на сорти рослин, стосовно кукурудзи зви-
чайної ІНДЕМ1316 (заявка № 23009048), замінивши
в назві сорту рослини (українською мовою та мовою
заявника) слова та цифри «ІНДЕМ1316 (INDEM1316)»
словами «Байлі (Bailey)».

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
2025009003	28.11.2025	01.01.2025	РЖТ КОЛБІККС RGT KOLBIXX	1783	1783		
2025009005	24.11.2025	01.01.2025	ВОРКС WORKX	1783	1783		
2025009081	28.11.2025		ГУ1126 GW1126	3428	3428		
2025009082	28.11.2025		ГУ3024 GW3024	3428	3428		
23009011	28.11.2025	20.01.2023	Альбом Albom	2794 921	2260 921		бюлетень, випуск 2, 2025
23009020	28.11.2025	08.03.2023	СТАЙН 9310 STINE 9310	3422	3422		бюлетень, випуск 1, 2025
23009057	28.11.2025	29.09.2023	ПС 310 PS 310	3228	3228		
23009066	28.11.2025	20.11.2023	РЖТ ПІНКФЛОЙД RGT PINXXFLOYD	1783	1783		
23009070	28.11.2025	20.11.2023	РЖТ ПЕТЕРККСОН RGT PETERXXON	1783	1783		
23009144	28.11.2025	29.12.2023	Стар Сідс Деві С 380 Star Sids Devi S 380	3244	3244		
23009145	28.11.2025	29.12.2023	Стар Сідс С 280 Star Sids S 280	3244	3244		
23009146	28.11.2025	29.12.2023	Стар Сідс С 350 Star Sids S 350	3244	3244		
23009147	28.11.2025	29.12.2023	Стар Сідс С 330 Star Sids S 330	3244	3244		
23009148	28.11.2025	29.12.2023	Стар Сідс С 320 Star Sids S 320	3244	3244		
23009149	28.11.2025	29.12.2023	Стар Сідс С 310 Star Sids S 310	3244	3244		
23009152	28.11.2025	29.12.2023	Стар Сідс Лена С 360 Star Sids Lena S 360	3244	3244		
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
23012009	17.11.2025	06.04.2023	Блеквіт Blekvit	2783	2783		
23012019	28.11.2025	18.07.2023	Стеліан Stelian	2552	2552		бюлетень, випуск 10, 2025
23012020	28.11.2025	18.07.2023	Ліпперт Lippert	2552	2552		бюлетень, випуск 10, 2025
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)							
23019002	17.11.2025	06.04.2023	Імператор Imperator	2783	2783		
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)							
2025020009	24.11.2025		Сейлер Sailer	1797	1797		
23020003	07.11.2025	11.10.2023	Подільський-50 Podilskiyi-50	1669	1669		бюлетень, випуск 10, 2025
23020004	07.11.2025	11.10.2023	Ювілейний Yuvileinyi	1669	1669		бюлетень, випуск 10, 2025

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)							
21022006	17.11.2025	05.08.2021	Фродо Поліський Frodo Poliskyi	1626	1626		
23022004	28.11.2025	04.08.2023	МІП Ренесанс MIP Renesans	2859	2859		бюлетень, випуск 10, 2025
Квасоля звичайна (зернова) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean							
23025003	17.11.2025	18.12.2023	Боберан Boberan	2794	2260		
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
2025039003	28.11.2025	01.01.2025	ЄЛЛО КЛП YELLO CLP	1783	1783		
23039035	28.11.2025	29.09.2023	ПС-115Е PS-115E	3228	3228		
23039043	28.11.2025		П63ЛЛ209 P63LL209	2715	2715		
23039044	28.11.2025		П64ГЕ233 P64HE233	2715	2715		
23039045	28.11.2025		П64ЛП196 P64LP196	2715	2715		
23039047	28.11.2025		П63ЛЕ193 P63LE193	2715	2715		
23039052	28.11.2025	23.11.2023	БОХЕМ VONEM	1783	1783		
23039053	28.11.2025	23.11.2023	ЛЛЮДВІГ LLUDWIG	1783	1783		
23039054	28.11.2025	23.11.2023	ОДІН ODYN	1783	1783		
23039090	28.11.2025	28.12.2023	Корсин Korsyn	3243	3243		
23039094	28.11.2025	28.12.2023	Клаус Klaus	3243	3243		
24039001	28.11.2025		Кадіз Cadiz	2882	2882		
24039004	28.11.2025	10.01.2024	СИ МАГІСТЕР SY MAGISTER	2643	1219		
24039062	28.11.2025	02.12.2024	РЖТ ЕЛЛІОТ КЛП RGT ELLIOT CLP	1783	1783		
24939004	28.11.2025	05.01.2024	Лорка Грано Lorca Grano	2882	2882		
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)							
23040029	07.11.2025	23.05.2023	РТ325 RT325	2715	2715		
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean							
23045019	28.11.2025	20.11.2023	СІБЕЛЛА SIBELLA	1783	1783		
23045021	28.11.2025	20.11.2023	СКВАДРА SQUADRA	1783	1783		
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato							
20088003	28.11.2025	03.01.2020	Шедевр Shedevr	2631	2631		бюлетень, випуск 1, 2022
20088005	28.11.2025	03.01.2020	Либідь Lybid	2631	2631		бюлетень, випуск 1, 2022
Боби кінські <i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i> Field Bean							
2025094001	24.11.2025	25.07.2025	Ньютон Newton	3429 3403	3429 3403		
Горох посівний (овочевий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea, Garden Pea							
24095002	07.11.2025	12.02.2024	Меґасайз Megasaiz	2429	2429		бюлетень, випуск 10, 2025
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage							
2025096003	28.11.2025		Манук Manouk	1730	1730		
24096004	07.11.2025	12.02.2024	Кентуккі Kentukki	2429	2429		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower							
2025101002	28.11.2025		Перето Pereto	1730	1730		
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion							
2025106007	07.11.2025		Джоакін Joaquin	753	753		
2025106008	07.11.2025		Сієста Siesta	1997		1997	
24106004	17.11.2025		Редеско Redesco	2086	2086		
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot							
2025109001	28.11.2025		Акат Akat	1997		1997	
2025109002	28.11.2025		Беркос Berkos	1997		1997	
2025109003	28.11.2025		Кларіс Klaris	1997		1997	
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber							
2025110007	28.11.2025		Баритон Barytone	1730	1730		
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika							
2025113003	28.11.2025		Дворана Dvorana	1997		1997	
2025113004	28.11.2025		Касандра Kasandra	1997		1997	
2025113005	07.11.2025		Нела Nela	1997		1997	
2025113006	07.11.2025		Тонгуа Tongua	1997		1997	
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato							
2025115003	17.11.2025	27.05.2025	Фарасан Farasan	840	840	840	
2025115010	07.11.2025		Апрікола Aprikola	1997		1997	
2025115012	07.11.2025		Делікано Delikano	1997		1997	
2025115013	17.11.2025	15.07.2025	Фрейзер Парадайз Fraser Paradise	840	840	840	
2025115014	17.11.2025	15.07.2025	Родіум Rhodium	840	840	840	
2025115015	17.11.2025	15.07.2025	Орагіо Oragio	840	840	840	
2025115016	17.11.2025	15.07.2025	Формоза Formoza	840	840	840	
2025115017	17.11.2025	15.07.2025	Корнаті Kornati	840	840	840	
2025115018	17.11.2025		Сан Блас San Blas	840	840	840	
2025115019	17.11.2025		Шівіос Shivios	840	840	840	
24115004	28.11.2025		СОЛВЕТ SOLVET	2643		1219	
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish							
2025118001	07.11.2025		Вікторі Victory	1997		1997	
Цикорій салатний (ендивій) <i>Cichorium endivia</i> L. Endive							
2025121004	28.11.2025		Берлінал Berlinal	1730	1730		
Буряк столовий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. Beetroot, Garden Beet							
23122001	07.11.2025		Делікатесний Delikatesnyi	3238		3238	
23122002	07.11.2025		Бордо 237 Bordo 237	3238		3238	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
23122003	28.11.2025	26.12.2023	Чарівниця Charivnytsya	3236	3236		
24122001	28.11.2025	04.01.2024	Конар Konar	3245	3245		
24122003	28.11.2025	07.02.2024	Мармеладка Marmeladka	3236	3236		
24122004	28.11.2025	07.02.2024	Овочевий скарб Ovochevyi skarb	3236	3236		
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill							
23125001	28.11.2025	09.06.2023	Беллі Belli	3216	3216		
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean							
2025127001	24.11.2025		Контендер Contender	1163		1163	
2025127003	24.11.2025		Максідор Maxidor	1163		1163	
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon							
2025147002	17.11.2025		Романостар Romanostar	840	840	840	
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash							
2025148005	17.11.2025		Інесса Inessa	840	840	840	
2025148008	24.11.2025		БОЛОНЬЄЗЕ BOLOGNESE	1163		1163	
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin							
24150002	07.11.2025		КЕМОН KEMON	2662	2662		
24150003	07.11.2025		ВОРТИ ГОБЛІН WARTY GOBLIN	2662	2662		
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover							
2025155001	28.11.2025		УНО UNO	3424		3424	
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)							
23177001	07.11.2025	03.11.2023	Таємниця Taiemnytsia	3232	3232		бюлетень, випуск 10, 2025
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne							
2025196006	07.11.2025		Дімітра DIMITRA	3424		3424	
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose							
2025339001	07.11.2025	28.05.2025	Крапля Сонця Kraplia Sontsia	348	348		бюлетень, випуск 10, 2025
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard							
2025380003	24.11.2025		ЕЛЕНДІЛ ELENDIL	3424	3424		
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Lettuce, Head Lettuce							
2025421003	28.11.2025		Металія Metalia	753	753		
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut							
2025543011	17.11.2025	14.08.2025	ПолліО PollyO	2538	2538		
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce							
2025546003	28.11.2025		Ольгада Olgada	753	753		
23546002	07.11.2025	13.11.2023	Одона Odon	1730	1730		
Лохина щиткова <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry; High Bush Blueberry							
21519001	17.11.2025	15.01.2021	Калінсо Calypso	2768	2768		бюлетень, випуск 10, 2025
21519005	17.11.2025	07.07.2021	Осорно Osorno	2768	2768		бюлетень, випуск 10, 2025

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
2025909086	28.11.2025		ГУ53501 GW53501	3428	3428		
2025909087	28.11.2025		ГУ51593 GW51593	3428	3428		
23909001	28.11.2025	02.01.2023	ФСАКС3657С FSAX3657S	2643	1219		
23909084	28.11.2025	20.11.2023	Р19009ЦМС R19009СMS	1783	1783		
23909085	28.11.2025	20.11.2023	Р22023 R22023	1783	1783		
23909086	28.11.2025	20.11.2023	Р22019 R22019	1783	1783		
23909089	28.11.2025	20.11.2023	Р21022 R21022	1783	1783		
23909146	28.11.2025	29.12.2023	ГВМ 36023 HVM 36023	3244	3244		
23909147	28.11.2025	29.12.2023	ГВФ 35023 HVF 35023	3244	3244		
23909150	28.11.2025	29.12.2023	ГВМ 28023 HVM 28023	3244	3244		
23909151	28.11.2025	29.12.2023	ГВМ 32023 HVM 32023	3244	3244		
23909152	28.11.2025	29.12.2023	ГВМ 35023 HVM 35023	3244	3244		
23909153	28.11.2025	29.12.2023	ГВМ 38023 HVM 38023	3244	3244		
23909154	28.11.2025	29.12.2023	ГВМ 31023 HVM 31023	3244	3244		
23909155	28.11.2025	29.12.2023	ГВФ 28023 HVF 28023	3244	3244		
23909156	28.11.2025	29.12.2023	ГВФ 31023 HVF 31023	3244	3244		
23909157	28.11.2025	29.12.2023	ГВФ 32023 HVF 32023	3244	3244		
23909158	28.11.2025	29.12.2023	ГВФ 38023 HVF 38023	3244	3244		
23909162	28.11.2025	29.12.2023	ГВФ 33023 HVF 33023	3244	3244		
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component							
23915002	07.11.2025	13.04.2023	Л2297П x Л2286Н L2297P x L2286N	1900	1900		бюлетень, випуск 10, 2025
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component							
2025939011	24.11.2025	10.01.2025	Р18ХВ8МК R18ХW8МК	1435	1435		
23939067	28.11.2025	21.12.2023	33568 33568	2834	2554		
23939069	28.11.2025	21.12.2023	15051 15051	2834	2554		

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin					
24150002	13.02.2024	250543	КЕМОН KEMON	2662	20.11.2025
24150003	14.02.2024	250544	ВОРТИ ГОБЛІН WARTY GOBLIN	2662	20.11.2025
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard					
2025380002	10.03.2025	250432	Северка Severka	880	14.11.2025
Горох посівний (овочевий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea, Garden Pea					
20095005	17.12.2020	250433	ЛАРАНГО LARANGO	1219	21.11.2025
24095002	12.02.2024	250545	Меґасайз Megasaiz	2429	13.11.2025
Горох посівний (озимий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea (Winter)					
2025559003	14.08.2025	250521	АВІРОН AVIRON	2627	14.11.2025
Деревій майже звичайний <i>Achillea submillefolium</i> Klok. et Krytzka Achillea					
2025499001	01.01.2025	250440	Козацький Kozatskyi	348	12.11.2025
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
2025147002	27.05.2025	250554	Романостар Romanostar	840	25.11.2025
Ельшольція Стаунтона <i>Elsholzia stauntonii</i> Benth. Elsholzia					
24449001	11.10.2024	250441	Вереснева красуня Veresneva krasunia	348	12.11.2025
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash					
2025148005	27.05.2025	250555	Інесса Inessa	840	25.11.2025
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
24096002	16.01.2024	250527	ОРАТОР ORATOR	1219	21.11.2025
24096004	12.02.2024	250548	Кентуккі Kentukki	2429	13.11.2025
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower					
2025101001	27.05.2025	250512	Синторі Suntory	840	25.11.2025
Квасоля звичайна (зернова) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean					
23025003	18.12.2023	250556	Боберан Boberan	2260	25.11.2025
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut					
2025543011	14.08.2025	250557	ПолліО PollyO	2538	27.11.2025
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot					
23109006	26.12.2023	250529	Бабусині смаколики Babusyni smakolyky	3236	04.11.2025
24109001	07.02.2024	250530	Ласощі для гномів Lasoshchi dlia hnomiv	3236	04.11.2025
24109002	29.02.2024	250531	НЯМ-НЯМ NIAM-NIAM	3236	04.11.2025
24109003	29.02.2024	250532	ОСІННІЙ ГІГАНТ OSINNIY HIHANT	3236	04.11.2025
24109004	06.03.2024	250533	Хрусткий Сніданок Khrustkyi Snidanok	3236	04.11.2025

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Помідор істівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
2025115001	27.02.2025	250489	РЕДНОВА REDNOVA	1219	21.11.2025
2025115003	27.05.2025	250560	Фарасан Farasan	840	25.11.2025
2025115013	15.07.2025	250561	Фрейзер Парадайз Fraser Paradise	840	25.11.2025
2025115014	15.07.2025	250562	Родіум Rhodium	840	25.11.2025
2025115015	15.07.2025	250563	Орагіо Oragio	840	25.11.2025
2025115016	15.07.2025	250564	Формоза Formoza	840	25.11.2025
2025115017	15.07.2025	250565	Корнаті Kornati	840	25.11.2025
2025115018	01.09.2025	250566	Сан Блас San Blas	840	25.11.2025
2025115019	09.09.2025	250567	Шівіос Shivious	840	25.11.2025
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (parental component)					
23900009	22.08.2023	250465	TR23UB646 TR23UW646	2597	04.11.2025
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
2025012040	14.08.2025	250523	ХОББІ НОВВУ	880	14.11.2025
2025012040	14.08.2025	250523	ХОББІ НОВВУ	2616	14.11.2025
2025012042	14.08.2025	250525	Інка Inka	880	14.11.2025
2025012042	14.08.2025	250525	Інка Inka	2616	14.11.2025
2025012043	14.08.2025	250526	ЛУКСУС LUXUS	880	14.11.2025
23012009	06.04.2023	250568	Блеквіт Blekvit	2783	25.11.2025
23012010	11.04.2023	250457	ЛГ ТОМЙОЛЬ LG TOMJOL	793	20.11.2025
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
2025040037	02.07.2025	250415	ЛГ АДВЕНТУС LG ADVENTUS	793	20.11.2025
2025040042	02.07.2025	250416	МАГЕЛАН MAGELAN	793	20.11.2025
23040007	10.04.2023	250471	Інвігор 2070 Invigor 2070	3415	04.11.2025
23040029	23.05.2023	250549	ПТ325 PT325	2715	13.11.2025
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose					
2025339001	28.05.2025	250551	Крапля Сонця Kraplia Sontsia	348	12.11.2025
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
2025106007	30.06.2025	250541	Джоакін Joaquin	753	13.11.2025
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach					
2025130003	27.05.2025	250518	Джип Jeep	840	25.11.2025
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
23019002	06.04.2023	250571	Імператор Imperator	2783	25.11.2025

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати

Information on issued certificates of authorship for plant varieties and their duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
22012050	22.12.2022	250233	Азія плюс Aziia plus	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Olexsii Borysovych	10.11.2025
22012051	22.12.2022	250234	Валькірія Valkiriia	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Olexsii Borysovych	10.11.2025
22012052	22.12.2022	250235	Гравіс Hravis	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Olexsii Borysovych	10.11.2025
22012053	22.12.2022	250236	Аватар Харківський Avatar Kharkivskyi	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Olexsii Borysovych	10.11.2025
22012054	22.12.2022	250237	Флагман Flahman	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Olexsii Borysovych	10.11.2025
23012005	20.03.2023	250238	Фурія Furiia	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Olexsii Borysovych	10.11.2025
23012006	20.03.2023	250239	Рататуй Ratatuï	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Olexsii Borysovych	10.11.2025
23012007	20.03.2023	250240	Коллана Kollana	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Olexsii Borysovych	10.11.2025
Шавлія лікарська <i>Salvia officinalis</i> L. Garden Sage					
2025059001	27.02.2025	250179	Чаклунка Chaklunka	Газнюк Марія Олександрівна Hazniuk Mariia Oleksandrivna	12.11.2025
2025059001	27.02.2025	250179	Чаклунка Chaklunka	Корабльова Ольга Анатоліївна Korablova Olha Anatoliivna	12.11.2025
2025059001	27.02.2025	250179	Чаклунка Chaklunka	Рахметов Джамал Бахлулович Rakhmetov Dzhamal Bakhlulovych	12.11.2025
2025059001	27.02.2025	250179	Чаклунка Chaklunka	Шанайда Марія Іванівна Shanaïda Mariia Ivanivna	12.11.2025
2025059002	27.02.2025	250180	Вишиванка Vyshyvanka	Газнюк Марія Олександрівна Hazniuk Mariia Oleksandrivna	12.11.2025
2025059002	27.02.2025	250180	Вишиванка Vyshyvanka	Корабльова Ольга Анатоліївна Korablova Olha Anatoliivna	12.11.2025
2025059002	27.02.2025	250180	Вишиванка Vyshyvanka	Пилипчук Валентина Федорівна Pylypchuk Valentyna Fedorivna	12.11.2025
2025059002	27.02.2025	250180	Вишиванка Vyshyvanka	Рахметов Джамал Бахлулович Rakhmetov Dzhamal Bakhlulovych	12.11.2025
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)					
09047002	12.11.2009	171071	Веснянка Vesniianka	Гагін Андрій Олександрович Hahin Andrii Oleksandrovych	18.11.2025
09047002	12.11.2009	171071	Веснянка Vesniianka	Синьогуб Сергій Васильович Syn`ohub Serhii Vasyl`ovych	18.11.2025

Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту

Information on revalidation of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
10004129	06.08.2014	24.11.2025	ДН Гарант DN Harant	311 1433	1854 1433
11004064	26.02.2015	07.11.2025	НС 2642	879 1210	879 1210
11004065	26.02.2015	07.11.2025	НС 2642 NS 2642	879 1210	879 1210
11004066	26.02.2015	07.11.2025	НС 2652 NS 2652	879 1210	879 1210
12004111	25.02.2016	07.11.2025	НС 2662 NS 2662	879 1210	879 1210
12004200	26.02.2015	24.11.2025	НС 2922 NS 2922	879 1210	879 1210
14009028	26.02.2015	24.11.2025	Марсер Marser	1854 1433	1854 1433
14009028	16.03.2017	07.11.2025	НС 2672	1978 1210	1978 1210
14009029	25.02.2016	07.11.2025	НС 2672 NS 2672	1978 1210	1978 1210
14009030	25.02.2016	07.11.2025	НС 3030 NS 3030	1978 1210	1978 1210
14009031	25.02.2016	07.11.2025	НС 2682 NS 2682	1978 1210	1978 1210
14009031	25.02.2016	07.11.2025	НС 3022 NS 3022	1978 1210	1978 1210
14009082	16.03.2017	07.11.2025	НС 3314 NS 3314	1978 1210	1978 1210
14009083	16.03.2017	07.11.2025	НС 2020 NS 2020	1978 1210	1978 1210
15009119	08.02.2019	24.11.2025	Оршанець Orshanets`	2260 1433	2260 1433
17009197	07.02.2020	24.11.2025	Рей Rei	2260 1433	2260 1433
19009061	24.12.2021	17.11.2025	Нетеребський 290 Neterebskyi 290	2577	2577
20009072	31.12.2022	17.11.2025	I 4314	2729	2729
20009073	31.12.2022	17.11.2025	I 4314 I 3553	2729	2729
20009076	31.12.2022	17.11.2025	I 3553 I 4545	2729	2729
20009077	31.12.2022	17.11.2025	I 4545 I 3113	2729	2729
20009078	31.12.2022	17.11.2025	I 3113 I 3737	2729	2729
20009079	31.12.2022	17.11.2025	I 3737 I 4930	2729	2729
20009080	31.12.2022	17.11.2025	I 4930 I 4141	2729	2729
20009081	31.12.2022	17.11.2025	I 4141 I 4739	2729	2729
20009082	31.12.2022	17.11.2025	I 4739 I 3311	2729	2729
20009082	31.12.2022	17.11.2025	I 3311	2729	2729
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)					
10005001	10.02.2015	17.11.2025	Мустанг Mustanh	1059	2445
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
00007001	26.12.2003	07.11.2025	Дріада 1 Driada 1	1123	1123
03007023	11.01.2007	17.11.2025	Лист 25 Lyst 25	1059	2445
04007035	23.01.2008	17.11.2025	Паляниця Palianytsia	1059	2445
07007032	22.11.2010	07.11.2025	Кірена Kirena	1123	1123
07007033	22.11.2010	07.11.2025	Ярославна Yaroslavna	1123 409	1123 409
14012051	17.01.2018	17.11.2025	АМПЕР AMPER	2047	2445
16012030	22.01.2019	07.11.2025	Генічанка Henichanka	1123	1123

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
16140001	09.11.2020	07.11.2025	Арабатка Arabatka	1123	1123
19012038	29.10.2021	17.11.2025	Белінда Belinda	2445 2599	2445 2599
19012062	08.10.2021	07.11.2025	НС Обала NS Obala	1978 2549	1978 2549
20012023	21.09.2022	17.11.2025	Макаровка Makarovka	2445 2599	2445 2599
20012026	21.09.2022	17.11.2025	Смарагд Smarahd	2445 2599	2445 2599
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)					
04003001	11.01.2007	07.11.2025	Хамарка Khamarka	404	404
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
07012008	22.11.2010	17.11.2025	Переможець Peremozhets	1059	2445
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum usitatissimum</i> L. Linseed					
06094001	11.01.2007	17.11.2025	Надійний Nadiinyi	1192 216	216 1192
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
02017043	01.01.2006	07.11.2025	Рімісол Rimisol	879	879
03017008	01.01.2005	17.11.2025	Алмаз Almaz	1192	1192
07017009	12.02.2010	07.11.2025	RIMI 2 RIMI 2	879 1210	879 1210
07017045	30.11.2010	07.11.2025	НС-Х-6046 NS-H-6046	1210 879	879 1210
07017047	30.11.2010	07.11.2025	НС-Х-6059 NS-H-6059	879 1210	879 1210
07017050	30.11.2010	07.11.2025	НС-Х-6045 NS-H-6045	879 1210	879 1210
08017049	09.07.2012	07.11.2025	НС Орфей NS Orfej	1210 879	879 1210
08017054	09.07.2012	07.11.2025	НС Голіат NS Goliat	1210 879	1210 879
09017303	28.03.2013	07.11.2025	НС ФАЛКОН NS FALCON	879 1210	879 1210
09017304	28.03.2013	07.11.2025	НС ТАУРУС NS TAURUS	879 1210	879 1210
09017305	28.03.2013	07.11.2025	НС РОМЕО NS ROMEO	879 1210	879 1210
09017306	20.01.2012	07.11.2025	НС Х 6054 NS H 6054	879 1210	879 1210
10017072	14.03.2014	07.11.2025	НС Х 6341 NS H 6341	879 1210	879 1210
10017073	14.03.2014	07.11.2025	НС Х 6343 NS H 6343	879 1210	879 1210
11017062	26.02.2015	07.11.2025	НС Х 6749 NS H 6749	879 1210	879 1210
12017137	25.02.2016	07.11.2025	НС Х 7037 NS H 7037	879 1210	879 1210
14039018	16.03.2017	07.11.2025	НС Х 26752 NS H 26752	1978 1210	1978 1210
14039023	16.03.2017	07.11.2025	НС Х 978 NS H 978	1978 1210	1978 1210
15039031	31.01.2018	07.11.2025	НС Х 7749 NS H 7749	1978 1210	1978 1210
15039032	31.01.2018	07.11.2025	НС Х 7640 NS H 7640	1978 1210	1978 1210
16039004	19.02.2019	17.11.2025	КОМАНДОР 777 KOMANDOR 777	2047	2445
17039024	15.02.2019	07.11.2025	НС Х ВЛСП NS H VLSP	1978 1210	1978 1210
17039025	15.02.2019	07.11.2025	НС Х ДФСР NS H DFSP	1978 1210	1978 1210
17039148	11.02.2020	07.11.2025	НС Х 7883 NS H 7883	1978 1210	1978 1210
17039153	11.02.2020	07.11.2025	НС Х 7902 NS H 7902	1978 1210	1978 1210

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
17039155	11.02.2020	07.11.2025	НС Х 7900	1978 1210	1978 1210
17039156	11.02.2020	07.11.2025	НС Н 7900	1978 1210	1978 1210
17039160	11.02.2020	07.11.2025	НС Х 8001 НС Н 8001	1978 1210	1978 1210
17039161	11.02.2020	07.11.2025	НС Х 8003 НС Н 8003	1978 1210	1978 1210
17039162	11.02.2020	07.11.2025	НС Х 8004 НС Н 8004	1978 1210	1978 1210
17039208	12.03.2020	17.11.2025	НС Х 8005 НС Н 8005	2445	2445
18039109	21.01.2021	17.11.2025	СУЛІКО 777 SULIKO 777	2445	2445
18039110	21.01.2021	17.11.2025	Карбон Karbon	2445	2445
18039119	18.01.2021	07.11.2025	Танос Tanos	1978 2549	1978 2549
18039154	16.02.2021	07.11.2025	НС Х 8063 НС Н 8063	1581	1581
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. Rape Seed (Winter)					
04016011	23.01.2008	24.11.2025	Стілуца Stilutsa	329	1702
Соя культурна <i>Glycine max.</i> (L.) Merr. Soya Bean					
07018019	20.12.2011	07.11.2025	Меркур Mercur	879 1210	879 1210
09018028	04.04.2013	07.11.2025	Фаворит Favorit	879 1210	879 1210
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
04013030	23.01.2008	17.11.2025	Резімакс Rezimax	796	796
09013031	18.02.2014	17.11.2025	Іпель Ipel	796	796
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant					
05022006	14.04.2006	24.11.2025	Бибо F1 Bibo F1	744	3381
05022007	26.05.2006	24.11.2025	Валентина F1 Valentina F1	744	3381
19093003	27.10.2020	24.11.2025	СВ1574ЕВ SV1574EV	1852	3381
22093005	24.10.2023	24.11.2025	МІРАБЕЛЬ MIRABELLE	1852	3381
98022001	01.01.2005	24.11.2025	Епик F1 Epic F1	744	3381
Горох посівний (овочевий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea, Garden Pea					
08024012	30.11.2010	24.11.2025	Талбот F1 Talbot F1	744	3381
09024008	15.02.2016	24.11.2025	Шервуд Sherwood	744	3381
09024010	15.02.2016	24.11.2025	Салінеро Salinero	744	3381
09024011	15.02.2016	24.11.2025	Аштон Ashton	744	3381
09024012	15.02.2016	24.11.2025	Різал Resal	744	3381
09024013	26.02.2016	24.11.2025	Вінко Venco	744	3381
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> (L.) alba DC. White Cabbage					
02028002	12.02.2003	24.11.2025	Пандион F1 Pandyon F1	744	3381
03028009	05.12.2003	24.11.2025	Аммон F1 Ammon F1	744	3381
05028002	15.04.2006	24.11.2025	Тобія F1 Tobia F1	744	3381
08028028	28.12.2010	24.11.2025	Чамп F1 Champ F1	744	3381
09028028	24.02.2014	24.11.2025	Мензанія Menzania	744	3381

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
13096007	21.02.2017	24.11.2025	СВ3336ЖБ SV3336JB	1852	3381
14096003	21.02.2017	24.11.2025	Ларсія Larsia	1852	3381
15096008	26.12.2017	24.11.2025	Рapidіон Rapidion	1852	3381
16096002	28.01.2019	24.11.2025	Галватрон Galvatron	1852	3381
16096004	28.01.2019	24.11.2025	СВ3404ЖЛ SV3404JL	1852	3381
16096005	28.01.2019	24.11.2025	Ферро Ferro	1852	3381
17096008	28.12.2019	24.11.2025	Бухарест Bucharest	744	3381
17096010	28.12.2019	24.11.2025	Заказ Zakaz	1852	3381
17096011	28.12.2019	24.11.2025	Грін Флеш Green Flash	1852	3381
18096003	25.11.2020	24.11.2025	Оксілуc Oxylus	1852	3381
18096004	25.11.2020	24.11.2025	Тропiкана Tropicana	1852	3381
18096005	25.11.2020	24.11.2025	Аструс Плюс Astrus Plus	1852	3381
95028005	01.01.1998	24.11.2025	Галакси F1 Galaxy F1	744	3381
97028005	01.01.2001	24.11.2025	Вестри F1 Vestry F1	744	3381
97028007	01.01.1999	24.11.2025	Ринда F1 Rinda F1	744	3381
98028010	20.01.2001	24.11.2025	Арривист F1 Arryvyst F1	744	3381
Капуста червоноголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> (L.) <i>rubra</i> DC. Red Cabbage					
03030001	05.12.2003	24.11.2025	Рокси F1 Roxy F1	744	3381
08030011	20.11.2009	24.11.2025	Ред Дiнастi F1 Red Dynasty F1	744	3381
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> Cauliflower					
09029004	24.02.2014	24.11.2025	Фрiдом F1 Freedom F1	744	3381
11029006	15.02.2016	24.11.2025	Форталеза Fortaleza	744	3381
16101002	28.01.2019	24.11.2025	Гiвонт Giewont	1852	3381
16101003	28.01.2019	24.11.2025	СВ5818АЦ SV5818AC	1852	3381
17101004	28.12.2019	24.11.2025	Овiндоли Ovindoli	1852	3381
18101002	25.11.2020	24.11.2025	Моментум Momentum	1852	3381
19101004	30.11.2021	24.11.2025	СВ5777АЦ SV5777AC	1852	3381
19101005	30.11.2021	24.11.2025	БАЙТЕКС WHITEX	1852	3381
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn					
05032004	26.05.2006	24.11.2025	Челленджер F1 Challenger F1 AS	744	3381
05032005	26.05.2006	24.11.2025	Шеба F1 Sheba R F1 AS	744	3381
15103004	24.01.2018	24.11.2025	СВ1514СК SV1514SK	1852	3381
16103005	28.01.2019	24.11.2025	СВ1446СД SV1446SD	1852	3381
17103004	25.11.2020	24.11.2025	Мессенджер Messenger	1852	3381
19103002	08.12.2020	17.11.2025	Роттердам Rotterdam	2424	2424
21103008	24.10.2023	24.11.2025	ПАССИОН PASSION	2522	3381
21103009	24.10.2023	24.11.2025	ВІЛЛІНГЕР WILLINGER	1852	3381

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Цибуля батун <i>Allium fistulosum</i> L. Welsh Onion, Japanese Bunching Onion					
05174001	01.01.2006	24.11.2025	Байа Верде Baia Verde PS	744	3381
09174001	15.04.2011	24.11.2025	Грін Баннер Green Banner	744	3381
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
00041001	01.01.2002	24.11.2025	Стерлінг F1 Sterlynh F1	744	3381
03041004	01.01.2005	24.11.2025	Сьєрра Бланка F1 Sierra Blanca F1	744	3381
08041029	09.09.2010	24.11.2025	Варес F1 Vares F1	744	3381
08041032	09.09.2010	24.11.2025	Балстар F1 Balstar F1	744	3381
09041023	27.04.2015	24.11.2025	P 4593 R 4593	744	3381
13106035	21.02.2017	24.11.2025	ПХ 07713119 PX 07713119	1852	3381
13106037	21.02.2017	24.11.2025	СВ6646НВ SV6646NW	1852	3381
15106012	26.12.2017	24.11.2025	Міссіссіппі Mississippi	744	3381
16106010	28.01.2019	24.11.2025	Міністер Minister	1852	3381
17106011	28.12.2019	24.11.2025	Поконо Pocopo	1852	3381
17106012	25.11.2020	24.11.2025	СВ4058НЮ SV4058NU	1852	3381
18106009	20.11.2020	24.11.2025	Сакраменто Sacramento	1852	3381
18106010	20.11.2020	24.11.2025	Міннесота Minnesota	1852	3381
18106011	20.11.2020	24.11.2025	Ред Флойд Red Floyd	1852	3381
19106014	18.11.2021	24.11.2025	КОДАЛ CODAL	1852	3381
19106015	18.11.2021	24.11.2025	РЕД НУГЕНТ RED NUGENT	1852	3381
19106016	18.11.2021	24.11.2025	САДДЛБАК SADDLEBACK	1852	3381
20106006	24.10.2023	24.11.2025	АЛМАНЗОРО ALMANZORO	1852	3381
21106003	15.03.2024	24.11.2025	ТУКАННОН TUCANNON	1852	3381
22106004	15.03.2024	24.11.2025	АДЖУСКО AJUSCO	1852	3381
22106005	24.10.2023	24.11.2025	СВ4774НВ SV4774NW	1852	3381
Морква <i>Daucus sativus</i> (Hoffm.) Roehl. Carrot					
03034005	05.12.2003	24.11.2025	Абако F1 Abaco F1	744	3381
06034005	23.01.2008	17.11.2025	Канада F1 Canada F1	751	751
13109010	21.02.2017	24.11.2025	СВ1140ДН SV1140DN	1852	3381
13109011	24.03.2017	24.11.2025	Карвора Carvora	1852	3381
17109006	15.12.2020	24.11.2025	Карлано Carlano	1852	3381
17109007	28.12.2019	24.11.2025	Лес Сінтес Les Saintes	1852	3381
19109014	30.11.2021	24.11.2025	АБРАЗО ABRAZO	1852	3381
19109015	30.11.2021	24.11.2025	КАРРУБА CARRUBA	1852	3381
19109016	30.11.2021	24.11.2025	КАРИБОУ CARIBOU	1852	3381
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
03035009	01.01.2005	24.11.2025	Потомак F1 Potomak F1	744	3381

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
05035031	26.05.2006	24.11.2025	Надежда F1 Nadezhda F1	744	3381
05035032	26.05.2006	24.11.2025	Меренга F1 Merengue F1 (RX 03301930)	744	3381
14110003	06.03.2015	24.11.2025	СВ4097ЦВ SV4097CV	1852	3381
14110017	16.06.2015	24.11.2025	Пакто Pacto	1852	3381
14110019	16.06.2015	24.11.2025	СВ3506ЦВ SV3506CV	1852	3381
17110016	28.11.2018	24.11.2025	Квінтус Quintus	1852	3381
18110010	18.11.2021	24.11.2025	Жозефіно Josefino	1852	3381
20110012	24.10.2023	24.11.2025	БРАНДІНО BRANDINO	1852	3381
20110014	30.11.2021	24.11.2025	ГРЕГОРІАН GREGORIAN	1852	3381
21110012	06.11.2023	24.11.2025	ГРАТЕН GRATEN	1852	3381
21110013	06.11.2023	24.11.2025	ГРИФОН GRYPHON	1852	3381
94035001	01.01.1998	24.11.2025	Левина Levina	744	3381
98035004	01.01.2001	24.11.2025	Наташа F1 Natasja F1	744	3381
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika					
05037031	26.05.2006	24.11.2025	Красний Рицарь F1 Red Knight F1	744	3381
05037033	01.01.2009	24.11.2025	Белладонна F1 Belladonna F1 BS	744	3381
05037035	26.05.2006	24.11.2025	Ерли Сансейшн F1 Early Sunsatation F1 PS	744	3381
09037020	26.02.2016	24.11.2025	Капро Carro	744	3381
09037022	24.02.2014	24.11.2025	Джипсі F1 Gypsy F1	744	3381
12036002	15.05.2014	07.11.2025	Ред Джет Red Jet	1730	1730
14113015	21.02.2017	24.11.2025	Карпекс Carrex	744	3381
15113026	21.07.2016	24.11.2025	ДСП 7054 DSP 7054	744	3381
18113011	28.12.2019	24.11.2025	Сардінеро Sardinero	1852	3381
18113012	28.12.2019	24.11.2025	Раптор Raptor	1852	3381
18113013	28.12.2019	24.11.2025	Декстер Dexter	1852	3381
22113014	21.12.2022	07.11.2025	Йокаріно Yocarino	1730	1730
22113015	21.12.2022	07.11.2025	Палермо Обедіус Palermo Obedius	1730	1730
22113016	21.12.2022	07.11.2025	Чоколоні Chocolony	1730	1730
Помідор їстівний <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomato					
03040009	05.12.2003	24.11.2025	Хайпил 108 F1 Hypel 108 F1	744	3381
03040016	05.12.2003	24.11.2025	Яки F1 Yaqi F1	744	3381
03040031	01.01.2005	24.11.2025	Флорида 47 P F1 Florida 47 P F1	744	3381
05040049	01.01.2006	24.11.2025	Джеронімо GERONIMO	1197	744
05040052	01.01.2006	24.11.2025	Адміро Admigo	1197	744
08040049	20.11.2009	24.11.2025	Мелодія F1 Melodiya F1	744	3381
08040055	09.09.2010	24.11.2025	6 пунто 7 F1 6 punto 7 F1	744	3381
08040057	28.12.2010	24.11.2025	Елегро F1 Elegro F1	744	3381

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
08040058	26.12.2011	24.11.2025	Гвадалетте F1 Guadalette F1	744	3381
08040059	28.12.2010	24.11.2025	Мірсіні F1 Mirsini F1	744	3381
08040062	24.02.2014	24.11.2025	Розаліса F1 Rosalisa F1	744	3381
09040054	15.04.2011	24.11.2025	Комітт F1 Komeett F1	744	3381
09040055	24.02.2014	24.11.2025	Велоз F1 Veloz F1	744	3381
09040059	24.02.2014	24.11.2025	Таня F1 Tanya F1	744	3381
09040060	24.02.2014	24.11.2025	Дочет F1 Docet F1	744	3381
09040061	24.02.2014	24.11.2025	Монті F1 Monty F1	744	3381
11040024	07.03.2014	24.11.2025	Мерліс Merlice	744	3381
11040026	07.03.2014	24.11.2025	Форонті Foronti	744	3381
11040027	07.03.2014	24.11.2025	Старбак Starbuck	744	3381
13115032	06.03.2015	24.11.2025	Тореро Torego	1852	3381
13115033	21.02.2017	24.11.2025	Компак Compack	1852	3381
13115034	18.03.2015	24.11.2025	Матіас Matias	1852	3381
13115035	10.04.2015	24.11.2025	Ігідо Yigido	1852	3381
13115036	21.02.2017	24.11.2025	ЯГ 8810 JAG 8810	1852	3381
13115038	18.03.2015	24.11.2025	Рок Roque	1852	3381
13115040	10.04.2015	24.11.2025	Канна 218 Kanna 218	1852	3381
13115041	21.02.2017	24.11.2025	Корвінус Corvinus	1852	3381
13115042	26.12.2017	24.11.2025	СВ8840ТМ SV8840ТМ	1852	3381
13115047	21.02.2017	24.11.2025	СВ8320ТД SV8320ТД	1852	3381
14115016	12.07.2018	24.11.2025	АВ 0311 AB 0311	1852	3381
14115026	16.06.2015	24.11.2025	Прунус Prunus	744	3381
14115027	16.06.2015	24.11.2025	ДРО141ТХ DR0141ТХ	744	3381
15115010	26.12.2017	24.11.2025	СВ1491ТМ SV1491ТМ	1852	3381
15115012	26.12.2017	24.11.2025	Белларіва Bellariva	1852	3381
15115014	21.10.2016	24.11.2025	Партова Partova	1852	3381
15115053	21.10.2016	24.11.2025	Матіссімо Matissimo	1852	3381
16115027	24.01.2018	24.11.2025	СВ3725ТЧ SV3725ТН	744	3381
16115029	26.12.2017	24.11.2025	Хуаніта Juanita	1852	3381
16115030	26.01.2018	24.11.2025	Севанс Sevance	1852	3381
16115031	26.12.2017	24.11.2025	Рестлер Wrestler	1852	3381
17115026	28.11.2018	24.11.2025	Волантіс Volantis	1852	3381
17115028	28.12.2019	24.11.2025	Сентоса Sentosa	1852	3381
17115029	28.11.2018	24.11.2025	Армаро Armaro	1852	3381
18115025	28.12.2019	24.11.2025	Куртіно Kurtino	1852	3381
18115027	28.12.2019	24.11.2025	ПІНКІД PINKID	1852	3381

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
18115028	28.12.2019	24.11.2025	Страбена	1852	3381
18115030	28.12.2019	24.11.2025	Фуджімару	1852	3381
18115032	28.12.2019	24.11.2025	Філовіта	1852	3381
18115033	28.12.2019	24.11.2025	Джорней	1852	3381
18115035	28.12.2019	24.11.2025	Компліс	1852	3381
19115028	27.10.2020	24.11.2025	АНТЕЛАІСІ	1852	3381
19115031	02.07.2021	17.11.2025	Вегас176	2507	2507
20115021	05.07.2022	24.11.2025	ЙЕЛОРІТА	1852	3381
20115024	05.07.2022	24.11.2025	ТОРЕЛІНО	1852	3381
20115025	30.11.2021	24.11.2025	ЛОРЕНЗО	2522	3381
20115026	30.11.2021	24.11.2025	БОЛЗАНО	2522	3381
21115034	24.10.2023	24.11.2025	ИНСПІТ	1852	3381
21115035	06.11.2023	24.11.2025	ХАКІМАРУ	1852	3381
23115029	15.01.2024	24.11.2025	АЛБРІС	1852	3381
Салат посівний листовий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce					
09291004	15.04.2011	24.11.2025	Фріліс	744	3381
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean					
08087007	29.11.2010	24.11.2025	Пауліста	744	3381
20127001	31.12.2022	17.11.2025	Апекс	2729	2729
20127002	31.12.2022	17.11.2025	Зоро	2729	2729
20127003	31.12.2022	17.11.2025	Кайен	2729	2729
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach					
24130003	23.12.2024	07.11.2025	Лізард	1730	1730
Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli					
05148003	01.01.2006	24.11.2025	Айронман F1	744	3381
16136002	26.12.2017	24.11.2025	СВ1002БЛ	1852	3381
16136003	18.04.2018	24.11.2025	Стііл	1852	3381
20136002	30.11.2021	24.11.2025	ТІТАНІУМ	1852	3381
Пшениця м'яка (дворучка) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (spring and winter compatible)					
10007039	13.10.2014	07.11.2025	Кларіса	1123	1123
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
08027020	09.09.2010	24.11.2025	Бонта F1	744	3381
09027017	07.03.2014	24.11.2025	Колізей F1	744	3381
09027018	24.02.2014	24.11.2025	Меланія F1	744	3381
09027019	24.02.2014	24.11.2025	Фенвей F1	744	3381
19146006	30.11.2021	24.11.2025	РЕД ХЕВЕН	1852	3381
19146007	30.11.2021	24.11.2025	ЕКІНОКС	1852	3381

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
20146011	24.10.2023	24.11.2025	СВ3807ВТ	1852	3381
22146009	24.10.2023	24.11.2025	БРІКСБЕРРІ	1852	3381
23146001	15.01.2024	24.11.2025	БОТЛ РОКЕТ	1852	3381
Диня звичайна <i>Melo sativus</i> Sager. ex M.Roem					
Melon					
19147004	30.11.2021	24.11.2025	ВІФАК	1852	3381
19147005	30.11.2021	24.11.2025	WIFAK	1852	3381
19147006	30.11.2021	24.11.2025	СВ3062МН	1852	3381
			SV3062MN		
			ЕЧАРКІА	1852	3381
			ECHARKIA		
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>girmontia</i> Duch.					
Vegetable Marrow, Squash					
08026006	09.09.2010	24.11.2025	Сціллі F1	744	3381
			Scilly F1		
09026006	24.02.2014	24.11.2025	Амьяд F1	744	3381
			Amjad F1		
14148005	26.12.2017	24.11.2025	СВ8575ЯЛ	1852	3381
			SV8575YL		
19148001	30.11.2021	24.11.2025	СВ2987ЯЛ	1852	3381
			SV2987YL		
Патисон <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>melopepo</i> (L.) Harz					
Yellow Summer Squash, Custard Squash					
09162001	15.04.2011	24.11.2025	Санні Делайт F1	744	3381
			Sunny Delight F1		
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L.					
Walnut					
18284002	13.11.2018	24.11.2025	Песціанські	2503	2681
			Pescianski		
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L.					
Grape, Grapevine					
00073007	01.01.2006	17.11.2025	Загадка	379	379
			Zahadka		
00073008	01.01.2006	17.11.2025	Загрей	379	379
			Zahrei		
05073004	11.01.2007	17.11.2025	Добриня	379	379
			Dobrynia		
05073007	11.01.2007	17.11.2025	Кишмиш таїровський	379	379
			Kyshmysh tairovs`kyi		
07073001	23.01.2008	17.11.2025	Флора	379	379
			Flora		
07073010	27.01.2009	17.11.2025	Ароматний	379	379
			Aromatnyi		
07073011	27.01.2009	17.11.2025	Комета	379	379
			Kometa		
39073001	01.01.1949	17.11.2025	Рислінг рейнський	1010	
			Ryslinh reins`kyi		
48073001	01.01.1956	17.11.2025	Аліготе	1010	
			Alihote		
49073001	01.01.1959	17.11.2025	Королева виноградників	1010	
			Koroleva vnohradnykiv		
49073004	01.01.1958	17.11.2025	Ркацителі	1010	
			Rkatsyteli		
49073009	01.01.1958	17.11.2025	Мускат гамбургський	1010	
			Muskat hamburhs`kyi		
49073012	01.01.1959	17.11.2025	Піно сірій	1010	
			Pino siryi		
49073017	01.01.1969	17.11.2025	Совіньон зелений	1010	
			Sovin`ion zelenyi		
49073018	01.01.1958	17.11.2025	Трам'єнер рожевий	1010	
			Traminer rozhevyi		
49073020	01.01.1958	17.11.2025	Шардоне	1010	
			Shardone		
50073001	01.01.1958	17.11.2025	Сапераві	1010	
			Saperavi		
50073002	01.01.1969	17.11.2025	Тельті курук	1010	
			Tel`ti kuruk		
50073004	01.01.1952	17.11.2025	Мускат Оттонель	1010	
			Muskat Ottonel'		
52073004	01.01.1962	17.11.2025	Каберне Совіньон	1010	
			Kaberne Sovin`ion		

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
57073002	01.01.1972	17.11.2025	Одеський чорний Odes'kyi chornyi	379	379
57073009	01.01.1958	17.11.2025	Іршаї Олівер Irshai Oliver	1010	
57073011	01.01.1959	17.11.2025	Піно чорний Pino chornyi	1010	
58073001	01.01.1969	17.11.2025	Сухолиманський білий Sukholymans'kyi bilyi	379	379
59073011	01.01.1983	17.11.2025	Мерло Merlo	1010	
70073001	01.01.1981	17.11.2025	Голубок Holubok	379	379
74073001	01.01.1985	17.11.2025	Одеський сувенір Odes'kyi suvenir	379	379
76073007	01.01.1978	17.11.2025	Рипарія х Рупестрис 101-14 Rypariia x Ripestrys 101-14	1010	
76073011	01.01.1978	17.11.2025	Берландієрі х Рипарія С04 Berlandiieri x Rypariia S04	1010	
79073003	01.01.1988	17.11.2025	Мускат жемчужний Muskat zhemchuzhnyi	379	379
79073005	01.01.1990	17.11.2025	Рубін таїровський Rubin tairovs'kyi	379	379
82073003	01.01.1993	17.11.2025	Мускат одеський Muskat odes'kyi	379	379
87073003	01.01.2002	17.11.2025	Оригінал Oryhinal	379	379
90073004	01.01.1995	17.11.2025	Аркадія Arkadiia	379	379
90073011	01.01.2006	17.11.2025	Кобзар Kobzar	379	379
94073015	05.04.2007	17.11.2025	Біанка Bianka	379	379
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Lettuce, Head Lettuce					
08165002	20.11.2009	24.11.2025	Сталіон Stallion	744	3381
15421005	26.12.2017	24.11.2025	СВ4896ЛЦ SV4896LC	1852	3381
21421002	10.04.2024	24.11.2025	КАРТАГОНОВА CARTAGONOVA	1852	3381
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce					
21546003	21.12.2022	07.11.2025	Рабелло Rabello	1730	1730
Горох посівний (озимий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea (Winter)					
12001010	25.02.2016	07.11.2025	НС Мороз NS Moroz	879 1210	879 1210
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
08004238	13.04.2009	07.11.2025	240192 HC 240192 NS	1210 879	879 1210
08004250	13.04.2009	07.11.2025	4 HC 4 NS	879 1210	879 1210
09004565	01.10.2010	07.11.2025	118 HC 118 NS	1210 879	879 1210
10004115	01.04.2013	07.11.2025	230155 HC 230155 NS	879 1210	879 1210
10004117	01.04.2013	07.11.2025	250120 HC 250120 NS	879 1210	879 1210
11004075	17.03.2014	07.11.2025	191 HC 191 NS	879 1210	879 1210
11004077	17.03.2014	07.11.2025	240311 HC 240311 NS	879 1210	879 1210
11004078	17.03.2014	07.11.2025	230177 HC 230177 NS	879 1210	879 1210
14909042	25.02.2016	07.11.2025	220712 HC 220712 NS	1978 1210	1978 1210
14909043	21.02.2017	07.11.2025	220718 HC 220718 NS	1978 1210	1978 1210
14909044	25.02.2016	07.11.2025	250119 HC 250119 NS	1978 1210	1978 1210
14909045	25.02.2016	07.11.2025	53 HC 53 NS	1978 1210	1978 1210

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
14909103	21.02.2017	07.11.2025	4653 HC	1978 1210	1978 1210
14909104	21.02.2017	07.11.2025	4653 NS 4411 HC 4411 NS	1978 1210	1978 1210
19909093	24.12.2021	07.11.2025	H53	2577	2577
19909094	24.12.2021	07.11.2025	N53 H26	2577	2577
20909097	31.12.2022	17.11.2025	N26 ГО 1307	2729	2729
20909098	31.12.2022	17.11.2025	НО 1307	2729	2729
20909099	31.12.2022	17.11.2025	ГА 1804 НА 1804	2729	2729
20909100	31.12.2022	17.11.2025	КФ 2704 KF 2704	2729	2729
20909101	31.12.2022	17.11.2025	КН 2803 KN 2803	2729	2729
20909102	31.12.2022	17.11.2025	РП 2303 RP 2303	2729	2729
20909103	31.12.2022	17.11.2025	АГ 7208 АН 7208 СВ 8384 SV 8384	2729	2729
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L.					
Sunflower – parental component					
08017129	13.04.2009	07.11.2025	РХА-Н-49 RHA-N-49	879 1210	879 1210
08017131	13.04.2009	07.11.2025	ВЛ-А-8 VL-A-8	879 1210	879 1210
08017132	13.04.2009	07.11.2025	ХА-26-ИМИ HA-26-IMI	879 1210	879 1210
08017133	13.04.2009	07.11.2025	РХА-СЕС-ИМИ RHA-SES-IMI	879 1210	879 1210
08017138	13.04.2009	07.11.2025	ХА-26 HA-26	879 1210	879 1210
08017145	13.04.2009	07.11.2025	ХА-981 HA-981	879 1210	879 1210
08017147	13.04.2009	07.11.2025	Х-РФ-4076 Kh-RF-4076	879 1210	879 1210
08017150	13.04.2009	07.11.2025	СТ-ЦС-3А ST-CS-3A	879 1210	879 1210
08017154	13.04.2009	07.11.2025	БТ-ВЛ-17 BT-VL-17	879 1210	879 1210
08017156	13.04.2009	07.11.2025	РХА-Е-АНН-65 RHA-E-ANN-65	1210 879	879 1210
08017157	13.04.2009	07.11.2025	РХА-РУС-РФ-ОЛ-168 RHA-RUS-RF-OL-168	1210 879	879 1210
08017158	13.04.2009	07.11.2025	РХА-ПЛ-1 RHA-PL-1	1210 879	879 1210
08017159	13.04.2009	07.11.2025	РХА-ИМИ-РФ-6 RHA-IMI-RF-6	1210 879	879 1210
08017160	13.04.2009	07.11.2025	ИМИ-АБ-14 IMI-AB-14	1210 879	879 1210
08017161	13.04.2009	07.11.2025	ИМИ-РФ-27 IMI-RF-27	879 1210	879 1210
08017163	13.04.2009	07.11.2025	ХА-26-ПР HA-26-PR	879 1210	879 1210
09017298	01.10.2010	07.11.2025	ИМИ АБ 12 YMY AB 12	879 1210	879 1210
09017299	01.10.2010	07.11.2025	РХА ВЛ 252 RHA VL 252	879 1210	879 1210
09017300	01.10.2010	07.11.2025	АС 95 AS 95	879 1210	879 1210
11017064	17.03.2014	07.11.2025	НС КОД 4 NS KOD 4	879 1210	879 1210
11017066	17.03.2014	07.11.2025	БГ Н 1 BG N 1	879 1210	879 1210
12017138	26.02.2015	07.11.2025	БГ Н 3 BG N 3	879 1210	879 1210
12017139	26.02.2015	07.11.2025	БГ Н 4 BG N 4	879 1210	879 1210
12017140	26.02.2015	07.11.2025	ОД ДИ 54 OD DI 54	879 1210	879 1210
14939020	25.02.2016	07.11.2025	СУ АБ 4 SU AB 4	1978 1210	1978 1210

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
14939021	25.02.2016	07.11.2025	XA 267	1978 1210	1978 1210
14939022	25.02.2016	07.11.2025	HA 267	1978 1210	1978 1210
15939016	31.01.2018	07.11.2025	ИМИ ПР 9 IMI PR 9	1978 1210	1978 1210
15939017	12.02.2019	07.11.2025	РФ ПОЛ 2 RF POL 2	1978 1210	1978 1210
15939032	05.02.2018	24.11.2025	ДОП 32 08 DOP 32 08	806	806
15939064	19.02.2018	07.11.2025	P469MЖCO R469MJSO	1581	1581
17939008	17.05.2019	07.11.2025	X 276 B Kh 276 V	1978 1210	1978 1210
17939009	17.05.2019	07.11.2025	РХА СП RHA SP	1978 1210	1978 1210
17939010	17.05.2019	07.11.2025	ДФ АБ 2 DF AB 2	1978 1210	1978 1210
17939097	11.02.2020	07.11.2025	ВЛА 8 ПР VLA 8 PR	1978 1210	1978 1210
17939098	11.02.2020	07.11.2025	РХА СТ БОС2 RHA ST BOS2	1978 1210	1978 1210
17939102	11.02.2020	07.11.2025	РХА РОМ 7 RHA ROM 7	1978 1210	1978 1210
18939014	24.02.2020	07.11.2025	ОР 26 ПЛ OR 26 PL	1978 1210	1978 1210
18939110	14.01.2021	24.11.2025	СУ РФ 1СП SU RF 1SP	1435	1435
18939114	18.01.2021	07.11.2025	P4HA1МК R4NA1МК ФЕ 54 FE 54	1978 2549	1978 2549
19939115	15.12.2021	24.11.2025	P8035МЖИ R8035MJI	1435	1435
19939144	13.01.2022	17.11.2025	BH 1506B VN 1506V	736	736
19939145	13.01.2022	17.11.2025	BH 3113B VN 3113V	736	736
20939095	04.01.2023	24.11.2025	P4HA1МЖС R4NA1MJS	1435	1435
20939101	04.01.2023	24.11.2025	P14B33МЖИ R14WZ3MJI	1435	1435
20939106	04.01.2023	24.11.2025	Ф7АХ2МЖСА F7AX2MJSA	1435	1435
21939012	29.11.2023	17.11.2025	Рф1122 Rf1122	2537	2537
21939091	31.10.2023	24.11.2025	P9TK6C R9TQ6S	1435	1435
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L.					
Rape Seed (Winter) – parental component					
19940018	08.10.2021	17.11.2025	ECP1095 ESR1095	806	806

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 24 листопада 2025 року № 1667 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміну до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно кукурудзи звичайної ІНДЕМ1316 (заявка № 22009050), замінивши в назві сорту рослини (українською мовою та мовою заявника) слова та цифри «ІНДЕМ1316 (INDEM1316)» словами «Байлі (Bailey)».

Відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 27 листопада 2025 року № 2038 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) підтримувача сорту рослини стосовно сортів рослин за переліком згідно з додатком.

Перелік сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) підтримувача сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Соняшник однорічний	22039036	H4X205 E	2024	НУСІД ЮРОП ЛТД. (NUSEED EUROPE LTD.)	НУСІД ІСПАНІЯ С. Л. (NUSEED SPAIN S. L.)
2	Соняшник однорічний	22039051	H4L215 E	2024		

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володітель патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal											
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L.											
Soft Wheat (Winter) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
© 23012009	Блеквіт Блеквіт / Blekvit	C3	2783	2783	2783		2025	СЛП			
© 23012019	Стеліан Stelian / Stelian	C3	2552	2552	2552		2025	СЛП			
© 23012020	Ліпперт Lippert / Lippert	C3	2552	2552	2552		2025	СЛП			
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L.											
Rye (Winter) – parental component (<i>Triticum secale</i> Link; <i>Triticum cereale</i> Salisb.)											
© 23915002	Л2297П x Л2286Н L2297P x L2286N / L2297P x L2286N	F1	1900	1900	1900		2025				
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt.											
Triticale (Winter) (<i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus; x <i>Triticale</i> ; x <i>Triticosecale</i> Wittmack)											
© 21022006	Фродо Поліський Frodo Poliskyi / Frodo Poliskyi	C3	1626	1626	1626		2025	ЛП			
© 23022004	МІП Ренесанс МІП Ренесанс / MIP Renesans	C3	2859	2859	2859		2025	ЛП			
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L.											
Barley (Winter) (<i>Hordeum distichum</i> jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachteev) Bachteev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar. <i>distichon</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp. <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum grex culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
© 23019002	Імператор Імператор / Imperator	C3	2783	2783	2783		2025	СЛП			
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L.											
Barley (Spring) (<i>Hordeum distichum</i> jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachteev) Bachteev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar. <i>distichon</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp. <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum grex culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
© 23020003	Подільський-50 Подільський-50 / Podilskyi-50	C3	1669	1669	1669		2025	СЛП			
© 23020004	Ювілейний Ювілейний / Yuvileinyi	C3	1669	1669	1669		2025	СЛП			
2025020009	Сейлер Sailer / Sailer	C3	1797	1797			2025				
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L.											
Maize, Corn (<i>Zea americana</i> ; <i>Zea alba</i> ; <i>Zea vulgaris</i> Mill.; <i>Mays zea</i> Gaertn; <i>Zea segetalis</i> Salisb.; <i>Mays americana</i> Baumg.; <i>Thalasia mays</i> O. Kuntze.)											
2025009005	ВОРКС WORKX / WORKX	F1	1783	1783			2025				
© 23009011	Альбом Albom / Albom	F1	2794 921	2260 921	2260 921		2025				
© 23009020	СТАЙН 9310 STINE 9310 / STINE 9310	F1	3422	3422	3422		2025				
23009057	ПС 310 PS 310 / PS 310	F1	3228	3228			2025				
23009066	РЖТ ПІНКСФЛОЙД (RGT PINXXFLOYD) / (RGT PINXXFLOYD)	F1	1783	1783			2025				
23009070	РЖТ ПЕТЕРКСОН RGT PETERXXON / RGT PETERXXON	F1	1783	1783			2025				
23009144	Стар Сідс Деві С 380 Star Sids Devi S 380 / Star Sids Devi S 380		3244	3244			2025				
23009145	Стар Сідс С 280 Star Sids S 280 / Star Sids S 280		3244	3244			2025				

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
23009146	Сmap Сідс С 350 Star Sids S 350 / Star Sids S 350		3244	3244			2025				
23009147	Сmap Сідс С 330 Star Sids S 330 / Star Sids S 330		3244	3244			2025				
23009148	Сmap Сідс С 320 Star Sids S 320 / Star Sids S 320		3244	3244			2025				
23009149	Сmap Сідс С 310 Star Sids S 310 / Star Sids S 310		3244	3244			2025				
23009152	Сmap Сідс Лена С 360 Star Sids Lena S 360 / Star Sids Lena S 360		3244	3244			2025				
2025009003	РЖТ КОЛБІКК RGT KOLBIXX / RGT KOLBIXX	F1	1783	1783			2025				
2025009081	ГУ1126 GW1126 / GW1126	F1	3428	3428			2025	СЛП			
2025009082	ГУ3024 GW3024 / GW3024	F1	3428	3428			2025				
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component											
23909001	ФСАКС3657С FSAX3657S / FSAX3657S	С3	2643	1219			2025				
© 23909084	Р19009ЦМС R19009CMS / R19009CMS	С3	1783	1783	1783		2025				
© 23909085	Р22023 R22023 / R22023	С3	1783	1783	1783		2025				
© 23909086	Р22019 R22019 / R22019		1783	1783	1783		2025				
© 23909089	Р21022 R21022 / R21022	С3	1783	1783	1783		2025				
© 23909146	ГВМ 36023 HVM 36023 / HVM 36023		3244	3244	3244		2025				
© 23909147	ГВФ 35023 HVF 35023 / HVF 35023		3244	3244	3244		2025				
© 23909150	ГВМ 28023 HVM 28023 / HVM 28023		3244	3244	3244		2025				
© 23909151	ГВМ 32023 HVM 32023 / HVM 32023		3244	3244	3244		2025				
© 23909152	ГВМ 35023 HVM 35023 / HVM 35023		3244	3244	3244		2025				
© 23909153	ГВМ 38023 HVM 38023 / HVM 38023		3244	3244	3244		2025				
© 23909154	ГВМ 31023 HVM 31023 / HVM 31023		3244	3244	3244		2025				
© 23909155	ГВФ 28023 HVF 28023 / HVF 28023		3244	3244	3244		2025				
© 23909156	ГВФ 31023 HVF 31023 / HVF 31023		3244	3244	3244		2025				
© 23909157	ГВФ 32023 HVF 32023 / HVF 32023		3244	3244	3244		2025				
© 23909158	ГВФ 38023 HVF 38023 / HVF 38023		3244	3244	3244		2025				
© 23909162	ГВФ 33023 HVF 33023 / HVF 33023		3244	3244	3244		2025				
2025909086	ГУ53501 GW53501 / GW53501	С3	3428	3428			2025				
2025909087	ГУ51593 GW51593 / GW51593		3428	3428			2025				
Сільськогосподарські: бобові Agricultural: Field pulse Квасоля звичайна (зернова) Phaseolus vulgaris L. French Bean (Phaseolus vulgaris (L.) Savi; Phaseolus nanus L.; Phaseolus romanus; Phaseolus gonospermus; Phaseolus saponaceus; Phaseolus sphaericus; Phaseolus haematocarpus Savi; Phaseolus compressus DC.; Phaseolus angulosus Schuebl. et Martens; Phaseolus capensis Hort.; Phaseolus cruentus Hort.; Phaseolus zedra; Phaseolus subglobosus Fingerh.; Phaseolus vexillatus Blanco; Phaseolus melanospermus Fingerh.; Phaseolus dimidiatus Haberte; Phaseolus pictus Cav.; Phaseolus nigricans Haberte)											
© 23025003	Боберан Боберан / Boberan	С3	2794	2260	2260		2025				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean (<i>Glycine max</i> (L.) Merrill; <i>Glycine hispida</i> var. <i>lutea</i> Skvortsov; <i>Glycine soja</i> (L.) Merr.; <i>Glycine hispida</i> var. <i>brunnea</i> Skvortsov; <i>Glycine gracilis</i> Skvortsov; <i>Phaseolus max</i> L.; <i>Dolichos soja</i> L.; <i>Soja hispida</i> Moench; <i>Phaseolus sordilis</i> Salisb.; <i>Soja japonica</i> Savi; <i>Soja angustifolia</i> Miq.; <i>Glycine tabacina</i> ; <i>Glycine tomentosa</i> Benth.; <i>Glycine hispida</i> (Moench) Maxim.; <i>Soja soja</i> Karst.; <i>Soja max</i> Piper)											
© 23045019	СІБЕЛЛА SIBELLA / SIBELLA		1783	1783	1783		2025				
© 23045021	СКВАДРА SQUADRA / SQUADRA	С3	1783	1783	1783		2025				
Сільськогосподарські: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> .; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
23039035	ПС-115Е ПС-115Е / PS-115Е	F1	3228	3228			2025	Л			
23039090	Корсин Korsyn / Korsyn	F1	3243	3243			2025	СЛП			
23039094	Клаус Клаус / Klaus	F1	3243	3243			2025	Л			
© 24039004	СИ МАГІСТЕР SY MAGISTER / SY MAGISTER	F1	2643	1219	1219		2025	Л			
23039043	Р63ЛЛ209 P63LL209 / P63LL209	F1	2715	2715			2025	Л			
23039044	Р64НЕ233 P64HE233 / P64HE233		2715	2715			2025	СЛ			
23039045	Р64ЛП196 P64LP196 / P64LP196		2715	2715			2025	Л			
23039047	Р63ЛЕ193 P63LE193 / P63LE193	F1	2715	2715			2025				
© 23039052	БОХЕМ ВОHEM / ВОHEM		1783	1783	1783		2025	Л			
© 23039053	ЛЛЮДВІГ LLUDWIG / LLUDWIG	F1	1783	1783	1783		2025	Л			
© 23039054	ОДІН ODYN / ODYN	F1	1783	1783	1783		2025	Л			
24039001	Кадіз Cadiz / Cadiz		2882	2882			2025	Л			
24939004	Лорка Грано Lorca Hrano / Lorca Hrano	F1	2882	2882			2025				
24039062	РЖТ ЕЛЛІОТ КЛП RGT ELLIOT CLP / RGT ELLIOT CLP	F1	1783	1783			2025				
2025039003	ЄЛЛО КЛП YELLOW CLP / YELLOW CLP	F1	1783	1783			2025				
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> .; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
2025939011	Р18ХВ8МК R18XW8MK / R18XW8MK	С3	1435	1435			2025				
23939067	33568 33568 / 33568	С3	2834	2554			2025				
23939069	15051 15051 / 15051	С3	2834	2554			2025				
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) (<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. emend. Metzg. ssp. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk; <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica oleifera</i> Moench.; <i>Brassica oleifera</i> Delile; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>napus</i> Briquet.)											
23040029	РТ325 PT325 / PT325	F1	2715	2715			2025	СП			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard (<i>Raphanus albus</i> Crantz; <i>Sinapis hispida</i> Tenore; <i>Bonnania officinalis</i> Presl; <i>Napus leucosinapis</i> Schimper et Sponner; <i>Sinapisstrum album</i> Chev.; <i>Eruca alba</i> Noulet; <i>Brassica alba</i> Rabenhorst; <i>Crucifera lampsana</i> Krause; <i>Sinapis dissecta</i> Lag.; <i>Brassica dissecta</i> Schmalh.)											
2025380003	ЕЛЕНДІЛ ELENDIL / ELENDIL	П	3424	3424			2025				
Сільськогосподарські: картопля Agricultural: Potato Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato (<i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>tuberosum</i> ; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>chiloense</i> DC.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>cultum</i> DC.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>sabini</i> DC.; <i>Solanum fonckii</i> Phil.; <i>Solanum chiloense</i> (DC.) Benth.; <i>Solanum cultum</i> (DC.) Berth.; <i>Solanum sabini</i> (DC.) Berth.; <i>Solanum maglia</i> Schlecht. var. <i>guaytecarum</i> Bitt.; <i>Solanum maglia</i> var. <i>chutubense</i> Bitt.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>europaeum</i> Buk.; <i>Solanum leptostigma</i> Juz.; <i>Solanum molinae</i> Juz.; <i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>chileanum</i> Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>guaytecarum</i> (Bitt.) Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>chutubense</i> (Bitt.) Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>andigenum</i> (Juz. et Buk.) Hawk.; <i>Solanum andigenum</i> Juz. et Buk.; <i>Solanum herrerae</i> Juz.; <i>Solanum subandigenum</i> Hawk.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>grauense</i> Varg.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>digitobatosum</i> Varg.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>carhua</i> Varg.)											
© 20088003	Шедевр Шедевр / Shedevr		2631	2631	2631		2025	СЛП			
© 20088005	Либідь Либідь / Lybid		2631	2631	2631		2025	СЛП			
Сільськогосподарські: кормові Agricultural: Fodder Боби кінські <i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i> Field Bean (<i>Vicia faba</i> L. var. <i>minuta</i> (hort. ex Alef.) Mansf.; <i>Faba vulgaris</i> var. <i>minor</i> Harz; <i>Faba vulgaris</i> var. <i>minuta</i> hort. ex Alef.; <i>Vicia faba</i> [unranked] <i>minor</i> (Harz) Beck; <i>Faba minor</i> Boxb.)											
2025094001	Ньютон Newton / Newton	С	3429 3403	3429 3403			2025				
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring) (<i>Vicia amphicarpa</i> L.; <i>Vicia notate</i> Gilib.; <i>Vicia leucosperma</i> Moench; <i>Vicia segetalis</i> Thuill.; <i>Faba sativa</i> Bernh.; <i>Vicia communis</i> Rouy et Foucaud.)											
© 23177001	Таємниця Таємниця / Taiemnytsia	С3	3232	3232	3232		2025	П			
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover (<i>Trifolium purpureum</i> Gilib. (non Lois.); <i>Trifolium sativum</i> Crome; <i>Trifolium pratense</i> var. <i>foliosum</i> Brand; <i>Trifolium folosium</i> (Brand) Min.)											
2025155001	УНО UNO / UNO	С3	3424	3424			2025				
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne (<i>Medicago falcata</i> Lam. (non L.); <i>Medicago coerulea</i> Less.)											
2025196006	Дімітра DIMITRA / DIMITRA		3424			3424	2025				
Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable Буяк столовий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. Beetroot, Garden Beet (<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>esculenta</i> L.; <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>hortensis</i> ; <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>europaea</i> Krass. var. <i>atro rubra</i> Krass.)											
23122001	Делікатесний Delikatesnyi / Delikatesnyi	П	3238			3238	2025				
23122002	Бордо 237 Bordo 237 / Bordo 237	П	3238			3238	2025				
23122003	Чарівниця Charivnytsya / Charivnytsya	П	3236	3236			2025				
24122001	Конар Konar / Konar	F1	3245	3245			2025				
24122003	Мармеладка Marmeladka / Marmeladka		3236	3236			2025				
24122004	Овочевий скарб Ovochevyi skarb / Ovochevyi skarb	П	3236	3236			2025				
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin (<i>Cucurbita pepo</i> L. subsp. <i>ovifera</i> (L.) D. S. Decker var. <i>ovifera</i> (L.) Harz; <i>Cucurbita pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i> var. <i>pepo</i> ; <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>montia</i> Duch; <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>patisson</i> Duch; <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>grau montia</i> Filov; <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>melopepo</i> (L.) Harz; <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>styracica</i> Greb.; <i>Cucurbita melopepo</i> ; <i>Cucurbita verrucosa</i> ; <i>Cucurbita ovifera</i> L.; <i>Cucurbita pyxidaris</i> DC.; <i>Cucurbita subverrucosa</i> Willd.; <i>Cucurbita aurantia</i> Willd.; <i>Cucurbita maxima g courgero</i> Ser.; <i>Cucurbita venosa</i> Descourt.; <i>Cucurbita mammeata</i> Molina.; <i>Cucurbita ceratoceares</i> Haberle; <i>Cucurbita tuberculosa</i> ; <i>Cucurbita asteroides</i> ; <i>Cucurbita cucumifera</i> ; <i>Cucurbita elongate</i> Schrad.; <i>Cucumis zapallo</i> ; <i>Cucurbita pileiformis</i> Roem; <i>Cucurbita marsupiformis</i> Haberle; <i>Citrullus variegatus</i> Schrad.; <i>Cucurbita succado</i> Naud.; <i>Cucurbita hybrida</i> Bertol.)											
24150002	КЕМОН KEMON / KEMON	F1	2662	2662			2025				
24150003	ВОРТИ ГОБЛІН WARTY GOBLIN / WARTY GOBLIN	F1	2662	2662			2025				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Горох посівний (овочевий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea, Garden Pea (<i>Pisum arvense</i> L.; <i>Pisum sativum</i> L. conv. <i>axiphium</i> Alef; <i>Pisum sativum</i> L. conv. <i>medullare</i> Alef emend. C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. conv. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. spp. <i>sativum</i> conv. <i>speciosum</i> Dierb.; <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>sativum</i> conv. <i>axiphium</i> Alef emend. C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>sativum</i> conv. <i>medullare</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>sativum</i> conv. <i>medullare</i> Alef emend. C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> var. <i>arvense</i> (L.) Poir.; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> var. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. var. <i>arvense</i> L. Gams; <i>Pisum sativum</i> var. <i>speciosum</i> (Alef.) Makasheva; <i>Pisum majus</i> Dode; <i>Pisum romanum</i> ; <i>Pisum saccharatum</i> Ser. in DC.; <i>Pisum macrocarpum</i> Ser.; <i>Pisum hortense</i> Asch. et Graebn.; <i>Pisum commune</i> Clav.; <i>Pisum jomardi</i> Schrank; <i>Pisum uniflorum</i> Hort.; <i>Pisum macrospermum</i> Hort.; <i>Pisum vulgare</i> Jundz.; <i>Pisum sativum</i> L. (s. <i>amplissima</i>) Gov.)											
© 24095002	Мегасаїз <i>Megasaiz / Megasaiz</i>	C3	2429	2429	2429		2025				
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon (<i>Melo sativus</i> Sarg.; <i>Melo adana</i> Pang.; <i>Cucumis melo</i> conv. <i>adana</i> (Pang.) Greb.)											
2025147002	Романостар <i>Romanostar / Romanostar</i>		840	840		840	2025				
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraultontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash											
2025148005	Інесса <i>Inessa / Inessa</i>	F1	840	840		840	2025				
2025148008	БОЛОНЬЄЗЕ <i>BOLOGNESE / BOLOGNESE</i>	C3	1163			1163	2025				
Капуста білогорова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage (<i>Brassica oleracea</i> L. conv. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.; <i>Brassica capitata</i> DC.; <i>Brassica oleracea</i> ssp. <i>capitata</i> <i>laevis</i> Metzg.; <i>Brassica oleracea</i> L.; <i>Brassica</i> (White Cabbage))											
© 24096004	Кентуккі <i>Kentukki / Kentukki</i>	F1	2429	2429	2429		2025				
23125001	Беллі <i>Belli / Belli</i>	C3	3216	3216			2025	СЛП			
2025096003	Манук <i>Manouk / Manouk</i>	F1	1730	1730			2025				
Капуста цвітня <i>Brassica oleracea</i> L. conv. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> Cauliflower (<i>Brassica oleracea</i> L. conv. <i>botrytis</i> (L.) Alef.; <i>Brassica cauliflora</i> (Mill.) Lizg.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> Plenck; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.; <i>Brassica botrytis</i> Mill.; <i>Brassica cauliflora</i> Garsaul; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> Helm; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cultiflora</i> DC. et subvar. <i>cyrosa</i> Lam.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>asparagoides</i> f. <i>albida</i> et f. <i>violascens</i> Thell.; <i>Brassica asparagoides</i> Dalechampi)											
2025101002	Перето <i>Pereto / Pereto</i>	F1	1730	1730			2025				
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean (<i>Phaseolus vulgaris</i> (L.) Savi; <i>Phaseolus nanus</i> L.; <i>Phaseolus romanus</i> ; <i>Phaseolus gonospermus</i> ; <i>Phaseolus saponaceus</i> ; <i>Phaseolus sphaericus</i> ; <i>Phaseolus haematocarpus</i> Savi; <i>Phaseolus compressus</i> DC.; <i>Phaseolus angulosus</i> Schuebl. et Martens; <i>Phaseolus capensis</i> Hort.; <i>Phaseolus zedra</i> ; <i>Phaseolus subglobosus</i> Fingerh.; <i>Phaseolus vexillatus</i> Blanco; <i>Phaseolus melanospermus</i> Fingerh.; <i>Phaseolus dimidiatus</i> Haberle; <i>Phaseolus pictus</i> Cav.; <i>Phaseolus nigricans</i> Haberle)											
2025127001	Контендер <i>Contender / Contender</i>		1163			1163	2025				
2025127003	Максідор <i>Maxidor / Maxidor</i>		1163			1163	2025				
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill											
23125001	Беллі <i>Belli / Belli</i>	C3	3216	3216			2025	СЛП			
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot (<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Arcang. var. <i>sativus</i> Hoffm.; <i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schubl. et G. Martens; <i>Daucus sativus</i> (Hoffm.) Roehl.; <i>Daucus carota</i> L. (pro parte); <i>Daucus carota</i> L. var. <i>sativus</i> Hoffm.; <i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> A. Hayek; <i>Daucus sativus</i> Zagor.)											
2025109001	Акат <i>Akat / Akat</i>	F1	1997			1997	2025	СЛП			
2025109002	Беркос <i>Berkos / Berkos</i>	F1	1997			1997	2025	СЛП			
2025109003	Кларіс <i>Klaris / Klaris</i>	F1	1997			1997	2025	СЛП			
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber (<i>Cucumis sativus</i> <i>chiar</i> Forsk.; <i>Cucumis esculentus</i> Salisb.; <i>Cucumis muricatus</i> Willd.)											
2025110007	Баритон <i>Barytone / Barytone</i>		1730	1730			2025				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L. Sweet Pepper, Paprika (<i>Capsicum annuum L. var. annuum; Capsicum annuum subsp. annuum var. pomiferum; Capsicum annuum var. fasciculatum (Sturtev.) Irish; Capsicum annuum var. grossum (L.) Sendtn.; Capsicum annuum var. longum Sendtn.; Capsicum indicum Rumph.; Capsicum frutescens L.; Capsicum grossum; Capsicum baccatum L.; Capsicum corsicum; Capsicum tetragonum; Capsicum cerasiforme; Capsicum olivaeformae; Capsicum peramidale; Capsicum conoides; Capsicum minimum Mill.; Capsicum bicolor Jacq.; Capsicum longum DC.; Capsicum cordiforme Mill.; Capsicum mexicanum Haz.</i>)											
2025113005	Нела <i>Nela / Nela</i>		1997			1997	2025				
2025113006	Тонгуа <i>Tongua / Tongua</i>		1997			1997	2025				
2025113003	Дворана <i>Dvorana / Dvorana</i>	C	1997			1997	2025	СЛП			
2025113004	Касандра <i>Kasandra / Kasandra</i>	F1	1997			1997	2025	СЛП			
Помідор їстівний Solanum lycopersicum L. Tomato (<i>Lycopersicon esculentum P. Mill.; Lycopersicon esculentum Mill.; Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell; Lycopersicon esculentum P. Mill. nom. cons. var. esculentum; Lycopersicon esculentum P. Mill. nom. cons. var. cerasiforme (Dun.) A. Gray; Lycopersicon pomumatori Moench; Solanum lirioides Salisb.; Solanum foliosum Link; Lycopersicon esculentum Alef.; Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst.; Lycopersicon lycopersicon Britt. et Brown; Lycopersicon esculentum Mill. ssp. esculentum Prokh.</i>)											
2025115010	Апрікола <i>Aprikola / Aprikola</i>		1997			1997	2025				
2025115012	Делікано <i>Delikano / Delikano</i>		1997			1997	2025				
2025115003	Фарасан <i>Farasan / Farasan</i>	F1	840	840		840	2025				
2025115013	Фрейзер Парадайз <i>Fraser Paradise / Fraser Paradise</i>	F1	840	840		840	2025	3г			
2025115014	Родіум <i>Rhodium / Rhodium</i>	F1	840	840		840	2025	3г			
2025115015	Орагіо <i>Oragio / Oragio</i>	F1	840	840		840	2025	3г			
2025115016	Формоза <i>Formoza / Formoza</i>		840	840		840	2025				
2025115017	Корнати <i>Kornati / Kornati</i>		840	840		840	2025				
2025115018	Сан Блас <i>San Blas / San Blas</i>	F1	840	840		840	2025				
2025115019	Шівіус <i>Shivius / Shivius</i>	F1	840	840		840	2025				
24115004	СОЛВЕТ <i>SOLVET / SOLVET</i>	F1	2643	1219			2025				
Редька посівна (редиска) Raphanus sativus L. var. sativus Pers. Radish, Garden Radish, European Radish (<i>Raphanus sativus L. var. sativus; Raphanus sativus L. var. radícula Pers.; Raphanus sativus L. var. radículus Pers.; Raphanus raphanistrum ssp. sativus Thell.; Raphanus sativus prol. radículus Pers.; Raphanus sativus var. radícula DC.; Raphanus sativus minor Dod.; Raphanus raphanistrum ssp. sativus Thell.; Raphanus sativus niger Pers.; Raphanus sativus major Schubler et Mart.</i>)											
2025118001	Вікторі <i>Victory / Victory</i>		1997			1997	2025				
Салат посівний головчастий Lactuca sativa L. var. capitata Lettuce, Head Lettuce (<i>Lactuca sativa L. convar. sativa var. capitata</i>)											
2025421003	Металія <i>Metalia / Metalia</i>	C3	753	753			2025	СЛП	свж		
Цибуля городня Allium cepa L. Onion, Echalion (<i>Allium cepa L. var. aggregatum G. Don; Allium cepa L. var. cepa Helm; Allium cepa L. var. viviparum (Metz.) Alef.; Allium esculentum Salisb.; Cepa vulgaris Renault; Cepa esculenta Rafin; Porrum cepa (L.) Rchb.</i>)											
2025106007	Джоакін <i>Joaquin / Joaquin</i>	F1	753	753			2025				
2025106008	Сієста <i>Siesta / Siesta</i>		1997			1997	2025				
24106004	Редеско <i>Redesco / Redesco</i>	F1	2086	2086			2025				
Цикорій салатний (ендивій) Cichorium endivia L. Endive (<i>Cichorium endivia L. subsp. endivia; Cichorium endivia var. crispum Lam.; Cichorium endivia var. latifolium Lam.; Cichorium crispum Mill.; Cichorium esculentum Salisb.; Cichorium dubium endivia Krause; Cichorium latifolium Sauv.; Cichorium endivia b dativa DC.; Cichorium endivia ssp. endivia</i>)											
2025121004	Берлінал <i>Bertinal / Bertinal</i>	C	1730	1730			2025				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce (<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i>)											
© 23546002	Одона <i>Odon</i> / <i>Odon</i>	С	1730	1730	1730		2025				
2025546003	Ольгада <i>Olgada</i> / <i>Olgada</i>	СЗ	753	753			2025	СЛП	свж		
Флодові та ягідні Fruit and Berry Лохина щиткова <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry; High Bush Blueberry <i>Vaccinium-Corymbosum-Hybridae</i>											
© 21519001	Каліпсо <i>Calypso</i> / <i>Calypso</i>		2768	2768	2768		2025	СЛПЗг	ун	рс	
© 21519005	Осорно <i>Osorno</i> / <i>Osorno</i>		2768	2768	2768		2025	СЛПЗг	ун	пс	
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut (<i>Corylus maxima</i> Mill.; <i>Corylus pontica</i> K. Koch; <i>Corylus avellana</i> var. <i>sativa</i> Ludwig; <i>Corylus tubulosa</i> Willd.; <i>Corylus avellana</i> var. <i>tubulosa</i> Loud; <i>Corylus avellana</i> var. <i>lamberti</i> Loud.; <i>Corylus arborescens</i> Gaertn.)											
2025543011	ПолліО <i>PollyO</i> / <i>PollyO</i>		2538	2538			2025	СЛП	тхн	рсдн	
Декоративні та лікарські Ornamental and Healing Троянда <i>Rosa</i> L. Rose											
© 2025339001	Крапля Сонця <i>Kraplia Sontsia</i> / <i>Kraplia Sontsia</i>		348	348	348		2025	ЛП	озл		

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

Кукурудза звичайна

Кукурудза звичайна – батьківський компонент

Пшениця м'яка (дворучка)

Пшениця м'яка (озима)

Пшениця м'яка (яра)

Тритикале (озиме)

Ячмінь звичайний (озимий)



Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи

Descriptions of plant varieties and indicators of economic suitability based on the results of qualification examination

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009011 Назва сорту: Альбом **Заявник (код):** 2794 921 **Власник сорту (код):** 2260 921

Володілець патенту (код): 2260 921

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент № 250086**

Дата пріоритету: 20.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250585

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,36	8,45	7,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,53	7,43	7,83
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,83	-1,02	0,15
+, - до усередненої урожайності, %	-13,1	-12,1	2,0
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, днів	112	120	121
Висота рослини, см	209,3	228,1	245,8
Вихід зерна, %	81,9	80,4	81,6
Висота прикріплення качана, см	85,1	82	84,2
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50	13,3	11,2
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,3	4,8	3,7
Вміст білка, %	10,4	9,3	9,5
Вміст крохмалю, %	71,6	70,8	71,7
Стійкість до посухи, бал	5	4	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспороюзу, бал	8	8	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчастої сажки за штучного зараження, бал		9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009057 Назва сорту: ПС 310 Заявник (код): 3228 Власник сорту (код): 3228

Дата пріоритету: 29.09.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250587

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,36	8,45	7,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,10	7,53	8,98
+, - до усередненої урожайності, т/га	-2,26	-0,92	1,30
+, - до усередненої урожайності, %	-35,5	-10,9	16,9
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	109	123	124
Висота рослини, см	224,4	232,5	264,3
Вихід зерна, %	85,8	81,5	83,5
Висота прикріплення качана, см	90	83	90,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51,8	11,5	9,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	5,3	4,2
Вміст білка, %	9,8	9,1	8,3
Вміст крохмалю, %	73,3	70,9	73,2
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	8	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчастої сажки за штучного зараження, бал		9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009070 Назва сорту: РЖТ ПЕТЕРККСОН **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250589

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	до зубовидного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,36	8,45	7,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,55	8,03	9,48
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,81	-0,42	1,80
+, - до усередненої урожайності, %	-12,7	-5,0	23,4
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	109	122	121
Висота рослини, см	212,2	239,3	257,1
Вихід зерна, %	85,6	80,9	83,6
Висота прикріплення качана, см	93,8	84,1	87,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	87	21,5	15,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	2,9	4,4	4,2
Вміст білка, %	10,6	9,5	8,8
Вміст крохмалю, %	72,3	71,2	72,8
Стійкість до посухи, бал	6	5	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	5
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчастої сажки за штучного зараження, бал		9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009066 Назва сорту: РЖТ ПІНККФЛОЙД **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250588

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,80	8,93	7,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,19	9,11	9,67
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,61	0,18	1,68
+, - до усередненої урожайності, %	-23,7	2,0	21,0
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, днів	121	129	129
Висота рослини, см	210,4	240,3	257,4
Вихід зерна, %	86,7	82,1	83,7
Висота прикріплення качана, см	79	81	87
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	44,6	19,8	14,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,7	3,9	3,3
Вміст білка, %	9,3	8,2	7,8
Вміст крохмалю, %	73,6	72,4	73,6
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	7
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	7	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчастої сажки за штучного зараження, бал		9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009020 Назва сорту: СТАЙН 9310 **Заявник (код):** 3422 **Власник сорту (код):** 3422

Володілець патенту (код): 3422

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.01.2025 **Патент №** 250010

Дата пріоритету: 08.03.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250586

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,80	8,93	7,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,72	8,67	8,51
+, - до усередненої урожайності, т/га	-2,08	-0,26	0,52
+, - до усередненої урожайності, %	-30,6	-2,9	6,5
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, днів	121	129	129
Висота рослини, см	188,9	207,6	214,6
Вихід зерна, %	82,4	79,6	81,6
Висота прикріплення качана, см	76,1	76,9	82,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43	19,4	8,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,7	4,8	3,2
Вміст білка, %	9,2	8,6	8,8
Вміст крохмалю, %	73	72,4	73,2
Стійкість до посухи, бал	4	7	7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчастої сажки за штучного зараження, бал		9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009144 Назва сорту: Стар Сідс Деві С 380 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250590

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	до зубовидного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,80	8,93	7,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,14	8,87	9,21
+, - до усередненої урожайності, т/га	-2,66	-0,06	1,22
+, - до усередненої урожайності, %	-39,1	-0,7	15,3
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	122	130	130
Висота рослини, см	225,6	235,3	258,5
Вихід зерна, %	86,8	80,1	81,4
Висота прикріплення качана, см	83,8	71,8	76,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	32	28,4	6,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,8	4,7	3,7
Вміст білка, %	9,1	8,2	7,8
Вміст крохмалю, %	74,4	71,9	73,6
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчастої сажки за штучного зараження, бал		9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009152 Назва сорту: Стар Сідс Лена С 360 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250596

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,80	8,93	7,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,88	8,92	9,65
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,92	-0,01	1,66
+, - до усередненої урожайності, %	-28,2	-0,1	20,8
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	122	131	129
Висота рослини, см	222	242,8	261,3
Вихід зерна, %	84,3	78,6	83,3
Висота прикріплення качана, см	89,2	81,8	86,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	68	25,9	12,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,2	5,3	3,8
Вміст білка, %	9	8,1	7,3
Вміст крохмалю, %	73,5	70	73,4
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	9	8	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчастої сажки за штучного зараження, бал		9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009145 Назва сорту: Стар Сідс С 280 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250591

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	до зубовидного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,36	8,45	7,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,62	7,08	8,80
+, - до усередненої урожайності, т/га	-2,74	-1,37	1,12
+, - до усередненої урожайності, %	-43,1	-16,2	14,6
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	110	119	120
Висота рослини, см	222,2	242,4	267,5
Вихід зерна, %	85	80,3	82,1
Висота прикріплення качана, см	87,6	86	94,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	41	18,5	9,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	4,1	4
Вміст білка, %	10,3	9,4	8,9
Вміст крохмалю, %	70,6	70,4	71,4
Стійкість до посухи, бал	5	5	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчастої сажки за штучного зараження, бал		9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009149 Назва сорту: Стар Сідс С 310 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250595

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,80	8,93	7,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,54	7,80	9,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	-2,26	-1,13	1,48
+, - до усередненої урожайності, %	-33,2	-12,7	18,5
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	121	129	128
Висота рослини, см	233,6	243,6	258,1
Вихід зерна, %	85,5	80,8	83,4
Висота прикріплення качана, см	88,8	81,9	89,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	58	32,9	19,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	4,8	3,4
Вміст білка, %	10	9,1	8,5
Вміст крохмалю, %	71,8	71,4	72,6
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчастої сажки за штучного зараження, бал		9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009148 Назва сорту: Стар Сідс С 320 Заявник (код): 3244 Власник сорту (код): 3244

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250594

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно заповнюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,80	8,93	7,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,98	7,67	9,26
+, - до усередненої урожайності, т/га	-2,82	-1,26	1,27
+, - до усередненої урожайності, %	-41,5	-14,1	15,9
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	122	127	130
Висота рослини, см	222,4	228,5	251,3
Вихід зерна, %	85,6	81,3	83
Висота прикріплення качана, см	87	78,4	82,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	44,6	14,5	7,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	2,9	4,2	3,5
Вміст білка, %	10,6	9,4	8,2
Вміст крохмалю, %	72	71,2	72,9
Стійкість до посухи, бал	6	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчатої сажки	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчатої сажки за штучного зараження, бал		9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009147 Назва сорту: Стар Сідс С 330 Заявник (код): 3244 Власник сорту (код): 3244

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250593

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,80	8,93	7,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,49	8,22	9,09
+, - до усередненої урожайності, т/га	-2,31	-0,71	1,10
+, - до усередненої урожайності, %	-34,0	-8,0	13,8
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	121	128	130
Висота рослини, см	223,2	235,5	247
Вихід зерна, %	84	78,3	82,8
Висота прикріплення качана, см	83,6	76,6	79,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52	27,4	18,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	4,7	3,3
Вміст білка, %	9,3	8,4	7,8
Вміст крохмалю, %	72,7	72,2	72,7
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчастої сажки за штучного зараження, бал	9	9	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009146 Назва сорту: Стар Сідс С 350 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250592

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,80	8,93	7,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,04	7,80	9,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,76	-1,13	1,86
+, - до усередненої урожайності, %	-25,9	-12,7	23,3
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	122	129	131
Висота рослини, см	227,6	234	252,3
Вихід зерна, %	86,8	81,5	83
Висота прикріплення качана, см	90,2	80,3	89,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	75,4	19,6	16,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,3	3,6	3,4
Вміст білка, %	9,5	8,7	8,2
Вміст крохмалю, %	72,8	72,1	73,5
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Стійкість проти пухирчастої сажки за штучного зараження, бал		9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909080 Назва сорту: 1ПГИЛ72 **Заявник (код):** 1690 **Володілець патенту (код):** 1690

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2025 **Патент №** 250306

Дата пріоритету: 21.08.2020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	пром'язаний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909150 Назва сорту: ГВМ 28023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250333**

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250604

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909154 Назва сорту: ГВМ 31023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250337

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250608

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909151 Назва сорту: ГВМ 32023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250334**

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250605

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909152 Назва сорту: ГВМ 35023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250335

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250606

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909146 Назва сорту: ГВМ 36023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250331**

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250602

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909153 Назва сорту: ГВМ 38023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250336

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250607

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909155 Назва сорту: ГВФ 28023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250338**

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250609

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909156 Назва сорту: ГВФ 31023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250339

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250610

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909157 Назва сорту: ГВФ 32023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250340

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250611

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909162 Назва сорту: ГВФ 33023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250342

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250613

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909147 Назва сорту: ГВФ 35023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250332**

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250603

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909158 Назва сорту: ГВФ 38023 **Заявник (код):** 3244 **Власник сорту (код):** 3244

Володілець патенту (код): 3244

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250341

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250612

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909123 Назва сорту: KB 1ФФ1925 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250325**

Дата пріоритету: 06.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909126 Назва сорту: KB 5ФЛ5068 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250328

Дата пріоритету: 06.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909125 Назва сорту: KB 6EY0128 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250327**

Дата пріоритету: 06.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909122 Назва сорту: KB 6EY0147 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250324

Дата пріоритету: 06.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909119 Назва сорту: KB 6ФД0064 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250321**

Дата пріоритету: 06.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909118 Назва сорту: KB 6ФЮ02022 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250320

Дата пріоритету: 06.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	пром'язаний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909120 Назва сорту: KB 6ФЮ2111 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250322**

Дата пріоритету: 06.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909121 Назва сорту: KB 6ФЮ02257 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250323

Дата пріоритету: 06.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909129 Назва сорту: KB 9ФЮ2154 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250329

Дата пріоритету: 06.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909130 Назва сорту: KB 9ФЮ2161 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250330

Дата пріоритету: 06.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909124 Назва сорту: КВСЕК 549 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250326**

Дата пріоритету: 06.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909070 Назва сорту: ПХ1ТДЦ **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2025 **Патент №** 250303

Дата пріоритету: 01.02.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	пром'язаний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909103 Назва сорту: ПХ2ДИМ **Заявник (код):** 1690 **Володілець патенту (код):** 1690

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2025 **Патент №** 250305

Дата пріоритету: 19.10.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909100 Назва сорту: ПХ2ТРФ **Заявник (код):** 1688 1690 **Володілець патенту (код):** 1688 1690

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2025 **Патент №** 250304

Дата пріоритету: 19.10.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909114 Назва сорту: P17106 Заявник (код): 1783 Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 Патент № 250343

Дата пріоритету: 02.12.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays L.*

Заявка № 23909084 Назва сорту: P19009ЦМС **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250316

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250598

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909089 Назва сорту: P21022 Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 Патент № 250319

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250601

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутне або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909086 Назва сорту: P22019 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250318

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250600

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909085 Назва сорту: P22023 Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 Патент № 250317

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250599

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909001 Назва сорту: ФСАКС3657С **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата пріоритету: 02.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250597

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Пшениця м'яка (дворучка) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 24012019 Назва сорту: ЛІД КАЛІНДА **Заявник (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2025 **Патент № 250308**

Дата пріоритету: 18.06.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	дуже сильне	9	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабовиповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці/ остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або соломяно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабе	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	до середнього
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	до прямого
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	до ледь зігнутого
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	дворучка (альтернативний)	2	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	наявний	9	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначена	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабе	3	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 23012009 Назва сорту: Блеквіт **Заявник (код):** 2783 **Власник сорту (код):** 2783

Володілець патенту (код): 2783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.11.2025 **Патент №** 250296

Дата пріоритету: 06.04.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250568

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	дуже сильне	9	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або соломяно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	коричневе	3	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	довгий	7	
32	Нижня квітова луска: киль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,70	7,86	7,45
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,07	0,45	0,71
+, - до усередненої урожайності, %	-1,2	6,1	10,5
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	255	266	273
Висота рослини, см	96,7	101,9	108,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	33,7	43,3	40,3
Вміст білка, %	13,8	13,4	13,5
Вміст сирової клейковини, %	28,5	26,8	25,7
Показник альвеографа (W), о.а.	218	269	243
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	760	843,3	883,3
Стійкість до вилягання, бал	9	6	5
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	7
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		4	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 24012020 Назва сорту: ЛІД МАКУМБА **Заявник (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2025 **Патент №** 250311

Дата пріоритету: 18.06.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	до напіврозлогого
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	до малої
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	до середнього
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	до дуже сильного
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	до щільного
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або соломяно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	до піднесеного
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже довгий	9	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 24012018 Назва сорту: ЛІД САРАБАНД **Заявник (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2025 **Патент № 250310**

Дата пріоритету: 18.06.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	помірне	5	
2	Рослина: габітус (форма куща)	розлогий	7	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	до пізнього
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	до дуже сильного
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	до середнього
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	до середнього
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	до дуже довгих
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабе	3	до помірного
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	до прямого
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	до довгого
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	до сильного
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	дуже сильне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 23012020 Назва сорту: Ліпперт **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552

Володілець патенту (код): 2552

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250289

Дата пріоритету: 18.07.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250632

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,09	7,94	8,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,32	0,53	1,28
+, - до усередненої урожайності, %	5,5	7,2	19,0
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	256	267	273
Висота рослини, см	87,5	87,8	91,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	32,9	39,7	40,3
Вміст білка, %	13,7	13,2	12,7
Вміст сирової клейковини, %	27	25,9	24,5
Показник альвеографа (W), о.а.	234,3	251	194
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860	930	770
Стійкість до вилягання, бал	8	7	7
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	7	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	7
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	6	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 23012002 Назва сорту: СОНАТІН КС **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2025 **Патент №** 250309

Дата пріоритету: 09.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230433

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	до розлогого
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже ранній	1	до раннього
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	до піднесеного
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже довгий	9	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 23012019 Назва сорту: Стеліан **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552

Володілець патенту (код): 2552

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250288

Дата пріоритету: 18.07.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250631

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	довгий	7	
32	Нижня квіткова луска: киль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	сильне	7	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,04	8,28	8,05
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,27	0,87	1,31
+, - до усередненої урожайності, %	4,7	11,7	19,4
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, днів	256	267	272
Висота рослини, см	83,8	87,8	94,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	35,4	45,1	43,3
Вміст білка, %	13,8	13,1	12,7
Вміст сирової клейковини, %	28,5	25,4	24,2
Показник альвеографа (W), о.а.	242,5	252	216
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	760	973,3	885
Стійкість до вилягання, бал	9	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	6	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	9
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		8	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	6	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цпн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 24013002 Назва сорту: Елая Заявник (код): 2011 Володілець патенту (код): 2011

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 Патент № 250344

Дата пріоритету: 19.08.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабе	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	до великого
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	до сильного
7	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабе	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	до середнього
19	Нижня колоскова луска. Плече за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначалась	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: киль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначається	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 23022004 Назва сорту: МІП Ренесанс **Заявник (код):** 2859 **Власник сорту (код):** 2859

Володілець патенту (код): 2859

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250253

Дата пріоритету: 04.08.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250621

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вужька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	сильно щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	коротка	3	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	щільний	7	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалася	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	деформована	3	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,56	5,69
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		8,01	7,41
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,45	1,72
+, - до усередненої урожайності, %		22,1	30,2
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		284	275
Висота рослини, см		108	109,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		52,6	48,5
Череззерниця, %		3,8	5,4
Вміст білка, %		11,7	11,3
Вміст морозобійних зерен, %		0	0
Стійкість до вилягання, бал		7	6
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	8
Напрямок використання		зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 21022006 Назва сорту: Фродо Поліський **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

Володілець патенту (код): 1626

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.11.2025 **Патент №** 250312

Дата пріоритету: 05.08.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250569

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	помірно щільне	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: перший кільвовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільвовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біле	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшквата	5	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,56	5,69
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,12	6,81
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,56	1,12
+, - до усередненої урожайності, %		8,5	19,7
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		284	275
Висота рослини, см		116,8	121,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		49,1	43,3
Череззерниця, %		3,9	4,7
Вміст білка, %		11,8	11
Вміст морозобійних зерен, %		0	0
Стійкість до вилягання, бал		6	6
Стійкість до обсіпання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		6	6
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	7
Напрямок використання		зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 23019002 Назва сорту: Імператор **Заявник (код):** 2783 **Власник сорту (код):** 2783

Володілець патенту (код): 2783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.11.2025 **Патент №** 250298

Дата пріоритету: 06.04.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250571

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	помірний	5	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідална	3	
15	Колос: за щільністю	щільний	7	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	відсутня	1	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	ромбічна	7	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: вивопнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	проміжна	5	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,85	5,93	5,38
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,35	6,46	7,01
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,50	0,53	1,63
+, - до усередненої урожайності, %	30,9	8,9	30,3
Довірчий інтервал, т/га	0,71	0,61	0,38
Тривалість періоду вегетації, діб	232	263	262
Висота рослини, см	100,3	99,9	110,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,4	49,1	48,3
Вміст білка, %	12,8	14,8	11,6
Стійкість до вилягання, бал	8	5	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	7
Стійкість проти гелмінтоспоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	5	7	7
Блок	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БОБОВІ

Горох посівний (зерновий)
Квасоля звичайна (зернова)
Соя культурна



Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 2025023003 Назва сорту: ЛГ КОРВЕТ **Заявник (код):** 793 **Володілець патенту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250315**

Дата пріоритету: 10.02.2025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	велика	7	до дуже великої
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (ozn. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	до довгого
16	Прилисток: за шириною	середній	5	до широкого
17	Прилисток: розмір	середній	5	до великого
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	довга	7	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3	до середньої
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	до пізнього
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	до широкого
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	до середньої
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	до довгої
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	до довгої
36	Квітконос: кількість приквіток	середня	2	
37	Біб: за довжиною	короткий	3	до середнього
38	Біб: за шириною	вузький	3	до середнього
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (ozn. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насінневих зачатків	мала	3	до середньої
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насіннина: форма	еліптична	1	
49	Насіннина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насіннини і простим типом крохмальних зерен. Насіннина: зморшкватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насіннинами із складним типом крохмальних зерен. Насіннина: інтенсивність зморшкватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насіннина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: мрамуровість насінневої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: фіолетові чи рожеві плями на насінневій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насіннина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінневої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: забарвлення насінневої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Вид: Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 23025003 Назва сорту: Боберан **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

Володілець патенту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2025 **Патент №** 250302

Дата пріоритету: 18.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250556

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилія	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	сланкий	2	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
10	Листок: зморшкуватість	слабка	3	до помірної
11	Верхівковий листочок: розмір	великий	7	
12	Верхівковий листочок: форма	від округлої до ромбічної	4	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	ознака не визначається	0	
15	Квітка: розмір приквітков	великий	7	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	тонкий	3	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	еліптична	1	
23	Біб: відношення товщини до ширини	мале	3	
24	Біб: основне забарвлення	жовте	1	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	слабка	3	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9	
30	Біб: ступінь вигину	відсутній або дуже слабкий	1	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	загострена	1	
33	Біб: дзьобик за довжиною	довгий	7	
34	Біб: вигин дзьобика	слабкий	3	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабко шерехата	3	до помірно шерехатої
36	Біб: звуження (в сухому стані)	помірне	2	
37	Насіння: маса	мала	3	
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	слабкий	3	
40	Насіння: форма поперечного перерізу	вузькоеліптична	2	
41	Насіння: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насіння: за довжиною	коротка	3	до середньої
43	Насіння: кількість кольорів	один	1	
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насіння: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насіння: вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	пізній	7	
49	Стійкість проти антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (CMNV)	наявна без симптомів	3	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	наявна	9	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 3,79. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 17. Тривалість періоду вегетації, діб – 95. Кількість бобів на рослині, шт. – 27. Вміст білка, % – 24,6. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 7. Дружність досягання, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 219. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 7, аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 24045012 Назва сорту: Аннабелла **Заявник (код):** 1564 **Володілець патенту (код):** 1564

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250371

Дата пріоритету: 06.02.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	темно-коричневе	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	дуже сильна	5	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 23045013 Назва сорту: Аурікула **Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011

Володілець патенту (код): 2011

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250367**

Дата пріоритету: 27.09.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230957

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	висока	7	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час достигання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	від малої до середньої	4	
23	Насіння: глясуватість	відсутня або слабка	1	

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 23045020 Назва сорту: САНКАРА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250369

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231425

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкоюйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	відсутня або дуже слабка	1	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 23045019 Назва сорту: СІБЕЛЛА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250368

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250644

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насінина: розмір	малий	3	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовто-зелене	2	
16	Насінина: забарвлення в насінневій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насінневій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час достигання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	відсутня або дуже слабка	1	
22	Насіння: маса 1000 насінин	від малої до середньої	4	
23	Насіння: глясуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,34	3,30	3,18
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,27	3,87	3,84
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,07	0,57	0,66
+, - до усередненої урожайності, %	-45,7	17,3	20,8
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	116	118	124
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	152,6	169,8	165
Висота рослини, см	51,5	65,6	70,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11	12,9	14
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсипання, бал	7	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	41,8	39	40,2
Вміст олії, %	20,8	21,9	21,7
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 23045021 Назва сорту: СКВАДРА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250370

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250645

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насінина: розмір	малий	3	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	відсутня або дуже слабка	1	
22	Насіння: маса 1000 насінин	мала	3	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,34	3,30	3,18
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,18	3,77	3,78
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,16	0,47	0,60
+, - до усередненої урожайності, %	-49,6	14,2	18,9
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	115	122	125
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	156,7	160,6	161
Висота рослини, см	51	63,6	72,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,5	11,1	13
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	41,8	39,1	40,2
Вміст олії, %	19,9	21,3	21,3
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КРУП'ЯНІ

Сорго звичайне (двокольорове)



Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

Заявка № 23018004 Назва сорту: РЖТ АРМСТРОНГГ **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250365

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240673

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптіля	слабка	3	
2	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	слабка	3	
3	Рослина: кількість бічних продуктивних пагонів	відсутня або дуже мала	1	
4	Листок: зелене забарвлення	помірне	3	
5	Листок: забарвлення центральної жилки	жовтувато-біле	2	
6	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	середня	5	
7	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
8	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння–кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
9	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Приймочка: забарвлення	біле	1	
11	Приймочка: за довжиною	коротка	3	
12	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	середня	5	
13	Квітка: здатність до самозапилення	сильна	3	
14	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	зелене	2	
15	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	помірно щільна	5	
16	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
17	Сухі тичинки: забарвлення	помаранчеве	3	
18	Рослина: за довжиною	від середньої до довгої	10	
19	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням флагового листка)	малий	3	
20	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	коротка	3	
21	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
22	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
23	Волоть: шийка за довжиною	коротка	3	
24	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	короткі	3	
25	Волоть: за щільністю (за досягання)	щільна	7	
26	Волоть: положення найширшої частини	середнє	3	
27	Колоскова луска: забарвлення за досягання	світло-коричнєве	4	
28	Колоскова луска: за довжиною	середня	5	
29	Зернівка: забарвлення за досягання	помаранчеве	5	
30	Маса 1000 зерен	середня	5	
31	Зернівка: форма зі спинки	широкоеліптична	2	
32	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
33	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
34	Зернівка: тип ендосперму	на 1/2 склоподібний	3	
35	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	2	
36	Рослина: чутливість до фотоперіодизму	відсутня	1	

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

Заявка № 23018005 Назва сорту: РЖТ ФІГГАРО **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250366

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240674

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля	відсутня або дуже слабка	1	
2	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: кількість бічних продуктивних пагонів	мала	2	
4	Листок: зелене забарвлення	помірне	3	
5	Листок: забарвлення центральної жилки	світло-зелене	3	
6	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	середня	5	
7	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
8	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння–кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
9	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
10	Приймочка: забарвлення	світло-жовте	2	
11	Приймочка: за довжиною	коротка	3	
12	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	коротка	3	
13	Квітка: здатність до самозапилення	помірна	2	
14	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	жовто-зелене	3	
15	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	помірно щільна	5	
16	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
17	Сухі тичинки: забарвлення	помаранчеве	3	
18	Рослина: за довжиною	середня	9	
19	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням флагового листка)	малий	3	
20	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	коротка	3	
21	Листок: листкова пластинки третього листка від верхівки за шириною	вузька	3	
22	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
23	Волоть: шийка за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
24	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
25	Волоть: за щільністю (за досягання)	щільна	7	
26	Волоть: положення найширшої частини	середнє	3	
27	Колоскова луска: забарвлення за досягання	світло-коричневе	4	
28	Колоскова луска: за довжиною	середня	5	
29	Зернівка: забарвлення за досягання	світло-коричневе	7	
30	Маса 1000 зерен	середня	5	
31	Зернівка: форма зі спинки	широкоеліптична	2	
32	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
33	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
34	Зернівка: тип ендосперму	на 1/2 склоподібний	3	
35	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	2	
36	Рослина: чутливість до фотоперіодизму	відсутня	1	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

Ріпак (озимий)

Соняшник однорічний

Соняшник однорічний – батьківський компонент



Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка №** 24040038 **Назва сорту:** Воллі **Заявник (код):** 2011 **Володілець патенту (код):** 2011**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.11.2025 **Патент №** 250345**Дата пріоритету:** 04.06.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	до великої
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	до середньої
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 23040029 Назва сорту: ПТ325 Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата пріоритету: 23.05.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250549

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	до сильної
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,87	3,39	3,25
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,93	2,87	3,54
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,06	-0,52	0,29
+, - до усередненої урожайності, %	2,1	-15,3	8,9
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,04	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	289	298	297
Висота рослини, см	124,5	128,6	137,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,9	5,3	5,3
Вміст білка, %	19,5	18,1	18
Вміст олії, %	46,9	48,6	48,8
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	1,2	0,9	0,9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	6	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039052 **Назва сорту:** БОХЕМ **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250346

Дата пріоритету: 23.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250639

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,56	3,66	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,75	3,50	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,81	-0,16	
+, - до усередненої урожайності, %	-31,6	-4,4	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	46,4	65,7	
Діаметр кошика, см	11,5	17,6	
Висота рослини, см	121,7	162	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,6	8,6	
Тривалість періоду вегетації, днів	104	114	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,7	50,9	
Вміст білка, %	17,3	17,5	
Лушпинність, %	26,3	25,1	
Блок (група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 24039001 Назва сорту: Кадіз **Заявник (код):** 2882 **Власник сорту (код):** 2882

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250642

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нешільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,54	3,64	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,04	4,00	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,50	0,36	
+, - до усередненої урожайності, %	-19,7	9,9	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	46,8	56,5	
Діаметр кошика, см	11,8	19,7	
Висота рослини, см	143,1	184,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	130	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,3	47,1	
Вміст білка, %	18,8	16,5	
Лушпинність, %	27	27,2	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	6		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039082 Назва сорту: КАСПЕРЕС Заявник (код): 2643 Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 Патент № 250350

Дата пріоритету: 26.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильнае	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вужькоюцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вужькоюцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039086 Назва сорту: КВС АДЕМЕС СУ **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250351

Дата пріоритету: 27.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильнае	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,54	3,64	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,03	4,00	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,51	0,36	
+ , - до усередненої урожайності, %	-20,1	9,9	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	51,4	72,3	
Діаметр кошика, см	11,9	18,7	
Висота рослини, см	133,3	164,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	7,6	
Тривалість періоду вегетації, днів	122	132	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	44,6	46,5	
Вміст білка, %	17,6	15,8	
Лущинність, %	31,7	28,8	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	6		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039094 Назва сорту: Клаус **Заявник (код):** 3243 **Власник сорту (код):** 3243

Дата пріоритету: 28.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250617

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильнае	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої поси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,58	3,63	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,00	4,01	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,58	0,38	
+ , - до усередненої урожайності, %	-22,5	10,5	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	35,6	56	
Діаметр кошика, см	10,7	20,6	
Висота рослини, см	130,6	170,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,6	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	2	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	44,6	48,3	
Вміст білка, %	17,6	15,5	
Лущинність, %	28,1	27,6	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	2		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039090 Назва сорту: Корсин **Заявник (код):** 3243 **Власник сорту (код):** 3243

Дата пріоритету: 28.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250616

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильнае	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,58	3,63	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,81	3,70	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,77	0,07	
+ , - до усередненої урожайності, %	-29,8	1,9	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	39,7	55,9	
Діаметр кошика, см	11,7	19,1	
Висота рослини, см	128,1	158,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	8,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	123	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	6	
Стійкість проти вовчка, бал	3	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,5	48	
Вміст білка, %	17,9	16,4	
Лущинність, %	27,8	26,5	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	4		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039053 Назва сорту: ЛЛЮДВІГ **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250347

Дата пріоритету: 23.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250640

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильнае	9	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,58	3,63	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,38	3,79	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,20	0,16	
+, - до усередненої урожайності, %	-7,8	4,4	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	49,6	70,2	
Діаметр кошика, см	11,9	18,6	
Висота рослини, см	127	156	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	8,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	116	123	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	7	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,8	46,9	
Вміст білка, %	18,4	17,6	
Лущинність, %	28	28,7	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 24939004 Назва сорту: Лорка Грано **Заявник (код):** 2882 **Власник сорту (код):** 2882

Дата пріоритету: 05.01.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250643

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,58	3,63	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,18	3,80	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,40	0,17	
+ , - до усередненої урожайності, %	-15,5	4,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	43,1	65,1	
Діаметр кошика, см	11,9	20,8	
Висота рослини, см	131,9	170,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	9	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	120	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	43,6	43,8	
Вміст білка, %	18,7	17,6	
Лущинність, %	30,4	29,5	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039054 Назва сорту: ОДІН **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250348

Дата пріоритету: 23.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250641

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,56	3,66	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,91	3,66	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,65	-0,00	
+ , - до усередненої урожайності, %	-25,4	-0,0	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	40,8	63,3	
Діаметр кошика, см	11,4	17,8	
Висота рослини, см	120,7	153,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,6	8,1	
Тривалість періоду вегетації, днів	108	116	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47,7	52,4	
Вміст білка, %	17,2	16,7	
Лущинність, %	26,4	25,1	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039047 Назва сорту: П63ЛЕ193 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250638

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,58	3,63	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,08	4,04	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,50	0,41	
+ , - до усередненої урожайності, %	-19,4	11,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	52	72,8	
Діаметр кошика, см	11,4	18	
Висота рослини, см	120,3	153,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,6	8,5	
Тривалість періоду вегетації, дів	117	123	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	46,6	49,5	
Вміст білка, %	18,1	16,5	
Лущинність, %	26,5	26,3	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	8		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039043 Назва сорту: П63ЛЛ209 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250635

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,56	3,66	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,14	3,49	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,42	-0,17	
+ , - до усередненої урожайності, %	-16,4	-4,6	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	40,2	61,1	
Діаметр кошика, см	11,4	18,7	
Висота рослини, см	122,4	155,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	106	113	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	49,3	51,3	
Вміст білка, %	16,4	15,7	
Лущинність, %	26,4	25,6	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039044 Назва сорту: П64ГЕ233 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250636

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильнае	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,61	3,63	
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,20	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,30	3,70	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,31	0,07	
+ , - до усередненої урожайності, %	-11,9	1,9	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	55	64	
Діаметр кошика, см	14,5	18,1	
Висота рослини, см	139,2	159,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, дів	125	127	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	44,6	47,8	
Вміст білка, %	16,6	15,1	
Лущинність, %	27,1	27,7	
Блок (Група стиглості)	8	8	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		9	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	85,4	83,6	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039045 Назва сорту: П64ЛП196 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250637

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,54	3,64	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,25	4,10	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,29	0,46	
+ , - до усередненої урожайності, %	-11,4	12,6	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	53,9	68,9	
Діаметр кошика, см	11,8	17	
Висота рослини, см	129,4	157,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	123	131	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,4	48,2	
Вміст білка, %	18,2	16,3	
Лушпинність, %	26,9	26,5	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039035 Назва сорту: ПС-115Е **Заявник (код):** 3228 **Власник сорту (код):** 3228

Дата пріоритету: 29.09.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250615

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюяцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,54	3,64	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,25	4,14	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,29	0,50	
+ , - до усередненої урожайності, %	-11,4	13,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	49,5	61,2	
Діаметр кошика, см	12,2	17,8	
Висота рослини, см	142,4	177,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	7,6	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	130	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	46,4	48,3	
Вміст білка, %	17,4	16,2	
Лущинність, %	26	28,7	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	8		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 24039004 Назва сорту: СИ МАГІСТЕР **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Володілець патенту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250352

Дата пріоритету: 10.01.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250618

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,58	3,63	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,19	3,66	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,39	0,03	
+ , - до усередненої урожайності, %	-15,1	0,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	43,4	66,8	
Діаметр кошика, см	12,3	19,3	
Висота рослини, см	135	175	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,4	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	123	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	46,8	48,8	
Вміст білка, %	17,2	16,3	
Лушпинність, %	27,1	26,8	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	8		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039056 Назва сорту: Холіб КЛП **Заявник (код):** 1783 **Володілець патенту (код):** 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250349

Дата пріоритету: 23.11.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильнае	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно-коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939069 Назва сорту: 15051 Заявник (код): 2834 Власник сорту (код): 2554

Дата пріоритету: 21.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250620

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939067 Назва сорту: 33568 **Заявник (код):** 2834 **Власник сорту (код):** 2554

Дата пріоритету: 21.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250619

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої поси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 2025939004 Назва сорту: АТ1620 **Заявник (код):** 1783 **Володілець патенту (код):** 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250363**

Дата пріоритету: 01.01.2025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояцевподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричневе	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 24939050 Назва сорту: АТ2120 **Заявник (код):** 1783 **Володілець патенту (код):** 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250360

Дата пріоритету: 02.12.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюяцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939072 Назва сорту: MP012223 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250358**

Дата пріоритету: 23.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюящеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939071 Назва сорту: МР079063 **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250357**

Дата пріоритету: 27.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	темно-коричневе	6	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 24939051 Назва сорту: РТ8522 **Заявник (код):** 1783 **Володілець патенту (код):** 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250361**

Дата пріоритету: 02.12.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Сійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Сійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 24939052 Назва сорту: РТ8822 **Заявник (код):** 1783 **Володілець патенту (код):** 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250362

Дата пріоритету: 02.12.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939054 Назва сорту: ТРІ5564Р **Заявник (код):** 2720 **Володілець патенту (код):** 2720

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент № 250356**

Дата пріоритету: 07.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 2025939029 Назва сорту: TPC5430P **Заявник (код):** 2720 **Володілець патенту (код):** 2720

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250364

Дата пріоритету: 17.01.2025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	до сильної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	до сильної
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939018 Назва сорту: X13241P Заявник (код): 2649 Володілець патенту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 Патент № 250353

Дата пріоритету: 20.11.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нешільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939073 Назва сорту: Х30014А **Заявник (код):** 2649 **Володілець патенту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250359

Дата пріоритету: 27.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КАРТОПЛЯ

Картопля



Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088005 **Назва сорту:** Либідь **Заявник (код):** 2631 **Власник сорту (код):** 2631

Володілець патенту (код): 2631

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2022 **Патент №** 220013

Дата пріоритету: 03.01.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250630

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	велике	3	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	дуже сильне	9	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	коротка	3	
12	Рослина: тип структури розвитку листків	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	дуже сильне	9	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за розташуванням листочків	проміжний (листочки торкаються)	3	
17	Листок: кількість вторинних листків	слабке	3	
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	дуже сильне	9	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	широкі	7	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5	
32	Віночок: діаметр	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	слабка	3	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	мале	3	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	глибокі	7	
39	Бульба: забарвлення шкірки	чорно-фіолетове	8	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	блакитне	4	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	блакитне	8	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		24,09	20,96
Урожайність, т/га		18,65	16,32
+, - до усередненої урожайності, т/га		-5,44	-4,64
+, - до усередненої урожайності, %		-22,6	-22,1
Довірчий інтервал, т/га		0,89	0,89
Тривалість періоду вегетації, діб		107	89
Середня маса товарної бульби, г		63,9	76,7
Вміст крохмалю, %		18	18
Збір крохмалю, т/га		33,57	29,38
Вміст сухої речовини, %		27,2	26,6
Дегустаційна оцінка, бал		5	3
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Лежкість, бал		5	8
Товарність бульб, %		67,4	72,6
Стойкість проти макроспоріозу, бал		7	7
Стойкість проти фітофторозу, бал		6	2
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		пк	пк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 23088002 Назва сорту:** Норман **Заявник (код):** 2660 **Власник сорту (код):** 2660**Володілець патенту (код):** 2660**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.11.2025 **Патент №** 250301**Дата пріоритету:** 08.02.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 15.02.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240125**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	коротка	3	
12	Рослина: тип структури розвитку листків	листяний	3	
13	Рослина: габітус	розлогий	7	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за розташуванням листочків	відкритий (листочки не перекриваються)	5	
17	Листок: кількість вторинних листків	помірне	5	
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	сильне	7	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: ясність цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1	
30	Суцвіття: розмір	малий	3	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок: діаметр	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	середнє	2	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7	
36	Рослина: час досягання	дуже ранній	1	
37	Бульба: форма	куляста	1	
38	Бульба: вічка за глибиною	глибокі	7	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	слабке	3	
43	Рослина: кількість суцвіть	відсутні або дуже мала	1	
44	Бульба: текстура шкірки	гладка	1	

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088003 Назва сорту: Шедевр **Заявник (код):** 2631 **Власник сорту (код):** 2631

Володілець патенту (код): 2631

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2022 **Патент №** 220011

Дата пріоритету: 03.01.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250629

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	малий	3	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	коротка	3	
12	Рослина: тип структури розвитку листків	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за розташуванням листочків	проміжний (листочки торкаються)	3	
17	Листок: кількість вторинних листків	помірне	5	
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	великий	7	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок: діаметр	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	слабка	3	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	темно-жовте	5	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	


Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		24,09	20,96
Урожайність, т/га		17,88	17,41
+, - до усередненої урожайності, т/га		-6,21	-3,55
+, - до усередненої урожайності, %		-25,8	-16,9
Довірчий інтервал, т/га		0,89	0,89
Тривалість періоду вегетації, діб		108	91
Середня маса товарної бульби, г		89,3	96
Вміст крохмалю, %		16,6	16,1
Збір крохмалю, т/га		29,68	28,03
Вміст сухої речовини, %		25,3	24,3
Дегустаційна оцінка, бал		3	4
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Лежкість, бал		6	8
Товарність бульб, %		71,9	80,1
Стійкість проти макроспоріозу, бал		6	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	3
Блок (Група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		пк	пк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

*Боби кормові
Буряк столовий
Гарбуз звичайний
Диня звичайна
Кабачок
Капуста білоголова
Квасоля звичайна (овочева)
Кріп пахучий
Помідор їстівний
Салат посівний головчастий
Салат посівний ромен
Цибуля городня*



Вид: Боби кормові *Vicia faba* L. var. *major* Harz

Заявка № 58043005 Назва сорту: Хоростківські **Заявник (код):** 395 **Власник сорту (код):** 3232

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1962

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04982

Сходи (на 10–15 день після появи): рослини гладенькі; забарвлення – сизо-зелене; стебельця міцні та товсті.

Листки (біля першого суцвіття) – однопарні, в середньому ярусі – двопарні, у верхньому ярусі – три-чотири парні.

Форма рослини (кущова, напівкущова, компактна, проміжна, розлога) – компактна.

Стебло: забарвлення (у період повного цвітіння) – сизо-зелене. Стебло за формою чотиригранне, порожнисте. Стебло за висотою (загальною та від кореневої шийки до кінця верхнього міжвузля) – високе (70–180 см). Стебло за будовою (з прямим закінченням чи з виткою верхівкою) – з прямим закінченням.

Квітка: характер суцвіття (квітки пазушні, китиця, неправильний зонтик) – метеликова, китиця; квітконос – довгий, блідо-зеленого забарвлення. Кількість квіток на квітконосі – 5–9 шт. Квітка велика, забарвлення на 1–2-й день після розкриття – біле; човник зверху відкритий, чашечка – трубчаста, гола, блідо-зелена.

Біб: за типом (цукровий, напівцукровий, луцильний) – луцильний; пергаментний шар (нерозвинений, слабкий, сильний) – сильний; характер швів (неволокнистий, тонкий, середньо-грубоволокнистий) – середній. Кількість бобів на рослині – 25–50. Форма боба (в цілому і його верхівки) – валькувата. Забарвлення (в період закінчення наливання насіння і повної стиглості) – темно-буре. Біб: за величиною (середні проміри, ширина та довжина, см) – 1,7–8,0 см; опушення – відсутнє; кількість насінин у бобі – 3–5 шт.

Насіння: за об'ємом середнє, відношення довжина : ширина – 10–13 мм : 7–8 мм, форма – кутаста, забарвлення блідо-жовте з зеленуватим відтінком. Поверхня насінини гладенька, матова з відливом. Насіннєва шкірка груба, блідо-жовта. Рубчик – 0,35–0,5 см.

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 23122002 Назва сорту: Бордо 237 **Заявник (код):** 3238 **Підтримувач сорту (код):** 3238

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250534

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	багаторосткове	2	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	пряме	1	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	середній	5	
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
8	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	3	
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
13	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	вузький	3	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	глибоке	7	
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	округла	3	
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	3	
21	Коренеплід: форма кінчика	плеската	3	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	червонувато-пурпурове	3	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність коренеплодів, т/га: загальна – 45, товарна – 35. Середня маса товарного коренеплоду, г – 170. Триваліть періоду, діб: від повних сходів до пучкової стиглості коренеплодів – 25; від повних сходів до товарної (технічної) стиглості коренеплодів – 120; від повних сходів висадків до повного досягання насіння – 130. Прояв кілець: відсутні – 1. Вміст у коренеплодах: сухої речовини, % – 18, загального цукру, % – 14, вітаміну С, мг/100 г с.р. – 28, бетаніну, мг/100 г с.р. – 0,5. Маса 1000 насінин, г – 14,18.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 23122001 Назва сорту: Делікатесний **Заявник (код):** 3238 **Підтримувач сорту (код):** 3238

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.11.2025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	багаторосткове	2	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотила	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	напівпряме	3	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	середній	5	
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5	
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
13	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	середній	5	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	середнє	5	
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	округла	3	
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	середнє	3	
21	Коренеплід: форма кінчика	округла	2	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	червонувато-пурпурове	3	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	сильнє	7	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність коренеплодів, т/га: загальна – 45, товарна – 36. Середня маса товарного коренеплоду, г – 310. Тривалість періоду, днів: від повних сходів до пучкової стиглості коренеплодів – 28; від повних сходів до товарної (технічної) стиглості коренеплодів – 115; від повних сходів висадків до повного досягання насіння – 130. Прояв кілець: відсутні – 1. Вміст у коренеплодах: сухої речовини, % – 13,7; загального цукру, % – 7,5; вітаміну С, мг/100 г с.р. – 27; бетаніну, мг/100 г с.р. – 0,6. Маса 1000 насінин, г – 13,72. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 24122001 Назва сорту: Конар **Заявник (код):** 3245 **Власник сорту (код):** 3245

Дата пріоритету: 04.01.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250581

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	багаторосткове	2	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	пряме	1	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3	
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
8	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	3	
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	вузький	3	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	глибоке	7	
17	Коренеплід: форма повздожнього розрізу	округла	3	
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	3	
21	Коренеплід: форма кінчика	округла	2	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	помірне	5	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	червонувато-пурпурове	3	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність коренеплодів, т/га: загальна – 70, товарна – 65. Середня маса товарного коренеплоду, г – 220. Тривалість періоду, діб: від повних сходів до пучкової стиглості коренеплодів – 95; від повних сходів до товарної (технічної) стиглості коренеплодів – 100; від повних сходів висадків до повного досягання насіння – 120. Прояв кілець: наявні – 9. Вміст у коренеплодах: сухої речовини, % – 20; загального цукру, % – 11,5; вітаміну С, мг/100 г с.р. – 15; бетаніну, мг/100 г с.р. – 200. Маса 1000 насінин, г – 14. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 24122003 Назва сорту: Мармеладка **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236

Дата пріоритету: 07.02.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250582

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	багаторосткове	2	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	пряме	1	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	середній	5	
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5	
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	середній	5	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	глибоке	7	
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	округла	3	
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	середнє	3	
21	Коренеплід: форма кінчика	округла	2	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	слабке	3	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	червонувато-пурпурове	3	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	сильне	7	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сіви)	відсутня або дуже слабка	1	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність коренеплідів, т/га: загальна – 45, товарна – 39. Середня маса товарного коренеплоду, г – 280. Тривалість періоду, діб: від повних сходів до пучкової стиглості коренеплідів – 38, від повних сходів до товарної (технічної) стиглості коренеплідів – 95, від повних сходів висадків до повного досягання насіння – 115. Прояв кілець: відсутні – 1. Вміст у коренеплодах: сухої речовини, % – 18,4; загального цукру, % – 13; вітаміну С, мг/100 г с.р. – 22; бетаніну, мг/100 г с.р. – 95. Маса 1000 насінин, г – 14,21. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 24122004 Назва сорту: Овочевий скарб **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236

Дата пріоритету: 07.02.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250583

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	багаторосткове	2	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотила	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	пряме	1	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	середній	5	
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5	
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	сильне	7	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	вузький	3	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	середнє	5	
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	дуже вузьковидовжена	6	
18	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	5	
21	Коренеплід: форма кінчика	загострена	1	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	помірне	5	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	бордове	4	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність коренеплодів, т/га: загальна – 33, товарна – 29. Середня маса товарного коренеплоду, г – 320. Тривалість періоду, діб: від повних сходів до пучкової стиглості коренеплодів – 55, від повних сходів до товарної (технічної) стиглості коренеплодів – 95, від повних сходів висадків до повного досягання насіння – 110. Прояв кілець: наявні – 9. Вміст у коренеплодах: сухої речовини, % – 17; загального цукру, % – 9; вітаміну С, мг/100 г с.р. – 17,5; бетаніну, мг/100 г с.р. – 85. Маса 1000 насінин, г – 13,11. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 23122003 Назва сорту: Чарівниця **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236

Дата пріоритету: 26.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250580

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	одноросткове	1	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотіля	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	пряме	1	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3	
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
8	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	3	
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
13	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	вузький	3	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	мілке	3	
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	дуже вузьковидовжена	6	
18	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	велике	5	
21	Коренеплід: форма кінчика	загострена	1	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	помірне	5	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	бордове	4	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	відсутні або дуже слабке	1	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність коренеплідів, т/га: загальна – 30, товарна – 28. Середня маса товарного коренеплоду, г – 250. Тривалість періоду, діб: від повних сходів до пучкової стиглості коренеплідів – 60, від повних сходів до товарної (технічної) стиглості коренеплідів – 130, від повних сходів висадків до повного досягання насіння – 135. Прояв кілець: відсутні – 1. Вміст у коренеплодах: сухої речовини, % – 19, загального цукру, % – 11, вітаміну С, мг/100 г с.р. – 16, бетаніну, мг/100 г с.р. – 90. Маса 1000 насінин, г – 14.17. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Гарбуз звичайний *Cucurbita pepo* L.

Заявка № 24150003 Назва сорту: ВОРТИ ГОБЛІН **Заявник (код):** 2662 **Власник сорту (код):** 2662

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250544

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	плетистий	3	
5	Рослина: галузнення	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галузнення	помірний	5	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	ознака не визначається	0	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Стебло: крапчастість	наявна	9	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість	глибока	7	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначається	0	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: кількість шипів	велика	7	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважача форма	ознака не визначається	0	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	зелене	4	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	помірна	5	
30	Плід: переважна форма	широкоеліптична	6	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	середній	5	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: боріздки	наявні	9	
47	Плід: боріздки за глибиною	мілкі	3	
48	Плід: ребра	відсутні	1	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	ознака не визначається	0	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	зелене	4	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	сильна	7	
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Плід: смужки на боріздках	відсутні	1	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	ознака не визначалась	0	
57	Плід: плямистість	наявна	9	
58	Плід: розмір основних плям	малий	3	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	ознака не визначалась	0	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	наявні	9	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	велика	7	
64	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	сильна	7	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	оранжеве	5	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	сильна	7	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	оранжеве	4	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	оранжеве	3	
75	Стиглий плід: здрев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	кремове	2	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність плодів, т/га – 78. Вміст сухої речовини, % – 5,9. Тривалість періоду до досягання, днів – 105. Ураженість хворобами: борошнистою росою, % – 6, антракнозом, % – 7, плямистістю бактеріальною, % – 7, фузаріозом, % – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Гарбуз звичайний *Cucurbita pepo* L.

Заявка № 24150002 Назва сорту: КЕМОН Заявник (код): 2662 Власник сорту (код): 2662

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250543

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	широкоеліптична	3	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	напівплетистий	2	
5	Рослина: галузнення	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галузнення	помірний	5	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	ознака не визначається	0	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Стебло: крапчастість	наявна	9	
11	Стебло: вусики	добре розвинені	2	
12	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначається	0	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: кількість шипів	велика	7	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	відсутнє	1	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначається	0	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	ознака не визначається	0	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	частково біле і частково зелене	6	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
30	Плід: переважна форма	поперечно еліптична	2	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	малий	3	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: боріздки	наявні	9	
47	Плід: боріздки за глибиною	середні	5	
48	Плід: ребра	відсутні	1	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	ознака не визначається	0	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	частково біле і частково жовте	5	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Плід: смужки на боріздвах	наявні	9	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздвах	жовті	2	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	ознака не визначалась	0	
57	Плід: плямистість	наявна	9	
58	Плід: розмір основних плям	середній	5	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	ознака не визначалась	0	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	сильна	7	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	кремове	3	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначалась	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	кремове	2	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	відсутній	1	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	широкоеліптична	7	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	кремове	2	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність плодів, т/га – 35. Вміст сухої речовини, % – 6. Тривалість періоду до досягання, діб – 90. Ураженість хворобами: борошнистою росою, % – 7, антракнозом, % – 7, плямистістю бактеріальною, % – 6, фузаріозом, % – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Гарбуз звичайний *Cucurbita pepo* L.**Заявка № 24150001 Назва сорту:** Пабло **Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011**Володілець патенту (код):** 2011**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.11.2025 **Патент № 250294****Дата пріоритету:** 02.02.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 15.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240330****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	плетистий	3	
5	Рослина: галузнення	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галузнення	помірний	5	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	ознака не визначається	0	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
10	Стебло: крапчастість	наявна	9	
11	Стебло: вусики	добре розвинені	2	
12	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість	відсутня або дуже мілка	1	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначається	0	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: кількість шипів	велика	7	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте і зелене	3	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	ознака не визначається	0	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	зелене	4	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	помірна	5	
30	Плід: переважна форма	куляста	4	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	середній	5	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: боріздки	наявні	9	
47	Плід: боріздки за глибиною	дуже мілкі	1	
48	Плід: ребра	відсутні	1	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	ознака не визначається	0	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	жовте	3	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	помірна	5	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Плід: смужки на боріздках	наявні	9	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	жовті	2	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	темніше	2	
57	Плід: плямистість	наявна	9	
58	Плід: розмір основних плям	середній	5	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	ознака не визначалась	0	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	помірна	5	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9	
69	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	оранжеве	5	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	помірна	5	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	оранжеве	4	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	жовте	2	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2	
77	Насінина: розмір	великий	7	
78	Насінина: форма	широкоеліптична	7	
79	Насінина: лушпиння	відсутнє	1	
80	Насінина: наявне лушпиння	ознака не визначається	0	
81	Насінина: забарвлення	ознака не визначається	0	

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.

Заявка № 2025147002 Назва сорту: Романостар Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Підтримувач сорту (код): 840

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250554

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	короткий	3	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	малий	3	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	моноєційні	1	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	жовтувато-зелений	2	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	дуже слабка	1	
15	Молодий плід: щільність крапок	дуже щільна	9	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	помірна	5	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на ранніх стадіях розвитку плоду	1	
24	Плід: за довжиною	середній	5	
25	Плід: діаметр	середній	5	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	4	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	сильна	7	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	оранжевий	4	
32	Плід: щільність крапок	щільна	7	
33	Плід: розмір крапок	малий	3	
34	Плід: забарвлення крапок	жовте	2	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	помірна	5	
36	Плід: щільність плям	відсутня або дуже нещільна	1	
37	Плід: розмір плям	ознака не визначається	0	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	дуже сильна	9	
40	Плід: форма основи	заокруглена	2	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	малий	3	
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабо виражені	1	
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	середній	5	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лініями і сіткою	4	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	щільна	7	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	відсутня або дуже низька	1	
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	товста	7	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	біле	1	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
57	Плід: консистенція м'якоті	середня	5	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	помірна	5	
60	Насінина: за довжиною	коротка	3	
61	Насінина: за шириною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
66	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
67	Час достигання	дуже ранній	1	
68	Термін зберігання плоду	тривалий	7	
69,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	наявна	9	
70,1	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси)	наявна	9	
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>) (борошнистої роси)	сприйнятливий	1	
72	Стійкість до колоній (<i>Aphis gossypii</i>)	відсутня	1	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (<i>ZYMV</i>)	відсутня	1	
74,1	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (<i>PRSV</i>)	відсутня	1	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (<i>MNSV</i>)	наявна	9	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (<i>CMV</i>)	відсутня	1	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 42. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 110. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 75. Вміст сухої речовини в плодах, % – 5, загального цукру, % – 16. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошнеста роса, роса 2,5 – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3г.

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *girautontia* Filov

Заявка № 2025148008 Назва сорту: БОЛОНЬЄЗЕ Заявник (код): 1163 Підтримувач сорту (код): 1163

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250572

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галузнення	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галузнення	помірний	5	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	мала	3	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: кількість шипів	мала	3	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте і зелене	3	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте і зелене	3	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	мале	3	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	конічно-еліптична	3	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	зелене	4	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	слабка	3	до помірної
30	Плід: переважаюча форма	еліптична	8	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5	до великого
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	середнє	5	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	округлий	1	
46	Плід: боріздки	відсутні	1	
47	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабкий	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	зелене	4	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	слабка	3	до помірної
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
54	Плід: смужки на боріздках	відсутні	1	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	наявна	9	
58	Плід: розмір основних плям	малий	3	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	помірна	5	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	відсутня	1	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	зелене	6	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	ознака не визначається	0	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремowego)	ознака не визначається	0	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	відсутнє	1	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2	
77	Насінина: розмір	малий	3	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	рудиментарне	1	
81	Насінина: забарвлення	кремове	2	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 40,5. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, днів – 50. Товарність, % – 90. Вміст сухої речовини, % – 9,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 7, бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 7, фузаріозне в'янення (*Fusarium niveum* E.Sm.) – 7, вірусні хвороби – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Зг.

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov

Заявка № 2025148005 Назва сорту: Інесса Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Підтримувач сорту (код): 840

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250555

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	сильна	7	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галуження	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галуження	дуже слабкий	1	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	від напівпрямого до горизонтального	4	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
10	Стебло: крапчастість	наявна	9	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначається	0	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: кількість шипів	середня	5	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважуюча форма	ознака не визначається	0	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	зелене	4	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	сильна	7	
30	Плід: переважуюча форма	циліндрична	9	
31.1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31.2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31.3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31.4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
32.1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32.2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32.3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
33.1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33.2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33.3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
34.1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34.2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: боріздки	відсутні	1	
47	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	дуже слабкий	1	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	зелене	4	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
54	Плід: смужки на боріздках	ознака не визначається	0	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	наявна	9	
58	Плід: розмір основних плям	малий	3	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	сильна	7	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	жовте	4	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	слабка	3	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	жовте	3	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	відсутній	1	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	слабкий	3	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	жовте	2	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	кремове	2	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 190. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 40. Товарність, % – 90. Вміст сухої речовини, % – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 7, бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 5, фузаріозне в'янення (*Fusarium niveum* E.Sm.) – 6, вірусні хвороби – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3г.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 24096004 Назва сорту: Кентуккі **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.11.2025 **Патент №** 250295

Дата пріоритету: 12.02.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250548

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	великий	7	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлоге	5	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	великий	7	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояцеподібна	5	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	частково покритий	2	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	середній	5	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Період від сівби до початку досягання, діб – 85. Лежкість, балів (1–9) – 8. Вміст вітаміну С, мг % – 67, загального цукру, % – 4,8; сухої речовини, % - 8,3. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 8, бактеріоз судинний – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 2025127001 Назва сорту: Контендер **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250573

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
10	Листок: зморшкватість	слабка	3	
11	Верхівковий листочок: розмір	середній	5	
12	Верхівковий листочок: форма	трикутна	1	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	середня	2	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно в листках	1	
15	Квітка: розмір приквітків	середній	5	
16	Квітка: забарвлення паруса	рожевувато-біле	2	
17	Квітка: забарвлення крил	рожевувато-біле	2	до фіолетового
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	довгий	7	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	помірний	5	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	яйцеподібна	2	
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5	
24	Біб : основне забарвлення	зелене	2	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	помірний	5	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	від загостреної до заокругленої	2	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	середній	5	
35	Біб: текстура поверхні	помірно шерехата	5	
36	Біб: звуження (у сухому стані)	помірне	2	
37	Насіння: маса	велика	7	
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	середній	5	
40	Насіння: форма поперечного перерізу	широкоеліптична	4	
41	Насіння: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насіння: за довжиною	середня	5	
43	Насіння: кількість кольорів	один	1	
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	бежеве	5	
45	Насіння: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насіння: вираження орнаменту	помірне	5	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	ранній	3	
49	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Паса 6	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	наявна з симптомами	2	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	відсутня	1	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність зелених бобів у фазу «лопатки», т/га – 15. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 8,2. Тривалість періоду від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 50. Тривалість плодоношення, діб – 30. Кількість бобів на рослині, шт. – 10. Вміст білка у бобах, % – 12,8; сухої речовини, % – 13,1; загального цукру, % – 3,2; вітаміну С, мг/100 г – 21,3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 6, аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Зг.

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 2025127003 Назва сорту: Максідор **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250574

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
10	Листок: зморшкуватість	слабка	3	
11	Верхівковий листочок: розмір	малий	3	до середнього
12	Верхівковий листочок: форма	від трикутної до округлої	2	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	середня	2	до довгої
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно в листках	1	
15	Квітка: розмір приквітків	середній	5	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	вузький	3	до середнього
21	Біб: за товщиною	тонкий	3	до помірної
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4	
23	Біб: відношення товщини до ширини	мале	3	
24	Біб: основне забарвлення	жовте	1	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	слабка	3	до помірної
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	відсутній або дуже слабкий	1	до слабого
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	від загостреної до заокругленої	2	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	до довгого
34	Біб: вигин дзьобика	середній	5	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабо шерехата	3	
36	Біб: звуження (у сухому стані)	помірне	2	
37	Насіння: маса	мала	3	до середньої
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	слабкий	3	
40	Насіння: форма поперечного перерізу	округла	5	
41	Насіння: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насіння: за довжиною	середня	5	
43	Насіння: кількість кольорів	один	1	
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насіння: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насіння: вираження орнаменту	помірне	5	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	ранній	3	до середнього
49	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Паса 6	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (CMNV)	наявна з симптомами	2	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	відсутня	1	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність зелених бобів у фазу «лопатки», т/га – 11,8. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 6,2. Тривалість періоду від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 50. Тривалість плодоношення, діб – 30. Кількість бобів на рослині, шт. – 10. Вміст білка у бобах, % – 15,2; сухої речовини, % – 13,1; загального цукру, % – 4,8; вітаміну С, мг/100 г – 22,3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 8, аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 5.

Географічні та зони рекомендації використання сорту: Зг.

Вид: Кріп пахучий *Anethum graveolens* L.

Заявка № 23125001 Назва сорту: Беллі **Заявник (код):** 3216 **Власник сорту (код):** 3216

Дата пріоритету: 09.06.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250584

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3-5 листків)	напівпряме	3	
3	Рослина: щільність листків	щільна	7	
4	Рослина: кількість первинних гілочок	велика	7	
5	Рослина: за висотою	середня	5	до високої
6	Стебло: головне стебло за довжиною	середнє	5	до довгої
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	середній	5	
8	Стебло: блакитний відтінок	відсутній	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
10	Стебло: восковий наліт	сильний	7	
11	Листок: форма	трикутна	1	
12	Листок: частки за щільністю	помірно щільні	5	
13	Листок: кінцеві частки за шириною	середні	5	
14	Листок: за довжиною	довгий	7	
15	Листок: за шириною	широкий	7	
16	Листок: блакитний відтінок	наявний	9	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
18	Листок: восковий наліт	помірний	5	
19	Головний зонтик: діаметр	великий	7	
20	Головний зонтик: кількість променів	велика	7	
21	Час появи головного зонтика	середній	5	
22	Час початку цвітіння	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність надземної маси, т/га – 3,2. Урожайність насіння, т/га – 1. Маса 1000 насінин, г – 1,3. Тривалість періоду вегетації, діб – 50. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Вміст в насінні ефірної олії, % – 8, в зеленій масі вітаміну С, мг/100 г – 100. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошнеста роса (*Plasmopara nivea* Schrot) – 5, септоріоз (*Puccinia petroselinii* (DC.) Lindr.) – 5, бактеріальна плямистість (*Bacillus petroselinii* Desm.) – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 2025115017 Назва сорту: Корнати Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Підтримувач сорту (код): 840

Дата пріоритету: 15.07.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250565

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	великий	7	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	відсутня	1	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	наявна	9	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 270. Вміст каротину, мг % – 3,1; сухої речовини в плоді, % – 2,6; вітаміну С, мг % – 21; загального цукру, % – 6,4. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 230. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 110. Тривалість періоду плодоношення, діб – 125. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): вірус мозаїки томата (*Tomato Mosaic tobamovirus*) – 9, вірус коричневої зморшкватості плодів томатів (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*) – 9, вертицильозне в'янення (*Verticillium albo-atrum*) – 9, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) – 8, кладоспоріоз або бура (оливкова) плямистість (*Fulvia fulva* (ex. *Cladosporium fulvum*)) – 8, сіра плямистість листків – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Зг.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 2025115015 Назва сорту: Opaгio Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Підтримувач сорту (код): 840

Дата пріоритету: 15.07.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250563

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	сильна	7	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	великий	7	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	плеската	1	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	дуже сильна	9	
26	Плід: форма поперечного перерізу	не кругляста	1	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	великий	7	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	більше шести	5	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	коричневе	6	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	коричневе	6	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	відсутня	1	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 280. Вміст каротину, мг % – 3,1; сухої речовини в плоді, % – 2,6; вітаміну С, мг % – 21; загального цукру, % – 7,1. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 260. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 110. Тривалість періоду плодоношення, діб – 125. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): вірус мозаїки томата (*Tomato Mosaic tobamovirus*) – 9, вірус коричневої зморшкватості плодів томатів (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*) – 9, вертицильозне в'янення (*Verticillium albo-atrum*) – 9, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) – 8, кладоспоріоз або бура (оливкова) плямистість (*Fulvia fulva* (ex. *Cladosporium fulvum*)) – 8, сіра плямистість листків – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Зг.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 2025115014 Назва сорту: Родіум Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Підтримувач сорту (код): 840

Дата пріоритету: 15.07.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250562

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	великий	7	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	відсутня	1	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 210. Вміст каротину, мг % – 3,1; сухої речовини в плоді, % – 2,6; вітаміну С, мг % – 21; загального цукру, % – 6,4. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 190. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 110. Тривалість періоду плодоношення, діб – 125. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): вірус мозаїки томата (*Tomato Mosaic tobamovirus*) – 9, вірус коричневої зморшкватості плодів томатів (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*) – 9, вертицильозне в'янення (*Verticillium albo-atrum*) – 9, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) – 8, кладоспоріоз або бура (оливкова) плямистість (*Fulvia fulva* (ex. *Cladosporium fulvum*)) – 8, сіра плямистість листків – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Зг.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 2025115018 Назва сорту: Сан Блас Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Підтримувач сорту (код): 840

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250566

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глясுவатість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	великий	7	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	оберненояйцеподібна	8	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глясுவатість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 190. Вміст каротину, мг % – 3,1; вміст сухої речовини в плоді, % – 2,6; вміст вітаміну С, мг % – 21; вміст загального цукру, % – 6,7. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 110. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 110. Тривалість періоду плодоношення, діб – 125. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): вірус мозаїки томата (*Tomato Mosaic tobamovirus*) – 9, вірус коричневої зморшкватості плодів томатів (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*) – 9, вертицильозне в'янення (*Verticillium albo-atrum*) – 9, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) – 8, кладоспоріоз або бура (оливкова) плямистість (*Fulvia fulva* (ex. *Cladosporium fulvum*)) – 8, сіра плямистість листків – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Зг.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 24115004 Назва сорту: СОЛВЕТ Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250614

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	великий	7	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоти (за досягання)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 70. Вміст каротину, мг % – 29; сухої речовини в плоді, % – 4,7; вітаміну С, мг % – 29; загального цукру, % – 3,4. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 180. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 48. Тривалість періоду плодоношення, діб – 85.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 2025115003 Назва сорту: Фарасан Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Підтримувач сорту (код): 840

Дата пріоритету: 27.05.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250560

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	великий	7	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	наявна	9	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 320. Вміст каротину, мг % – 3,1; сухої речовини в плоді, % – 3,6; вітаміну С, мг % – 26; загального цукру, % – 7,4. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 210. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 107. Тривалість періоду плодоношення, діб – 105. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вірус мозаїки томата (*Tomato Mosaic tobamovirus*) – 9, вірус коричневої зморшкватості плодів томатів (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*) – 9, вертицильозне в'янення (*Verticillium albo-atrum*) – 9, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) – 8, кладоспоріоз або бура (оливкова) плямистість (*Fulvia fulva* (ex. *Cladosporium fulvum*) – 6, сіра плямистість листків – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Зг.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 2025115016 Назва сорту: Формоза Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Підтримувач сорту (код): 840

Дата пріоритету: 15.07.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250564

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	великий	7	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	дуже малий	1	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	слабка	3	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	відсутня	1	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	наявна	9	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 270. Вміст каротину, мг % – 3,1; сухої речовини в плоді, % – 2,6; вітаміну С, мг % – 21; загального цукру, % – 6,4. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 230. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 110. Тривалість періоду плодоношення, діб – 125. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): вірус мозаїки томата (*Tomato Mosaic tobamovirus*) – 9, вірус коричневої зморшкватості плодів томатів (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*) – 9, вертицильозне в'янення (*Verticillium albo-atrum*) – 9, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) – 8, кладоспоріоз або бура (оливкова) плямистість (*Fulvia fulva* (ex. *Cladosporium fulvum*)) – 8, сіра плямистість листків – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Зг.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 2025115013 Назва сорту: Фрейзер Парадайз Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Підтримувач сорту (код): 840

Дата пріоритету: 15.07.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250561

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	дуже малий	1	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	дуже малий	1	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	тільки дві	1	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	відсутня	1	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 120. Вміст каротину, мг % – 3,1; сухої речовини в плоді, % – 2,6; вітаміну С, мг % – 21; загального цукру, % – 8,2. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 25. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 110. Тривалість періоду плодоношення, діб – 125. Стійкість проти ураження хворобами, балів (1–9): вірус мозаїки томата (*Tomato Mosaic tobamovirus*) – 9, вірус коричневої зморшкватості плодів томатів (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*) – 9, вертициліозне в'янення (*Verticillium albo-atrum*) – 9, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) – 8, кладоспоріоз або бура (оливкова) плямистість (*Fulvia fulva* (ex. *Cladosporium fulvum*)) – 8, сіра плямистість листків – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Зг.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 2025115019 Назва сорту: Шівіос Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Підтримувач сорту (код): 840

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250567

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глясுவатість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	тільки дві	1	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глясுவатість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 180. Вміст каротину, мг % – 3,1; сухої речовини в плоді, % – 2,6; вітаміну С, мг % – 21; загального цукру, % – 6,5. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 45. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 110. Тривалість періоду плодоношення, діб – 125. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): вірус мозаїки томатів (*Tomato Mosaic tobamovirus*) – 9, вірус коричневої зморшкватості плодів томатів (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*) – 9, вертицильозне в'янення (*Verticillium albo-atrum*) – 9, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) – 9, кладоспоріоз або бура (оливкова) плямистість (*Fulvia fulva* (ex. *Cladosporium fulvum*)) – 8, сіра плямистість листків – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Зг.

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata*

Заявка № 2025421003 Назва сорту: Металія Заявник (код): 753 Власник сорту (код): 753

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250633

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	до великого
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	сильний	3	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	дуже сильне	9	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	малий	3	до середнього
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	округла	3	
14	Листок: за товщиною	товстий	7	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглості	напівпряме	3	до горизонтального
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	поперечно широко еліптична	5	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	сірувато-зелене	3	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глясуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	наявні	9	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	середня	5	
30	Листок: щільність надрізаності краю	дуже нещільна	1	
31	Листок: за типом надрізаності	двозубчастий	4	
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне галуження	відсутнє або дуже слабе	1	
34	Час збиральної стиглості	пізній	7	
35	Час початку стрілкування	дуже пізній	9	
36	Рослина: за висотою (під час квітання)	низька	3	
37	Рослина: фасціація (під час квітання)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітання)	ознака не визначається	0	
39	Стойкість проти збудника борошнистої роси <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стойкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	відсутня	1	
41	Стойкість проти попелиць <i>Nasonovii arabis nigri</i> (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стойкість проти збудника фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	наявна	9	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	ознака не визначалась	0	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	увігнутий	1	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначалась	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоти	ознака не визначається	0	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 3,5. Середня маса головки, г – 500. Щільність головки, бал (1–9) – 7. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 55. Група стиглості: пізня – 7. Вміст у головках: сухої речовини, % – 5,5; цукрів, % – 1,4; вітаміну С, мг % – 18,5. Холодостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhanutz) – 6, чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 7, септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 7, вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 6. Стійкість до пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): попелиця – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia* Lam.

Заявка № 23546002 Назва сорту: Одона **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Володілець патенту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.11.2025 **Патент № 250297**

Дата пріоритету: 13.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250550

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	середній	2	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	слабке	3	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	нешільна	3	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	малий	3	
12	Лише для сортів маслянистого типу в теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	вузько еліптична	1	
14	Листок: за товщиною	товстий	7	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральної стиглості	пряме	1	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	обернено-ланцетна	12	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	зелене	1	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	помірна	5	
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	наявна	9	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	дуже мілка	1	
30	Листок: щільність надрізаності краю	нешільна	3	
31	Листок: за типом надрізаності	городчастий	1	
32	Листок: жилкування	напіввіялоподібне	3	
33	Пазушне галузнення	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	середній	5	
35	Час початку стрілкування	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (під час квітання)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час квітання)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітання)	ознака не визначається	0	
39	Стойкість проти збудника борошнистої роси <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	ознака не визначалась	0	
40	Стойкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	ознака не визначалась	0	
41	Стойкість проти попелиць <i>Nasonovii arabis nigri</i> (Nr). Біотин Nr: 0	ознака не визначалась	0	
42	Стойкість проти збудника фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	ознака не визначалась	0	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	ознака не визначалась	0	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	опуклий	5	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначається	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоти	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 23,2. Середня маса плоду, г – 517. Щільність головки, балів – 5. Тривалість періоду до достигання, дів – 54. Лежкість, % – 61. Стойкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 8, борошниста роса – 7, антракноз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia* Lam.

Заявка № 2025546003 Назва сорту: Ольгада **Заявник (код):** 753 **Власник сорту (код):** 753

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250634

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1	до напівпрямого
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	великий	7	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	сильний	3	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	середнє	5	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	щільна	7	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	середній	5	до великого
12	Лише для сортів маслянистого типу в теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	вузько еліптична	1	
14	Листок: за товщиною	середній	5	до товстого
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглістю	пряме	1	до напівпрямого
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	еліптична	2	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	зелене	1	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	відсутня	1	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листок: щільність надрізаності краю	ознака не визначається	0	
31	Листок: за типом надрізаності	ознака не визначається	0	
32	Листок: жилкування	нев'ялоподібне	1	
33	Пазушне галуження	сильне	7	
34	Час збиральної стиглості	пізній	7	
35	Час початку стрілкування	дуже пізній	9	
36	Рослина: за висотою (під час квітування)	ознака не визначалась	0	
37	Рослина: фасціація (під час квітування)	ознака не визначалась	0	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітування)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиць <i>Nasonovii arabis nigri</i> (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	наявна	9	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	ознака не визначалась	0	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	увігнутий	1	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначається	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 3,1. Середня маса плоду, г – 550. Щільність головки, балів – 7. Тривалість періоду до досягання, діб – 50. Лежкість, % – 85. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 7, борошниста роса – 5, антракноз – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 24106004 Назва сорту: Редеско **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250570

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	напівпряме	3	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулінка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулінка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулінка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулінка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина / цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина / цибулінка: шийка за шириною	середня	5	
18	Цибулина / цибулінка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина / цибулінка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина / цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина / цибулінка: суха шкірка за товщиною	тонка	3	
23	Цибулина / цибулінка: основне забарвлення сухої шкірки	червоне	7	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина / цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	сильна	7	
25	Цибулина / цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	пурпуровий	8	
26	Цибулина / цибулінка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3	
27	Цибулина / цибулінка: кількість точок зростання на кг	дуже мала	1	
28	Цибулина / цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5	до високої
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ранній	3	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ранній	3	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	пізній	7	
36	Чоловіча стерильність	висока	3	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 60. Товарна врожайність, т/га – 57. Тривалість вегетації рослин, діб – 150. Маса цибулини, г – 200. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 32, сухої речовини, % – 11, загального цукру % – 15. Лежкість, діб – 210. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 8, несправжня борошніста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 7. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

*Ліщина звичайна
Суниця садова
Яблуня домашня*



Вид: Ліщина звичайна *Corylus avellana* L.

Заявка № 2025543011 Назва сорту: ПолліО Заявник (код): 2538 Власник сорту (код): 2538

Дата пріоритету: 14.08.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250557

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	5	
3	Рослина: щільність розміщення гілок	помірна	5	
4	Рослина: тенденція до утворення кореневих паростків	слабка	3	до помірної
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: опушення	слабке	3	
7	Однорічний пагін: щільність (кількість) сочевичок	помірна	5	
8	Вегетативна брунька: форма	яйцеподібна	2	
9	Вегетативна брунька: забарвлення	зелене	1	
10	Час розпускання вегетативних бруньок	від середнього до пізнього	6	
11	Чоловіче суцвіття: за довжиною	коротке	3	
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	зелене	1	
13	Приймочка: забарвлення	рожеве	1	
14	Час цвітіння чоловічих квіток	пізній	7	
15	Час цвітіння жіночих квіток	від середнього до пізнього	6	
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	одночасно	2	
17	Листкова пластинка: за формою	округла	3	
18	Листкова пластинка: за розміром	середня	5	
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	Черешок: за довжиною	середній	5	
21	Черешок: опушення	слабке	3	
22	Обгортка: стиснутість	відсутня	1	
23	Обгортка: довжина порівняно з довжиною плоду	однакова	5	до довшої
24	Обгортка: зазубленість	помірна	5	
25	Обгортка: зубчастість зазублення	помірна	5	
26	Обгортка: основа за товщиною	товста	7	
27	Обгортка: опушення	наявне	9	
28	Обгортка: щільність опушення	нещільна	3	
29	Обгортка: зрощення покривних листків	відсутнє	1	
30	Супліддя: переважаюча кількість горіхів	три або чотири	4	
31	Горіх: розмір	малий	3	до середнього
32	Горіх: форма	куляста	1	
33	Плід: форма в поперечному перерізі	округла	2	
34	Горіх: забарвлення	світло-коричневе	2	
35	Горіх: кількість смужок на шаралупі	мала	3	
36	Плід: форма верхівки	вузькозагострена	1	
37	Горіх: верхівка	слабко помітна	3	
38	Горіх: розмір рубчика маточки	малий	3	
39	Горіх: опушення верхівки	слабке	3	до помірного
40	Горіх: розмір базального рубчика	малий	3	
41	Горіх: вигин базального рубчика	плосканий	2	
42	Плід: подвоєне ядро	відсутнє	1	
43	Ядро: розмір	середній	5	
44	Ядро: форма	куляста	1	
45	Ядро: форма у поперечному перерізі	округла	2	
46	Ядро: форма верхівки	тупа	2	
47	Ядро: форма основи	плеската	3	
48	Ядро: бічний жолобок	відсутній	1	
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	помірно закорковіла	5	
50	Ядро: внутрішня порожнина	середня	5	
51	Час досягання	від раннього до середнього	4	
52	Горіх: зростання обгортки з плодом (після обпадання)	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	середній	5	до великого
54	Час обпадання листків	ранній	3	
55	Ядро: наявність клітковини	помірне	5	до сильного

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 2,05. Середній урожай з куца, кг – 7,6. Середня маса плоду, г – 2,9. Легкість видалення ядра, бал – 9. Виповненість ядра горіха, бал (1–9) – 8. Вихід ядра, % – 47,0. Вміст жиру, % – 63,0; білка, % – 16,0; вуглеводів, % – 18,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошніста роса – 6, чорна плямистість – 6, плодова гниль – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщі – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.

Заявка № 2025294003 Назва сорту: Ёнка **Заявник (код):** 2885 **Власник сорту (код):** 2885

Володілець патенту (код): 2885

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.11.2025 **Патент №** 250373

Дата пріоритету: 26.02.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.09.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250429

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: щільність розміщення листків	середня	5	
3	Рослина: сила росту	середня	5	
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	середня	5	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	помірне	5	
7	Вуса: щільність опушення	середня	5	
8	Листок: розмір	великий	7	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	4	
10	Листок: пухирчатість	сильна	3	
11	Листок: глянсуватість	помірна	2	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма краю	зубчаста	1	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	до довгого
18	Черешок: положення волосків	спрямоване догори	1	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	сильне	7	
20	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
21	Квітконіжка: положення волосків	спрямоване догори	1	
22	Квітка: діаметр	середній	5	до великого
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	торкаються	2	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	однаковий	2	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	однакова	3	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	великий	7	
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	відсутня або дуже мала	1	до малої
32	Плід: забарвлення	темно-червоне	6	
33	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірний	2	
34	Плід: глянсуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	вузька	3	до середньої
37	Плід: положення сім'янок	нарівні з поверхнею	2	
38	Плід: положення чашечки	на рівні плоду	2	
39	Плід: положення чашолистків	горизонтальне	2	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	дещо більший	4	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	сильне	7	
42	Плід: твердість	помірна	5	
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	червоне	5	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	середня	2	
46	Час початку цвітіння	середній	5	до пізнього
47	Час початку достигання плодів	ранній	3	до середнього
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 2025263002 Назва сорту: ІНОГО **Заявник (код):** 3403 **Власник сорту (код):** 3403

Володілець патенту (код): 3403

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.11.2025 **Патент № 250313**

Дата пріоритету: 28.02.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.09.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250430

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	до сильної
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	похилий	3	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	до товстого
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	короткі	3	до середніх
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричневе	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване назвні	2	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	до довгої
12	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	до середньої
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	до великого
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 2	4	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	до середньої
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	темно-рожеве	4	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	вище	3	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	помірне	5	
24	Плід: розмір	великий	7	
25	Плід: за висотою	високий	7	
26	Плід: діаметр	середній	5	до великого
27	Плід: відношення висота / діаметр	середнє	5	до великого
28	Плід: основна форма	циліндрична	4	
29	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	відсутні або слабкі	1	
31	Плід: розмір чашечки	великий	7	
32	Плід: чашолисток за довжиною	довгий	7	
33	Плід: наліт на шкірці	відсутній або слабкий	1	
34	Плід: маслянистість шкірки	відсутня або слабка	1	
35	Плід: основне забарвлення	жовте	3	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	відсутня або дуже мала	1	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	оранжево-червоний	1	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	слабка	3	від дуже слабкої до слабкої
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем і крапчастий	6	
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	середня	2	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	до середньої
45	Плід: розмір сочевичок	середній	5	до великого
46	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7	до дуже довгої
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	до глибокої
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	до широкої
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	широке	7	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	закриті або ледь відкриті	1	
55	Час початку цвітіння	ранній	3	
56	Час збирання врожаю	пізній	7	
57	Час споживчої стиглості	від пізнього до дуже пізнього	8	

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 2025263003 **Назва сорту:** ІНОБІ **Заявник (код):** 3412 3403 **Власник сорту (код):** 3412 3403

Володілець патенту (код): 3412 3403

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.11.2025 **Патент №** 250314

Дата пріоритету: 28.03.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.09.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250431

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	розлогий	2	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричневе	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	1	до середньої
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване догори	1	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	до довгої
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	короткий	3	до середнього
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	велика	7	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	темно-рожеве	4	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	малий	3	до середнього
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	помірне	5	до сильного
24	Плід: розмір	середній	5	
25	Плід: за висотою	середній	5	до високого
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	велике	7	
28	Плід: основна форма	яйцеподібна	3	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	до довгого
33	Плід: наліт на шкірці	відсутній або слабкий	1	
34	Плід: маслянистість шкірки	відсутня або слабка	1	
35	Плід: основне забарвлення	жовте	3	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	велика	7	до дуже великої
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	червоний	3	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	сильна	7	
39	Плід: характер покривного забарвлення	суцільний рум'янець із слабо визначеними смугами	2	
40	Плід: смуги за шириною	вузькі	3	до середніх
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	середня	5	
45	Плід: розмір сочевочок	середній	5	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	дуже довга	9	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	тонка	3	до середньої
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	вузьке	3	до середнього
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	середній	5	до пізнього
57	Час споживчої стиглості	від середнього до пізнього	6	

ДЕКОРАТИВНІ ТА ЛІКАРСЬКІ

Тютюн справжній



Вид: Тютюн справжній *Nicotiana tabacum* L.

Заявка № 94019008 **Назва сорту:** Тернопільський 14 **Заявник (код):** 396 **Власник сорту (код):** 3232

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.02.1998

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04985

Колір розсади – світло-зелений. Характер росту рослин на перших фазах – проміжний. Форма рослин – циліндрична. Форма суцвіття – щиткоподібна. Листок – сидячий. Прилистки – не зігнуті. Форма пластинки середнього листка – овально-новитягнута. Форма пластинки листка – середньозагострена. Поверхня листка гладенька, край рівний, колір жовто-зелений. Забарвлення квітки – рожеве.

**Результати досліджень, які надані безпосередньо заявником
відповідно до частини 3 статті 12 Закону України
«Про охорону прав на сорти рослин»**

Буряк цукровий

Картопля

Пшениця м'яка (озима)

Смородина чорна

Ячмінь звичайний (ярий)



Описи сортів рослин та показники господарської придатності

Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 24069002 Назва сорту: АГАМА СМАРТ **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240306

Орган, що провів випробовування: CREA (Italy)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
6	Рослина: тип розетки	від розлогої до напівпохилої	6	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	від середньої до широкої	6	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	від помірно гофрованої до сильно гофрованої	6	
15	Листкова пластинка: блиск	від слабкого до помірного	4	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	85
2	Тривалість періоду від повних сходів до початку досягання, діб	205
3	Середня маса товарного коренеплоду, г	800
4	Цукристість, %	18,5
5	Вміст розчинної золи, %	0,24
6	Зануреність коненеплодів у ґрунт, %	92
7	Гіллястість коренеплодів, %	7
8	Дуплистість коренеплодів, %	0
9	Цвітушність, %	0
10	Лежкість коренеплодів, %	92
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	6
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): церкоспороз	9
13	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	5
14	Стійкість до хвороб, балів (1–9): ризоманія	9
15	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): бурякова листкова попелиця	5
16	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): коренева бурякова попелиця	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 24069021 Назва сорту: АСПЕН **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.02.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250126

Орган, що провів випробовування: Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal, Budapest (Національне управління безпеки продуктів харчування, Будапешт)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	4	
3	Урожайність коренеплодів	середня	5	
4	Вміст цукру	середній	5	
5	Вміст білого цукру	середній	5	
6	Урожайність білого цукру	середній	5	
7	Вміст калію	низький	2	
8	Вміст натрію	середній	5	
9	Вміст амінокислот	середній	5	
10	Листок: положення	проміжне	5	
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість країв	середня	5	
13	Коренеплід: положення в ґрунті	середнє	5	
14	Стійкість до ризоманії	присутня	9	
15	Схильність до церкоспорозу	середня	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	85
2	Тривалість періоду від повних сходів до початку збирання, днів	210
3	Середня маса товарного коренеплоду, г	850
4	Цукристість, %	18,0
5	Вміст розчинної золи, %	0,23
6	Зануреність коренеплодів у ґрунт, %	89
7	Гіллястість коренеплодів, %	9
8	Дуплистість коренеплодів, %	0
9	Цвітушність, %	0
10	Лежкість коренеплодів, %	93
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	5
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): церкоспороз	9
13	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	6
14	Стійкість до хвороб, балів (1–9): ризоманія	9
15	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): бурякова листкова попелиця	6
16	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): коренева бурякова попелиця	6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 24069001 Назва сорту: ВАКІТА СМАРТ **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240305

Орган, що провів випробування: CREA (Italy)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
6	Рослина: тип розетки	від розлогої до напівпохилої	6	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	від вузької до середньої	4	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	від слабкої до помірної	4	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	від слабо гофрованої до помірно гофрованої	4	
15	Листкова пластинка: блиск	від слабкого до помірного	4	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	90
2	Тривалість періоду від повних сходів до початку достигання, діб	205
3	Середня маса товарного коренеплоду, г	830
4	Цукристість, %	17,5
5	Вміст розчинної золи, %	0,21
6	Зануреність коненеплодів у ґрунт, %	80
7	Гіллястість коренеплодів, %	6
8	Дуплистість коренеплодів, %	0
9	Цвітушність, %	0
10	Лежкість коренеплодів, %	95
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	6
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): церкоспоров	6
13	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	6
14	Стійкість до хвороб, балів (1–9): ризоманія	9
15	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): бурякова листкова попелиця	4
16	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): коренева бурякова попелиця	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 2025069002 Назва сорту: ГАЛАГО **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.09.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250390

Орган, що провів випробовування: Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), PL

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	від середнього до довгого	6	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	від слабкої до помірної	4	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	від слабо гофрованої до помірно гофрованої	4	
15	Листкова пластинка: блиск	від слабкого до помірного	4	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	90
2	Тривалість періоду від повних сходів до початку досягання, д/б	210
3	Середня маса товарного коренеплоду, г	900
4	Цукристість, %	17,5
5	Вміст розчинної золи, %	0,21
6	Зануреність коренеплодів у ґрунт, %	88
7	Гіллястість коренеплодів, %	9
8	Дуплистість коренеплодів, %	0
9	Цвітуність, %	0
10	Лежкість коренеплодів, %	96
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	6
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): церкоспороз	8
13	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	7
14	Стійкість до хвороб, балів (1–9): ризоманія	9
15	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): бурякова листкова попелиця	6
16	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): коренева бурякова попелиця	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 24069023 Назва сорту: КАПРА СМАРТ **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.02.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250128

Орган, що провів випробування: CREA (Italy)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
6	Рослина: тип розетки	від розлогої до напівпохилої	6	
10	Листкова пластинка: за довжиною	від короткої до середньої	4	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	від слабо гофрованої до помірно гофрованої	4	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
18	Черешок: за шириною	від вузького до середнього	4	
24	Коренеплід: за довжиною	від короткого до середнього	4	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	від повністю заглибленого до заглибленого на 3/4	4	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	85
2	Тривалість періоду від повних сходів до початку досягання, д/б	210
3	Середня маса товарного коренеплоду, г	850
4	Цукристість, %	18,5
5	Вміст розчинної золи, %	0,20
6	Зануреність коренеплодів у ґрунт, %	95
7	Гіллястість коренеплодів, %	7
8	Дуплистість коренеплодів, %	0
9	Цвітущість, %	0
10	Лежкість коренеплодів, %	96
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	6
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): церкоспороз	6
13	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	6
14	Стійкість до хвороб, балів (1–9): ризоманія	9
15	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): бурякова листкова попелиця	5
16	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): коренева бурякова попелиця	4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 24069005 Назва сорту: МАНАТИ СМАРТ **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240286

Орган, що провів випробовування: CREA (Italy)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	90
2	Тривалість періоду від повних сходів до початку досягання, діб	210
3	Середня маса товарного коренеплоду, г	850
4	Цукристість, %	18,0
5	Вміст розчинної золи, %	0,22
6	Зануреність коренеплодів у ґрунт, %	91
7	Гіллястість коренеплодів, %	7
8	Дуплистість коренеплодів, %	0
9	Цвітушність, %	0
10	Лежкість коренеплодів, %	95
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	9
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): церкоспороз	6
13	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	6
14	Стійкість до хвороб, балів (1–9): ризоманія	9
15	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): бурякова листкова попелиця	4
16	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): коренева бурякова попелиця	4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 24069003 Назва сорту: МАРСУПІАЛ СМАРТ Заявник (код): 1628 Власник сорту (код): 1628

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240287

Орган, що провів випробування: CREA (Italy)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	від короткої до середньої	4	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	від слабкої до помірної	4	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	від слабко гафрованої до помірно гафрованої	4	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
18	Черешок: за шириною	від вузького до середнього	4	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	від повністю заглибленого до заглибленого на 3/4	4	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	80
2	Тривалість періоду від повних сходів до початку досягання, діб	210
3	Середня маса товарного коренеплоду, г	750
4	Цукристість, %	18,5
5	Вміст розчинної золи, %	0,23
6	Зануреність коненеплодів у ґрунт, %	90
7	Гіллястість коренеплодів, %	8
8	Дуплистість коренеплодів, %	0
9	Цвітущість, %	0
10	Лежкість коренеплодів, %	94
11	Стійкість до хвороб, балів (1-9): борошниста роса	7
12	Стійкість до хвороб, балів (1-9): церкоспороз	9
13	Стійкість до хвороб, балів (1-9): кореневі гнилі	6
14	Стійкість до хвороб, балів (1-9): ризоманія	9
15	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1-9): бурякова листкова попелиця	3
16	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1-9): коренева бурякова попелиця	4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 2025088022 Назва сорту: Пріська Заявник (код): 2553 Власник сорту (код): 1046

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.03.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250243

Орган, що провів випробовування: BUNDESSORTENAMT, Germany

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	від слабкого до помірного	4	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	від помірної до сильної	6	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	від помірного до сильного	6	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	від дуже коротких до коротких	2	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	від прямого до напіврозлогого	4	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	від закритого до проміжного	2	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	від світлого до помірного	4	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	від вузьких до середніх	4	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
29	Рослина: рясність цвітіння	від обрідного до помірного	4	
30	Суцвіття: розмір	від малого до середнього	4	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	від слабкого до помірного	4	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	від слабкої до помірної	4	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні	відсутнє або мале внутрішнього боку	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7	
36	Рослина: час досягання	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	від м'яких до середніх	4	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	від дуже слабкого до слабкого	2	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	42,0
2	Середня маса товарної бульби, г	94
3	Тривалість періоду вегетації, днів	105
4	Посухостійкість, бал (1–9)	8
5	Лежкість, %	84
6	Стойкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофтороз (<i>Phytophthora infestans</i> D.B.)	8
7	Стойкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вірусні захворювання	8
8	Стойкість проти збудників хвороб, бал (1–9): рак (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb) Perc.)	7
9	Стойкість проти шкідників, бал (1–9): колорадський жук (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say)	6
10	Стойкість проти шкідників, бал (1–9): картопляна нематода (<i>Nematoda</i>)	7
11	Вміст сухої речовини, %	22,0
12	Вміст крохмалю, %	14,1
13	Напрямок використання	столовий
14	Товарність, %	81
15	Вміст редукованих цукрів, %	0,15

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 2025012027 Назва сорту: Вольтаж Заявник (код): 2486 Власник сорту (код): 2486

Дата пріоритету: 05.06.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.09.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250427

Орган, що провів випробування: TystofteFonden, Denmark

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	від дуже слабкої до слабкої	2	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	ознака не визначалась	0	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від середнього до пізнього	6	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: вивпнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	відсутнє або слабко вивпнене	1	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	від нещільного до середнього	4	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	від слабкого до помірного	4	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	від вузького до середнього	4	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	сильне	7	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,7
2	Висота рослини, см	85
3	Веgetаційний період, днів	248
4	Маса 1000 зерен, г	41
5	Зимостійкість, балів (1–9)	6
6	Критична температура вимерзання, °C	-19
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	9
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
9	Натура зерна, г/л	73,8
10	Вміст білка, %	11,2
11	Вміст сирової клейковини, %	23
12	Показник альвеографа (W), о. а.	195
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	390
14	Напрямок використання	зерновий
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	8
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	8
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа	6
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	7
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	6
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	7
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	7
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	7
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

Заявка № 24297001 Назва сорту: ГОФЕРТ **Заявник (код):** 2835 **Власник сорту (код):** 2835

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240710

Орган, що провів випробовування: Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), PL

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	середня	5	
8	Вегетативна брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5	
9	Вегетативна брунька: наліт	слабкий	3	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	від слабкого до помірного	4	
14	Листкова пластинка: основа	помірно відкрита	2	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	середня	5	
16	Листкова пластинка: глянуватість (верхній бік)	помірна	2	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	помірне	5	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівку	одне або два	1	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	слабке	3	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	слабке	3	
25	Плід: розмір	від середнього до великого	6	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	середній	5	
29	Час початку цвітіння	ранній	3	
30	Час початку збирання плодів	середній	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність, т/га	9,2
2	Середній урожай з куща, кг	1,85
3	Середня маса ягоди, г	1,08
4	Вміст вітаміну С, мг /100 г	217,0
5	Вміст загального цукру, %	16,5
6	Вміст пектинових речовин, %	1,5
7	Вміст сухих розчинних речовин, %	21,5
8	Загальна кислотність, %	2,84
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): біла плямистість	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа	8
13	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщ смородиновий	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця	7
15	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): склівка	7
16	Підмерзання бруньок, бал (1–9)	1
17	Зимостійкість, балів (1–9)	9
18	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
19	Група стиглості	сс
20	Напрямок використання	ун
21	Схема садіння, м	3,0 x 0,6; 3,5 x 1,0
22	Дегустаційна оцінка, балів (1–9)	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

Заявка № 24297002 Назва сорту: ОРЕС Заявник (код): 2835 Власник сорту (код): 2835

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240711

Орган, що провів випробування: Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), PL

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	від середньої до великої	6	
8	Вегетативна брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5	
9	Вегетативна брунька: наліт	помірний	5	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	помірне	5	
14	Листкова пластинка: основа	закрита	4	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	середня	5	
16	Листкова пластинка: глянсуватість (верхній бік)	від слабкої до помірної	4	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	помірне	5	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівку	одне або два	1	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	слабке	3	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Плід: розмір	від середнього до великого	6	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	середній	5	
29	Час початку цвітіння	середній	5	
30	Час початку збирання плодів	від середнього до пізнього	6	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність, т/га	7,0
2	Середній урожай з куща, кг	1,4
3	Середня маса ягоди, г	0,97
4	Вміст вітаміну С, мг /100 г	227,0
5	Вміст загального цукру, %	13,2
6	Вміст пектинових речовин, %	1,5
7	Вміст сухих розчинних речовин, %	19,2
8	Загальна кислотність, %	3,72
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): біла плямистість	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа	8
13	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщ смородиновий	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця	7
15	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): склівка	7
16	Підмерзання бруньок, бал (1–9)	1
17	Зимостійкість, балів (1–9)	9
18	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
19	Група стиглості	сс
20	Напрямок використання	ун
21	Схема садіння, м	3,0 x 0,6; 3,5 x 1,0
22	Дегустаційна оцінка, балів (1–9)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

Заявка № 24297004 Назва сорту: ПОЛБЕН **Заявник (код):** 2835 **Власник сорту (код):** 2835

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240713

Орган, що провів випробовування: Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), PL

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	2	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	середня	5	
4	Однорічний пагін: забарвлення	жовто-коричневе	1	
5	Вегетативна брунька: положення відносно пагона	помірно відхилене	2	
6	Вегетативна брунька: за довжиною	середня	5	
7	Вегетативна брунька: форма верхівки	широкозагострена	2	
8	Вегетативна брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Вегетативна брунька: наліт	слабкий	3	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	від слабкого до помірного	4	
11	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
12	Листкова пластинка: за шириною	від вузької до середньої	4	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	від дуже малого до малого	2	
14	Листкова пластинка: основа	дуже відкрита	1	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	сильна	7	
16	Листкова пластинка: глянуватість (верхній бік)	сильна	3	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівку	одне або два	1	
19	Суцвіття: за довжиною	середнє	2	
20	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	слабке	3	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	сильне	7	
23	Суцвіття: тип	гроно	2	
24	Суцвіття: коливання у розмірах ягід	середнє	2	
25	Плід: розмір	великий	7	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
27	Плід: глянуватість	сильна	7	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	ранній	3	
29	Час початку цвітіння	від раннього до середнього	4	
30	Час початку збирання плодів	середній	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність, т/га	9,5
2	Середній урожай з куща, кг	1,89
3	Середня маса ягоди, г	1,26
4	Вміст вітаміну С, мг/100 г	117,0
5	Вміст загального цукру, %	14,0
6	Вміст пектинових речовин, %	1,5
7	Вміст сухих розчинних речовин, %	18,5
8	Загальна кислотність, %	3,17
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): біла плямистість	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа	8
13	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщ смородиновий	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця	7
15	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): склівка	7
16	Підмерзання бруньок, бал (1–9)	1
17	Зимостійкість, балів (1–9)	9
18	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
19	Група стиглості	сс
20	Напрямок використання	ун
21	Схема садіння, м	3,0 x 0,6; 3,5 x 1,0
22	Дегустаційна оцінка, балів (1–9)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

Заявка № 24297005 Назва сорту: ТІБЕН Заявник (код): 2835 Власник сорту (код): 2835

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240714

Орган, що провів випробування: Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), PL

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	середня	5	
8	Вегетативна брунька: антоціанове забарвлення	дуже сильне	9	
9	Вегетативна брунька: наліт	слабкий	3	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	помірне	5	
14	Листкова пластинка: основа	дуже відкрита	1	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	середня	5	
16	Листкова пластинка: глянуватість (верхній бік)	помірна	2	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	сильне	7	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівку	одне або два	1	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	слабке	3	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Плід: розмір	великий	7	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	середній	5	
29	Час початку цвітіння	середній	5	
30	Час початку збирання плодів	пізній	7	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність, т/га	11,4
2	Середній урожай з куща, кг	2,28
3	Середня маса ягоди, г	1,1
4	Вміст вітаміну С, мг/100 г	132,0
5	Вміст загального цукру, %	15,9
6	Вміст пектинових речовин, %	1,5
7	Вміст сухих розчинних речовин, %	20,4
8	Загальна кислотність, %	3,94
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): біла плямистість	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса	9
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа	8
13	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщ смородиновий	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця	7
15	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): склівка	7
16	Підмерзання бруньок, бал (1–9)	1
17	Зимостійкість, балів (1–9)	9
18	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
19	Напрямок використання	ун
20	Схема садіння, м	3,0 x 0,6; 3,5 x 1,0
21	Дегустаційна оцінка, балів (1–9)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

Заявка № 24297003 Назва сорту: ТІСЕЛ **Заявник (код):** 2835 **Власник сорту (код):** 2835

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240712

Орган, що провів випробовування: Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), PL

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	середня	5	
8	Вегетативна брунька: антоціанове забарвлення	сильне	7	
9	Вегетативна брунька: наліт	слабкий	3	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	сильне	7	
14	Листкова пластинка: основа	дуже відкрита	1	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	слабка	3	
16	Листкова пластинка: глянуватість (верхній бік)	помірне	2	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	помірне	5	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівку	одне або два	1	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Плід: розмір	великий	7	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	ранній	3	
29	Час початку цвітіння	ранній	3	
30	Час початку збирання плодів	ранній	3	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність, т/га	9,6
2	Середній урожай з куща, кг	1,91
3	Середня маса ягоди, г	1,04
4	Вміст вітаміну С, мг /100 г	267,0
5	Вміст загального цукру, %	17,2
6	Вміст пектинових речовин, %	1,5
7	Вміст сухих розчинних речовин, %	22,8
8	Загальна кислотність, %	3,11
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): біла плямистість	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса	9
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа	8
13	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщ смородиновий	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця	7
15	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): склівка	7
16	Підмерзання бруньок, бал (1–9)	1
17	Зимостійкість, балів (1–9)	9
18	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
19	Група стиглості	рс
20	Напрямок використання	ун
21	Схема садіння, м	3,0 x 0,6; 3,5 x 1,0
22	Дегустаційна оцінка, балів (1–9)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 24020006 Назва сорту:** НОС Гамбіт **Заявник (код):** 2486 **Власник сорту (код):** 2486**Дата пріоритету:** 12.12.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250419**Орган, що провів випробовування:** Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), PL**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від раннього до середнього	4	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
10	Колос: восковий наліт	від слабкого до середнього	4	
11	Колос: положення в просторі	від прямого до напівпрямого	2	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	від короткого до середнього	4	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	від нещільного до середнього	4	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	від середнього до довгого	5	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	від середнього до сильного	6	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундментарний	1	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,0
2	Тривалість періоду вегетації, діб	120
3	Висота рослини, см	75
4	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	2
5	Стійкість до обсіпання, балів (1–9)	1
6	Вміст білка, %	10
7	Маса 1000 зерен, г	53
8	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошніста роса	1
9	Стійкість до хвороб, балів (1–9): гельмінтоспоріоз	2
10	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	9
11	Вміст крохмалю, %	1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості Other notifications

Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин Other notifications of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Робота Методичної комісії

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин провела засідання **26 листопада 2025 року**, в якому взяли участь: Присяжнюк Л. М. – к. с.-г. н., с. д., Лікар С. П., Байдюк Т. О. – к. с.-г. н., Бобось І. М. – к. с.-г. н., доцент, Бугайов В. Д. – к. с.-г. н., Григор'єв В. М. – к. с.-г. н., с. н. с., Гринів С. М. – к. с.-г. н., с. н. с., Захарчук О. В. – д. е. н., професор, Король Л. В. – к. с.-г. н., Костенко Н. П. – к. с.-г. н., Михайлик С. М. – к. с.-г. н., Рубцова О. Л. – д. б. н., Хоменко Т. М. – к. с.-г. н., доцент, Цизь О. М. – к. с.-г. н., доцент.

Запрошені: Ільченко Я. В., Матус В. М., Носуля А. М.

за Порядком денним:

1. Розгляд проєкту Методики визначення відповідності сортів соняшнику однорічного (*Helianthus annuus* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

2. Розгляд проєкту Методики визначення відповідності сортів ріпаку (*Brassica napus* L. *oleifera*) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

3. Розгляд Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні для ботанічного таксону актинідія делікатесна (*Actinidia deliciosa* (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson) плодового напрямку використання.

4. Різне.

Схвалено:

1) Методику визначення відповідності сортів соняшнику однорічного (*Helianthus annuus* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

2) Методику визначення відповідності сортів ріпаку (*Brassica napus* L. *oleifera*) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

3) Показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні для ботанічного таксону актинідія делікатесна (*Actinidia deliciosa* (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson) плодового напрямку використання.

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту

List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Address
216	ДНУ «Донська дослідна станція ім. Л.А. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур» DNU «Donska doslidna stantsiia im. L.A. Zhdanova Vserosiiskoho naukovo-doslidnoho instytutu oliinykh kultur»	П/в Суходольськ, п. Опорний, Азовський р-н, Ростовська обл., Росія, 346754 P/v Sukhodolsk, p. Oporny, Azovsky r-n, Rostovska obl., Rosiia, 346754
311	Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук Instytut zernovoho hospodarstva Ukrainської akademii ahrarnykh nauk	49027, вул. Дзержинського, 14, м. Дніпро 49027, vul. Dzerzhynskoho, 14, m. Dnipro
329	Інститут олійних культур Української академії аграрних наук Instytut oliinykh kultur Ukrainської akademii ahrarnykh nauk	70417, вул. Весняна, 1, с. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл. 70417, vul. Vesniiana, 1, s. Soniachne, Zaporizkyi r-n, Zaporizka obl.
344	Інститут садівництва Української академії аграрних наук Instytut sadivnytstva Ukrainської akademii ahrarnykh nauk	03027, м. Київ, вул. Садова 6, смт Новосілки 03027, m. Kyiv, vul. Sadova 6, smt Novosilky
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Садово-Ботанічна, 1, м. Київ, 01014 vul. Sadovo-Botanichna, 1, m. Kyiv, 01014
372	Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук Lvivska doslidna stantsiia sadivnytstva Instytutu sadivnytstva Ukrainської akademii ahrarnykh nauk	с. Неслухів, Кам'янсько-Бузький р-н, Львівська обл., 80455 s. Nesluhiv, Kam'iansko-Buzkyi r-n, Lvivska obl., 80455
379	Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» Української академії аграрних наук Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut vynohadarstva i vynorobstva im. V.IE. Tairova» Ukrainської akademii ahrarnykh nauk	65496, м. Одеса, вул. 40-річчя Перемоги, 27, смт Таїрове 65496, m. Odesa, vul. 40-richchia Peremohy, 27, smt Tairove
404	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Української академії аграрних наук Instytut roslynnytstva im. V. IA. Iur'ieva Ukrainської akademii ahrarnykh nauk	проспект Героїв Харкова, 142, м. Харків, 61060 prospekt Heroiv Kharkova, 142, m. Kharkiv, 61060
409	Херсонський державний аграрний університет Khersonskyi derzhavnyi ahrarnyi universytet	вул. Рози Люксембург, 23, м. Херсон, 73006 vul. Rozy Liuksemburh, 23, m. Kherson, 73006
417	Подільський державний аграрно-технічний університет Podilskyi derzhavnyi ahrarno-tekhnichnyi universytet	32316, вул. Шевченка, 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. 32316, vul. Shevchenka, 13, m. Kam'ianets-Podilskyi, Khmelnytska obl.
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова, 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova, 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
744	Монсанта Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Вестейнд 161, 1601ВМ, Енхуїзен, (поштова адреса: Постбус 22, 1600АА, Енхуїзен) Westeinde 161, 1601ВМ Enkhuizen (mailing address: Postbus 22, 1600AA Enkhuizen)
751	Бейо Заден Б.В. Bejo Zaden B.V.	П.О. Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхьюзен, Нідерланди P.O. Box 50, Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, The Netherlands
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	Р.О. Бокс 4005,6080 АА Хаелен, Нідерланди P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
793	ЛІМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флоримон Денре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплеув, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
806	Євраліс Семанс Euralis Semences	Авеню Гастон Фоебюс, 64231 Лескар Седекс, Франція Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bikhir B.V.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуїзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанта Технологі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800 Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
879	Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad	М. Горкого 30, 21000 Нові Сад, Сербія M. Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Serbia
921	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рост Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Rost Agro»	39027, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кириаківка 39027, Poltavska obl., Hlobynskyi r-n, s. Kyryakivka
1010	Заявник не зареєстрований Applicant not registered	-
1059	Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю Luhanskyi instytut selektsii i tekhnologii u formi tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu	91490, м. Луганськ, с. Тепличне, вул. Степова, 11 91490, m. Luhansk, s. Teplychne, vul. Stepova, 11
1123	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Дріада, Лтд» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Naukovo-vyrobnycha firma «Driada, Ltd»	Вул. Рози Люксембург, 23, Херсон, Україна, 73006 Vul. Rozy Liuksemburh, 23, Kherson, Ukraina, 73006
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свितязь» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiaz»	вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1192	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма «Землеробець» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha ahrofirma «Zemlerobets»	с. Полігон, Жовтневий р-н, Миколаївська обл., 57217 с. Polihon, Zhovtnevyi r-n, Mykolaivska obl., 57217
1210	Іноземне Підприємство «НС SEME-Україна» Inozemne Pidpryiemstvo «NS SEME-UKRAINA»	64032, с. Красне, Кегичівський р-н, Харківська обл., Україна 64032, s. Krasne, Kehychivskiyi r-n, Kharkivska obl., Ukraina
1433	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія «Маїс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahropromyslova kompaniia «Mais»	вул. Дерев'янка, 2а, с. Боровиця, Чигиринський район, Черкаська область, Україна, 20921 vul. Derev'ianka, 2a, s. Borovytsia, Chyhyrnynskyi raion, Cherkaska oblast, Ukraina, 20921
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslinnytstva im. V.IA. IUr'ieva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128 pr. Moskovskiyi, 142, m. Kharkiv, 61128
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	м. Київ, смт Новосілки, вул. Садова, 23, 03027 m. Kyiv, smt Novosilky, vul. Sadova, 23, 03027
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, смт Чабани, Фастівський р-н, Київська обл., 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt Chabany, Fastivskiyi r-n, Kyivska obl., 08162
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1708	Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia «Maiak» Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Крути, вул. Незалежності, 39, Україна, 16645 Chernihivska obl., Nizhynskiyi r-n, selo Kruty, vul. Nezalezhnosti, 39, Ukraina, 16645
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Рюе Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1797	Секобра Речерчес С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1852	Монсанто Веджітол ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1854	Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut silskoho hospodarstva stepovoi zony Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Дзержинського, 14, м. Дніпро, Україна, 49600 vul. Dzerzhynskoho, 14, m. Dnipro, Ukraina, 49600
1900	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ Hybro Saatzaucht GmbH & Co. KG	Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany
1904	Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.С. Таїрова» Національної академії аграрних наук України Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut vynohradarstva i vynorobstva imeni V.IE. Tairova» Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. 40-річчя Перемоги, 27, смт Таїрове, м. Одеса, 65496, Україна vul. 40-richchia Peremohy, 27, smt Tairove, m. Odesa, 65496, Ukraina
1974	Бетасід ГмбХ Betaseed GmbH	Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany
1978	Інститут за ратарство і повртарство Instytut za ratarstvo i povrtarstvo	Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija
1990	Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Nosivska selektsiino-doslidna stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівський район, Чернігівська область, 17131 vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivskiyi raion, Chernihivska oblast, 17131
1997	МОРОВОСІД ЦЗ а.с. MORAVOSEED CZ a.s.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2046	Приватне підприємство МНАГОР Privatne pidpryiemstvo MNAHOR	Хмельницьке шосе, 122, м. Вінниця, 21029 Khmelnyske shose, 122, m. Vinnytsia, 21029
2047	Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганський Інститут Селекції і Технологій» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Luhanskyi Instytut Selektzii i Tekhnologii»	вул. Степова, 11, с. Тепличне, м. Луганськ, 91490 vul. Stepova, 11, s. Teplychne, m. Luhansk, 91490
2086	Хазера Сідз Б.В. Hazera Seeds B.V.	Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands
2093	Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс ГмбХ Гросс Люзевіц NORIKA Nordring-Kartoffelzucht-und Vermehrungs GmbH Grob Lusewitz	Парквег 4, Д-18190 Занітц, Німеччина Parkweg 4, D-18190 Sanitz, Deutschland

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2243	ІПМ Потейто Грууп Лімітед IPM Potato Group Limited	Unit 412, Q House, 76 Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Republic of Ireland Unit 412, Q House, 76 Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Republic of Ireland
2257	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕКС УКРАЇНА» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «HENEKS UKRAINA»	вул. Гоголя, 12, оф. 610, м. Полтава, 36020 vul. Hoholia, 12, of. 610, m. Poltava, 36020
2260	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2313	Нордік Сід Германі ГмбХ Nordic Seed Germany GmbH	Kirchhorster Str. 16. DE-31688 Nienstadt Kirchhorster Str. 16. DE-31688 Nienstadt
2424	Нагорняк Михайло Миколайович Nahorniak Mykhailo Mykolaiovych	вул. Станіславського, 23, кв. 72, м. Вінниця, 21022 vul. Stanislavskoho, 23, kv. 72, m. Vinnytsia, 21022
2429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СПАРК СІДЗ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «SPARK SIDZ»	проспект Маршала Жукова, буд. 47/3, Київський р-н, м. Одеса, 65114 prospekt Marshala Zhukova, bud. 47/3, Kyivskiy r-n, m. Odesa, 65114
2445	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ЛІСТ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Kompaniia LIST»	пр-т Академіка Корольова, б. 12, кв. 12, м. Київ, 03134 pr-t Akademika Korolova, b. 12, kv. 12, m. Kyiv, 03134
2503	Інтерпріндереа Пентру Сількультура Яргара Intreprinderea Pentru Silvicultura Iargara	г. Яргара, ул. Штефан Водэ, 180, MD-6321 Республика Молдова h. Iargara, ul. Shtefan Vodэ, 180, MD-6321 Respublyka Moldova
2507	Хареба Володимир Васильович Khareba Volodymyr Vasylovych	вул. Садова, буд. 19, кв. 34, с. Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. vul. Sadova, bud. 19, kv. 34, s. Novosilky, Kyievo-Sviatoshynskiy r-n, Kyivska obl.
2522	Монсанта Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
2537	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA
2538	Орегон Стейт Юніверсіті Oregon State University	Oregon State University, Office for Commercialization and Corporate Development, A312 Kerr Administration build. Corvallis, OR 97331, US Oregon State University, Office for Commercialization and Corporate Development, A312 Kerr Administration build. Corvallis, OR 97331, US
2549	Іноземне Підприємство «НС СЕМЕ - УКРАЇНА» Inozemne Pidpriyemstvo «NS SEME - UKRAINA»	проспект Науки, буд. 28, м. Київ, Голосіївський р-н, 03028 prospekt Nauky, bud. 28, m. Kyiv, Holosivskiy r-n, 03028
2551	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ НПП АГРОМИР» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AF NPP AHROMYR»	вул. Кузнєцова, 1-Ж, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430 vul. Kuznietsova, 1-Zh, s. Sorokivka, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl., 62430
2552	Штрубе Д енд С ГмбХ Strube D&S GmbH	Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany
2577	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Корсунь» Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrofirma Korsun»	вул. Симоненка, 42, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл., 19400 vul. Symonenka, 42, m. Korsun-Shevchenkivskiy, Cherkaska obl., 19400
2599	Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганський Інститут Селекції і Технологій» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Luhanskyi Instytut Seleksii i Tekhnolohii»	пр-т Академіка Корольова, б. 12, кв. 12, м. Київ, 03134 pr-t Akademika Korolova, b. 12, kv. 12, m. Kyiv, 03134
2629	Приватне Підприємство «НАСІННЕВЕ» Privatne Pidpriyemstvo «NASINNEVE»	вул. Надточівська, буд. 19-Б, смт Пісочин, Харківський р-н, Харківська обл., 62418 vul. Nadtochiivska, bud. 19-B, smt PISOCHYN, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl., 62418
2631	Приватне акціонерне товариство науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля» Privatne aktsionerne tovarystvo naukovo-vyrobnyche ob'iednannia «Chernihivelitkartoplia»	вул. Я. Лизогуба, 13, смт Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522 vul. YA. Lyzohuba, 13, smt Sedniv, Chernihivskiy r-n, Chernihivska obl., 15522
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС СААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2658	Приватне підприємство «Голд Сідс» Privatne pidpriyemstvo «Hold Sids»	20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Магістральна, 21 20300, Cherkaska obl., m. Umanь, vul. Mahistralna, 21
2660	АйПіАр Б.В. IPR B.V.	P.O. Box 88, 8500 AB Joure, the Netherlands P.O. Box 88, 8500 AB Joure, the Netherlands
2662	ХМ.КЛОЗ, Інк. HM.CLAUSE, Inc.	260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618 260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618
2706	Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Donetska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. захисників України, буд. 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307 vul. Zakhysnykiv Ukrainy, bud. 1, m. Pokrovsk, Donetska oblast, 85307
2712	Кревес Девелопмент Ко., Лтд Kreves Development Co., Ltd	11F, 1419, Dongil-ro, Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea 11F, 1419, Dongil-ro, Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaєns Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2729	Дробязко Юрій Геннадійович Drobiazko IUrii Hennadiiovych	вул. Генерала Жмаченка, буд. 4, кв. 16, м. Київ, 02192 vul. Henerala Zhmachenka, bud. 4, kv. 16, m. Kyiv, 02192

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2768	Борд оф Трестіз оф Мічиган Стейт Юніверсіті Board of Trustees of Michigan State University	325 East Grand River Suite 350 East Lansing Michigan 48823 United States of America 325 East Grand River Suite 350 East Lansing Michigan 48823 United States of America
2776	Зеленько Олексій Анатолійович Zelenko Olexsii Anatoliiovych	Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, буд. 76, кв. 78, 28500 Kirovohradska obl., m. Dolynska, vul. Nova, bud. 76, kv. 78, 28500
2783	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокрай» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahroкрай»	вул. Козацька, 1, м. Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна, 31000 vul. Kozatska, 1, m. Krasyliv, Krasylivskiy r-n, Khmelnytska obl., Ukraina, 31000
2794	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2834	Адванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis 6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis
2882	ТОВ «Грано Де Оро Україна» TOV «Hrano De Oro Ukraina»	вул. Чорновола, 41, смт Катеринопіль, Черкаська обл., 20501, Україна vul. Chornovola, 41, smt Katerynopil, Cherkaska obl., 20501, Ukraina
2885	Фреш Форвард Холдінг БВ Fresh Forward Holding BV	Hogewoerd 1C, 6851 ET Huissen. The Netherlands Hogewoerd 1C, 6851 ET Huissen. The Netherlands
2890	Лідеа Франсе САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3204	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВНІС ГЕНЕТИКС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «VNIS HENETIKS»	вул. Академіка Заболотного, 150 Г, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, 150 H, m. Kyiv, 03143
3216	Храпатий Ігор Васильович Khrapatyi Ihor Vasylovych	вул. Гореницька, буд.4/9, с. Гореничі, Бучанський р-н, Київська обл., 08114 vul. Horenytska, bud.4/9, s. Horenychy, Buchanskyi r-n, Kyivska obl., 08114
3218	Ярмолюк Іван Савич Yarmoliuk Ivan Savych	вул. Нагорна, 23 а, с. Хутірське, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., 51822, Україна vul. Nahorna, 23 a, s. Khutirске, Dniprovskiy r-n, Dnipropetrovska obl., 51822, Ukraina
3228	Приватне підприємство «Поділля-Агрохімсервіс» Pryvatne pidpriyemstvo «Podillia-Ahrokhimservis»	вул. Незалежності, буд. 233, смт Вапнярка, Тульчинський р-н, Вінницька обл., Україна, 24240 vul. Nezalezhnosti, bud. 233, smt Vapnyarka, Tulchynskiy r-n, Vinnytska obl., Ukraina, 24240
3232	Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН Ternopilska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu silskoho gospodarstva Karpatskoho rehionu NAAN	вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль vul. Troleibusna, 12, m. Ternopil
3236	Вовк Жанна Миколаївна Vovk Zhanna Mykolaivna	вул. Л. Вольгемут, 4, кв. 165, м. Київ, 03194 vul. L. Volhemut, 4, kv. 165, m. Kyiv, 03194
3238	Тарашенко Петро Анатолійович Tarashchenko Petro Anatoliiovych	вул. Стеценка буд. 35, м. Київ, 04216 vul. Stetsenka bud. 35, m. Kyiv, 04216
3241	Будзинський Олександр Сергійович Budzynskiy Olexsandr Serhiiovych	просп. Ювілейний, 23 А, кв. 30, м. Запоріжжя, 69097 prosp. IUVileinyi, 23 A, kv. 30, m. Zaporizhzhia, 69097
3243	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК АРТ-АГРО» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «TK ART-AHPO»	вул. Академіка Лебедева, буд. 1, корпус 8, кв. 146, м. Київ, 02143 vul. Akademika Lebedeva, bud. 1, korpus 8, kv. 146, m. Kyiv, 02143
3244	Гордієнко Володимир Валерійович Hordiienko Volodymyr Valeriiovych	вул. Шкільна, буд. 34, с. Семидуби, Голованівський р-н, Кіровоградська обл., 26521 vul. Shkilna, bud. 34, s. Semyduby, Holovanivskiy r-n, Kirovohradska obl., 26521
3245	Шевченко Андрій Олексійович Shevchenko Andrii Olexsiiiovych	вул. Татарська, 27/4, кв. 50, м. Київ, 04107 vul. Tatarska, 27/4, kv. 50, m. Kyiv, 04107
3403	Інститут Національ де Решерше поур л'Агрікултур л'Аліментацион ет л'Енвіроннемент (ІНРАЕ) Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE)	147, Rue de l'Universite FR-75338 Paris Cedex 07, France 147, Rue de l'Universite FR-75338 Paris Cedex 07, France
3412	Новаді С.А.Р.Л. Novadi S.A.R.L.	23, Rue Jean Baldassini, FR-69007 Lyon, France 23, Rue Jean Baldassini, FR-69007 Lyon, France
3422	ІННОВІА Дженетікс срл INNOVIA Genetics srl	Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi, Romania Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi, Romania
3424	Континентал Семенсес Лімітед Лайбіліті Компані CONTINENTAL SEMENSES LIMITED LIABILITY COMPANY	Via Per Parma 62, 43029 Traversetolo, Itali Via Per Parma 62, 43029 Traversetolo, Itali
3428	ГОЛДЕН ВЕСТ РЕСЕАРЧ ЕООД GOLDEN WEST RESEARCH EOOD	BG/7 Midia Enos blvd. entr. 1. fl. 10 Ruse, 7001 Bulgaria BG/7 Midia Enos blvd. entr. 1. fl. 10 Ruse, Ruse, 7001 Bulgaria
3429	Агрі Обтеншнс СА Agri Obtentions S.A.	Chemin de la Petite Miniere. 78280 Guyancourt, France Chemin de la Petite Miniere. 78280 Guyancourt, France
3432	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД САНТРЕЙД ЛТД» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «TD SANTREID LTD»	пр. Слобожанський, буд. 40А, м. Дніпро, 49051 pr. Slobozhanskyi, bud. 40A, m. Dnipro, 49051
3433	ГРАПА ГЛОБАЛ ЛЛС GRAPA GLOBAL LLC	US/11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA US/11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA

Інші відомості

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
3436	Далівал С.А.С. Dalival S.A.S.	Шато де Ну Віллер - Котре - Франція, 02600 Chateau de Noue Villers - Cotterets - France,02600
3438	Агро Селекшнс Фрутс С.А.С. Agro Selections Fruits S.A.S.	La Prade de Mousseillous, Route d Alenya FR-66200 Elne La Prade de Mousseillous, Route d Alenya FR-66200 Elne
3540	Товариство з обмеженою відповідальністю «Галузинецький сад» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Haluzynetskyi sad»	вул. Подільська, буд. 43, с. Галузинці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 32226 vul. Podilska, bud. 43, s. Haluzyntsi, Khmelnytskyi r-n, Khmelnytska obl., 32226

Загальноживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальноживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин, П – підтримувач.	The translation from Ukrainian to English of the abbreviations in the Bulletin engaged common abbreviation of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), AC – Plant Variety Authorship Certificate, M – Maintainer.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, abbreviations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся, Л – Лісостеп, С – Степ, ЗГр – захищений ґрунт.	П – Woodlands, Л – Forest-Steppe, С – Steppe, ЗГр – covered ground.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками**Кукурудза звичайна**

Група стиглості	ФАО	Тривалість періоду вегетації, діб
2 Середньоранньостигла	200–299	106–120
3 Середньостигла	300–399	121–130

Соняшник однорічний

- 2 Ранньостиглий: 101–115 діб
- 3 Середньоранньостиглий: 116–125 діб
- 4 Середньостиглий: понад 125 діб
- 8 Високоолеїновий (середньостиглий: понад 125 діб)

Ячмінь звичайний (ярий, озимий)

- 2 Голозерний

Ріпак (ярий, озимий)

- 1 Низькоеруковий

Соя культурна

- 7 Середньостиглий (111–130 діб)

Картопля

- 8 Середньостиглий 101–125 діб

Пшениця м'яка (озима)

- 1 Середньорослий

© патент

/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрямок використання

цін	цінний	ф	філер
зерн	зерновий	олн	олійний
ВОЛ	високоолеїновий	тхн	технічний
стл	столовий	ун	універсального призначення
свж	споживання у свіжому вигляді	озл	озеленення

Характеристика 2 – Група стиглості

рс	ранньостиглий	пс	пізньостиглий
рсдн	ранньосередній		

Характеристика 3 – Якість

сбіл	середньобілковий	сл	середньоолійний
пк	підвищеної крохмальності		

Характеристика 4 – Метод створення

СЗ	самозапилення	П	перехресне запилення
С	сорт-синтетик	F1	гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальна за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко Н. О.

Номер підготували: Возна Т. Г., Гайдай А. О., Коляденко С. С., Мажуга К. М.,
Симоненко Н. В., Сиплива Н. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В.,
Шкапенко Є. А.

Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи підготували: Баліцька Л. М., Дудка Т. В., Дутова Г. А., Ільченко Я. В.,
Києнко З. Б., Курочка Н. В., Матус В. М., Михайлик С. М.,
Носуля А. М., Свиначук О. В., Смутьська І. В.,
Сонець Т. Д., Таганцова М. М., Хоменко Т. М.

Описи сортів рослин та показники господарської придатності підготували: Баліцька Л. М., Дудка Т. В., Дутова Г. А., Ільченко Я. В.,
Матус В. М., Михайлик С. М., Сонець Т. Д., Таганцова М. М.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 12.12.2025
Відправлено в друк .12.2025
Формат 60×84/8. Папір офсетний.
Друк цифровий. Гарнітура Officina.
Друк. арк. . Умов. друк. арк. .
Обл.-вид. арк. .
Наклад 25 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.
ТОВ «ТВОРИ»
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852.
e-mail: info@tvoru.com.ua
<https://www.tvoru.com.ua>

Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» – офіційне видання, що містить офіційні відомості щодо охорони прав на сорти рослин.

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211