

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 16 грудня 2016 року № 547
(зі змінами та доповненнями внесеним наказами:
Мінекономіки від 27 жовтня 2020 № 2162-20,
Мінагрополітики від 27 липня 2021 року № 102)

**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН**

**МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН ГРУПИ
ЗЕРНОВИХ НА ВІДМІННІСТЬ, ОДНОРІДНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ**

ЗМІСТ

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА ВОС (ЗЕРНОВІ)		
1.	Жито посівне.....	3
2.	Кукурудза звичайна.....	32
3.	Овес посівний і овес голозерний.....	71
4.	Пшениця м'яка.....	102
5.	Пшениця спельта, пшениця шарозерна, пшениця однозерна.....	145
6.	Пшениця тверда, пшениця картлійська, пшениця польська, пшениця тучна, пшениця двозерна (пшениця полба звичайна, пшениця туранська).....	180
7.	Пшениця щільноколоса.....	219
8.	Тритикале	254
9.	Ячмінь звичайний	290

**Методика
проведення експертизи сортів жита посівного (*Secale cereale* L.)
на відмінність, однорідність і стабільність групи зернових на відмінність,
однорідність і стабільність**

Загальні рекомендації

1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів жита посівного *Secale cereale* L.

2. Необхідний рослинний матеріал – насіння.

1) Комpetентний орган визначає скільки, якої якості, коли й куди постачається насіння для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 5 кг для гібридів і перехреснозапильних сортів, 1,5 кг – для інbredних ліній. Для гібридів додатково надсилається 0,3 кг насіння кожного батьківського компонента (інbredної лінії).

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

3. Метод експертизи

1) *Тривалість експертизи.* Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, вільнозапилених сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій.

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібриду – дві вихідні лінії, трилінійного гібриду –

Використано документ UPOV TG /58/6, 1999, TG /58/7, 2020. Сорти-еталони жита посівного (озимого) виділені: к-тами с.-г. н. Каражбей Г. М., Гринів С.М.; 2012. Зміни й доповнення внесені : Костенко Н. П., канд. с.-г. наук, Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб., Ткачик С. О., канд. с.-г. наук, УІЕСР, 2021.

простий гібрид та три лінії, подвійного гібриду – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів. Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію (успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис) – польові дослідження вище зазначеної лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявника, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст і розвиток рослин, і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожній експертизі загалом підлягає для перехреснозапильних сортів, гібридів і синтетичних сортів (за виключенням простих гібридів, отриманих від інbredних ліній) щонайменше 600 рослин на рядкових ділянках (А), розділених на два повторення; 60 окремих рослин на пунктирних ділянках (Б), розділених на два повторення;

для інbredних ліній і простих гібридів, отриманих від інbredних ліній 600 рослин на рядкових ділянках (А), розділених на два повторення; 20 окремих рослин на пунктирних ділянках (Б), розділених на два повторення.

Для визначення типу розвитку використовують не менше ніж 300 рослин.

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

Окремі ділянки для обстежень і вимірювань можуть бути використані лише за ідентичних умов довкілля.

Типи ділянок

Тип ділянки	Назва ділянки	Вид експертизи	Примітка
A	рядкова	відмінність однорідність	Висівають першого та другого років експертизи насінням заявника відповідно до року врожаю
A ₁	рядкова	стабільність	Висівають на другий рік експертизи насінням заявника першого року врожаю
B	пунктирна	відмінність однорідність	Висівають першого та другого років експертизи насінням заявника за роками врожаю

A, B – у двох повтореннях;

A₁ – в одному повторенні.

Необхідна кількість рослин жита посівного для експертизи на ВОС

Тип ділянки	Схема розміщення рослин		Кількість рослин, шт.			
	ширина міжряддя, см	відстань між рослинами в рядку, см	на ділянці, шт.	для обліку на:	відмінність	однорідність
Перший рік експертизи						
A	20,0	≈2,0	600	600	600*	-
B	40,0	25,0	60/10	60/10	60/10	-
Другий рік експертизи						
A	20,0	≈2,0	600	600*	600*	600*
A ₁	20,0	≈2,0	600	-	-	300

Б	40,0	25,0	60/10	60/10	60/10	-
---	------	------	-------	-------	-------	---

* за візуальної одноразової оцінки групи рослин;

60/10 – дослідження окремих рослин перехреснозапильних сортів, гібридів і синтетичних сортів/інbredних ліній і простих гібридів, отриманих від інbredних ліній на пунктирних ділянках (Б).

5) Метод дослідження. Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ). Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG: разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS: вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG: візуальна разова оцінка групи рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

6) Кількість рослин / частин рослин. Експертизі підлягає щонайменше 600 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

для перехреснозапильних сортів, гібридів (за виключенням простих гібридів, отриманих від інbredних ліній) і синтетичних сортів

MG: разове вимірювання 60 рослин або частин 60 рослин;

MS: вимірювання окремих, попередньо визначених 60 рослин або частин 60 рослин;

VG: візуальна разова оцінка 600 рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 60 рослин або частин 60 рослин.

Для інbredних ліній і простих гібридів, отриманих від інbredних ліній

MG: разове вимірювання 10 рослин або частин 10 рослин;

MS: вимірювання окремих, попередньо визначених 10 рослин або частин 10 рослин;

VG: візуальна разова оцінка 600 рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 10 рослин або частин 10 рослин.

У випадку, коли у п. 7 Таблиці ознак зазначено більше, ніж один метод дослідження ознаки, спостереження на групі рослин (MG, VG) завжди слід проводити на інbredних лініях і простих гібридах, отриманих від інbredних ліній; спостереження на окремих рослинах (MS, VS) слід проводити на перехреснозапильних сортах, гібридах (за виключенням простих гібридів, отриманих від інbredних ліній) і синтетичних сортах.

4. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

1) Експертиза на відмінність

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису первого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізняним з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнати сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

2) Експертиза на однорідність

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності інbredних батьківських ліній і простих гіbridів, отриманих від інbredних ліній приймається популяційний стандарт 0,5% за рівня ймовірності 95%. У вибірці з 600 рослин допускається шість нетипових.

Для оцінки однорідності перехреснозапильних сортів, гіybridів (за виключенням простих гіybridів, отриманих від інbredних ліній) і синтетичних сортів використовують відносні межі мінливості методом порівняння з достатньо вивченими гіybridами та сортами.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

3) Експертиза на стабільність

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

У разі виникнення сумніву можуть бути проведені додаткові дослідження з експертизи на стабільність.

За необхідності або у випадку сумніву стабільності гібрида, проводять додаткові дослідження з визначення однорідності й стабільності його батьківських компонентів.

5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти групують за найвідміннішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіюють або дуже слабко варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- рослина: плойдність (ознака 1);

- зернівка: забарвлення алейронового шару (ознака 2);
- тип розвитку (ознака 22).

Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

6. Умовні позначення

(*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залишаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливлюють;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

Сорти-еталони в таблиці ознак виділені тільки для озимого типу розвитку.

7. Таблиця ознак сортів жита посівного

Назва ознаки		Ступінь виявлення ознаки	Код	Сорт-еталон
1	2	3	4	5
1. (*) (+) QN	Рослина: плоїдність VS L	диплоїд	2	Синтетик 38, Дозор, Інтенсивне 95
		тетраплоїд	4	Древлянське
2. (+) PQ	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю VG (Б) L 00	світле	1	Дозор
		темне	2	Клич, Інтенсивне 95, Велітень
3. (*) (+) QN	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення VG (Б) L 10–11	відсутня або дуже слабка	1	
		слабка	3	Матадор, Пікассо, Ірина
		помірна	5	Хлібне
		сильна	7	Синтетик 38, Юр'ївець
		дуже сильна	9	Велітень, Первісток, Полі 2
4. (+) QN	Колеоптиль: за довжиною MS (Б) (а) L 12–13	дуже короткий	1	
		короткий	3	Древлянське, Пікассо, Синтетик 38
		середній	5	Паллада, Дозор, Інтенсивне 95
		довгий	7	Ірина
		дуже довгий	9	

1	2	3	4	5
5. QN	Пропорцевий листок: піхва за довжиною MS (Б) 54–58	дуже коротка	1	
		коротка	3	Синтетик 38
		середня	5	Паллада, Дозор, Велітенъ
		довга	7	Первісток
		дуже довга	9	
6. QN	Пропорцевий листок: пластинка за довжиною MS (Б) 54–58	дуже коротка	1	
		коротка	3	Синтетик 38, Пікассо
		середня	5	Дозор, Велітенъ, Інтенсивне 95
		довга	7	Protector
		дуже довга	9	
7. (*) (+) PQ	Рослина: габітус VG (A)/VS (Б) 25–29	прямий	1	Клич, Дозор
		напівпрямий	3	Древлянське, Первісток, Синтетик 38
		напіврозлогий	5	Інтенсивне 95, Ірина, Велітенъ
		розлогий	7	Calypso
		сланкий	9	
8. (*) (+) QN	Пропорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві VG (A) 54–58	відсутня або дуже слабка	1	
		слабка	3	Дозор
		помірна	5	Пікассо, Ірина, Синтетик 38
		сильна	7	Велітенъ, Клич
		дуже сильна	9	Amando

1	2	3	4	5
9. (*) (+) QN	Час початку колосіння MG (А)/MS (Б) 52	дуже ранній	1	Матадор
		ранній	3	Первісток
		середній	5	Велітень, Юр'ївець, Синтетик 38
		пізній	7	Клич, Паллада
		дуже пізній	9	
10. (*) QN	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною MS (Б) 60–69	дуже коротка	1	Ірина
		коротка	3	Паллада, Пікассо
		середня	5	Первісток, Юр'ївець, Синтетик 3
		довга	7	Клич, Дозор, Інтенсивне 95
		дуже довга	9	Древлянське
11. QN	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною MS (Б) 60–69	дуже вузька	1	Ірина
		вузька	3	Amando
		середня	5	Інтенсивне 95, Клич
		широка	7	Синтетик 38
		дуже широка	9	
12. (*) QN	Колос: інтенсивність воскового нальоту VG (А)/VS (Б) 69–75	відсутня або дуже слабка	1	Ірина
		слабка	3	Дозор, Велітень
		помірна	5	Хлібне, Інтенсивне 95, Синтетик 38
		сильна	7	Древлянське, Клич
		дуже сильна	9	Motto
13. (*)	Соломина: опущення під колосом	відсутнє або дуже нещільне	1	

1	2	3	4	5
(+) QN	за щільністю VG (A)/VS (Б) 70–85	нешільне	3	Древлянське, Пікассо
		помірної щільності	5	Велітень, Юр'ївець, Паллада
		щільне	7	Клич, Інтенсивне 95, Первісток
		дуже щільне	9	Хлібне
14.	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками) QN MS (Б) 80–92	дуже коротка	1	
(*)		коротка	3	Інтенсивне 95, Синтетик 38
(+)		середня	5	Паллада, Ірина
		довга	7	Первісток
		дуже довга	9	Поліクロсне, Полі 2, Древлянське
15.	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом MS (Б) 80–92	дуже коротка	1	Юр'ївець, Синтетик 38
QN		коротка	3	Пікассо
		середня	5	Первісток, Дозор, Древлянське
		довга	7	Клич
		дуже довга	9	Полі 2
16.	Колос: за довжиною (без остюків) QN MS (Б) 80–92	дуже короткий	1	
(+)		короткий	3	Первісток, Пікассо
QN		середній	5	Інтенсивне 95, Синтетик 38
		довгий	7	Паллада
		дуже довгий	9	Дозор, Клич
17.	Колос: за щільністю (*) MS (Б), 80–92	дуже	1	
		нешільний		

1	2	3	4	5
(+) QN		нешільний	3	Пікассо, Юр'ївець
		середньої щільності	5	Ірина, Інтенсивне 95, Синтетик 38
		щільний	7	Дозор, Велітень
		дуже щільний	9	Клич, Паллада
18. (*) (+) QN	Колос: положення в просторі VG (A)/VS (Б) 90–92	пряме	1	
		напів пряме	3	Матадор, Древлянське
		горизонтальне	5	Первісток, Юр'ївець
		напівпохиле	7	Дозор, Велітень, Синтетик 38
		похиле	9	Хлібне, Ірина, Полі 2
19. (*) (+) QN	Зернівки: маса 1000 шт. MG (A) 90–92	дуже мала	1	
		мала	3	Полі 2
		середня	5	Первісток, Клич, Інтенсивне 95
		велика	7	Паллада, Ірина, Синтетик 38, Пікассо
		дуже велика	9	Древлянське
20. (*) (+) QN	Зернівка: за довжиною MG (A) 92	дуже коротка	1	
		коротка	3	Uso
		середня	5	Пікассо, Первісток, Синтетик 38
		довга	7	Ірина, Дозор
		дуже довга	9	
21. (+) QN	Зернівка: забарвлення у фенолі VG, (Б)	відсутнє або дуже світле	1	Інтенсивне 95, Велітень
		світле	3	Древлянське

1	2	3	4	5
L 00		помірне	5	Пікассо, Первісток, Юр'ївець
		темне	7	Ірина, Полі 2
		дуже темне	9	Синтетик 38
22. (+) (*) PQ	Тип розвитку VG	озимий	1	SU Stakkato
		дворучка (альтерна- тивний)	2	
		ярий	3	Arantes

8. Пояснення до Таблиці ознак сортів жита посівного

1) Пояснення до ознак, що містять наступний ключ, слід розглядати як зазначено нижче:

(а) 3 x 24 насінини, надісланих на експертизу, висівають у багатокоміркові чашки із стандартний ґрунтом на глибину 1 см. Рослини вирощують в умовах закритого ґрунту за температури 20 °C, із додатковим 12 годинним освітленням щодня протягом 12 діб. В одному повторенні вимірюють 20 рослин.

2) Пояснення до окремих ознак

До 1. Рослина: плоїдність

Визначають підрахунком хромосом не менше, ніж у 2×50 паростків.

До 2. Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю

Визначають візуально не менше, ніж у 100 зернівок.

До 3. Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення

Антоціанове забарвлення визначають візуально в лабораторії. Для цього 100 зерен розкладають на вологий фільтрувальний папір і пророщують за температури +15...+16°C у темряві. За досягнення довжини колеоптилів близько 1 см (через 5–6 діб), рослини освітлюють 4 доби з інтенсивністю близько 13000–15000 Lux за кімнатної температури (18...19°C).

Спостерігають повністю розвинені колеоптилі, стадія росту 09-11.


Примітка: для контролю використовують щонайменше 2 сорти-еталони.

Також може бути використаний будь-який інший альтернативний метод з визначення, якщо він дає ті самі результати.

До 7. Рослина: габітус

Визначають візуально у рослин на пунктирних ділянках за кутом відхилення листків і стебел рослин відносно уявної вертикальної осі.

1 прямий



До 8. Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві


Визначають у верхній третині піхви.

До 9. Час початку колосіння

Для перехреснозапильних сортів, гібридів і синтетичних сортів спостереження проводять з інтервалом через дві доби на пунктирній ділянці на групі попередньо визначених рослин (MS (Б)), що досягли фази росту і розвитку 52 (з'явилося $\frac{1}{4}$ суцвіття). За цими даними підраховують середній час початку колосіння сорту.

Час початку колосіння для інbredних ліній і простих гібридів, отриманих від інbredних ліній встановлюють на рядковій ділянці за разового спостереження (MG (A)), коли 50 % рослин досягли фази росту і розвитку 52 і з'явилося $\frac{1}{4}$ суцвіття.

До 13. Соломина: опущення під колосом за щільністю



1 відсутнє або дуже нещільне	3 нешільне	5 помірної щільності	7 щільне	9 дуже щільне
------------------------------------	---------------	----------------------------	-------------	---------------------

До 14. Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)

Довжину рослини вимірюють, включаючи стебло, колос з остюками.


До 16. Колос: за довжиною (без остюоків)

Довжину колоса вимірюють, виключаючи довжину остюоків.

До 17. Колос: за щільністю

Оцінюють за середньою кількістю сегментів осі на довжину колоса.

До 18. Колос: положення в просторі



1 3 5 7 9
пряме напівпряме горизонтальне напівпохиле похиле

До 19–20. Зернівки: маса 1000 шт. (19). Зернівка: за довжиною (20)

Масу і довжину зернівки оцінюють за снопиками, зібраними з рядкової ділянки. Довжину вимірюють на 60 зернівках.

До 21. Зернівка: забарвлення у фенолі

Визначають, аналізуючи 100 зернівок. Не оброблене хімічно насіння замочують у воді на 16–20 год, підсушують, видаляючи залишкову воду з поверхні; розміщують зернівки боріздкою донизу, накривають чашкою з вічком. 2 мл 1%-ого свіжовиготовленого розчину фенолу наливають у чашку Петрі на фільтрувальний папір. Витримують чашки з зернівками на денному світлі, уникуючи прямих сонячних променів, за температури +18...+20°C.

Забарвлення визначають через 4 год після додавання до зернівок розчину фенолу.

Для контролю використовують щонайменше 2 сорти-еталони.

До 22. Тип розвитку

Тип розвитку (необхідність у яровизації) слід оцінювати на ділянках, висіяних навесні. Для опису сортів–кандидатів до експертизи обов'язково залишають сорти-еталони. Коли найпізніший сорт-еталон ярого типу розвитку досягне повного розвитку (фаза, що відповідає десятковому коду 91-92 розвитку

злакових видів за шкалою Zadoks), візуально оцінюють фазу росту і розвитку сортів-кандидатів, порівнюючи їх із сортом- еталоном.

Тип розвитку оцінюють наступним чином:

1 – озимий тип (сильна потреба в яровизації) – рослини повністю досягли фази 45 (набрякання піхви листка) за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів;

2 – дворучка або альтернативний тип (часткова потреба в яровизації) – рослини пройшли фазу 75 (молочної стигlostі зерна) і перебувають загалом у фазі 90 (достигання зернівки) за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів;

3 – ярий тип (відсутня або зовсім слабка потреба в яровизації) – рослини пройшли фазу 90 (достигання зернівки) за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів.

9. Додаткова інформація

1) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВІДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52; Zadoks et al., 1974*)

Двозначний код	Загальний опис	Шкала Фіке	Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса, тритикале та рису
1	2	3	4
	Проростання		
00	Сухе насіння		
01	Початок набрякання		
02			
03	Повне набрякання		
04			
05	Поява зародкового корінця		
06			
07	Поява колеоптиля		
08			
09	На верхівці колеоптиля помітний листок		
	Ріст паростка		
10	Поява першого листка з колеоптиля	} 1	Другий листок (< 1 см)
11	Перший листок розгорнувся		

1	2	3	4
12	2 листки розгорнулись		
13	3 листки розгорнулись		
14	4 листки розгорнулись		
15	5 листків розгорнулись		
16	6 листків розгорнулись		
17	7 листків розгорнулись		
18	8 листків розгорнулись		
19	Розгорнулись 9 або більше листків		
	Кущіння		
20	Розвивається лише головний пагін		
21	Головний пагін та один бічний		
22	Головний пагін та два бічних		
23	Головний пагін та три бічних		
24	Головний пагін та чотири бічних		
25	Головний пагін та п'ять бічних		
26	Головний пагін та шість бічних		
27	Головний пагін та сім бічних		«Паралельні коди»
28	Головний пагін та вісім бічних		
29	Головний пагін та дев'ять або більше бічних		
	Видовження стебла		
30	Піднімається несправжнє стебло (починається розтягнення)	4–5	У рису: фаза вегетативної затримки
31	1-й вузол		
32	2-й вузол	6	Етапи закладання вузла
		7	

1	2	3	4
33	3-й вузол		Вузли вище основи стебла
34	4-й вузол		
35	5-й вузол		
36	6-й вузол		
37	Наявність прапорцевого листка	8	
38			
39	Язичок прапорцевого листка помітний	9	Стадія перед колосінням У рису: стадія, коли вушка останнього та передостаннього листків розташовані одне навпроти одного
	Набрякання колоса		
40			Невелике збільшення суцвіття, стадія раннього набухання колоса
41	Піхва прапорцевого листка довшає		
42			
43	Помітне набрякання піхви листка	{ } 10	
44			
45	Набрякання піхви листка		

1	2	3	4
46			
47	Відкрито піхву пропорцевого листка	} 10,1	Тільки для остистих форм
48			
49	Перший остюк помітний		
	Колосіння		викидання волоті
50	Перший колосок суцвіття помітний	N	
51	{	S	
52	З'явилося 1/4 суцвіть	N 10,2	N -
53	{	S	несинхронні види
54	З'явилося 1/2 суцвіть	N 10,3	S - синхронні види
55	{	S	
56	З'явилося 3/4 суцвіть	N 10,4	
57	{	S	
58	Ріст суцвіть закінчений	N 10,5	
59	{	S	
	Цвітіння		Для ячменю встановити нелегко
60	Початок цвітіння	N 10,51	Для рису: як правило, після цього відразу
61		S	

1	2	3	4
62	{		ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ВОЛОТЬ
63			
64	Середина цвітіння	N 10,52	
65	{	S	
66			
67			
68	Кінець цвітіння	N 10,53	
69	{	S	
	Фаза молочної стиглості		
70			
71	Зернівка водостигла	10,54	
72	Зернівка втрачає зелений колір		
73	Рання молочна стиглість		
74	Поява клітинної будови ендосперму		
75	Середина молочної стиглості		
76			
77	Пізня молочна стиглість		
78	Завершення формування ендосперму		
79		11,1	
	Фаза воскової стиглості		
80			
81			

1	2	3	4
82			
83	Рання воскова стиглість		Можливо розрізання зернівки нігтем, але не відбиток
84			
85	М'яка воскова стиглість		
86			
87	Тверда воскова стиглість		Розрізання зернівки нігтем неможливе, але можливий відбиток; у суцвіттях зменшується вміст хлорофілу 11,2
88			
89			
	Достигання		
90			
91	Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3))	11,3	Для рису: досягають колоски на верхівці
92	Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4))	11,4	Для рису: 50 % колосків досягло
93	Зернівка вдень відокремлюється (5)		Для рису: досягає 90 % колосків
94	Перестиглість, соломина відмирає		

1	2	3	4
95	Насіння в стадії спокою		Можлива втрата насіння внаслідок обсипання
96	Насіння життєздатне (50 % схожість)		
97	Насіння пробуджене		
98	Настає вторинний спокій		
99	Вторинний спокій закінчується		

10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Rye (*Secale cereale* L.) (TG /58/6, UPOV) // Geneva. 1999–03–24. – 27 P.
// URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg058.pdf
2. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Rye (*Secale cereale* L.) (TG /58/7, UPOV) // Geneva. 2020–12–17. – 29 P.
// URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg058.pdf

11. Технічна анкета

Номер заявки

(не заповнюється заявником)

Annex to Application

(not to be filled in by the applicant)

ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY

Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявлання, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.

Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.

In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.

1. Предмет Технічної анкети

1. Subject of the Technical Questionnaire

1.1. Ботанічний таксон (вид)

(латинською мовою)

1.1 Botanical name species

(in Latin Language)

Secale cereale L.

1.2. Ботанічний таксон (вид)

(українською мовою)

1.2 Botanical name species

(in Ukrainian Language)

Жито посівне

2. Заявник(и)

2. Applicant(s)

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

Name (denomination)

Автор(и)

Autor(s)

3. Назва сорту

3. Variety denomination

4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту

4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety

4.1. Схема селекції

4.1. Breeding scheme

Сорт, одержаний в результаті:

Variety resulting from:

4.1.1. схрещування

crossing

a) контролюване схрещування _____

a) controlled cross

(точно вказати батьківські сорти)

(please state parent varieties)

b) частково відоме схрещування _____

b) partially known cross

(вказати відомий батьківський сорт(и))

(please state known parent variety(ies))

b) невідоме схрещування.....	<input type="checkbox"/>
v) unknown cross	
4.1.2. мутація.....	<input type="checkbox"/>
mutation	
(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)	
4.1.3. виявлення та поліпшення.....	<input type="checkbox"/>
discovery and development	
(точно визначити, де і коли виявлено та як поліпшено) (please state where and when discovered and how developed)	
4.1.4. інше.....	<input type="checkbox"/>
other	
(надати деталі) (please provide details)	
4.2. Метод розмноження сорту: method of propagating the variety	
4.2.1. сорти, що розмножуються насінням seed-propagated varieties	
a) самозапилення.....	<input type="checkbox"/>
a) self-pollination	
б) перехресне запилення	
b) cross-pollination	
Популяція.....	<input type="checkbox"/>
population	
синтетичний сорт	<input type="checkbox"/>
synthetic variety	
в) гібрид.....	<input type="checkbox"/>
c) hybrid	
Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида: In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.	
Простий гібрид $\text{♀} \times \text{♂}$	Трьохлінійний гібрид $\text{♀} \times \text{♂} \rightarrow (\text{♀} \times \text{♂}) \times \text{♂}$
Single Hybrid	Three-Way Hybrid
і має визначати, зокрема: and should identify in particular:	
a) будь-які чоловічі стерильні лінії	
a) any male sterile lines	
б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній	
b) maintenance system of male sterile lines.	
г) інші.....	<input type="checkbox"/>
d) other	
(надати детальну інформацію) (please provide details)	
4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно: vegetative propagation	
a) живці.....	<input type="checkbox"/>
a) cuttings	
б) розмноження <i>in vitro</i>	<input type="checkbox"/>
b) <i>in vitro</i> propagation	
в) інші (установлений метод).....	<input type="checkbox"/>
c) other (state method)	
4.2.3. інші.....	<input type="checkbox"/>
other	
(надати детальну інформацію) (please provide details)	

5. Ознаки сорту

Variety characteristics

Назва ознаки Variety denomination	Ступінь проявлення Manifestation	Сорт-еталон Example variety		Код Code
		ярий spring	озимий winter	
5.1 (1) Рослина: плюїдність Ploidy	диплоїд diploid		Синтетик 38, Дозор, Інтенсивне 95	2 <input type="checkbox"/>
	тетраплоїд tetraploid		Древлянське	4 <input type="checkbox"/>
5.2 (2) Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю Grain: intensity of color of aleurone layer	світле light		Дозор	1 <input type="checkbox"/>
	темне dark		Клич, Інтенсивне 95, Велітень	2 <input type="checkbox"/>
5.3 (22) Тип розвитку Seasonal type	озимий winter		SU Stakkato	1 <input type="checkbox"/>
	дворучка (альтернативний) alternative			2 <input type="checkbox"/>
	ярий Spring	Arantes		3 <input type="checkbox"/>

6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявки відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

Назва(и) сорту(ів) подібного(их) до сорту- кандидата Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety	Ознака(и), за якою (якими) сорт- кандидат відрізняється від подібних сортів Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(y) Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) сорту-кандидата Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Коментарі

Comments

7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Tak

Yes

(якщо так, описати ці ознаки)
(if yes, please provide details)

Hi

No

7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?
Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці умови)
(if yes, please provide details)

7.3. Інша інформація (широке використання)

Other information

Main use

(надати детальну інформацію)
(please provide details)

8. Дозвіл на використання

Autorization for release

a) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно
охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?

a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?

Так Hi

Yes

No

b) чи було одержано такий дозвіл?

b) Has such authorization been obtained?

Так Hi

Yes

No

Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту

Information on use of GMOs for creating a variety

a) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів,
які не відбуваються у природних умовах?

a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?

Так Hi

Yes

No

b) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?

b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?

Так Hi

Yes

No

Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку
ризику.

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

**10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на
експертизу**

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознак або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів,
як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан
культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.
The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так Hi

Yes

No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

**10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявики не має зазнавати будь-якої обробки, що може
вплинути на прояв ознак сорту, поки Комpetентний орган дозволить або запропонує зробити**

це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| a) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма)..... | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди)..... | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| в) культури тканини..... | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| c) Tissue culture | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| г) інших факторів..... | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| g) Other factors | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так"

Please provide details for where you have indicated "yes"

10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заяви, призначений для експертизи, перевіреним на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так

Yes

(просимо надати деталі)
(please provide details as specified by
the Authority)

Hi

No

Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

Ініціали та прізвище уповноваженої особи

Applicant's name

Підпис
Signature

Дата
Date

_____ - _____ - _____

**МЕТОДИКА
проведення експертизи сортів кукурудзи звичайної (*Zea mays L.*)
на відмінність, однорідність і стабільність**

Загальні рекомендації

1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів кукурудзи звичайної (*Zea mays L.*) (за винятком декоративних сортів).

2. Необхідний рослинний матеріал – насіння

1) Компетентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 1500 шт. насінин (0,6 кг) для ліній та по 1 кг для гібридів і перехреснозапильних сортів. Для гібридів додатково надають 1500 шт. насінин (0,6 кг) кожного батьківського компонента.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

3. Метод експертизи

1) *Тривалість експертизи.* Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, вільнозапилених сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій.

Використано документ UPOV TG /02/7, 2009. Зміни й доповнення внесені : Присяжнюк Л. М., канд. с.-г. наук, Гринів С. М., канд. с.-г. наук, Шитікова Ю. В., Черній С. О., Таганцова М. М., Свинарчук О. В., Мельник С. І., д-р екон. наук, Ткачик С. О., канд. с.-г. наук, Києнко З. Б., канд. с.-г. наук, Український інститут експертизи сортів рослин, 2019.

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібриду – дві вихідні лінії, трилінійного гібриду – простий гібрид та три лінії, подвійного гібриду – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію (успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис) – польові дослідження вище зазначеної лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявитика, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

Якщо вихідна лінія, як батьківський компонент є стерильною, тривалість дослідження становить тільки один незалежний вегетаційний цикл. У випадку, коли вихідна лінія, яка підтримує стерильність, є фертильна, заявник повинен заявити про це, дана лінія має бути досліджена два незалежні вегетаційні цикли.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст і розвиток рослин, і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожне дослідження має включати щонайменше: 40 рослин для інbredних ліній і простих гібридів; 60 рослин для інших типів гібридів і вільнозапильних сортів, розділених на два повторення.

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ). Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких впродовж вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак;

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин.

6) *Кількість рослин / частин рослин.* Для інbredних ліній і простих гібридів усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 40 рослин або частин 40 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 10 рослин або частин 10 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 40 рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 40 рослин або частин 40 рослин.

Для інших типів гібридів усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 60 рослин або частин 60 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 60 рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 60 рослин або частин 60 рослин.

Для вільнозапилених сортів усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 60 рослин або частин 60 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 40 рослин або частин 40 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 60 рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 60 рослин або частин 60 рослин.

4. Оцінка відмінності, однорідності та стабільності

Ознаки, що використовують для оцінки відмінності, однорідності й стабільності та ступені їх виявлення наведені в Таблиці ознак 7. Кожному ступеню виявлення ознаки присвоєно коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

1) Експертиза на відмінність

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису первого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізняним з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнати сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

2) Експертиза на однорідність

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності інbredних ліній і простих гібридів приймається популяційний стандарт 3% за рівня ймовірності 95%. У вибірці з 40 рослин допускається три нетипові. Крім того, той самий популяційний стандарт і рівень ймовірності приймається у випадку дослідження інbredних ліній перехреснозапильних рослин, материнських ліній простих гібридів (різниця висоти рослин, розміру качана, скоростигlostі досліджується через поліморфізм ізоферментів).

Для оцінки однорідності інших типів гібридів і вільнозапилених сортів використовують відносні межі мінливості методом порівняння з достатньо вивченими гібридами та сортами.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

3) Експертиза на стабільність

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти-кандидати групують із подібними загальновідомими сортами на групи для полегшення оцінки відмінності. Для групування використовують ознаки, які, як відомо з практики, не варіють або дуже слабко варіють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- волоть – час цвітіння (ознака 8);
- волоть – антоціанове забарвлення основи колоскової луски (ознака 9);
- качан – антоціанове забарвлення шовку (ознака 16);
- рослина – за довжиною (ознака 24);
- качан – тип зернівки (ознака 36);

- за винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан – забарвлення низу зернівки (ознака 39);
 - качан – антоціанове забарвлення лусок стрижня (ознака 41).

Для чіткого виявлення ознак поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

6. Умовні позначення

(*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залучаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків коли виявлення попередньої ознаки або умови довкілля це унеможливило;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

PC – попкорнові сорти;

SC – цукрові сорти;

(S) – для трилінійних та подвійних гібридів.

7. Таблиця ознак сортів кукурудзи звичайної

Назва ознаки		Ступінь виявлення ознаки	Код	Сорт-еталон
1	2	3	4	5
1. QN	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви VG, (S) 14	відсутнє або дуже слабке	1	0674, Jubilee (SC)
		слабке	3	MO17, Puma (SC)
		помірне	5	Gyöngymazsola (SC), F252
		сильне	7	F244
		дуже сильне	9	
2. (+) PQ	Перший листок: форма верхівки VG 14	загострена	1	
		від загостrenoї до округлої	2	0674
		округла	3	Empire (SC), F816
		від округлої до лопатоподібної	4	F259, Merkur (SC)
		лопатоподібна	5	EP1
3. QN	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення VG 51–59	слабка	1	W 182E
		помірна	2	Empire (SC), F816
		сильна	3	GSS 3287 (SC), W401
4. (+) QN	Листок: хвилястість краю пластинки VG, (a) 51–59	відсутня або дуже слабка	1	F2
		помірна	2	F252, Puma (SC)
		сильна	3	Empire (SC), F259

1	2	3	4	5
5. (+) QN	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом VG, (a), 65–69	дуже малий	1	
		малий	3	A188
		середній	5	F66, GH2547 (SC)
		великий	7	F186, Spirit (SC)
		дуже великий	9	
6. (+) QN	Листок: положення пластинки в просторі VG, (a) 65–69	пряме	1	WD36
		ледь похиле	3	A654, Bonus (SC)
		помірно похиле	5	Jubilee (SC), W117
		сильно похиле	7	W79A
		поникле	9	
7. QN	Стебло: зигзагоподібність VG 65–69	відсутня або дуже слабка	1	F2
		слабка	2	F186
		сильна	3	F66
8. (*) (+) QN	Волоть: час цвітіння MG, (b)	дуже ранній	1	
		від дуже раннього до раннього	2	KW1069, Spirit (SC)
		ранній	3	Champ (SC), F257
		від раннього до середнього	4	Centurion (SC), F259
		середній	5	F522, Zenith (SC)
		від середнього до пізнього	6	A632
		пізній	7	B73
		від пізнього до дуже пізнього	8	AM1513
		дуже пізній	9	

1	2	3	4	5
9. (*) (+) QN	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски VG, (S), (b) 65–69	відсутнє або дуже слабке	1	Royalty (SC), W117
		слабке	3	Boston (SC), F66
		помірне	5	F107
		сильне	7	EP1
		дуже сильне	9	
10. (+) QN	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи VG, (S), (b) 65–69	відсутнє або дуже слабке	1	Empire (SC), F259
		слабке	3	F2, Royalty (SC)
		помірне	5	Centurion (SC), WD36
		сильне	7	W79A
		дуже сильне	9	
11. (+) QN	Волоть: антоціанове забарвлення пиликів VG, (S), (b)	відсутнє або дуже слабке	1	A654, Empire (SC)
		слабке	3	F2, Royalty (SC)
		помірне	5	Centurion (SC), W182E
		сильне	7	
		дуже сильне	9	
12. (*) (+) QN	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками VG, (c) 65–69	дуже малий	1	
		малий	3	F492
		середній	5	EP1, Mv. Aranyos (SC)
		великий	7	Bonus (SC), F186
		дуже великий	9	
13. (*) (+) QN	Волоть: положення бічних гілочок у просторі VG, (S), (c), 69	пряме	1	El Toro (SC), F257
		ледь похиле	3	Empire (SC), F816
		помірно похиле	5	Bonus (SC), F182E
		сильно похиле	7	F66

1	2	3	4	5
		поникле	9	
14. (*) QN	Волоть: кількість первинних бічних гілочок MS/VG 65–75	відсутня або дуже мала	1	F7
		мала	3	Mv. Aranyos (SC), F252
		середня кількість	5	F244, Kokanee (SC)
		велика	7	A188, Zenith (SC)
		дуже велика	9	Suregold (SC)
15. (+) QN	Качан: час появи шовку MG	дуже ранній	1	Mv. Aranyos (SC)
		від дуже раннього до раннього	2	KW1069, Spirit (SC)
		ранній	3	Champ (SC), F257
		від раннього до середнього	4	F259, Royalty (SC)
		середній	5	Bonus (SC), F522
		від середнього до пізнього	6	A632
		пізній	7	B73
		від пізнього до дуже пізнього	8	AM1513
		дуже пізній	9	
16. (*) QN	Качан: антоціанове забарвлення шовку VG, (S) 65	відсутнє або дуже слабке	1	Bonus (SC), F7, F195
		слабке	3	El Toro (SC), F257
		помірне	5	Gyöngymazola (SC), F244
		сильне	7	W401

1	2	3	4	5
		дуже сильне	9	
17. (+) QN VG, (S) 65–75	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	F16, Jubilee (SC)
		слабке	3	Puma (SC), W117
		помірне	5	El Toro (SC), WD36
		сильне	7	EP1
		дуже сильне	9	
18. QN VG, (b), 61–71	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	F16
		середньої щільності	5	EP1, Royalty (SC)
		щільне	7	Empire (SC), F259
19. (+) QN VG, (S) 71–75	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	Jubilee (SC), W401
		слабке	3	F107
		помірне	5	F257
		сильне	7	EP1
		дуже сильне	9	
20. (+) QN VG, (S) 71–75	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	Jubilee (SC), F259
		слабке	3	F816
		помірне	5	W79A
		сильне	7	F257
		дуже сильне	9	
21. (+) QN	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної)	дуже коротка	1	
		коротка	3	EP1
		середня	5	Bonus (SC), F244

1	2	3	4	5
	гілочки до верхівки) MS, 71–75	довга	7	Empire (SC), F492
		дуже довга	9	
22. (*) (+) QN	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) MS 71–75	дуже коротка	1	
		коротка	3	EP1
		середня	5	W182E
		довга	7	F492
		дуже довга	9	
23. QN	Волоть: бічна гілочка за довжиною MS, (с) 71–75	дуже коротка	1	
		коротка	3	EP1
		середня	5	A632
		довга	7	F492
		дуже довга	9	
24.1 (*) (+) QN	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розвусним типом зернівки. Рослина: за довжиною MS, 75–85	дуже коротка	1	F7
		коротка	3	Spirit (SC), W117
		середня	5	F244, Puma (SC)
		довга	7	Royalty (SC), WD36
		дуже довга	9	Enterprise (SC)
24.2 (*) (+) QN	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розвусним типом зернівки. Рослина:	дуже коротка	1	
		коротка	3	PR39D23
		середня	5	PR37Y12
		довга	7	DKC5166
		дуже довга	9	

1	2	3	4	5
	за довжиною MS, 75–85			
25. (+) QN	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини MG, 75–85	дуже мале	1	Gyöngymazsola (SC)
		мале	3	F816, Spirit (SC)
		середнє	5	F252, Royalty (SC)
		велике	7	F481
		дуже велике	9	
26. QN	Листок: пластинка за ширину MS, (a) 75–85	дуже вузька	1	
		вузька	3	Champ (SC), F16
		середня	5	Empire (SC), F244
		широка	7	Centurion (SC), F481
		дуже широка	9	
27. QN	Качан: ніжка за довжиною VG 75–85	дуже коротка	1	
		коротка	3	Centurion (SC), F259
		середня	5	A654, Jubilee (SC)
		довга	7	F107
		дуже довга	9	
28. (*) (+) QN	Качан: за довжиною MS, 92–93 для цукрової 75–79	дуже короткий	1	
		короткий	3	F2
		середній	5	A654, Spirit (SC)
		довгий	7	Empire (SC), M017
		дуже довгий	9	
29. QN	Качан: діаметр (посередині) MS, 92–93	дуже малий	1	
		малий	3	F7
		середній	5	W117

1	2	3	4	5
	для цукрової 75–79	великий дуже великий	7 9	Centurion (SC), F481 Empire (SC)
30. (+) QN	Качан: форма VG 92–93 для цукрової 75–79	конусна конусно-циліндрична циліндрична	1 2 3	F16, Wombat (SC) Centurion (SC), F481 F66, GH2547 (SC)
31. QN	Качан: кількість зернових рядів MS, 92–93 для цукрової 75–93	дуже мала мала середня велика дуже велика	1 3 5 7 9	
32. QL	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен VG, (S), (e), 75–79	одне два	1 2	Jubilee (SC) Eolrukchal-ilho, Serendipity (SC)
33. (*) QN	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору VG, (e), 75–79	слабка помірна сильна	3 5 7	Gyöngymazsola (SC) Royalty (SC) Kokanee (SC)
34. QN	Лише для сортів з цукровим типом	коротка середня	3 5	
				Boston (SC)

1	2	3	4	5
	зернівки. Зернівка: за довжиною VG, (d), 75–79	довга	7	GH5704 (SC)
35. (+) QN	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною VG, (d), 75–79	вузька	3	Bonus (SC)
		середня	5	Jubilee (SC)
		широва	7	Mv. Aranyos (SC)
36. (*) (+) QL	Качан: тип зернівки VG, (S), (d), (e) 92	кременистий	1	F2
		кременистоподібний	2	F252
		проміжний	3	F107
		зубовидноподібний	4	A654
		зубовидний	5	W182E
		цукровий	6	Jubilee (SC)
		розлусний	7	Iowa Pop (PC)
		восковий	8	
		борошнистий	9	
37. (*) (+) QN	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок VG, (d), (e), 92	слабка	1	Zarja (SC)
		помірна	3	Merkur (SC)
		сильна	5	Dessert 73 (SC)
38. (*) PQ	Качан: забарвлення верхівки зернівки VG, (S), (d), (e)	біле	1	Pure white (SC), Snowbelle (SC), A188
		жовтувато-біле	2	

1	2	3	4	5
	92–93	жовте	3	F259
		жовто-оранжеве	4	Gyöngymazsola (SC), F2
		оранжеве	5	F257, GH 2547 (SC)
		червоно-оранжеве	6	Dynasty (SC)
		червоне	7	
		пурпурове	8	
		коричнювате	9	Zenith (SC)
		синьо-чорне	10	Miheukchal
39. (*) PQ	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки VG, (S), (d), (e) 92–93	біле	1	F481
		жовтувато-біле	2	A188
		жовте	3	
		жовто-оранжеве	4	F66
		оранжеве	5	EP1
		червоно-оранжеве	6	
		червоне	7	
		пурпурове	8	
		коричнювате	9	
		синьо-чорне	10	
40. (+) QN	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення VG, 93	метелик	1	Robust 97461 (PC)
		проміжний	2	
		кулястий	3	Robust 90252 (PC)
41. (*) (+)	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	F2, F257
		слабке	3	F252

1	2	3	4	5
QN 93	VG, (S)	помірне	5	W117
		сильне	7	A632
		дуже сильне	9	

Коди фаз розвитку рослин кукурудзи, в які рекомендовано робити спостереження


Коди	Загальний опис
14	4 листки розгорнулись; кущіння; видовження стебла; трубкування
<i>Поява суцвіття</i>	
51 (♂, ♀)	Видиме суцвіття
59	Повна поява суцвіття
<i>Цвітіння</i>	
61 (♂, ♀)	Початок цвітіння
65 (♂, ♀)	Середина цвітіння
69	Завершення цвітіння
<i>Молочна стиглість</i>	
71	Зернівка водостигла
73	Рання молочна стиглість
75	Середина молочної стигlosti
79 (1)	Зернівка досягла остаточного розміру
<i>Воскова стиглість</i>	
85	М'яка воскова стиглість
<i>Достигання</i>	
92	Зернівка тверда (важко продавити нігтем)
93	Зернівка вдень відокремлюється

8. Пояснення до Таблиці ознак сортів кукурудзи звичайної

Ознаки обстежують за таким ключем у другій колонці Таблиці ознак, як зазначено нижче:

- (а) обстеження листка, розташованого над верхнім качаном;
 - (б) обстеження середньої третини головної гілки волоті;
 - (с) обстеження другої знизу гілки волоті;
 - (д) обстеження середньої третини найвищого добре розвиненого качана;
 - (е) на цю ознаку може мати вплив перехресне запилення. Зокрема, у випадку цукрової та розлусної кукурудзи перехресне запилення має бути попереджене.

До 2. Перший листок: форма верхівки



загострена від загостrenoї округла від округлої до лопатоподібна
до округлої лопатоподібної

До 4. Листок: хвилястість краю пластиинки




відсутня або дуже слабка помірна сильна

До 5. Листок: кут між пластиною і стеблом

До 12. Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками

Обстеження проводять не пізніше 30 діб після початку цвітіння волотей.



1

3

5

7

9

дуже малий
(до 5°)

малий
($+/-25^\circ$)

середній
($+/-50^\circ$)


великий
($+/-75^\circ$)

дуже великий
(понад 90°)

До 6. Листок: положення пластиинки в просторі

До 13. Волоть: положення бічних гілок у просторі

Обстеження проводять не пізніше 30 діб після початку цвітіння волотей.



1

3

5

7

9

пряме

ледь похиле

помірно похиле

сильно похиле


поникле

До 8. Волоть: час цвітіння

Час цвітіння визначається, коли 50% рослин мають видимі піляки в середній третині головної гілки.

До 9. Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски

До 10. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи



До 11. Волоть: антоціанове забарвлення піляків

Обстежують свіжі піляки на середній третині головної гілки.

До 15. Качан: час появи шовку

Час появи шовку визначається тоді, коли 50% рослин викинули шовк.

До 17. Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів

Обстеження здійснюється, якщо повітряні корені є добре розвиненими, свіжими і присутні у 50% рослин.

До 19. Листок: антоціанове забарвлення піхви


Обстежують середню третину рослини.

До 20. Стебло: антоціанове забарвлення міжузлів

Обстежують верхню частину від місця прикріплення верхнього качана.

До 21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)

До 22 Головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)




До 24.1, 24.2, 25. Лише для інbredних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки: Рослина за довжиною (24.1). Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки: Рослина за довжиною (24.2). Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини (25)

Висоту рослини визначають разом із волоттю.


До 28. Качан: за довжиною




До 30. Качан: форма



До 35. Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за ширину



До 36. Качан: тип зернівки



1	Кременистий	Твердий ендосперм, зернівка округлої форми, товстий шар твердого ендосперму на верхівці, більший розмір зернівки в порівнянні з розлусним типом
2	Кременистоподібний	Більшою мірою твердий ендосперм, зернівка округлої форми, помірний шар твердого ендосперму на верхівці
3	Проміжний	Тонкий шар твердого ендосперму на верхівці, верхівка злегка вдавлена
4	Зубовидноподібний	М'який ендосперм верхівка помірно вдавлена, помірний шар твердого ендосперму на дорсальній частині зернівки
5	Зубовидний	М'який ендосперм верхівки, тонкий шар твердого ендосперму лише в дорсальній частині зернівки, верхівка зернівки сильно вдавлена
6	Цукровий	Лискучий ендосперм з відсутнім або дуже низьким умістом крохмалю, зернівка зморшкувата
7	Розлусний	Практично весь ендосперм твердий, зернівка подібна до рисової зернівки (загострена) або на перлину (заокруглена), дуже товстий шар твердого ендосперму на верхівці, зернівка менша за розміром у порівнянні з кременистим типом
8	Восковий	Близько 100% амілопектину, восковий вигляд зернівки, рожеве забарвлення ендосперму під час йодного тесту (інші типи зернівок під час такого тесту набувають темно-синього забарвлення)

		Забарвлення під час йодного тесту:
		
	восковий	
9	Борошнистий	Ендосперм м'який, зернівка заокруглена або злегка вдавлена на верхівці

До 37. Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок



До 40. Тільки сорти з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення
Качан має зберігатись щонайменше 2–3 місяці після збирання до лущення.
Сухі зернівки (13,0–13,5% – оптимальний уміст вологи) розлущуються за нагрівання. Має бути оглянута типова форма розлущених зернівок.



1
метелик



3
кулястий

До 41. Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня

Антоціанове забарвлення має обстежуватися на середній третині стрижня найвищого розвиненого качана після видалення декількох зернівок.

9. Застосування ДНК маркерів для визначення S- та C-типів стерильності кукурудзи звичайної (*Zea mays L.*) в кваліфікаційній експертизі на відмінність, однорідність та стабільність»

1) Реактиви для виділення ДНК

– Лізуючий розчин (на 200 мл: СТАВ – 4 г; NaCl – 16,4 г; Tris – 3,15 г; EDTA – 1,5 г, pH розчину 8,0). 20 mM EDTA; 100 mM Tris-HCl; 1,4 M NaCl; 2% СТАВ. Зберігають за температури 4°C до 4 місяців.

– Розчин для преципітації (на 200 мл: СТАВ – 1 г; NaCl – 0,5 г, pH розчину 8,0). Кінцеві концентрації компонентів: 0,5% СТАВ; 0,04 M NaCl. Зберігають розчин при 4°C до 4 місяців.

– Хлороформ; трихлорметан; метилтрихлорид – CHCl₃ (M_m = 119,37).

– Розчин 1,2 M NaCl (на 100 мл: NaCl – 7 г). Зберігають при кімнатній температурі до 6 місяців.

– Ізопропіловий спирт; ізопропанол; 2-пропанол – (CH₃)₂CHOH (M_m=60,10)

– Розчин для відмивання (70 % етиловий спирт). Зберігають розчин при кімнатній температурі до 6 місяців.

- Розчин ТЕ (на 200 мл: 0,5 М EDTA pH 8,0 – 400 мкл; 1 М Tris-HCl pH 8,0 – 1 мл). Кінцеві концентрації ТЕ розчину: 1мМ EDTA pH 8,0; 10 мМ Tris-HCl pH 8,0. Зберігають розчин при 4°C до 6 місяців.
- Розчин 0,5 М EDTA (на 200 мл: 37,22 г EDTA, pH розчину 8,0). Зберігають за температури 4°C до 6 місяців.
 - pH всіх розчинів регулюють за допомогою 1 М NaOH.

2) Проведення екстракції ДНК

1. Для виділення ДНК пророшують по 10 насінин кожної лінії кукурудзи протягом 5 днів за ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості».
2. Гомогенізують наважку зразку 50 мг з 500 мкл лізуючого розчину та переносять у мікроцентрифужну пробірку. Додають 300 мкл стерильної деіонізованої води та вортексують протягом 30 с.
3. Інкубують за температури 65°C протягом 45 хв. Після цього центрифугують за 1 3000g протягом 10 хв.
4. Весь супернатант ~300 мкл переносять в нову мікроцентрифужну пробірку та додають хлороформ у співвідношенні 1:1 до відібраного супернатанту, обережно перемішують протягом 30 с.
5. Після центрифугування за 1 3000g 10 хв. переносять верхній шар (~250 мкл) в нову мікроцентрифужну пробірку та повторюють п. 5.
6. Після центрифугування за 1 3000g протягом 5 хв. додають 2 об'єми (~500 мкл) Розчину для преципітації та обережно перемішують.
7. Інкубують 60 хв. за кімнатної температури.
8. Центрифугують за 13000g протягом 5 хв. та обережно видаляють супернатант не зачіпаючи осад (преципітат).
9. Розчиняють преципітат в 350 мкл 1,2 М NaCl та додають 0,6 об'єму (210 мкл) охолодженого ізопропілового спирту, обережно перемішують.
10. Центрифугують за 1 3000 g протягом 10 хв., після чого видаляють супернатант, не зачіпаючи осад. До отриманого осаду додають 500 мкл 70% етилового спирту, обережно перемішують.

11. Центрифугують за 13000 g протягом 10 хв, видаляють супернатант. Осад підсушують за 60°C протягом 30 хв.

12. Сухий осад, в якому міститься ДНК розчиняють в 50 мкл ТЕ-буферу. Отриману ДНК одразу використовують для проведення ПЛР або зберігають за температури +4°C не більше одного місяця.

13. Концентрацію та чистоту ДНК визначають за допомогою спектрофотометра/мультифункціонального мікропланшетного рідеру CLARIOstar при довжинах хвиль 260 та 280 нм.

3) Умови проведення ПЛР

Використовують дві пари праймерів до генів мітохондрій за двома основними типами стерильності. Характеристики праймерів та склад реакційної суміші наведені в таблиці 1 та 2.

Таблиця 1. Характеристика праймерів

Тип ЦЧС	Нуклеотидна послідовність праймерів 5'→3'	Розмір амплікону, пн	Послідовність ДНК (GenBank)
ЦЧС-С	F* – ATGCTAATGGTGTCCGATTCC R** - AGCATCATCCACATTGCTAG	398	S81074
ЦЧС-S	F – CAACTTATTACGAGGCTGATGC R - AGTCGTCCCCATATAACCCGTAC	799	AF008647

*F – прямий праймер.

**R – зворотний праймер.

Таблиця 2. Склад реакційної суміші для проведення ПЛР ДНК ліній кукурудзи

Компоненти ПЛР	Кінцева концентрація
1	2
10×ПЛР буфер*	1×
dNTP	200 мкМ
Тaq-полімераза	1 од.
Праймер F	0,2 мкМ

Продовження таблиці

1	2
Праймер R	0,2 мкМ
dH ₂ O	-
Загальний об'єм реакції	10 мкл

*10 mM Tris-HCl, pH 9,0; 50 mM KCl; 0,01% Тритон X-100; 20 mM MgCl₂

4) Проведення ПЛР ДНК ліній кукурудзи

1. Розраховують кількість компонентів реакційної суміші для проведення ПЛР відповідно до наведених в таблиці 2 кінцевих концентрацій.

2. Реакційну суміш готують у пробірці 1,5 мл. Розрахунок компонентів ПЛР здійснюють з урахуванням можливих втрат (фактична кількість зразків+1 зразок).

3. Додають в кожну 0,2 мл пробірку по 9 мкл реакційної суміші відповідно до кількості зразків.

4. Після цього в кожну пробірку додають по 1 мкл зразків ДНК (концентрація 100 нг/мкл). Всі операції бажано проводити на льоду з метою уникнення утворення неспецифічних фрагментів реакції.

5. Готову реакційну суміш з зразками ДНК центрифугують для осадження крапель та бульбашок протягом 15 с за 7 000 g. Пробірки з реакційною сумішшю поміщають в ампліфікатор та задають параметри ампліфікації ДНК ліній кукурудзи (табл. 3).

Таблиця 3. Параметри ПЛР ДНК ліній кукурудзи

Етап	Температура, °C	Час
Початкова денатурація	96	2 хв.
Денатурація	94	45 с
Гібридизація праймерів	55	30 с
Елонгація	72	1 хв.
Кінцева елонгація	72	2 хв.
Кількість циклів – 30		

5) Електрофорез продуктів ПЛР в агарозному гелі

Реактиви для електрофорезу

– 10×ТВЕ-буфер (стоковий розчин) (на 1 л: 108 г Tris, 55 г борної кислоти.

Після розчинення додають 40 мл 0,5 М ЕДТА (рН 8,0)). Зберігають у холодильнику при 4°C до 6 місяців.

– 0,5×ТВЕ-буфер (робочий розчин) (на 1 л розчину: 50 мл 10×ТВЕ-буфер (десятикратний ТВЕ-буфер), доводять об'єм до 1 л дистильованою водою). Зберігають при кімнатній температурі не більше 1 місяця.

– легкоплавка агароза для електрофорезу;

– етидій бромистий; бромід етидію; EtBr; 2,7-диамін-10-етил-9-фенілфенантрідіум бромід; EtBr – C₂₁H₂₀NBr (M_n=394,3) розчин 10 мг/мл.

– агарозний гель 3% (на 100 мл: 3 г легкоплавкої агарози для електрофорезу розчинити в 0,5×ТВЕ-буфері шляхом нагрівання у мікрохвильовій печі або киплячій водяній бані). Приготований гель одразу використовують для проведення електрофорезу.

6) Проведення горизонтального електрофорезу продуктів ПЛР

1. Після повного розчинення агарози, гель охолоджують при кімнатній температурі до 60°C. Додають розчин бромистого етидію до кінцевої концентрації 1 мкг/мл. Встановлюють гребінку в камеру для заливки гелів та заливають гель товщиною близько 4 мм. Після полімеризації гелю гребінку видаляють попередньо заливши поверх гелю розчин 0,5×ТВЕ-буферу шаром 1 мм.

2. Гель на підложці поміщають в електрофорезну камеру приладу для горизонтального електрофорезу, заповнену 0,5×ТВЕ-буфером.

3. Готують розчин 1×буферу для нанесення (однократний буфер): для кожного зразку змішують 1,66 мкл 6×буферу (шестикратний буфер для нанесення*) та 3,34 мкл деіонізованої води.

*Примітка: комерційний реактив або 0,25% бромфеноловий синій, 0,25% ксиленцианол, 30% гліцерин.

4. Відбирають по 5 мкл продуктів ПЛР та змішують з 5 млк 1×буферу для нанесення, уникаючи утворення бульбашок. В лунки гелю вносять отриманий розчин (10 мкл) та маркер молекулярної маси ДНК.

5. Електрофорез продуктів ампліфікації проводять протягом 1,5 год. за напруженості електричного поля 5 В/см у напрямку від катода до анода в 0,5×ТВЕ-буфері.

6. Для візуалізації продуктів ПЛР після закінчення електрофорезу гель поміщають на фільтр трансілюмінатора з лампою ультрафіолетового світла (254-310 нм). Результати електрофоретичного розділення продуктів ампліфікації документують за допомогою цифрової камери або інших систем документування гелю.

7. На основі отриманих електрофорограм визначити розмір ампліконів за допомогою комп’ютерної програми TotalLab або іншого аналогічного програмного забезпечення.

7) Визначення S- та C –типів стерильності у ліній кукурудзи

Рослинний матеріал кукурудзи, пов’язаний з S та C типами стерильності включав по: 4 пари стерильних ліній-аналогів та їх закріплювачів, 3 стерильних ліній-аналога С типу та 3 стерильних ліній-аналога S типу.

В результаті аналізу ліній кукурудзи, які в польових умовах продемонстрували ознаки стерильності, за праймерами до S типу стерильності були отримані амплікони очікуваного розміру 799 пн та 398 пн (рис. 1 а та рис. 1 б).




Рис. 1. Результати ПЛР ліній кукурудзи з S-типом стерильності: М – маркер молекулярної маси 100 bp DNA Ladder O'GeneRuler (Thermo Scientific); а) 1-3 – стерильні лінії за S-типом; б) 1-3 – стерильні лінії за C-типом

10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Maize (*Zea mays* L.) (TG /02/7, UPOV) // Geneva. 2009-04-01. – 62 P. // URL : www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg002.pdf.
2. Присяжнюк Л. М., Ткачик С. О., Шитікова Ю. В. та ін. Визначення молекулярно-генетичного поліморфізму сільськогосподарських культур за допомогою SSR маркерів. Вінниця, 2019. 23 с.
3. Сліщук Г. І., Кожухова Н. Е., Сиволап Ю. М. Молекулярно-генетичний аналіз регіонів мітохондріону, асоційованих з цитоплазматичною чоловічою стерильністю, у кукурудзи. *Цитологія и генетика*. 2011. № 3. С. 15-19.
4. Kalendar R., Khassenov B., Ramankulov Y. et al. FastPCR: An in silico tool for fast primer and probe design and advanced sequence analysis. *Genomics*. 2017. Vol. 109, No. 3-4. P. 312-319. <https://doi:10.1016/j.ygeno.2017.05.005>.
5. Liu Z., Peter S. O., Long M. et al. A PCR assay for rapid discrimination of sterile cytoplasm types in maize. *Crop science*. 2002. Vol. 42. No. 2. P. 566-569.
6. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Maize (*Zea mays* L.) (TG /02/7, UPOV) // Geneva. 2009-04-01. – 62 P. // URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg002.pdf.
7. Vancetovic J., Ignjatovic-Micic D., Nikolic A. et al. (2013). Potentially a new subtype of the cytoplasmic male sterility S-type in maize. *Genetika*. Vol. 45. No. 1. P. 145-151). <https://doi:10.2298/GENS1301145V>

11. Технічна анкета

Номер заявки

(не заповнюється заявитником)

Annex to Application

(not to be filled in by the applicant)

ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY

Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявки, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.

Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.

In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.

1. Предмет Технічної анкети

1. Subject of the Technical Questionnaire

1.1. Ботанічний таксон

(вид)

(латинською мовою)

1.1 Botanical name species
(in Latin Language)

Zea mays L.

1.2. Ботанічний таксон

(вид)

(українською мовою)

1.2 Botanical name species
(in Ukrainian Language)

Кукурудза звичайна

2. Заявник(и)

2. Applicant(s)

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

Name (denomination)

Автор(и)

Autor(s)

3. Назва сорту

3. Variety denomination

4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту

4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety

4.1. Схема селекції

4.1. Breeding scheme

Сорт, одержаний в результаті:

Variety resulting from:

4.1.1. схрещування

crossing

а) контролюване схрещування

a) controlled cross

(точно вказати батьківські сорти)

(please state parent varieties)

б) частково відоме схрещування

b) partially known cross

(вказати відомий батьківський

сорт(и))

(please state known parent variety(ies))

b) невідоме схрещування
v) unknown cross

4.1.2. мутація
mutation

(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)

4.1.3. виявлення та поліпшення
discovery and development

(точно визначити, де і коли виявлено та як
поліпшено)

(please state where and when discovered and how
developed)

4.1.4. інше
other

(надати деталі)
(please provide details)

4.2. Метод розмноження сорту:
method of propagating the variety

4.2.1. сорти, що розмножуються насінням
seed-propagated varieties

a) самозапилення
a) self-pollination

б) перехресне запилення
b) cross-pollination

ПОПУЛЯЦІЯ
population

синтетичний сорт
synthetic variety

в) гібрид
c) hybrid

Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити
детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида:

In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the
parent lines required for propagating the hybrid e.g.

Простий гібрид $\text{♀} \times \text{♂}$ Трьохлінійний гібрид $\text{♀} \times \text{♂} \rightarrow (\text{♀} \times \text{♂}) \times \text{♂}$ і має визначати, зокрема:
Single Hybrid Three-Way Hybrid and should identify in particular:

- a) будь-які чоловічі стерильні лінії
a) any male sterile lines
б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній
b) maintenance system of male sterile lines.

г) інші
d) other

(надати детальну інформацію)
(please provide details)

4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно:
vegetative propagation

a) живці
a) cuttings

б) розмноження *in vitro*
b) *in vitro* propagation

в) інші (установлений метод)
c) other (state method)

4.2.3. інші
other

(надати детальну інформацію)
(please provide details)

5. Ознаки сорту

Variety characteristics

Назва ознаки Variety denomination		Ступінь проявлення Manifestation	Сорт-еталон Example variety	Код Code
5.1 (8)	Волоть: час цвітіння Tassel: time of anthesis	дуже ранній very early		1 <input type="checkbox"/>
		від дуже раннього до раннього very early to early	KW1069	2 <input type="checkbox"/>
		ранній early	F257	3 <input type="checkbox"/>
		від раннього до середнього early to medium	F259	4 <input type="checkbox"/>
		середній medium	F522	5 <input type="checkbox"/>
		від середнього до пізнього medium to late	A632	6 <input type="checkbox"/>
		пізній late	B73	7 <input type="checkbox"/>
		від пізнього до дуже пізнього late to very late	AM153	8 <input type="checkbox"/>
		дуже пізній very late		9 <input type="checkbox"/>
5.2 (9)	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски Tassel: anthocyanin coloration at base of glume	відсутнє або дуже слабке absent or very weak	W117	1 <input type="checkbox"/>
		слабке weak	F66	3 <input type="checkbox"/>
		помірне medium	F107	5 <input type="checkbox"/>
		сильне strong	EP1	7 <input type="checkbox"/>
		дуже сильне very strong		9 <input type="checkbox"/>
5.3 (16)	Качан: антоціанове забарвлення шовку Ear: anthocyanin coloration of silks	відсутнє або дуже слабке absent or very weak	F7, F195	1 <input type="checkbox"/>
		слабке weak	F257	3 <input type="checkbox"/>
		помірне medium	F244	5 <input type="checkbox"/>
		сильне strong	W401	7 <input type="checkbox"/>
		дуже сильне very strong		9 <input type="checkbox"/>

5.4i (24.1)	<u>Лише для інbredних ліній</u> <u>та сортів з</u> <u>цукровим або розлусним</u> <u>типов зернівки.</u> Рослина: за довжиною Only inbred lines and varieties with ear type of grain: sweet or pop: Plant: length	дуже коротка very short	F7	1 <input type="checkbox"/>
		коротка short	W117	3 <input type="checkbox"/>
		середня medium	F244	5 <input type="checkbox"/>
		довга long	WD36	7 <input type="checkbox"/>
		дуже довга very long		9 <input type="checkbox"/>
5.4ii (24.2)	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типов зернівки. Рослина: за довжиною Only hybrids and open-pollinated varieties, excluding varieties with ear type of grain: sweet or pop: Plant: length	дуже коротка very short		1 <input type="checkbox"/>
		коротка short	PR39D23	3 <input type="checkbox"/>
		середня medium	PR37Y12	5 <input type="checkbox"/>
		довга long	DKC5166	7 <input type="checkbox"/>
		дуже довга very long		9 <input type="checkbox"/>
5.5 (36)	Качан: тип зернівки Ear: type of grain	кременистий flint	F2	1 <input type="checkbox"/>
		кременистоподібний flint-like	F252	2 <input type="checkbox"/>
		проміжний intermediate	F107	3 <input type="checkbox"/>
		зубовидноподібний dent-like	A654	4 <input type="checkbox"/>
		зубовидний dent	W182E	5 <input type="checkbox"/>
		цукровий sweet		6 <input type="checkbox"/>
		розлусний pop		7 <input type="checkbox"/>
		восковий waxy		8 <input type="checkbox"/>
		борошнистий flour		9 <input type="checkbox"/>
5.6 (39)	<u>За виключенням сортів з</u> <u>цукровим типом зернівки.</u> Качан: забарвлення низу зернівки <u>Excluding varieties with ear type of</u> <u>grain: sweet.</u> Ear: color of dorsal side of grain	біле white	F481	1 <input type="checkbox"/>
		жовтувато-біле yellowish white	A188	2 <input type="checkbox"/>
		жовте yellow		3 <input type="checkbox"/>
		жовто-оранжеве yellow orange	F66	4 <input type="checkbox"/>
		оранжеве orange	EP1	5 <input type="checkbox"/>
		червоно-оранжеве red orange		6 <input type="checkbox"/>
		червоне red		7 <input type="checkbox"/>
		пурпурове purple		8 <input type="checkbox"/>

		коричнювате brownish		9 <input type="checkbox"/>
		синьо-чорне blue black		10 <input type="checkbox"/>
5.7 (41)	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня Ear: anthocyanin coloration of glumes of cob	відсутнє або дуже слабке absent or very weak	F2, F257	1 <input type="checkbox"/>
		слабке weak	F252	3 <input type="checkbox"/>
		помірне medium	W117	5 <input type="checkbox"/>
		сильне strong	A632	7 <input type="checkbox"/>
		дуже сильне very strong		9 <input type="checkbox"/>

6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявики відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

Назва(и) сорту(ів) подібного(их) до сорту-кандидата Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety	Ознака(и), за якою (якими) сорт-кандидат відрізняється від подібних сортів Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(y) Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) сорту-кандидата Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Коментарі
Comments

7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці ознаки)
(if yes, please provide details)

7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці умови)
(if yes, please provide details)

7.3. Інша інформація (широке використання)

Other information

Main use

(надати детальну інформацію)
(please provide details)**8. Дозвіл на використання**

Authorization for release

a) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?

a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?

Так

Yes

Hi

No

б) чи було одержано такий дозвіл?

b) Has such authorization been obtained?

Так

Yes

Hi

No

Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту

Information on use of GMOs for creating a variety

a) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?

a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?

Так

Yes

Hi

No

б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?

b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?

Так

Yes

Hi

No

Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику.

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертизу

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так

Yes

Hi

No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заяви не має зазнавати будь-якої обробки, що може

вплинути на прояв ознак сорту, поки Комpetентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

- | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| a) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма) | <input type="checkbox"/> | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) | | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| b) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди) | <input type="checkbox"/> | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) | | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| c) культури тканини | <input type="checkbox"/> | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| c) Tissue culture | | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| g) інших факторів | <input type="checkbox"/> | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| g) Other factors | | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так"

Please provide details for where you have indicated "yes"

10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявики, призначений для експертизи, перевіреним на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так

Yes

(просимо надати деталі)
(please provide details as specified
by the Authority)

Hi

No

Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

Ініціали та прізвище уповноваженої особи
Applicant's name

Підпис
Signature

Дата
Date

МЕТОДИКА
проведення експертизи сортів вівса посівного (*Avena sativa L.*) і
голозерного (*A. nuda L.*) на відмінність, однорідність і стабільність

Загальні рекомендації

1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів вівса посівного (*Avena sativa L.*) і голозерного (*A. nuda L.*).

2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, волоті

1) Компетентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 3 кг. Крім того, заявник надсилає щонайменше 150 волотей вівса озимого і 100 – ярого на другий рік експертизи.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

3. Метод експертизи

1) *Тривалість експертизи.* Експертиза має тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли, за необхідності експертизу продовжують на третій.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст, розвиток рослин і достатнє виявлення характерних ознак сорту.

Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає близько 2 000 рослин, які поділяють на два повторення. За проведення експертизи колосових рядків обстежують щонайменше 100 таких рядків.

Для визначення типу розвитку використовують не менше ніж 300 рослин.

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ).

Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

6) *Кількість рослин / частин рослин.* Експертизі підлягає щонайменше 2 000 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 2 000 рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

4. Оцінка відмінності, однорідності та стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

1) Експертиза на відмінність

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису первого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнати сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

2) Експертиза на однорідність

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності приймається популяційний стандарт 0,1% за рівня ймовірності 95%. У вибірці з 2000 рослин допускається 5 нетипових. За оцінки однорідності рослин чи частин рослин волотевих рядків приймається популяційний стандарт 1% за рівня ймовірності 95%. У вибірці зі 100 рослин або частин рослин волотевих рядків допускається три нетипові. Волотевий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Однорідність оцінюють у два етапи. Спершу обстежують 20 рослин або частини 20 рослин. Якщо виявлено 1–3 нетипові рослини, необхідно додатково обстежити 80 рослин або частини 80 рослин. Якщо виявлено понад три нетипові рослини, сорт вважається неоднорідним. За відсутності нетипових рослин сорт визнають однорідним.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

3) Експертиза на стабільність

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти групують за найвідміннішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіють або дуже слабко варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- стебло – опущення найвищого вузла (ознака 6);
- колоскові луски – восковий наліт (ознака 11);
- первинна зернівка – восковий наліт нижньої квіткової луски (ознака 13);
- зернівка – плівчастість (ознака 17);
- зернівка – забарвлення нижньої квіткової луски (ознака 20);
- тип розвитку (ознака 25).

Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

6. Умовні позначення

(*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залучаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли

виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливлюють;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

* Сорти-еталони виділені для ярого типу розвитку

7. Таблиця ознак сортів вівса посівного, вівса голозерного

Назва ознаки		Ступінь виявлення ознаки	Код	Сорт-еталон*
1	2	3	4	5
1. (+) PQ	Рослина: габітус VG (Б) 25–29	прямий	1	Зірковий
		напівпрямий	3	Житомирський, Скарб України
		проміжний	5	Дарунок, Нептун
		напівсланкий	7	
		сланкий	9	
2. (+) QN	Найнижчі листки: опущення піхви VS (Б) 25–29	відсутнє або дуже слабке	1	Скарб України, Дарунок
		слабке	3	Спурт, Ант
		помірне	5	
		сильне	7	
		дуже сильне	9	
3. (*) (+) QN	Листкова пластинка: опущення країв листка VS (A) 40–45	відсутнє або дуже слабке	1	Спурт, Зірковий
		слабке	3	Стерно
		помірне	5	
		сильне	7	
		дуже сильне	9	
4. (+) QN	Кількість рослин із зігнутим пропорцевим листком VG (A) 47–51	відсутня або дуже мала	1	Нептун
		мала	3	Ант, Житомирський
		середня	5	Спурт, Візит
		велика	7	Тіфон
		дуже велика	9	Стерно

1	2	3	4	5
5. QN	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок) VG (A), 50–52	дуже ранній	1	Житомирський
		ранній	3	Зірковий
		середній	5	Спурт, Тіфон
		пізній	7	
		дуже пізній	9	
6. (*) QL	Стебло: опущення найвищого вузла VS (A) 60–65	відсутнє	1	Ант, Тіфон
		наявне	9	Житомирський, Зірковий
7. (+) QN	Стебло: інтенсивність опущення найвищого вузла VS (A) 60–65	дуже слабка	1	
		слабка	3	Зірковий
		помірна	5	Житомирський
		сильна	7	
		дуже сильна	9	
8. (+) QL	Волоть: орієнтація гілочок VG (A) 70–75	одногрива	1	Спурт, Стерно
		стисла	2	Дарунок, Тіфон
		розкидиста	3	Нептун, Ант
9. (+) QN	Волоть: положення гілочок VG (A) 70–75	пряме	1	Зірковий
		напівпряме	3	Житомирський, Візит
		горизонтальне	5	Декамерон
		поникле	7	
		сильно поникле	9	

1	2	3	4	5
10. (+) QL	Волоть: положення вторинних колосків VG (A) 70–75	пряме поникле	1 2	Авгол Стерно, Тіфон, Скарб України
11. QN	Колоскові луски: восковий наліт VG (A) 65–69	відсутній або дуже слабкий слабкий помірний сильний дуже сильний	1 3 5 7 9	Авгол Дарунок Зірковий, Візит Ант
12. QN	Колоскові луски: за довжиною VS (A) 70–75	короткі середні довгі	3 5 7	Авгол Стерно Саломон, Візит
13. (*) QL	Первинна зернівка: восковий наліт нижньої квіткової луски VS (A) 70–75	відсутній наявний	1 9	Авгол, Тіфон Стерно, Спонтано
14. (*) QN	Первинна зернівка: інтенсивність воскового нальоту нижньої квіткової луски VS (A), 70–75	дуже слабка слабка помірна сильна дуже сильна	1 3 5 7 9	

1	2	3	4	5
15. (*) QN	Рослина: за висотою MG (A) 80–85	дуже низька	1	
		низька	3	Тіфон, Стерно
		середня	5	Житомирський, Дарунок
		висока	7	Саломон
		дуже висока	9	Саргон
16. QN	Волоть: за довжиною MG (A) 80–85	дуже коротка	1	Скарб України
		коротка	3	Саргон, Зірковий
		середня	5	Житомирський, Спурт
		довга	7	Саломон
		дуже довга	9	
17. (*) QL	Зернівка: плівчастість VS (A), 92	відсутня	1	Скарб України, Спонтано
		наявна	9	Тіфон, Дарунок
18. QN	Первинна зернівка: остистість VS (A) 92	відсутня або дуже слабка	1	Спонтано, Авгол
		слабка	3	Скарб України, Тіфон
		помірна	5	Дарунок
		сильна	7	
		дуже сильна	9	
19. QN	Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною VS (A) 92	дуже коротка	1	
		коротка	3	Стерно
		середня	5	Тіфон
		довга	7	Спонтано
		дуже довга	9	


1	2	3	4	5
20. (*) PQ	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски VG (A) 92	біле	1	Зірковий, Дарунок
		жовте	2	Спурт
		коричневе	3	Декамерон, Житомирський
		cipe	4	
		чорне	5	
21. (+) QL	Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски VS (A), 92	відсутнє	1	Стерно, Спурт
		наявне	9	Спонтано
22. (+) QN	Первинна зернівка: опушення основи VS (A) 92	відсутнє або дуже слабке	1	Житомирський
		слабке	3	Зірковий
		помірне	5	
		сильне	7	Стерно
		дуже сильне	9	
23. (+) QN	Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною VS (A), 92	короткі	3	Тіфон, Скарб України
		середні	5	Саломон, Спурт
		довгі	7	Стерно
24. (+) QN	Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною VS (A) 92	короткий	3	Житомирський
		середній	5	Зірковий
		довгий	7	Візит

1	2	3	4	5
25. (*) PQ	Тип розвитку VG	озимий	1	
		дворучка (альтернативний)	2	
		ярий	3	
26. QN	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві VG (A), 60–65	відсутній або слабкий	1	
		помірний	3	
		сильний	5	

8. Пояснення до Таблиці ознак сортів вівса посівного, вівса голозерного

До 1. Рослина: габітус


1 прямий




Габітус оцінюють візуально за положенням листків і стебел. Вимірюють кут між зовнішніми листками і стеблами та умовою вертикальною віссю.

До 2. Найнижчі листки: опущення піхви

Ця ознака легко обстежується в теплиці.



До 3. Листкова пластинка: опущення країв листка



Спостерігають на листках із найбільш вираженою ознакою.

До 4. Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком

1 – прапорцеві листки прямі у всіх рослин;

3 – приблизно 1/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;

5 – приблизно 1/2 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;

7 – приблизно 3/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;

9 – усі прапорцеві листки зігнуті.

До 7. Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла



3

слабка



5

помірна



7

сильна

До 8. Волоть: орієнтація гілочок




1

одногрива



2

стисла



3

розкидиста

До 9. Волоть: положення гілочок




1

прямe




3

напівпрямe




5

горизонтальне



7


поникле



9

сильнo поникле

До 10. Волоть: положення вторинних колосків




До 21. Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски




Ознаку визначають за виключенням для білого та жовтого забарвлення нижньої квіткової луски.


До 22. Первинна зернівка: опушення основи



До 23. Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною



До 24. Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною



9. Додаткова інформація

1) Типи ділянок для вівса посівного, вівса голозерного

Тип ділянки	Назва ділянки	Вид експертизи	Примітки
A	рядкова	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявителя відповідно до року врожаю
A ₁	рядкова	стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням заявителя першого року врожаю
Б	пунктирна	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявителя відповідного року врожаю
В	колосова 1 (волотева 1)	однорідність стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів (волотей), надісланих заявителем
Г	колосова 2	відмінність однорідність стабільність	для ботанічних таксонів групи зернових озимого типу розвитку весняної сівби, експертизи на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявителем
Д	колосова 3 (волотева 3) (спеціальна)	однорідність	висівають на другий рік експертизи насіння з колосів (волотей), які відбирають з усіх нетипових рослин.
E _к	колосова 4 (волотева 4) (спеціальна)	однорідність (контроль)	Для встановлення причин неоднорідності висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту

2) Необхідна кількість рослин вівса посівного, вівса голозерного для експертизи на ВОС

Тип ділянки	Схема розміщення рослин		Кількість рослин, шт.			
	ширина міжряддя, см	відстань між рослинами в рядку, см	на ділянці, шт.	для обліку на:		
				відмінність	однорідність	стабільність
Перший рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2 500	2 000*	2 000*	—
Б	15–20	10,0	240	20	100	—
Другий рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2 500	2 000*	2 000*	2 000*
A ₁	15–20	≈2,0	2 500	—	—	1 000
Б	15–20	10,0	240	20	100	100
В	15–20	10,0	2 000	—	2 000	20
Г	15–20	10,0	1 000	20	1 000	1 000
Д	15–20	10,0	x	y	y	y
E _к **	15–20	10,0	x	y	y	y

* За візуальної одноразової оцінки групи рослин;

** Параметри ділянки E_к повністю відповідають параметрам ділянки Д;
x, y – значення цих показників перемінне та залежить від кількості нетипових рослин;

А – у двох повтореннях;

A₁, Б, В, Д, Г, Е_к – в одному повторенні.

3) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВІДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52*)

Двозначний код	Загальний опис	Шкала Фіке	Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса та рису
1	2	3	4
	Проростання		
00	Сухе насіння		
01	Початок набрякання		
02			
03	Повне набрякання		
04			
05	Поява зародкового корінця		
06			
07	Поява колеоптиля		
08			
09	На верхівці колеоптиля помітний листок		
	Ріст паростка		
10	Поява першого листка з колеоптиля	}	Другий листок
11			

1	2	3	4
	Перший листок розгорнувся		(< 1 см)
12	2 листки розгорнулись		
13	3 листки розгорнулись		
14	4 листки розгорнулись		
15	5 листків розгорнулись		
16	6 листків розгорнулись		
17	7 листків розгорнулись		
18	8 листків розгорнулись		
19	Розгорнулись 9 або більше листків		
	Кущіння		
20	Розвивається лише головний пагін		
21	Головний пагін та один бічний		
22	Головний пагін та два бічних		
23	Головний пагін та три бічних		
24	Головний пагін та чотири бічних		
25	Головний пагін та п'ять бічних		
26	Головний пагін та шість бічних		
27	Головний пагін та сім бічних		«Паралельні коди»
28	Головний пагін та вісім бічних		
29	Головний пагін та дев'ять або більше бічних		
	Видовження стебла		

1	2	3	4
30	Піднімається несправжнє стебло (починається розтягнення)	4–5	У рисі: фаза вегетативної затримки
31	1-й вузол	6	Етапи закладання вузла
32	2-й вузол		
33	3-й вузол		
34	4-й вузол		
35	5-й вузол		
36	6-й вузол		
37	Наявність прапорцевого листка	8	
38			
39	Язичок прапорцевого листка помітний	9	Стадія перед колосінням У рису: стадія, коли вушка останнього та передостаннього листків розташовані одне навпроти одного
	Набрякання колоса		
40			Невелике збільшення

1	2	3	4
			суцвіття, стадія раннього набухання колоса
41	Піхва прапорцевого листка довшає		
42			
43	Помітне набрякання піхви листка		
44			
45	Набрякання піхви листка		
46			
47	Відкрито піхву прапорцевого листка		
48			
49	Перший остюк помітний	10,1	Тільки для остюкових форм
	Колосіння		викидання волоті
50	Перший колосок суцвіття помітний	N	
51	{	S	
52	З'явилось 1/4 суцвіть	N 10,2	
53	{	S	N - несинхронні види
54	З'явилось 1/2 суцвіть	N 10,3	
55	{	S	S - синхронні види

1	2	3	4
56	З'явилося 3/4 суцвіть	N 10,4	
57	{	S	
58	Ріст суцвіть закінчений	N 10,5	
59	{	S	
	Цвітіння		Для ячменю встановити нелегко
60	Початок цвітіння	N 10,51	Для рису: як правило, після цього відразу виявляється волоть
61	{	S	
62			
63			
64	Середина цвітіння	N 10,52	
65	{	S	
66			
67			
68	Кінець цвітіння	N 10,53	
69	{	S	
	Фаза молочної стигlosti		
70			
71	Зернівка водостигла	10,54	
72	Зернівка втрачає зелений колір		

1	2	3	4
73	Рання молочна стиглість		
74	Поява клітинної будови ендосперму		
75	Середина молочної стиглості		
76			
77	Пізня молочна стиглість		
78	Завершення формування ендосперму	11,1	
79			
	Фаза воскової стиглості		
80			
81			
82			
83	Рання воскова стиглість		Можливо розділення зернівки
84			нігтем, але не відбиток
85	М'яка воскова стиглість		
86			
87	Тверда воскова стиглість	11,2	Розрізання зернівки нігтем неможливе, але можливий відбиток; у суцвіттях зменшується

1	2	3	4
			вміст хлорофілу
88			
89			
	Достигання		
90			
91	Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3))	11,3	Для рису: досягають колоски на верхівці
92	Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4))	11,4	Для рису: 50 % колосків досягло
93	Зернівка вдень відокремлюється (5)		Для рису: досягає 90 % колосків
94	Перестиглість, соломина відмирає		
95	Насіння в стадії спокою		Можлива втрата насіння внаслідок обсипання
96	Насіння життєздатне (50 % схожість)		
97	Насіння пробуджене		
98	Настає вторинний спокій		

1	2	3	4
99	Вторинний спокій закінчується		

10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Avena (*Avena sativa* L. & *Avena nuda* L.) (TG /20/10 UPOV) // Geneva. 1994. – 32 P. // URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg020.pdf

2. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Avena (*Avena sativa* L. & *Avena nuda* L.) (TG /20/11 UPOV) // Geneva. 1994. – 30 P. // URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg020.pdf

11. Технічна анкета

Номер заявки

(не заповнюється заявником)
Annex to Application
(not to be filled in by the applicant)

ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY

Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заяви, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.

Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.

In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.

1. Предмет Технічної анкети

1. Subject of the Technical Questionnaire

1.1. Ботанічний таксон (вид)

(латинською мовою)

1.1 Botanical name species
(in Latin Language)

Avena sativa L.

Avena. nuda L.

1.2. Ботанічний таксон (вид)

(українською мовою)

1.2 Botanical name species
(in Ukrainian Language)

Овес посівний

Овес голозерний

2. Заявник(и)

2. Applicant(s)

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

Name (denomination)

Автор(и)

Autor(s)

3. Назва сорту

3. Variety denomination

4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту

4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety

4.1. Схема селекції

4.1. Breeding scheme

Сорт, одержаний в результаті:

Variety resulting from:

4.1.1. схрещування

crossing

a) контролюване схрещування _____

a) controlled cross

(точно вказати батьківські сорти)

(please state parent varieties)

b) частково відоме схрещування _____

b) partially known cross

(вказати відомий батьківський сорт(и))

(please state known parent variety(ies))

b) невідоме схрещування.....	<input type="checkbox"/>
v) unknown cross	
4.1.2. мутація.....	<input type="checkbox"/>
mutation	
(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)	
4.1.3. виявлення та поліпшення.....	<input type="checkbox"/>
discovery and development	
(точно визначити, де і коли виявлено та як поліпшено) (please state where and when discovered and how developed)	
4.1.4. інше.....	<input type="checkbox"/>
other	
(надати деталі) (please provide details)	
4.2. Метод розмноження сорту: method of propagating the variety	
4.2.1. сорти, що розмножуються насінням seed-propagated varieties	
a) самозапилення.....	<input type="checkbox"/>
a) self-pollination	
b) перехресне запилення.....	<input type="checkbox"/>
b) cross-pollination	
Популяція.....	<input type="checkbox"/>
population	
синтетичний сорт.....	<input type="checkbox"/>
synthetic variety	
b) гібрид.....	<input type="checkbox"/>
c) hybrid	
Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида: In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.	
Простий гібрид $\text{♀} \times \text{♂}$	Трьохлінійний гібрид $\text{♀} \times \text{♂} \rightarrow (\text{♀} \times \text{♂}) \times \text{♂}$
Single Hybrid	Three-Way Hybrid
a) будь-які чоловічі стерильні лінії	i має визначати, зокрема: and should identify in particular:
a) any male sterile lines	
b) систему підтримки чоловічих стерильних ліній	
b) maintenance system of male sterile lines.	
г) інші.....	<input type="checkbox"/>
d) other	
(надати детальну інформацію) (please provide details)	
4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно: vegetative propagation	
a) живці.....	<input type="checkbox"/>
a) cuttings	
b) розмноження <i>in vitro</i>	<input type="checkbox"/>
b) <i>in vitro</i> propagation	
b) інші (установлений метод).....	<input type="checkbox"/>
c) other (state method)	
4.2.3. інші.....	<input type="checkbox"/>
other	
(надати детальну інформацію) (please provide details)	

5. Ознаки сорту

Variety characteristics

Назва ознаки Variety denomination		Ступінь проявлення Manifestation	Сорт-еталон Example variety	Код Code
5.1 (6)	Стебло: опущення найвищого вузла Stem: hairiness of uppermost node	відсутнє absent	Ант, Тіфон	1 <input type="checkbox"/>
		наявне present	Житомирський, Зірковий	9 <input type="checkbox"/>
5.2 (11)	Колоскові луски: восковий наліт Glume: glaucosity	відсутній або дуже слабкий absent or very weak	Авгол	1 <input type="checkbox"/>
		слабкий weak	Дарунок	3 <input type="checkbox"/>
		помірний medium	Зірковий, Візит	5 <input type="checkbox"/>
		сильний strong	Ант	7 <input type="checkbox"/>
		дуже сильний very strong		9 <input type="checkbox"/>
5.3 (13)	Первинна зернівка: восковий наліт нижньої квіткової луски Primary grain: glaucosity of lemma	відсутній absent	Авгол, Тіфон	1 <input type="checkbox"/>
		наявний present	Стерно, Спонтано	9 <input type="checkbox"/>
5.4 (17)	Зернівка: плівчастість Grain: husk	відсутня absent	Скарб України, Спонтано	1 <input type="checkbox"/>
		наявна present	Тіфон, Дарунок	9 <input type="checkbox"/>
5.5 (20)	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски Grain: color of lemma	біле white	Зірковий, Дарунок	1 <input type="checkbox"/>
		жовте yellow	Спурт	2 <input type="checkbox"/>
		коричневе brown	Декамерон, Житомирський	3 <input type="checkbox"/>
		сіре grey		4 <input type="checkbox"/>
		чорне black		5 <input type="checkbox"/>
5.6 (25)	Тип розвитку Seasonal type	озимий winter type		1 <input type="checkbox"/>
		дворучка (альтернативний) alternative type		2 <input type="checkbox"/>
		ярий spring type		3 <input type="checkbox"/>

6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявлання відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом

Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

Назва(и) сорту(ів) подібного(их) до сорту-кандидата Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety	Ознака(и), за якою (якими) сорт-кандидат відрізняється від подібних сортів Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(y) Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) сорту-кандидата Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Коментарі

Comments

7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Так

Yes

(якщо так, описати ці ознаки)
(if yes, please provide details)

Hi

No

7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так

Yes

(якщо так, описати ці умови)
(if yes, please provide details)

Hi

No

7.3. Інша інформація (широке використання)

Other information

Main use

(надати детальну інформацію)
(please provide details)

8. Дозвіл на використання

Autorization for release

a) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?

a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?

Так

Yes

Hi

No

b) чи було одержано такий дозвіл?

b) Has such authorization been obtained?

Так

Yes

Hi

No

Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту

Information on use of GMOs for creating a variety

а) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?

a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?

Так

Yes

Hi

No

б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?

b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?

Так

Yes

Hi

No

Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику.

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертізу

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо. The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так

Yes

Hi

No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявики не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Комpetентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про ней має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертізу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| а) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма) | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) | Yes | No |
| б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди) | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) | Yes | No |
| в) культури тканини | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| c) Tissue culture | Yes | No |
| г) інших факторів | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| g) Other factors | Yes | No |

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так"

Please provide details for where you have indicated "yes"

10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявки, призначений для експертизи, перевіреним на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так

Yes

(просимо надати деталі)
(please provide details as specified by
the Authority)

Ні

No

Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

Ініціали та прізвище уповноваженої особи

Applicant's name

Підпис

Signature

Дата

Date

_____ - _____ - _____

МЕТОДИКА
проведення експертизи сортів виду Пшениці м'якої (*Triticum aestivum L.*)
на відмінність, однорідність і стабільність

Загальні рекомендації

1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів виду Пшениці м'якої (*Triticum aestivum L.*).

2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси

1) Комpetентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 3 кг. Крім того, на другий рік експертизи заявник надсилає 100 колосів пшениці ярої і 150 – озимої.

Для гібридів додатково надають по 0,3 кг кожного батьківського компонента.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

3. Метод експертизи

1) Тривалість експертизи. Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій цикл.

*Використано документи UPOV TG / 3/11, 1996, TG / 3/12, 2017. Зміни й доповнення внесені : Андрющенко А. В., Кривицький К. М., канд. біол. наук, Веселовська О. Б., мол. наук. співроб. УІЕСР, 2010. Сорти-еталони пшениці м'якої виділені : Василюк П. М., Уліч Л. І., канд. с.-г. наук, Камінська Л. В., УІЕСР, Семко С. В., Ульянівська лабораторія Кіровоградського ОДЦЕСР, 2014. Зміни й доповнення внесені : Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб., Костенко Н. П., канд. с.-г. наук, Лікар С. П., Душар М. Б. УІЕСР, 2018

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібриду – дві вихідні лінії, трилінійного гібриду – простий гібрид та три лінії, подвійного гібриду – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію, що успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис, польові дослідження зазначененої вище лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявитика, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст, розвиток рослин і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає близько 2 000 рослин, які поділяють на два повторення. За проведення експертизи колосових рядків обстежують щонайменше 100 таких рядків.

Для визначення типу розвитку використовують не менше ніж 300 рослин.

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ).

Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

6) *Кількість рослин / частин рослин.* Експертизі підлягає щонайменше 2 000 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 2 000 рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

4. Оцінка відмінності, однорідності та стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

1) *Експертиза на відмінність*

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку

заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису первого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізняним з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнати сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

2) Експертиза на однорідність

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності сортів і ліній приймається популяційний стандарт 0,3 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається десять нетипових. Для оцінки однорідності колосових рядків приймається популяційний стандарт 1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається три нетипові. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Однорідність оцінюють у два етапи. Спершу обстежують 20 рослин або частини 20 рослин. Якщо виявлено 1–3 нетипові рослини, необхідно додатково обстежити 80 рослин або частини 80 рослин. Якщо виявлено понад три нетипові рослини, сорт вважається неоднорідним. За відсутності нетипових рослин сорт визнають однорідним. *Не застосовується до ознак 24 (Зернівка: забарвлення) та 25 (Зернівка: забарвлення у фенолі).*

Для оцінки однорідності гіbridів приймається популяційний стандарт 10 % за рівня ймовірності 95 %. Розмір вибірки для оцінки однорідності гіbridів може бути зменшений до 200 рослин. У вибірці з 200 рослин допускається 27 нетипових. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 15 нетипових.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

3) Експертиза на стабільність

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти групують за найвідміннішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіюють або дуже слабко варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- соломина – виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом) (ознака 10);
- колос – остюки або зубці нижніх квіткових лусок (ознака 14);
- колос – забарвлення (ознака 16);
- тип розвитку (ознака 26);
- нижня колоскова луска – опушення зовнішньої поверхні (ознака 37).

Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-сталони.

6. Умовні позначення

(*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залищаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливлюють;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

7. Таблиця ознак сортів виду Пшениці м'якої

Назва ознаки		Ступінь виявлення ознаки	Код	Сорт-еталон	
				озимий	ярий
1	2	3	4	5	6
1. (+) QN	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення L VS 09–11	відсутня або дуже слабка	1	Диканька Бенефіс	Харківська 30 Стависька
		слабка	3	Литанівка	
		помірна	5	Кірена Апогей Луганський	
		сильна	7	Відрада Світанок 1	
		дуже сильна	9	Почесна (Престиж)	
2. (+) (*) PQ	Рослина: габітус (форма куща) VG (Б) 25–29	прямий	1	Литанівка Кірена	Харківська 30
		напівпрямий	3	Диканька Відрада	Мажор
		напіврозлогий	5	Ясочка	
		розлогий	7		
		сланкий	9		
3. QN	Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок VG (A) 49–51	відсутнє або дуже слабке	1	Ясочка Відрада	Харківська 30 Елегія Миронівська
		слабке	3	Василина Астет	
		помірне	5		Стависька
		сильне	7		

1	2	3	4	5	6
		дуже сильне	9		
4. (+) QN	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком VG (A) 47–51	відсутня або дуже мала	1	Пам'яті Ремесла Сейлор	Трізо
		мала	3	Безмежна	Мажор
		середня	5	Астет Легенда Миронівська	Краса Полісся Стависька
		велика	7	Вільшана Лютиця	Харківська 30
		дуже велика	9	Сагайдак Ювівата 60	
5. (*) QN	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів) VG (A) 50–52	дуже ранній	1	Писанка Білосніжка	
		ранній	3	Царівна Співанка	Скороспілка 99 Трізо
		середній	5	Литанівка Вільшана	Мажор Краса Полісся
		пізній	7	Ювівата 60 Дарунок Поділля	Стависька
		дуже пізній	9	Астрон	
6. (*) QN	Пропорцевий листок: восковий наліт на піхві VG (A), 60–65	відсутній або дуже слабкий	1	Сагайдак Ласуня	
		слабкий	3	Шестопалівка Єсаул	Харківська 30
		помірний	5	Диканька	Краса Полісся

1	2	3	4	5	6
				Досконала	
		сильний	7	Відрада, Ювіата 60	Трізо
		дуже сильний	9	Легенда Миронівська Краплина	
7. (*) QN	Колос: восковий наліт VG (A) 60–69	відсутній або дуже слабкий	1	Василина Диканька	
		слабкий	3	Краплина Ласуня	Харківська 30
		помірний	5	Досконала Сагайдак	Скороспілка 99
		сильний	7	Ясочка Безмежна	
		дуже сильний	9	Годувальниця одеська Царівна	
8. (*) QN	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі VG (A) 60–69	відсутній або дуже слабкий	1	Ласуня Сагайдак	
		слабкий	3	Чорнява Оржиця	Скороспілка 99
		помірний	5	Василина Борвій	Краса Полісся Етюд
		сильний	7	Астет Ясочка	Мажор Трізо
		дуже сильний	9	Легенда миронівська	

1	2	3	4	5	6
				Чародійка білоцерківська	
9. (*) (+) QN	Рослина: за висотою (стебло і колос) MG (A) 75–92	дуже низька	1		
		низька	3	Оржиця Борвій	Етюд
		середня	5	Дарунок Поділля Царівна	Мажор Трізо
		висока	7	Легенда миронівська Астрон	Стависька
		дуже висока	9	Дар Луганщини Зіра	
10. (*) (+) QN	Соломина: виповнення (переріз між основою колося й найближчим вузлом) VS (A) 80–92	слабко виповнена	3	Дар Луганщини Ювіата 60	Харківська 30 Стависька
		помірно виповнена	5	Оржиця Статна Білиця Астет	Етюд
		виповнена	7	Вихованка одеська	Трізо
11. (+) PQ	Колос: форма (вигляд збоку) VS (A) 92	піраміdalна	1	Лимарівна Ювіата 60 Вихованка одеська	Трізо Етюд
		циліндрична	2	Пам'яті	Мажор

1	2	3	4	5	6
				Ремесла Вільшана	Краса Полісся
		напівбулаво- подібна	3	Матрікс	
		булавоподібна	4		
		веретено- подібна	5		
12. (+) QN	Колос: за щільністю VS або MS 80–92	дуже нешільний	1		
		нешільний	3	Краплина Пам'яті Ремесла	Харківська 30 Краса Полісся
		середній	5	Досконала Литанівка	Мажор
		щільний	7	Лазурна Паляниця	
		дуже щільний	9		
13. QN	Колос: за довжиною (без остюків і зубців) MS (A) 80–92	дуже короткий	1	Щедра нива	
		короткий	3	Вільшана Борвій	
		середній	5	Паляниця Ювілейна 100	Мажор Етюд
		довгий	7	Краплина Пам'яті Ремесла	Харківська 30
		дуже довгий	9	Калинова Чорноброва	

1	2	3	4	5	6
14. (*) (+) QL	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок VG (A) 80–92	обое відсутні	1	Сейлор Торрілд	
		наявні зубці	2	Дарунок Поділля Досконала	Мажор Трізо
		наявні остюки	3	Щедра нива Білиця	Скороспілка 99 Етюд
15. (*) (+) QN	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною VG (A) 80–92	дуже короткі	1	Дарунок Поділля	
		короткі	3	Зіра Комерційна	Стависька
		середні	5	Пам'яті Ремесла Калинова	Мажор
		довгі	7	Миронівська сторічна Повелія	Трізо Краса Полісся
		дуже довгі	9	Статна Вільшана	Етюд
16. (*) PQ	Колос: забарвлення VG (A) 90–92	біле або солом'яно- жовте	1	Дарунок Поділля Диканька	Харківська 30 Етюд
		червоне	2	Красень	
		сіро-димчасте	3		
		чорне	4		
17. (+) QN	Соломина: опущення	відсутнє або дуже слабке	1	Чорнява Зіра	Харківська 30
		слабке	3	Статна	Етюд

1	2	3	4	5	6
	опуклої поверхні верхнього вузла VS (A), 80–92			Дарунок Поділля	
		помірне	5	Світанок 1 Диканька	Мажор
		сильне	7	Відрада Станіслава	Краса Полісся Стависька
		дуже сильне	9		
18. (+) QN	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса) VS (A), 80–92	відсутнє або дуже вузьке	1	Щедра нива Вільшана	
		вузьке	3	Станіслава Ювілейна 100	Скороспілка 99
		середнє	5	Місія одеська Пам'яті Ремесла	Мажор Стависька
		широке	7	Матрікс	Харківська 30 Етюд
		дуже широке	9		
19. (+) PQ	Нижня колоскова луска. Плече: за формою VS (A) 80–92	скошене	1	Ласуня Царівна	Мажор Стависька
		округле	2	Красень Зорепад	
		пряме	3	Василина Повелія	Харківська 30 Етюд
		піднесене	4	Ясочка Калинова	
		піднесене з	5	Ювілейна 100 Борвій Відрада	Скороспілка 99

1	2	3	4	5	6
		наявністю другої вершини			
20. (+) QN	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною VS (A) 80–92	дуже короткий	1	Досконала Снігурка	
		короткий	3	Чорнява	Мажор
				Безмежна	Краса Полісся
		середній	5	Зорепад Щедра нива	
		довгий	7	Відрада Красень	Етюд
		дуже довгий	9	Паляниця	Скороспілка 99
21. (+) PQ	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою VS (A) 80–92	прямий	1	Снігурка Литанівка	Трізо
		ледь зігнутий	3	Безмежна Краплина	Мажор Стависька
		середньо зігнутий	5	Миронівська сторічна Паляниця	Краса Полісся
		сильно зігнутий	7	Відрада Чорнява	
		дуже сильно зігнутий	9		
22. (+) QN	Нижня колоскова луска:	слабке	3	Краплина Ювілейна 100	Мажор Стависька

1	2	3	4	5	6
	опущення внутрішньої поверхні VS (A) 80–92	помірне	5	Паляниця Світанок 1	Етюд
		сильне	7	Актер	
23. (+) PQ	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою VS (A) 80–92	прямий	1	Пам'яті Ремесла	Трізо
		ледь зігнутий	2	Годувальниця одеська Зіра	
		середньо зігнутий	3	Повелія Снігурка	Харківська 30
		дуже зігнутий	4	Фаворитка Деметра	Стависька
		з дуже значним перегином	5		
24. (+) PQ	Зернівка: забарвлення VG (A) L 92	біле	1	Зимоярка Евклід	
		червоне	2	Деметра Василина	Мажор Краса Полісся
		коричневе	3	Чорноброва	
		сизе	4		
		інше	5		
25. (+)	Зернівка: забарвлення у	відсутнє або дуже світле	1		

1	2	3	4	5	6
QN	фенолі L, VS, 92	світле	3	Дарунок Поділля Чорнява	Краса Полісся
		помірне	5	Відрада Зорепад	Мажор
		темне	7	Краєвид Чорноброва	Харківська 30 Стависька
		дуже темне	9	Співанка	Трізо Скороспілка 99
26. (*) (+) PQ	Тип розвитку VG (Г)	озимий	1	Відрада Зорепад	
		дворучка (альтернатив- ний)	2	Зимоярка	
		ярий	3		Героїня Сюїта Харківська 30
27. QN	Зернівка: за довжиною MG (А) 92	коротка	3	Красень Пам'яті Ремесла	Краса Полісся
		середня	5	Калинова Місія одеська	Мажор
		довга	7	Росинка тарасівська Либідь	

1	2	3	4	5	6
28. QN	Зернівка: за шириною MG (A), 92	вузька	3	Пам'яті Ремесла	
		середня	5	Росинка	Мажор
		широка	7	Деметра Диканька	
29. QN	Зернівка: відношення довжина / ширина MG (A) 92	мале	3	Паляниця Ремеслівна	Мажор
		середнє	5	Диканька	Трізо
		велике		Пам'яті Ремесла	
			7	Росинка тарасівська Либідь	
30. QN	Зернівка: за крупністю MG (A) 92	дуже дрібна	1		
		дрібна	3	Ремеслівна	Етюд
		середня	5	Либідь Паляниця	Мажор
		крупна	7	Деметра Росинка Тарасівська	Елегія Миронівська Стависька
		дуже крупна	9	Диканька Володарка	
31. QN	Язичок: виявлення VS (Б) 12–19	відсутній	1		
		короткий	3	Ювілейна 100 Литанівка	Мажор
		середній	5	Зимоярка Безмежна	Харківська 30

1	2	3	4	5	6
		довгий	7	Станіслава Астет	Стависька
32. QL	Нижня квіткова луска: кіль VS (A) 80–87	відсутній	1	Фаворитка Диканька Актер	Харківська 30 Трізо
		наявний	9		
33. PQ	Вушка: за формою VS (Б), 12–19	тупі	1	Ласуня Бенефіс	Етюд Стависька
		гострі	2	Світанок 1 Либідь Ювілейна 100	Харківська 30
		шилоподібні	3	Фаворитка Диканька Дарунок Поділля	Трізо
34. QN	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні VS (A), 80–87	слабке	3	Пам'яті Ремесла Відрада	Харківська 30 Скороспілка 99
		помірне	5	Апогей Луганський	Мажор
		сильне	7	Співанка	
35. PQ	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої	яйцеподібна	1	Фаворитка Бенефіс Співанка	Харківська 30
		овальна	2	Шестопалівка	Краса Полісся Стависька


1	2	3	4	5	6
	третини колоса) VS (A), 80–87			Пам'яті Ремесла	
		овально- ланцетна	3	Володарка Ласуня	Мажор
		ланцетна	4	Астет Ясочka	Трізо Етюд
36. (+) QL	Пропорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки VS (A), 60-65	відсутній або уже слабкий	1		
		слабкий	3		
		помірний	5		
		сильний	7		
		уже сильний	9		
37. QL	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні VS (A), 69-92	відсутнє	1		
		наявне	9		

8. Пояснення до Таблиці ознак сортів пшениці м'якої


До 1. Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення

Метод визначення антоціанового забарвлення (лабораторія або теплиця): 20 насінин для визначення відмінності і 100 – для визначення однорідності кладуть у чашки Петрі на вологий фільтрувальний папір, закривають і пророщують у темряві. Коли довжина колеоптиля досягне 1 см, чашки з насінням виставляють на постійне штучне освітлення (12 000–5 000 Lux) на 3–4 доби, за


температури 15–20 С. Оцінюють у стадії 09–11 паралельно з контрольним сортом.



До 2. Рослина: габітус (форма куща)



Габітус визначають візуально за кутом розміщення листків та пагонів по відношенню до уявної вертикальної осі.



До 4. Кількість рослин із зігнутим пропорцевим листком

- 1 – пропорцеві листки прямі у всіх рослин;
- 3 – приблизно 1/4 рослин мають зігнутий пропорцевий листок;
- 5 – приблизно 1/2 рослин мають зігнутий пропорцевий листок;
- 7 – приблизно 3/4 рослин мають зігнутий пропорцевий листок;
- 9 – усі пропорцеві листки зігнуті.




1 3 5 7 9
відсутня або мала середня велика дуже велика
дуже мала

До 9. Рослина: за висотою (стебло і колос)

Висота включає: стебло, колос, остюки і зубці.

До 10. Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)


Виповнення соломини в поперечному перерізі слід обстежувати між основою колоса та верхнім вузлом. Перевіряють усі стебла рослин та фіксують найвищий показник по кожній рослині.





3

слабко виповнена



5

помірно виповнена



7

виповнена

До 11. Колос: форма (вигляд збоку)



1



2



3



4



5

піраміdalна циліндрична напівбулавоподібна булавоподібна веретеноподібна

До 12. Колос: за щільністю



1



3



5



7



9


дуже нещільний нещільний середній

щільний

дуже щільний

До 14. Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок

Спостереження проводять на верхівці колоса.



1



2

обоє відсутні

наявні зубці




3


наявні остюки

До 15. Колос: зубці/ остюки на верхівці за довжиною


Спостереження здійснюють на верхівці колоса на сортах з відсутніми зубцями та остюками.




До 17. Соломина: опущення опуклої поверхні верхнього вузла




До 18. Нижня колоскова луска. Плече: за ширину (колосок у середині колоса)




До 19. Нижня колоскова луска. Плече: за формою




До 20. Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною




До 21. Нижня колоскова луска. Зубець: за формою



До 22. Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні



До 23. Нижня квіткова луска. Зубець: за формою



До 24. Зернівка: забарвлення

Забарвлення зернівки визначають на сухих насінинах. Для більш чіткого визначення ознаки можливо визначати за допомогою розчину NaOH (насіння занурюють на 10 хвилин при 60 °C або на 60 хвилин при кімнатній температурі в 5M розчині NaOH).



1

біле



2

червоне



3

коричневе



4

сизе

До 25. Зернівка: забарвлення у фенолі

Для дослідження потрібно 20 насінин для визначення відмінності і 100 насінин для визначення однорідності.

Обладнання: чашки Петрі (діаметр 9 см).

Підготовка насіння: замочити на 16–20 год у воді, воду злити, насіння підсушити, помістити в чашки борозенкою донизу, закрити чашки кришкою.

Концентрація розчину: 1 % розчин фенолу (свіжоприготований).

Кількість розчину: насіння має зануритись у розчин на 3/4.

Місце дослідження: лабораторія.

Освітлення: денне світло без прямих сонячних променів.

Температура: 18–20 °C.

Час дослідження: через 4 год після занурення в розчин.

Визначення ступеня

забарвлення: див. ознаку 25.

Примітка: визначення ступеня забарвлення фенолом варто проводити і для стандарту.

До 26. Тип розвитку

Оцінюють на одній чи кількох висіяних навесні ділянках. До експертизи обов'язково залучають сорти-еталони. Коли найпізніший ярий сорт-еталон досягне повного розвитку (фаза 91/92), оцінюють фазу розвитку сорту-кандидата. Ступені виявлення ознаки: озимий тип – повністю досягнув фази 45, дворучка – рослини, як правило, пройшли фазу 75 і перебувають загалом у фазі 90, ярий тип – рослини пройшли фазу 90.

До 36. Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки

Спостереження проводять на нижній поверхні листкової пластинки.

9. Додаткова інформація

1) Типи ділянок для пшениці м'якої

Тип ділянки	Назва ділянки	Вид експертизи	Примітки
A	рядкова	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявителя відповідно до року врожаю
A ₁	рядкова	стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням заявителя першого року врожаю
Б	пунктирна	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявителя відповідного року врожаю
В	колосова 1 (волотева 1)	однорідність стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів (волотей), надісланих заявителем
Г	колосова 2	відмінність однорідність стабільність	для ботанічних таксонів групи зернових озимого типу розвитку весняної сівби, експертизи на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявителем
Д	колосова 3 (волотева 3) (спеціальна)	однорідність	висівають на другий рік експертизи насіння з колосів (волотей), які відбирають з усіх нетипових рослин.
E _к	колосова 4 (волотева 4) (спеціальна)	однорідність (контроль)	Для встановлення причин неоднорідності висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту

2) Необхідна кількість рослин пшениці м'якої для експертизи на ВОС

Тип ділянки	Схема розміщення рослин		Кількість рослин, шт.			
	ширина міжряддя, см	відстань між рослинами в рядку, см	на ділянці, шт.	для обліку на:		
				відмінність	однорідність	стабільність
Перший рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2 500	2 000*	2 000*	—
Б	15–20	10,0	240	20	100	—
Другий рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2 500	2 000*	2 000*	2 000*
A ₁	15–20	≈2,0	2 500	—	—	1 000
Б	15–20	10,0	240	20	100	100
В	15–20	10,0	2 000	—	2 000	20
Г	15–20	10,0	1 000	20	1 000	1 000
Д	15–20	10,0	x	y	y	y
E _k **	15–20	10,0	x	y	y	y

* За візуальної одноразової оцінки групи рослин;

** Параметри ділянки E_k повністю відповідають параметрам ділянки Д;

х, у – значення цих показників перемінне та залежить від кількості нетипових рослин;

А – у двох повтореннях;

A₁, Б, В, Д, Г, E_k – в одному повторенні.

3) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВІДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52*)

Двозначний код	Загальний опис	Шкала Фіке	Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса та рису
1	2	3	4
	Проростання		
00	Сухе насіння		
01	Початок набрякання		
02			
03	Повне набрякання		
04			
05	Поява зародкового корінця		
06			
07	Поява колеоптиля		
08			
09	На верхівці колеоптиля помітний листок		
	Ріст паростка		
10	Поява першого листка з колеоптиля	}	Другий листок (< 1 см)
11	Перший листок розгорнувся		

1	2	3	4
12	2 листки розгорнулись		
13	3 листки розгорнулись		
14	4 листки розгорнулись		
15	5 листків розгорнулись		
16	6 листків розгорнулись		
17	7 листків розгорнулись		
18	8 листків розгорнулись		
19	Розгорнулись 9 або більше листків		
	Кущіння		
20	Розвивається лише головний пагін		
21	Головний пагін та один бічний		
22	Головний пагін та два бічних		
23	Головний пагін та три бічних		
24	Головний пагін та чотири бічних		
25	Головний пагін та п'ять бічних		
26	Головний пагін та шість бічних		
			Цей розділ може бути використа- ний для доповнення спостере- жень інших розділів таблиці
27	Головний пагін та сім бічних		«Паралельні коди»
28	Головний пагін та вісім бічних		
29	Головний пагін та дев'ять або більше бічних		
	Видовження стебла		
30	Піднімається несправжнє стебло (починається розтягнення)	4–5	У рисі: фаза вегетатив-

1	2	3	4
			ної затримки
31	1-й вузол	6	Етапи закладання вузла
32	2-й вузол	7	Вузли вище основи стебла
33	3-й вузол		
34	4-й вузол		
35	5-й вузол		
36	6-й вузол		
37	Наявність прапорцевого листка	8	
38			
39	Язичок прапорцевого листка помітний	9	Стадія перед колосінням У рису: стадія, коли вшка останнього та передос- таннього листків розташовані одне навпроти одного
	Набрякання колоса		
40			Невелике збільшення суцвіття,

1	2	3	4
			стадія раннього набухання колоса
41	Піхва прaporцевого листка довшає		
42			
43	Помітне набрякання піхви листка		
44			
45	Набрякання піхви листка		
46			
47	Відкрито піхву прaporцевого		
48	листка		
49	Перший остюк помітний		
	Колосіння		викидання волоті
50	Перший колосок суцвіття помітний	N	
51	{	S	
52	З'явилось 1/4 суцвіть	N 10,2	N -
53	{	S	несинхронні види
54	З'явилось 1/2 суцвіть	N 10,3	S -
55	{	S	синхронні види
56	З'явилось 3/4 суцвіть	N 10,4	
57	{	S	

1	2	3	4
58 59	Ріст суцвіть закінчений }	N 10,5 S	
	Цвітіння		Для ячменю встановити нелегко
60 61 62	Початок цвітіння }	N 10,51 S	Для рису: як правило, після цього відразу виявляється волоть
63			
64 65	Середина цвітіння }	N 10,52 S	
66			
67			
68 69	Кінець цвітіння }	N 10,53 S	
	Фаза молочної стигlosti		
70			
71	Зернівка водостигла	10,54	
72	Зернівка втрачає зелений колір		
73 74	Рання молочна стиглість		

1	2	3	4
75	Поява клітинної будови		
76	ендосперму		
77	Середина молочної стиглості		
78			
79	Пізня молочна стиглість Завершення формування ендосперму	11,1	
	Фаза воскової стиглості		
80			
81			
82			
83	Рання воскова стиглість		Можливо
84			розрізання
85	М'яка воскова стиглість		зернівки
86			нігтем, але
87	Тверда воскова стиглість		не відбиток
		11,2	Розрізання
			зернівки
			нігтем
			неможливе,
			але
			можливий
			відбиток; у
			суцвіттях
			зменшується
			вміст
			хлорофілу

1	2	3	4
88			
89			
	Достигання		
90			
91	Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3))	11,3	Для рису: досягають колоски на верхівці
92	Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4))	11,4	Для рису: 50 % колосків достигло
93	Зернівка вдень відокремлюється (5)		Для рису: досягає 90 % колосків
94	Перестиглість, соломина відмирає		
95	Насіння в стадії спокою		Можлива втрата насіння внаслідок обсипання
96	Насіння життєздатне (50 % схожість)		
97	Насіння пробуджене		
98	Настає вторинний спокій		
99	Вторинний спокій закінчується		

10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.) (TG /3/11+Corr UPOV) // Geneva. 1994-10-04 + 1996-10-18. – 21 P. // URL : www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf
2. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.) (TG /3/12 UPOV) // Geneva. 2017-04-05. – 39 P. // URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf

11. Технічна анкета

Номер заявки

(не заповнюється заявитником)

Annex to Application

(not to be filled in by the applicant)

ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY

Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявлання, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.

Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.

In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.

1. Предмет Технічної анкети

1. Subject of the Technical Questionnaire

1.1. Ботанічний таксон

(вид)

(латинською мовою)

1.1 Botanical name species
(in Latin Language)

Triticum aestivum L.

1.2. Ботанічний таксон

(вид)

(українською мовою)

1.2 Botanical name species
(in Ukrainian Language)

Пшениця м'яка

2. Заявник(и)

2. Applicant(s)

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

Name (denomination)

Автор(и)

Autor(s)

3. Назва сорту

3. Variety denomination

4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту

4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety

4.1. Схема селекції

4.1. Breeding scheme

Сорт, одержаний в результаті:

Variety resulting from:

4.1.1. Схрещування

crossing

а) контролюване схрещування

a) controlled cross

(точно вказати батьківські сорти)

(please state parent varieties)

б) частково відоме схрещування

b) partially known cross

(вказати відомий батьківський

сорт(и))

(please state known parent variety(ies))

в) невідоме схрещування
v) unknown cross

4.1.2. мутація
mutation
(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)

4.1.3. виявлення та поліпшення
discovery and development
(точно визначити, де і коли
виявлено та як поліпшено)
(please state where and when discovered
and how developed)

4.1.4. інше
other
(надати деталі)
(please provide details)

4.2. Метод розмноження сорту:
method of propagating the variety

4.2.1. сорти, що розмножуються насінням
seed-propagated varieties

- a) самозапилення
a) self-pollination
- б) перехресне запилення
b) cross-pollination
- ПОПУЛЯЦІЯ
population
- СИНТЕТИЧНИЙ СОРТ
synthetic variety
- в) гібрид
c) hybrid

Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида:
In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.

Простий гібрид $\text{♀} \times \text{♂}$ Трьохлінійний гібрид $\text{♀} \times \text{♂} \rightarrow (\text{♀} \times \text{♂}) \times \text{♂}$ і має визначати, зокрема:
Single Hybrid Three-Way Hybrid and should identify in particular:

- a) будь-які чоловічі стерильні лінії
a) any male sterile lines
- б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній
b) maintenance system of male sterile lines.

г) інші
d) other
(надати детальну інформацію)
(please provide details)

4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно:
vegetative propagation

- а) живці
a) cuttings
- б) розмноження *in vitro*
b) *in vitro* propagation
- в) інші (установлений метод)
c) other (state method)

4.2.3. інші
other
(надати детальну інформацію)
(please provide details)

5. Ознаки сорту

Variety characteristics

Назва ознаки Variety denomination		Ступінь проявлення Manifestation	Сорт-еталон Example variety		Код Code
			озимий winter	ярий spring	
1	2	3	4	5	6
5.1. (10)	Соломина: виповнення (переріз між основою колося і найближчим вузлом) Straw: pith in cross section (halfway between base of ear and stem node below)	слабко виповнена thin	Дар Луганщини Ювіата 60	Харківська 30 Стависька	3 <input type="checkbox"/>
		помірно виповнена medium	Оржиця Статна Білиця Астет	Етюд	5 <input type="checkbox"/>
		виповнена thick	Вихованка одеська	Трізо	7 <input type="checkbox"/>
5.2. (14)	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок awns or scurs: presence	обоє відсутні both absent	Сейлор Торрілд		1 <input type="checkbox"/>
		наявні зубці scurs present	Дарунок Поділля Досконала	Мажор Трізо	2 <input type="checkbox"/>
		наявні остюки awns present	Щедра нива Білиця	Скороспілка 99 Етюд	3 <input type="checkbox"/>
5.3. (16)	Колос: забарвлення Ear: color	біле або солом'яно-жовте white or straw yellow	Дарунок Поділля Диканька	Харківська 30 Етюд	1 <input type="checkbox"/>
		червоне red	Красень		2 <input type="checkbox"/>
		сіро-димчасте gray and smoky			3 <input type="checkbox"/>
		чорне black			4 <input type="checkbox"/>
5.4. (26)	Тип розвитку Seasonal type	озимий winter type	Відрада Зорепад		1 <input type="checkbox"/>
		дворучка (альтернативний) alternative type	Зимоярка		2 <input type="checkbox"/>
		ярий spring type		Героїня Сюїта Харківська 30	3 <input type="checkbox"/>

5.5. (37)	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні Lower glume: hairiness on external surface	відсутнє absent			1 <input type="checkbox"/>
		наявне present			9 <input type="checkbox"/>

6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявки відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

Назва(и) сорту(ів) подібного(их) до сорту- кандидата Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety	Ознака(и), за якою (якими) сорт-кандидат відрізняється від ПОДІБНИХ СОРТІВ Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(у) Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) сорту- кандидата Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Коментарі
Comments

7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці ознаки)
(if yes, please provide details)

7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці умови)
(if yes, please provide details)

7.3. Інша інформація (широке використання)

Other information

Main use

_____	_____
(надати детальну інформацію) (please provide details)	
_____	_____

8. Дозвіл на використання

Autorization for release

а) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?

a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?

Так

Hi

Yes

No

б) чи було одержано такий дозвіл?

b) Has such authorization been obtained?

Так

Hi

Yes

No

Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту

Information on use of GMOs for creating a variety

а) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?

a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?

Так

Hi

Yes

No

б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?

b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?

Так

Hi

Yes

No

Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику.

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертизу

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так

Hi

Yes

No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявики не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Комpetентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

а) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма).....

Так

Hi

Yes

No

б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди).....	Tак <input type="checkbox"/>	Hi <input type="checkbox"/>
b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide)	Yes	No
в) культури тканини.....	Tак <input type="checkbox"/>	Hi <input type="checkbox"/>
c) Tissue culture	Yes	No
г) інших факторів.....	Tак <input type="checkbox"/>	Hi <input type="checkbox"/>
g) Other factors	Yes	No

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано “так”

Please provide details for where you have indicated “yes”

10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заяви, призначений для експертизи, перевіреним на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так

Yes

(просимо надати деталі)
 (please provide details as specified
 by the Authority)

Hi

No

Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

Ініціали та прізвище уповноваженої особи

Applicant's name

Підпис

Signature

Дата

Date

_____ - _____ - _____

МЕТОДИКА
проведення експертизи сортів пшениці спельти (*Triticum spelta L.*),
пшениці шарозерної (*Triticum sphaerococcum* Perc.) і пшениці однозерної
(*Triticum monococcum* L.) на відмінність, однорідність і стабільність

Загальні рекомендації

1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів пшениці спельти (*Triticum spelta L.*), пшениці шарозерної (*Triticum sphaerococcum* Perc.) і пшениці однозерної (*Triticum monococcum* L.).

2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси

1) Комpetентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 3 кг. Крім того, на другий рік експертизи заявник надсилає 100 колосів пшениці ярої і 150 – озимої.

Для гібридів додатково надають по 0,3 кг кожного батьківського компонента.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

3. Метод експертизи

1) Тривалість експертизи. Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати

Методику пшениці шарозерної розроблено: Андрющенко А.В., Кривицький К.М., к-ти б. н., УІЕСР, 2009.
 Методику пшениці спельти розроблено: Андрющенко А.В., Кривицький К.М., к-ти б. н., Мамайсур В.В. м. н. с. УІЕСР, 2011. Використано документ UPOV TG /03/11, 1994., RTG /0003/2, TG / 3/12, 2017.

щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій цикл.

З метою оцінки однорідності та стабільноті гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібриду – дві вихідні лінії, трилінійного гібриду – простий гібрид та три лінії, подвійного гібриду – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію, що успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис, польові дослідження зазначеної вище лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявителя, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст, розвиток рослин і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає близько 2 000 рослин, які поділяють на два повторення. За проведення експертизи колосових рядків обстежують щонайменше 100 таких рядків.

Для визначення типу розвитку використовують не менше ніж 300 рослин.

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) Метод дослідження. Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ).

Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

6) Кількість рослин / частин рослин. Експертизі підлягає щонайменше 2 000 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 2 000 рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

4. Оцінка відмінності, однорідності та стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

1) Експертиза на відмінність

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису первого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізняним з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнати сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

2) Експертиза на однорідність

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності сортів і ліній приймається популяційний стандарт 0,3 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається десять нетипових. Для оцінки однорідності колосових рядків приймається популяційний стандарт 1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається три нетипові. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Однорідність оцінюють у два етапи. Спершу обстежують 20 рослин або частини 20 рослин. Якщо виявлено 1–3 нетипові рослини, необхідно додатково обстежити 80 рослин або частини 80 рослин. Якщо виявлено понад три нетипові рослини, сорт вважається неоднорідним. За відсутності нетипових рослин сорт визнають однорідним. *Не застосовується до ознак 24 (Зернівка: забарвлення) та 25 (Зернівка: забарвлення у фенолі).*

Для оцінки однорідності гібридів приймається популяційний стандарт 10 % за рівня ймовірності 95 %. Розмір вибірки для оцінки однорідності гібридів може бути зменшений до 200 рослин. У вибірці з 200 рослин допускається 27 нетипових. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 15 нетипових.

Для оцінки однорідності сортів пшениці однозерної приймається популяційний стандарт 0,1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2000 рослин допускається п'ять нетипових. Для оцінки однорідності колосових рядків приймається популяційний стандарт 1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається три нетипові. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

3) Експертиза на стабільність

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти групують за найвідміннішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіють або дуже слабко варіють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- колос – форма (вигляд збоку) (ознака 11);
- колос – остюки або зубці нижніх квіткових лусок (ознака 14);
- колос – забарвлення (ознака 16);
- зернівка – забарвлення (ознака 24);
- тип розвитку (ознака 26);
- нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні (ознака 32).

Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

6. Умовні позначення

(*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залишаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливлюють;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

7. Таблиця ознак сортів пшениці спельти, пшениці шарозерної, пшениці однозерної

Назва ознаки		Ступінь виявлення ознаки	Код	Сорт-еталон
1	2	3	4	5
1. (+) QN	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення L VS, 09–11	відсутня або дуже слабка	1	
		слабка	3	
		помірна	5	
		сильна	7	
		дуже сильна	9	
2. (+) (*) PQ	Рослина: габітус (форма куща) VG (Б) 25–29	прямий	1	
		напівпрямий	3	
		напіврозлогий	5	
		розлогий	7	
		сланкий	9	
3. QN	Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок VG (A) 49–51	відсутнє або дуже слабке	1	
		слабке	3	
		помірне	5	
		сильне	7	
		дуже сильне	9	
4. (+) QN	Кількість рослин із зігнутим пропорцевим листком VG (A) 47–51	відсутня або дуже мала	1	
		мала	3	
		середня	5	
		велика	7	
		дуже велика	9	

1	2	3	4	5
5. (*) QN	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) VG (A) 50–52	дуже ранній	1	
		ранній	3	
		середній	5	
		пізній	7	
		дуже пізній	9	
6. (*) QN	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві VG (A) 60–65	відсутній або дуже слабкий	1	
		слабкий	3	
		помірний	5	
		сильний	7	
		дуже сильний	9	
7. (*) QN	Колос: восковий наліт VG (A) 60–69	відсутній або дуже слабкий	1	
		слабкий	3	
		помірний	5	
		сильний	7	
8. (*) QN	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі VG (A) 60–69	відсутній або дуже слабкий	1	
		слабкий	3	
		помірний	5	
		сильний	7	
		дуже сильний	9	
9. (*) QN	Рослина: за висотою (стебло, колос) MG (A) 75–92	низька	3	
		середня	5	
		висока	7	

1	2	3	4	5
10. (*) (+) QN	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом) VS (A) 80–92	слабко виповнена	3	
		помірно виповнена	5	
		виповнена	7	
11. (+) PQ	Колос: форма (вигляд збоку) VS (A) 92	піраміdalна	1	
		циліндрична	2	
		напівбулавоподібна	3	
		булавоподібна	4	
		веретеноподібна	5	
12. (+) QN	Колос: за щільністю VS або MS (A) 80–92	дуже нещільний	1	
		нешільний	3	
		середній	5	
		щільний	7	
		дуже щільний	9	
13. QN	Колос: за довжиною (без остюків і зубців) MS (A) 80–92	дуже короткий	1	
		короткий	3	
		середній	5	
		довгий	7	
		дуже довгий	9	
14. (*) (+) QL	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок VG (A) 80–92	обоє відсутні	1	
		наявні зубці	2	
		наявні остюки	3	

1	2	3	4	5
15.	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною QN VG (A) 80–92	дуже короткі	1	
(*)		короткі	3	
(+)		середні	5	
		довгі	7	
		дуже довгі	9	
16.	Колос: забарвлення (*) VG (A) PQ 90–92	біле або солом'яно-жовте	1	
		сіро-димчасте	2	
		димчасте	3	
		червоне	4	
		з чорною облямівкою	5	
		чорне	6	
17.	Соломина: (+) опущення опуклої QN поверхні верхнього вузла VS (A) 80–92	відсутнє або дуже слабке	1	
(+)		слабке	3	
QN		помірне	5	
		сильне	7	
		дуже сильне	9	
18.	Нижня колоскова луска. Плече: QN за ширину (колосок у середині колоса) VS (A) 80–92	відсутнє або дуже вузьке	1	
(+)		вузьке	3	
QN		середнє	5	
		широке	7	
		дуже широке	9	

1	2	3	4	5
19. (+) PQ	Нижня колоскова луска. Плече: за формою VS (A) 80–92	скошене	1	
		округле	2	
		пряме	3	
		піднесене	4	
		піднесене з наявністю другої вершини	5	
20. (+) QN	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною VS (A) 80–92	дуже короткий	1	
		короткий	3	
		середній	5	
		довгий	7	
		дуже довгий	9	
21. (+) PQ	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою VS (A) 80–92	прямий	1	
		ледь зігнутий	3	
		середньо зігнутий	5	
		сильно зігнутий	7	
		дуже сильно зігнутий	9	
22. (+) QN	Нижня колоскова луска: опущення внутрішньої поверхні VS (A) 80–92	слабке	3	
		помірне	5	
		сильне	7	
23. (+) PQ	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою VS (A), 80–92	прямий	1	
		ледь зігнутий	2	
		середньо зігнутий	3	
		дуже зігнутий	4	

1	2	3	4	5
		з дуже значним перегином	5	
24. PQ VG (A) 92	Зернівка: забарвлення	біле	1	
		червоне	2	
		коричневе	3	
		сизе	4	
		інше	5	
25. (+) QN L VS 92	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
		світле	3	
		помірне	5	
		темне	7	
		дуже темне	9	
26 (*) (+) PQ	Тип розвитку VG (Г)	озимий	1	
		дворучка (альтернативний)	2	
		ярий	3	
27. QL	Лише для сортів пшениці шарозерної. Колос (остистий): зазубленість остюків VS (A), 80–92	дрібно зубчасті	1	
		грубо зубчасті	2	
28. (*) (+) QN	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: час достигання зерна MS (A), 92	ранній	3	
		середній	5	
		пізній	7	

1	2	3	4	5
29. QN	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: тенденція до вилягання VG (A) 80–92	відсутня або дуже слабка слабка середня сильна дуже сильна	1 3 5 7 9	
30. (+) QN	Лише для сортів пшениці шарозерної. Насіння: маса 1000 шт. MS (A) 92	мала середня велика	3 5 7	
31. (+) QL	Пропорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки VS (A) 60-65	відсутній або дуже слабкий слабкий помірний сильний дуже сильний	1 3 5 7 9	
32. QL	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні VS (A) 69-92	відсутнє наявне	1 9	


8. Пояснення до Таблиці ознак сортів пшениці спельти, пшениці шарозерної, пшениці однозерної

До 1. Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення

Метод визначення антоціанового забарвлення (лабораторія або теплиця):
20 насінин для визначення відмінності і 100 – для визначення однорідності кладуть у чашки Петрі на вологий фільтрувальний папір, закривають і пророщують у темряві.

Коли довжина колеоптиля досягне 1 см, чашки з насінням виставляють на постійне штучне освітлення (12000–15000 Lux) протягом 3–4 діб за температури +15...+20°C. Оцінюють у стадії 09–11 паралельно з контролльним сортом.

До 2. Рослина: габітус (форма куща)




Габітус визначають візуально за кутом розміщення листків та пагонів відносно уявної вертикальної осі.

До 4. Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком

- 1 – прапорцеві листки прямостоячі у всіх рослин;
- 3 – приблизно 1/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 5 – приблизно 1/2 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 7 – приблизно 3/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 9 – усі прапорцеві листки зігнуті.


До 10. Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)

Оглядають усі соломини рослини, відмічають найбільший ступінь вираженості ознаки кожної рослини.




3

слабко виповнена



5

помірно виповнена



7

виповнена

До 11. Колос: форма (вигляд збоку)



1



2



3



4



5

піраміdalна циліндрична напівбулавоподібна булавоподібна веретеноподібна

До 12. Колос: за щільністю

Щільність визначають візуально або як відношення кількості колосків до довжини колоса.

До 14. Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок




1

обоє відсутні



2

наявні зубці



3

наявні остюки


До 15. Колос: зубці/ остюки на верхівці за довжиною

Спостереження здійснюють на верхівці колоса на сортах з відсутніми зубцями та остюками.



1 3 5 7 9
дуже короткі короткі середні довгі дуже довгі

До 17. Соломина: опущення опуклої поверхні верхнього вузла



1 3 5 7 9
відсутнє або дуже слабке помірне сильне дуже сильне
слабке

До 18. Нижня колоскова луска. Плече: за ширину (колосок у середині колоса)




1 3 5 7 9
відсутнє або вузьке середнє широке дуже широке
дуже вузьке


До 19. Нижня колоскова луска. Плече: за формою




До 20. Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною




До 21. Нижня колоскова луска. Зубець: за формою



До 22. Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні



До 23. Нижня квіткова луска. Зубець: за формою



До 25. Зернівка: забарвлення у фенолі

Забарвлення зернівки визначають на сухих насінинах. Для більш чіткого визначення ознаки можливо визначати за допомогою розчину NaOH (насіння занурюють на 10 хвилин при 60 °C або на 60 хвилин при кімнатній температурі в 5M розчині NaOH).

Обладнання: чашки Петрі (діаметр 9 см)

Підготовка насіння: залити водою на 16–20 год, потім воду злити, насіння підсушити, помістити в чашки борозенкою донизу, закрити чашки кришкою

Концентрація 1%-ий розчин фенолу (свіжоприготований) розчину:

Кількість розчину:	насіння має зануритись у розчин на 3/4
Місце дослідження:	лабораторія
Освітлення:	денне світло без прямих сонячних променів
Температура:	+18...+20°C
Час досліджень:	через 4 год після занурення в розчин
Визначення ступеня забарвлення:	дивіться ознаку 25

Примітка: визначення ступеня забарвлення фенолом варто проводити і для стандарту.

До 26. Тип розвитку

Оцінюють на одній чи кількох висіяних навесні ділянках. До експертизи залишають обов'язково сорти-еталони. Коли найпізніший ярий сорт-еталон досягне повного розвитку (фаза 91/92), оцінюють фазу розвитку сорту-кандидата. Ступені виявлення ознаки: озимий тип – повністю досягнув фази 45, дворучка – рослини, як правило, пройшли фазу 75 і перебувають загалом у фазі 90, ярий тип – рослини пройшли фазу 90.

До 28. Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: час достигання зерна, діб

Ярого типу розвитку рослини:

Ранній – до 90, середній – 90–100, пізній – понад 100.

Озимого типу розвитку рослини:

Ранній – до 260, середній – 260–275, пізній – понад 275.

До 30. Лише для сортів пшениці шарозерної. Насіння: маса 1000 шт., г.

Мала – до 30, середня – 30–40, велика – понад 40.

До 31. Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки

Спостереження проводять на нижній поверхні листкової пластинки.

9. Додаткова інформація

1) Типи ділянок для пшениці спельти, пшениці шарозерної, пшениці однозерної

Тип ділянки	Назва ділянки	Вид експертизи	Примітки
A	рядкова	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявителя відповідно до року врожаю
A ₁	рядкова	стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням заявителя першого року врожаю
Б	пунктирна	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявителя відповідного року врожаю
В	колосова 1 (волотева 1)	однорідність стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів (волотей), надісланих заявителем
Г	колосова 2	відмінність однорідність стабільність	для ботанічних таксонів групи зернових озимого типу розвитку весняної сівби, експертизи на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявителем
Д	колосова 3 (волотева 3) (спеціальна)	однорідність	висівають на другий рік експертизи насіння з колосів (волотей), які відбирають з усіх нетипових рослин.
E _к	колосова 4 (волотева 4) (спеціальна)	однорідність (контроль)	Для встановлення причин неоднорідності висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту

2) Необхідна кількість рослин пшениці спельти, пшениці шарозерної, пшениці однозернянки для експертизи на ВОС

Тип ділянки	Схема розміщення рослин		Кількість рослин, шт.			
	ширина міжряддя, см	відстань між рослинами в рядку, см	на ділянці, шт.	для обліку на:		
				відмінність	однорідність	стабільність
Перший рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2 500	2 000*	2 000*	—
Б	15–20	10,0	240	20	100	—
Другий рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2 500	2 000*	2 000*	2 000*
A ₁	15–20	≈2,0	2 500	—	—	1 000
Б	15–20	10,0	240	20	100	100
В	15–20	10,0	2 000	—	2 000	20
Г	15–20	10,0	1 000	20	1 000	1 000
Д	15–20	10,0	x	y	y	y
E _к **	15–20	10,0	x	y	y	y

* За візуальної одноразової оцінки групи рослин;

** Параметри ділянки E_к повністю відповідають параметрам ділянки Д;
x, y – значення цих показників перемінне та залежить від кількості нетипових рослин;

А – у двох повторенях;

A₁, Б, В, Д, Г, Е_к – в одному повторенні.

3) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВІДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52*)

Двозначний код	Загальний опис	Шкала Фіке	Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса та рису
1	2	3	4
	Проростання		
00	Сухе насіння		
01	Початок набрякання		
02			
03	Повне набрякання		
04			
05	Поява зародкового корінця		
06			
07	Поява колеоптиля		
08			
09	На верхівці колеоптиля помітний листок		
	Ріст паростка		
10	Поява першого листка з колеоптиля	}	Другий листок (< 1 см)
11	Перший листок розгорнувся		

1	2	3	4
12	2 листки розгорнулись		
13	3 листки розгорнулись		
14	4 листки розгорнулись		
15	5 листків розгорнулись		
16	6 листків розгорнулись		
17	7 листків розгорнулись		
18	8 листків розгорнулись		
19	Розгорнулись 9 або більше листків		
	Кущіння		
20	Розвивається лише головний пагін		
21	Головний пагін та один бічний		
22	Головний пагін та два бічних		
23	Головний пагін та три бічних		
24	Головний пагін та чотири бічних		
25	Головний пагін та п'ять бічних		
26	Головний пагін та шість бічних		
			Цей розділ може бути використа- ний для доповнення спостере- жень інших розділів таблиці
27	Головний пагін та сім бічних		«Паралельні коди»
28	Головний пагін та вісім бічних		
29	Головний пагін та дев'ять або більше бічних		
	Видовження стебла		
30	Піднімається несправжнє стебло (починається розтягнення)	4–5	У рисі: фаза вегетатив- ної затримки

1	2	3	4
31	1-й вузол	6	Етапи закладання вузла
32	2-й вузол		
33	3-й вузол		
34	4-й вузол		Вузли вище основи стебла
35	5-й вузол		
36	6-й вузол		
37	Наявність прапорцевого листка	8	
38			
39	Язичок прапорцевого листка помітний	9	Стадія перед колосінням У рису: стадія, коли вушка останнього та передос- тannього листків розташовані одне навпроти одного
	Набрякання колоса		
40			Невелике збільшення суцвіття, стадія раннього набухання колоса

1	2	3	4
41	Піхва прапорцевого листка довшає		
42			
43	Помітне набрякання піхви листка		
44			
45	Набрякання піхви листка		
46			
47	Відкрито піхву прапорцевого листка		
48			
49	Перший остюк помітний		
	Колосіння		викидання волоті
50	Перший колосок суцвіття помітний	N	
51	{	S	
52	З'явилось 1/4 суцвіть	N 10,2	N -
53	{	S	несинхронні види
54	З'явилось 1/2 суцвіть	N 10,3	S - синхронні види
55	{	S	
56	З'явилось 3/4 суцвіть	N 10,4	
57	{	S	
58	Ріст суцвіть закінчений	N 10,5	
59	{	S	

1	2	3	4
	Цвітіння		Для ячменю встановити нелегко
60	Початок цвітіння	N 10,51	Для рису: як правило, після цього відразу виявляється волоть
61	{	S	
62			
63			
64	Середина цвітіння	N 10,52	
65	{	S	
66			
67			
68	Кінець цвітіння	N 10,53	
69	{	S	
	Фаза молочної стиглості		
70			
71	Зернівка водостигла	10,54	
72	Зернівка втрачає зелений колір		
73	Рання молочна стиглість		
74	Поява клітинної будови ендосперму		
75	Середина молочної стиглості		
76			
77	Пізня молочна стиглість		
78	Завершення формування		
79	ендосперму	11,1	

1	2	3	4
	Фаза воскової стиглості		
80			
81			
82			
83	Рання воскова стиглість		Можливо
84			розрізання
85	М'яка воскова стиглість		зернівки
86			нігтем, але
87	Тверда воскова стиглість		не відбиток
			Розрізання
			зернівки
			нігтем
			неможливе,
			але
			можливий
			відбиток; у
			суцвіттях
			зменшується
			вміст
			хлорофілу
88			
89			
	Достигання		
90			

1	2	3	4
91	Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3))	11,3	Для рису: досягають колоски на верхівці
92	Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4))	11,4	Для рису: 50 % колосків досягло
93	Зернівка вдень відокремлюється (5)		Для рису: досягає 90 % колосків
94	Перестиглість, соломина відмирає		
95	Насіння в стадії спокою		Можлива втрата насіння внаслідок обсипання
96	Насіння життездатне (50 % схожість)		
97	Насіння пробуджене		
98	Настає вторинний спокій		
99	Вторинний спокій закінчується		

10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.*) (TG /3/11+Corr UPOV) // Geneva. 1994 – 10 – 04 + 1996 – 10 – 18. – 21 P. // URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf
2. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.*) (TG /3/12 UPOV) // Geneva. 2017-04-05. – 39 P. // URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf
2. А.Н. Шарозерная пшеница (*Triticum sphaerococcum Perc.*). Проблемы и перспективы (Обзор). / А.Н. Боровик, Л.А. Беспалова, О.Ф. Колесникова // Эволюция научных технологий в растениеводстве: сб. науч. тр. в честь 90-летия со дня образования КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко в 4 т. – Краснодар, 2004. – Т. 1: Пшеница. – С. 198–222.
3. Конопкин С.О. Совершенствование методики сортоиспытания озимой пшеницы / С.О. Конопкин И.Н. Кудряшов // Пшеница и тритикале: материалы науч.-практ. конф. «Зеленая революция П.П. Лукьяненко». – Краснодар, 2001. – С. 469–480.
4. Шахмедов И.Ш. Хозяйственно-биологические особенности вида шарозерной пшеницы (*Tr. sphaerococcum Perc.*) / И.М. Шахмедов: дис. ... канд. с.-х. наук. – Л., 1972. – 153 с.
5. Шелепов В.В. Пшеница: история, морфология, биология, селекция / В.В. Шелепов, В.С. Кочмарский. – Мироновка: ЗАТ Мироновская типография, 2009. – С. 135–146.
6. RTG /003/2 Пшеница мягкая, пшеница спельта. Первоисточник TG /3/11+Corr. 27.10.2004. – 22 с. www.gossort.cjm/mtd_dus.html

11. Технічна анкета

Номер заявки

(не заповнюється заявником)

Annex to Application

(not to be filled in by the applicant)

ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY

Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявлання, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.

Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.

In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.

1. Предмет Технічної анкети

1. Subject of the Technical Questionnaire

1.1. Ботанічний таксон

(вид)

(латинською мовою)

1.1 Botanical name species
(in Latin Language)

Triticum spelta L.

Triticum sphaerococcum Perc.

Triticum monococcum L.

1.2. Ботанічний таксон

(вид)

(українською мовою)

1.2 Botanical name species
(in Ukrainian Language)

Пшениця спельта

Пшеница шарозерна

Пшениця однозерна

2. Заявник(и)

2. Applicant(s)

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

Name (denomination)

Автор(и)

3. Назва сорту

3. Variety denomination

4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту

4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety

4.1. Схема селекції

4.1. Breeding scheme

Сорт, одержаний в результаті:

Variety resulting from:

4.1.1. схрещування

crossing

а) контролюване схрещування

a) controlled cross

(точно вказати батьківські сорти)

(please state parent varieties)

б) частково відоме схрещування

b) partially known cross

(вказати відомий батьківський

сорт(и))

(please state known parent variety(ies))

в) невідоме схрещування

v) unknown cross

4.1.2. мутація

mutation

(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)

4.1.3. виявлення та поліпшення

discovery and development

(точно визначити, де і коли
виявлено та як поліпшено)
(please state where and when discovered
and how developed)

4.1.4. інше

other

(надати деталі)
(please provide details)

4.2. Метод розмноження сорту:

method of propagating the variety

4.2.1. сорти, що розмножуються насінням

seed-propagated varieties

а) самозапилення

a) self-pollination

б) перехресне запилення

b) cross-pollination

популяція

population

синтетичний сорт

synthetic variety

в) гібрид

c) hybrid

Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида:

In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.

Простий гібрид $\text{♀} \times \text{♂}$ Трьохліній гібрид $\text{♀} \times \text{♂} \rightarrow (\text{♀} \times \text{♂}) \times \text{♂}$ і має визначати, зокрема:
Single Hybrid Three-Way Hybrid and should identify in particular:

а) будь-які чоловічі стерильні лінії

a) any male sterile lines

б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній

b) maintenance system of male sterile lines.

г) інші

d) other

(надати детальну інформацію)

(please provide details)

4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно:

vegetative propagation

а) живці

a) cuttings

б) розмноження *in vitro*

b) *in vitro* propagation

в) інші (установлений метод)

c) other (state method)

4.2.3. інші

other

(надати детальну інформацію)

(please provide details)

5. Ознаки сорту

Variety characteristics

Назва ознаки Variety denomination		Ступінь проявлення Manifestation	Сорт-еталон Example variety	Код Code
1	2	3	4	5
5.1. (11)	Колос: форма (вигляд збоку) Ear: shape in profile	піраміdalна tapering		1 <input type="checkbox"/>
		циліндрична parallel sided		2 <input type="checkbox"/>
		напівбулавоподібна slightly clavate		3 <input type="checkbox"/>
		булавоподібна strongly clavate		4 <input type="checkbox"/>
		веретеноподібна fusiform		5 <input type="checkbox"/>
5.2. (14)	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок awns or scurs: presence	обоє відсутні both absent		1 <input type="checkbox"/>
		наявні зубці scurs present		2 <input type="checkbox"/>
		наявні остюки awns present		3 <input type="checkbox"/>
5.3. (16)	Колос: забарвлення Ear: color	біле або солом'яно- жовте white or straw yellow		1 <input type="checkbox"/>
		червоне red		2 <input type="checkbox"/>
		сіро-димчасте gray and smoky		3 <input type="checkbox"/>
		чорне black		4 <input type="checkbox"/>
5.4. (24)	Зернівка: забарвлення Seed: color	біле white		1 <input type="checkbox"/>
		червоне red		2 <input type="checkbox"/>
		коричневе purple		3 <input type="checkbox"/>
		сизе bluish		4 <input type="checkbox"/>
		інше other		5 <input type="checkbox"/>
5.5. (26)	Тип розвитку Seasonal type	озимий winter type		1 <input type="checkbox"/>
		дворучка (альтернативний) alternative type		2 <input type="checkbox"/>
		ярий spring type		3 <input type="checkbox"/>
5.6. (28)	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні Lower glume: hairiness on external surface	відсутнє absent		1 <input type="checkbox"/>
		наявне present		9 <input type="checkbox"/>

6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявики відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом. Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way.

Назва(и) сорту(ів) подібного(их) до сорту-кандидата Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety	Ознака(и), за якою (якими) сорт-кандидат відрізняється від подібних сортів Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(у) Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) сорту-кандидата Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Коментарі

Comments

7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці ознаки)
(if yes, please provide details)

7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці умови)
(if yes, please provide details)

7.3. Інша інформація (широке використання)

Other information

Main use

(надати детальну інформацію)
(please provide details)

8. Дозвіл на використання

Autorization for release

a) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?

a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?

Так

Hi

Yes

No

б) чи було одержано такий дозвіл?

b) Has such authorization been obtained?

Так

Hi

Yes

No

Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту

Information on use of GMOs for creating a variety

а) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?

a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?

Так

Hi

Yes

No

б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?

b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?

Так

Hi

Yes

No

Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику.

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертизу

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознак або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так

Hi

Yes

No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявики не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Комpetентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

а) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма) Так Hi
a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) Yes No

б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди) Так Hi
b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) Yes No

в) культури тканини Так Hi
c) Tissue culture Yes No

г) інших факторів Так Hi
g) Other factors Yes No

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано “так”
Please provide details for where you have indicated “yes”

10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявики, призначений для експертизи, перевіреним на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так

Yes

(просимо надати деталі)
(please provide details as specified
by the Authority)

Ні

No

Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

Ініціали та прізвище уповноваженої особи

Applicant's name

Підпис
Signature

Дата
Date

Методика

проведення експертизи сортів підвидів Пшениці твердої (*Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) Husn.), Пшениці картлійської (*Triticum turgidum* L. subs. *carthlicum* (Nevski) Á. Löve & D. Löve), Пшениці польської (*Triticum turgidum* L. subsp. *polonicum* (L.) Thell.), Пшениці тучної (*Triticum turgidum* L. subsp. *turgidum*), Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної) (*Triticum turgidum* L. subsp. *dicoccum* (Schrank ex Schübl.) Thell.) (*Triticum dicoccum* Schrank ex Schübl.), Пшениці туранської (*Triticum turgidum* L. subsp. *turanicum* (Jakubz.) Á. Löve & D. Löve) на відмінність, однорідність і стабільність групи зернових на відмінність, однорідність і стабільність

Загальні рекомендації

1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів підвидів Пшениці твердої (*Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) Husn.), Пшениці картлійської (*Triticum turgidum* L. subs. *carthlicum* (Nevski) Á. Löve & D. Löve), Пшениці польської (*Triticum turgidum* L. subsp. *polonicum* (L.) Thell.), Пшениці тучної (*Triticum turgidum* L. subsp. *turgidum*), Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної) (*Triticum turgidum* L. subsp. *dicoccum* (Schrank ex Schübl.) Thell.) (*Triticum dicoccum* Schrank ex Schübl.), Пшениці туранської (*Triticum turgidum* L. subsp. *turanicum* (Jakubz.) Á. Löve & D. Löve).

2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси

*Використано документ UPOV TG /120/3, 1988 та TG /120/4, 2012. Зміни й доповнення внесені: Андрющенко А. В., Кривицький К. М., канд-ти. біол. наук.; Веселовська О. Б., УІЕСР, 2010; Кривицький К. М., канд. біол. наук, УІЕСР, 2012. Сорти-еталони пшениці твердої виділені: Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб., Камінська Л. В., УІЕСР, Семко С. В., Ульяновська лабораторія Кіровоградського ОДЦЕСР, 2014. Зміни і доповнення внесені: Костенко Н. П., канд. с.-г. наук, Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб.; Лікар С. П., Душар М. Б., УІЕСР, 2019. Зміни і доповнення внесені: Костенко Н. П., канд. с.-г. наук, Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб.; Лікар С. П., УІЕСР, 2021.

1) Комpetентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 3 кг. Крім того, на другий рік заявник надсилає 100 колосів. Мінімальна кількість насіння кожного батьківського компонента (інбредних ліній) має становити щонайменше 0,3 кг.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не ушкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

3. Метод експертизи

1) Тривалість експертизи. Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій цикл.

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібриду – дві вихідні лінії, трилінійного гібриду – простий гібрид та три лінії, подвійного гібриду – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію (успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис) – польові дослідження вище зазначененої лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявника, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) Місце експертизи. Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) Умови для проведення експертизи. Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст і розвиток рослин, і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) План експертизи. Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає близько 2000 рослин, які поділяють на два повторення. За визначення типу розвитку обстежують щонайменше 300 рослин. За проведення експертизи колосових рядків обстежують щонайменше 100 таких рядків.

До випробування гібридів повинні бути включені батьківські компоненти. Експертизу проводять так само, як і будь-якого іншого сорту. Спостереження проводять щонайменше на 200 рослинах.

Під час проведення експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) Метод дослідження. Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ). Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюються всі виміри кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

б) *Кількість рослин / частин рослин.* Експертизі підлягає щонайменше 2000 рослин.

Усі вимірювання здійснюють на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальне разове обстеження 2000 рослин;

VS – візуальне обстеження окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

4. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

1) Експертиза на відмінність

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнати сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

2) Експертиза на однорідність

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності приймається популяційний стандарт 0,1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2000 рослин допускається п'ять нетипових.

У вибірці зі 100 рослин або частин рослин і колосових рядків приймається популяційний стандарт 1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 рослин, частин рослин або колосових рядків допускається три нетипові рослини / колосові рядки. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Однорідність оцінюють у два кроки. Спершу обстежують 20 рослин або частин 20 рослин. За відсутності нетипових сорт визнають однорідним. Якщо виявлено 1–3 нетипові рослини, необхідно додатково обстежити 80 рослин або частин 80 рослин.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

3) Експертиза на стабільність

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти групують за найвідміннішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіють або дуже слабко варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- нижня колоскова луска – опушення зовнішньої поверхні (ознака 20);
- соломина – виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом) (ознака 21);
- остюк – забарвлення (ознака 22);
- колос – інтенсивність забарвлення за досягнення (ознака 25);
- зернівка – забарвлення у фенолі (ознака 30);

– тип розвитку (ознака 31).

Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

6. Умовні позначення

(*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залишаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливлюють;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак;

Сорти-еталони* – виділені для пшениці твердої.

7. Таблиця ознак сортів підвидів Пшениці твердої, Пшениці картлійської, Пшениці польської, Пшениці тучної, Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної), Пшениці туранської

Назва ознаки		Ступінь виявлення ознаки	Код	Сорт-еталон *	
				озимий	ярий
1	2	3	4	5	6
1. (+) QN	Колеоптиль: антоціанове забарвлення VS 09–11 L	відсутнє або дуже слабке	1	Андромеда, Шулиндінка	Славута, Прикраса
		слабке	3		Роза дур
		помірне	5		
		сильне	7		Жізель
		дуже сильне	9		
2. (+) QN	Перший листок: антоціанове забарвлення VS (A) 10	відсутнє або дуже слабке	1	Андромеда, Шулиндінка	Славута, Прикраса
		слабке	3	Бурштин	
		помірне	5		
		сильне	7		
		дуже сильне	9		
3. (*) (+) PQ	Рослина: габітус VG (Б) 25–29	прямий	1	Андромеда, Шулиндінка	Династія, Славута
		напівпрямий	3	Бурштин	Жізель
		напіврозлогий	5		
		розлогий	7		
		сланкий	9		
4. (+) QN	Кількість рослин із	відсутня або дуже мала	1	Андромеда, Шулиндінка	Мерідіано
		мала	3	Бурштин	Букурія
		середня	5	Гардемарин	Жізель

1	2	3	4	5	6
	зігнутим прапорцевим листком VG (A) 47–51	велика дуже велика	7 9		Спадщина
5. (*) QN	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) MG (A) 50–52	дуже ранній ранній середній пізній дуже пізній	1 3 5 7 9	Гардемарин, Андромеда Бурштин, Крейсер Афіна	Жізель, Спадщина Мерідіано, Метиска
6. (*) QN	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві VG (A) 55–69	відсутній або дуже слабкий слабкий помірний сильний дуже сильний	1 3 5 7 9	Крейсер, Бурштин Андромеда, Шулиндінка	Спадщина, Жізель Мерідіано, Славута Леванте, Букурія
7. (*) QN	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці	відсутній або дуже слабкий слабкий помірний сильний	1 3 5 7	Золоте руно Босфор Андромеда	Славута Мерідіано Леванте

1	2	3	4	5	6
	(з нижнього боку) VG (A) 55–69	дуже сильний	9	Прозорий	
8. QN	Остюки: антоціанове забарвлення VG (A) 58–60	відсутнє або дуже слабке	1	Прозорий, Бурштин	Леванте, Славута
		слабке	3	Шулиндінка, Крейсер	Прикраса
		помірне	5		Метиска
		сильне	7		
		дуже сильне	9		
9. (+) QN	Соломина: опущення верхнього вузла VG (A) 55–75	відсутнє або дуже слабке	1	Золоте руно	Славута, Прикраса
		слабке	3	Крейсер	Мерідіано
		помірне	5	Босфор	
		сильне	7	Андромеда	Леванте
		дуже сильне	9		
10. (*) QN	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі VG (A) 60–69	відсутній або дуже слабкий	1		
		слабкий	3		Жізель
		помірний	5	Континент	Прикраса
		сильний	7	Крейсер	Метиска
		дуже сильний	9	Андромеда	Букурія
11. (*) QN	Колос: восковий наліт VS (A) 60–69	відсутній або дуже слабкий	1		
		слабкий	3		
		помірний	5	Гардемарин	Букурія

1	2	3	4	5	6
		сильний	7	Континент, Босфор	Метиска
		дуже сильний	9	Шулиндінка	Династія
12. (*) QN	Рослина: за висотою (стебло і колос) MG (A) 75–92	дуже низька	1		Славута
		низька	3	Перлина одеська, Афіна	Метиска
		середня	5	Континент, Крейсер	Букурія
		висока	7		Прикраса
		дуже висока	9		Династія
13. (+) PQ	Колос: наявність і розміщення остюків VG (A) 70–92	відсутні	1		
		тільки на верхівці колоса	2		
		у верхній половині колоса	3		
		по всій довжині колоса	4	Бурштин, Континент	Славута, Династія
14. (+) (*) QN	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса VG (A), 75–92	коротша	1		
		однакова	2		
		довша	3	Бурштин, Континент	Славута, Династія

1	2	3	4	5	6
15.	Нижня колоскова луска: за формою VG (A) 80–92, (a)	яйцеподібна видовжена	3 5		Славута Прикраса, Династія
(+)					
(*)					
PQ		дуже видовжена	7	Лінкор	Мерідіано
16.	Нижня колоскова луска. Плече: за формою VS (A) 80–92 (a)	скошене округле пряме піднесене піднесене з наявністю другої вершини	1 2 3 4 5	Континент Прозорий, Шулиндінка Кассіопея, Золоте руно	Мерідіано Династія Спадщина Славута
(+)					
PQ					
17.	Нижня колоскова луска. Плече: за ширину VS (A) 80–92, (a)	вузьке середнє широке	3 5 7	Кассіопея, Крейсер Гардемарин	Прикраса Славута
(+)					
QN					
18.	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною VS (A) 80–92 (a)	дуже короткий короткий середній довгий дуже довгий	1 3 5 7 9	Континент, Кассіопея Гардемарин	Жізель, Спадщина Метиска, Букурія
QN					

1	2	3	4	5	6
19. (+) PQ	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою VS (A) 80–92, (a)	прямий	1		Прикраса
		ледь зігнутий	2	Континент	Славута
		середньо зігнутий	3	Кассіопея	Букурія
		дуже зігнутий	4	Бурштин Архипелаг	
20. (*) QL	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні VS (A) 80–92, (a)	відсутнє	1	Лінкор, Босфор	Спадщина
		наявне	9	Перлина одеська, Партеніт	Мерідіано, Нащадок
21. (*) (+) QN	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом) VS (A) 80–92	слабке	3	Континент, Кассіопея	Спадщина, Жізель
		помірне	5	Лінкор, Прозорий	Леванте
		сильне	7		
22. (*) PQ	Остюки: забарвлення VG (A) 90–92	біле	1	Афіна	Династія
		світло- коричневе	2	Босфор	Метиска
		коричневе	3	Партеніт	Шовковиста
		чорне	4	Лінкор	Букурія

1	2	3	4	5	6
		пурпурове	5		
		темно-пурпурове	6		
23.	Колос: за довжиною (*) QN (без остюків) VS (A) 90–92	дуже короткий	1	Лінкор	
		короткий	3	Босфор	Букурія
		середній	5	Континент	Метиска
		довгий	7		
		дуже довгий	9		
24.	Колос: QN опущення край в нижніх 2–4 сегментів стрижня VS (A) 90–92	відсутнє або дуже слабке	1		Леванте
		слабке	3		Мерідіано
		помірне	5	Прозорий, Бурштин	Прикраса
		сильне	7	Андромеда	Спадщина
		дуже сильне	9	Архипелаг, Перлина одеська	Чадо
25.	Колос: (*) QN інтенсивність забарвлення за досягнання VG (A) 90–92	біле	1	Прозорий, Лінкор	Династія
		слабко забарвлене	2	Партеніт, Крейсер	Славута
		сильно забарвлене	3	Гардемарин, Бурштин	Прикраса, Спадщина
26.	Колос: форма VS (A) PQ 92	піраміdalьна	1	Континент, Бурштин	Спадщина
		циліндрична	2	Прозорий, Партеніт	Леванте, Славута

1	2	3	4	5	6
		напівбулаво-подібна	3		
		булавоподібна	4		
		веретено-подібна	5		
27. (*) (+) QN	Колос: за щільністю VG/MS (A) 92	нешкільний	3	Партеніт	
		помірний	5	Прозорий, Крейсер	Букурія, Династія
		щільний	7	Бурштин, Гардемарин	Чадо, Славута
28. (+) PQ	Зернівка: форма MS/VG (A) 92	яйцеподібна	3		Жізель
		овальна	5	Бурштин	Метиска
		видовжена	7	Континент, Босфор	Чадо, Букурія
		куляста	9		
29. (+) QN	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки) VG (A), 92	короткий	3	Босфор	Жізель
		середній	5	Гардемарин	Спадщина
		довгий	7	Шулиндінка	Шовковиста
30. (*) (+) QN	Зернівка: забарвлення у фенолі VG 92, L	відсутнє або дуже світле	1	Андromeda	Леванте
		світле	3		Шовковиста
		помірне	5		Чадо
		темне	7		
		дуже темне	9		

1	2	3	4	5	6
31. (*) PQ	Тип розвитку VG (Г) PQ	озимий	1	Босфор	
		дворучка (альтерна- тивний)	2		
		ярий	3		Чадо, Славута
32. PQ	Колос: забарвлення VG (A) 90–92	біле або солом'яно- жовте	1	Прозорий	Леванте, Династія
		червоне	2	Континент	Шовковист, Нащадок
		сіро-димчасте	3	Андромеда	Метиска
		чорне	4		
		інше	5		
33. PQ	Язичок: за формою VS (Б) 12–19	округлий	1	Континент	Династія
		трикутний	2	Андромеда	Славута, Прикраса
34. QN	Язичок: за довжиною VS (Б) 12–19	відсутній або короткий	1		
		короткий	3	Андромеда	Шовковиста
		середній	5	Кассіопея, Партеніт	Леванте, Династія
		довгий	7		Славута, Жізель
35. QN	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	Континент	Жізель, Славута
		повне	2	Бурштин	Нащадок

1	2	3	4	5	6
	VS (Б) 12–19	з перекриттям	3	Прозорий	
36. QN	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок 55–59 VG, (A)	відсутнє або дуже слабке	1	Kamilaroi, Tamaroi	
		слабке	3	Carpio, Yallaroi	
		помірне	5	Don Jose	
		сильне	7	Carioca, Wollaroi	
		дуже сильне	9		
37. (*) QL	Лише для сортів пшениці двозерної Колос: ламкість MS (A), 90–92	слабка	3		
		помірна	5		
		сильна	7		
38. (*) QN	Лише для сортів пшениці двозерної Зернівка: маса 1000 шт. VS (A), 95	мала	3		
		середня	5		
		велика	7		
39. (*) QN	Лише для сортів пшениці двозерної	ранній	3		
		середній	5		
		пізній	7		

1	2	3	4	5	6
	Рослина: час достижання зерна VS (A)				

8. Пояснення до Таблиці ознак сортів підвидів Пшениці твердої, Пшениці картлійської, Пшениці польської, Пшениці тучної, Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної), Пшениці туранської

1) Ознаки обстежують за таким ключем у другій колонці Таблиці ознак, як зазначено нижче:

- (а) Усі обстеження колоска проводять у середній третині колоса.
- 2) Пояснення або ілюстрації до окремих ознак

До 1. Колеоптиль: антоціанове забарвлення

Метод визначення антоціанового забарвлення

Кількість насіння для тесту: 100 насінин для відмінності та однорідності

Підготовка насіння: помістити життєздатне насіння на зволожений фільтрувальний папір у закриті чашки Петрі для пророщування

Місце: лабораторія або теплиця

Освітлення: за досягнення довжини колеоптилів приблизно 1 см в темряві, їх поміщають на штучне освітлення (рівноцінне денному світлу), 12 000 –15 000 Lux на 3–4 доби

Температура: 15...20°C

Час оцінювання: колеоптилі повністю розвинені (блізько одного тижня) у фазі 09–11


Шкала оцінювання: дивись ознаку 1 в Таблиці ознак

Для визначення відмінності беруть 20 насінин і 100 – для визначення однорідності, поміщають у чашки Петрі на вологий фільтрувальний папір, закривають кришками і пророщують у темряві.

До 2. Перший листок: антоціанове забарвлення

Рослини вирощують у теплиці на нейтральному субстраті (наприклад, пісок) за температури $+18^{\circ}\text{C}$ і постійному освітленні 15000 Lux від моменту появи колеоптиля. Спостерігають за антоціановим забарвленням точно у стадії 10, тому що виявлення ознаки може швидко зникнути.

До 3. Рослина: габітус



Габітус визначають візуально за кутом розміщення листків і пагонів по відношенню до уявної вертикальної осі.


До 4. Кількість рослин із зігнутим прaporцевим листком

- 1 – прaporцеві листки прямі у всіх рослин;
- 3 – приблизно 1/4 рослин мають зігнутий прaporцевий листок;
- 5 – приблизно 1/2 рослин мають зігнутий прaporцевий листок;

7 – приблизно 3/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;

9 – усі прапорцеві листки зігнуті.

9. Соломина: опущення верхнього вузла




До 13. Колос: наявність і розміщення остюків




До 14. Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса



До 15. Нижня колоскова луска: за формою




До 16. Нижня колоскова луска. Плече: за формою



До 17. Нижня колоскова луска. Плече: за ширину




До 19. Нижня колоскова луска. Зубець: за формою



До 21. Соломина: виповнення (між основою колосу й верхнім вузлом)




До 26. Колос: форма



До 27. Колос: за щільністю

Щільність колоса визначають підрахунком кількості колосків з наступним їх діленням на довжину колоса (визначати відношенням кількості колосків на одиницю довжини колоса). Більше відношення вказує на більшу щільність.




До 28. Зернівка: форма

Обстежують вид згори



До 29. Зернівка: чубок за довжиною



До 30. Зернівка: забарвлення у фенолі

Метод визначення забарвлення фенолом. Кількість насінин, потрібних для дослідження: 20 – для визначення відмітності, 100 – для визначення однорідності. Насіння нічим не обробляють.

Обладнання:	чашки Петрі (діаметр 9 см)
Підготовка насіння:	замочити на 16–20 год у воді, воду злити, насіння підсушити, помістити в чашки борозенкою донизу, закрити чашки кришкою
Концентрація розчину:	1%-ий розчин фенолу (свіжоприготований)
Кількість розчину:	насіння має зануритись у розчин на 3/4
Місце дослідження:	лабораторія
Освітлення:	денне світло без прямих сонячних променів
Температура:	18...20°C
Час досліджень:	через 4 год (після занурення в розчин)
Визначення ступеня забарвлення:	дивіться ознаку 32
Примітка:	визначають ступінь забарвлення фенолом і для сорту-еталону.

До 37. Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість

Ламкість колоса визначають у повній стиглості за частиною колоса, що відламується.

Слабка – до 1/3 колоса, помірна – до 1/2 колоса, сильна – понад 1/2 колоса.

До 38. Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000 шт.

Мала – до 25, середня – 25–30, велика – понад 30.

До 39. Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час достигання зерна, декада, місяць.

Ранній – II декада серпня, середній – III декада серпня, пізній – початок вересня.

9. Додаткова інформація

1) Типи ділянок для підвидів Пшениці твердої, Пшениці картлійської, Пшениці польської, Пшениці тучної, Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної), Пшениці туранської

Тип ділянки	Назва ділянки	Вид експертизи	Примітки
A	рядкова	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідно до року врожаю
A ₁	рядкова	стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням заявника першого року врожаю
B	пунктирна	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявника відповідного року врожаю
B	колосова 1 (волотева 1)	однорідність стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів (волотей), надісланих заявником
Г	колосова 2	відмінність однорідність стабільність	для ботанічних таксонів групи зернових озимого типу розвитку весняної сівби, експертизи на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявником
Д	колосова 3 (волотева 3) (спеціальна)	однорідність	висівають на другий рік експертизи насіння з колосів (волотей), які відбирають з усіх нетипових рослин. Для встановлення причин неоднорідності висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту
E _к	колосова 4 (волотева 4) (спеціальна)	однорідність (контроль)	висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту

2) Необхідна кількість рослин підвидів Пшениці твердої, Пшениці картлійської, Пшениці польської, Пшениці тучної, Пшениці двозерної (Пшениці полби звичайної), Пшениці туранської для експертизи на ВОС

Тип ділянки	Схема розміщення рослин		Кількість рослин, шт.			
	ширина міжряддя, см	відстань між рослинами в рядку, см	на ділянці, шт.	для обліку на:		
Перший рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2 500	2 000*	2 000*	—
Б	15–20	10,0	240	20	100	—
Другий рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2 500	2 000*	2 000*	2 000*
A ₁	15–20	≈2,0	2 500	—	—	1 000
Б	15–20	10,0	240	20	100	100
В	15–20	10,0	2 000	—	2 000	20
Г	15–20	10,0	1 000	20	1 000	1 000
Д	15–20	10,0	x	y	y	y
E _к **	15–20	10,0	x	y	y	y

* За візуальної одноразової оцінки групи рослин;

** Параметри ділянки E_к повністю відповідають параметрам ділянки Д;

х, у – значення цих показників перемінне та залежить від кількості нетипових рослин;

А – у двох повторенях;

A₁, Б, В, Д, Г, Е_к – в одному повторенні.

3) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВІДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52; Zadoks et al., 1974*)

Двозначний код	Загальний опис	Шкала Фіке	Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса, тритикале та рису
1	2	3	4
	Проростання		
00	Сухе насіння		
01	Початок набрякання		
02			
03	Повне набрякання		
04			
05	Поява зародкового корінця		
06			
07	Поява колеоптиля		
08			
09	На верхівці колеоптиля помітний листок		
	Ріст паростка		
10	Поява першого листка з колеоптиля	} 1	Другий листок (< 1 см)
11	Перший листок розгорнувся		

1	2	3	4
12	2 листки розгорнулись		
13	3 листки розгорнулись		
14	4 листки розгорнулись		
15	5 листків розгорнулись		
16	6 листків розгорнулись		
17	7 листків розгорнулись		
18	8 листків розгорнулись		
19	Розгорнулись 9 або більше листків		
	Кущіння		
20	Розвивається лише головний пагін		
21	Головний пагін та один бічний		
22	Головний пагін та два бічних		
23	Головний пагін та три бічних		
24	Головний пагін та чотири бічних		
25	Головний пагін та п'ять бічних		
26	Головний пагін та шість бічних		
27	Головний пагін та сім бічних		«Паралельні коди»
28	Головний пагін та вісім бічних		
29	Головний пагін та дев'ять або більше бічних		
	Видовження стебла		
30	Піднімається несправжнє стебло (починається розтягнення)	4–5	У рису: фаза вегетативної затримки
31	1-й вузол		
32	2-й вузол	6	Етапи закладання вузла
		7	

1	2	3	4
33	3-й вузол		Вузли вище основи стебла
34	4-й вузол		
35	5-й вузол		
36	6-й вузол		
37	Наявність прапорцевого листка	8	
38			
39	Язичок прапорцевого листка помітний	9	Стадія перед колосінням У рису: стадія, коли вушка останнього та передостаннього листків розташовані одне навпроти одного
	Набрякання колоса		
40			Невелике збільшення суцвіття, стадія раннього набухання колоса
41	Піхва прапорцевого листка довшає		
42			
43	Помітне набрякання піхви листка	{ } 10	
44			
45	Набрякання піхви листка		

1	2	3	4
46			
47	Відкрито піхву пропорцевого листка	} 10,1	Тільки для остистих форм
48			
49	Перший остюк помітний		
	Колосіння		викидання волоті
50	Перший колосок суцвіття помітний	N	
51	{	S	
52	З'явилося 1/4 суцвіть	N 10,2	N -
53	{	S	несинхронні види
54	З'явилося 1/2 суцвіть	N 10,3	S - синхронні види
55	{	S	
56	З'явилося 3/4 суцвіть	N 10,4	
57	{	S	
58	Ріст суцвіть закінчений	N 10,5	
59	{	S	
	Цвітіння		Для ячменю встановити нелегко
60	Початок цвітіння	N 10,51	Для рису: як правило, після цього відразу
61		S	

1	2	3	4
62	{		ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ВОЛОТЬ
63			
64	Середина цвітіння	N 10,52	
65	{	S	
66			
67			
68	Кінець цвітіння	N 10,53	
69	{	S	
	Фаза молочної стиглості		
70			
71	Зернівка водостигла	10,54	
72	Зернівка втрачає зелений колір		
73	Рання молочна стиглість		
74	Поява клітинної будови ендосперму		
75	Середина молочної стиглості		
76			
77	Пізня молочна стиглість		
78	Завершення формування ендосперму		
79		11,1	
	Фаза воскової стиглості		
80			
81			

1	2	3	4
82			
83	Рання воскова стиглість		Можливо розрізання зернівки нігтем, але не відбиток
84			
85	М'яка воскова стиглість		
86			
87	Тверда воскова стиглість	11,2	Розрізання зернівки нігтем неможливе, але можливий відбиток; у суцвіттях зменшується вміст хлорофілу
88			
89			
	Достигання		
90			
91	Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3))	11,3	Для рису: досягають колоски на верхівці
92	Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4))	11,4	Для рису: 50 % колосків досягло
93	Зернівка вдень відокремлюється (5)		Для рису: досягає 90 % колосків
94	Перестиглість, соломина відмирає		

1	2	3	4
95	Насіння в стадії спокою		Можлива втрата насіння внаслідок обсипання
96	Насіння життєздатне (50 % схожість)		
97	Насіння пробуджене		
98	Настає вторинний спокій		
99	Вторинний спокій закінчується		

10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) Husn.) (TG /120/4 UPOV) // Geneva, 2012 03–28. 34 P. URL: www.upov.int/edocs/tgdogs/en/tg120.pdf

11. Технічна анкета

Номер заявки

(не заповнюється заявником)

Annex to Application

(not to be filled in by the applicant)

ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY

Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявлання, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.

Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.

In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.

1. Предмет Технічної анкети

1. Subject of the Technical Questionnaire

1.1. Ботанічний таксон (вид) (латинською мовою)

1.1 Botanical name species
(in Latin Language)

<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.	[]
<i>Triticum turgidum</i> L. subs. <i>carthlicum</i> (Nevski) Á. Löve & D. Löve	[]
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>polonicum</i> (L.) Thell.	[]
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turgidum</i>	[]
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>dicoccum</i> (Schrank ex Schübl.) Thell.) (<i>Triticum dicoccum</i> Schrank ex Schübl.)	[]
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turanicum</i> (Jakubz.) Á. Löve & D. Löve	

1.2. Ботанічний таксон (вид)

(українською мовою)

1.2 Botanical name species
(in Ukrainian Language)

Пшениця тверда	[]
Пшениця картлійська	[]
Пшениця польська	[]
Пшениця тучна	[]
Пшениця двозерна (Пшениця полба звичайна)	[]
Пшениця туранська	

2. Заявник(и)

2. Applicant(s)

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

Name (denomination)

Автор(и)

Autor(s)

3. Назва сорту

3. Variety denomination

4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту

4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety

4.1. Схема селекції

4.1. Breeding scheme

Сорт, одержаний в результаті:

Variety resulting from:

4.1.1. схрещування crossing	
a) контролюване схрещування	<input type="checkbox"/>
a) controlled cross (точно вказати батьківські сорти) (please state parent varieties)	_____
b) частково відоме схрещування	<input type="checkbox"/>
b) partially known cross (вказати відомий батьківський сорт(и)) (please state known parent variety(ies))	_____
v) невідоме схрещування	<input type="checkbox"/>
v) unknown cross	
4.1.2. мутація mutation	<input type="checkbox"/>
(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)	_____
4.1.3. виявлення та поліпшення discovery and development	<input type="checkbox"/>
(точно визначити, де і коли виявлено та як поліпшено) (please state where and when discovered and how developed)	_____
4.1.4. інше other	<input type="checkbox"/>
(надати деталі) (please provide details)	_____
4.2. Метод розмноження сорту: method of propagating the variety	
4.2.1. сорти, що розмножуються насінням seed-propagated varieties	
a) самозапилення	<input type="checkbox"/>
a) self-pollination	
b) перехресне запилення	<input type="checkbox"/>
b) cross-pollination	
популяція	<input type="checkbox"/>
population	
синтетичний сорт	<input type="checkbox"/>
synthetic variety	
b) гібрид	<input type="checkbox"/>
c) hybrid	
Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида: In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.	
Простий гібрид $\text{♀} \times \text{♂}$	Трьохлінійний гібрид $\text{♀} \times \text{♂} \rightarrow (\text{♀} \times \text{♂}) \times \text{♂}$
Single Hybrid	Three-Way Hybrid
a) будь-які чоловічі стерильні лінії	i має визначати, зокрема: and should identify in particular:
a) any male sterile lines	
b) систему підтримки чоловічих стерильних ліній	
b) maintenance system of male sterile lines.	
г) інші	<input type="checkbox"/>
d) other	
(надати детальну інформацію) (please provide details)	_____
4.2.2. сорти, що розмножуються вегетативно: vegetative propagation	
a) живці	<input type="checkbox"/>
a) cuttings	
b) розмноження <i>in vitro</i>	<input type="checkbox"/>
b) <i>in vitro</i> propagation	

в) інші (установлений метод) <input type="checkbox"/>					
c) other (state method)					
4.2.3. інші <input type="checkbox"/> other (надати детальну інформацію) (please provide details) _____					
5. Ознаки сорту Variety characteristics					
Назва ознаки Variety denomination	Ступінь проявлення Manifestation	Сорт-еталон Example variety		Код Code	
		озимий winter	ярий spring		
5.1 (20)	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні Lower glume: hairiness of external surface	відсутнє absent	Лінкор, Босфор	Спадщина	1 <input type="checkbox"/>
		наявне present	Перлина одеська, Партеніт	Мерідіано, Нащадок	9 <input type="checkbox"/>
5.2 (21)	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом) Straw: pith in cross section (halfway between base of ear and stem node below)	слабке thin	Континент, Кассіонея	Спадщина, Жізель	3 <input type="checkbox"/>
		помірне medium	Лінкор, Прозорий	Леванте	5 <input type="checkbox"/>
		сильне thick			7 <input type="checkbox"/>
5.3 (22)	Остюки: забарвлення Awn: color	біле white	Афіна	Династія	1 <input type="checkbox"/>
		світло- коричневе light brown	Босфор	Метиска	2 <input type="checkbox"/>
		коричневе brown	Партеніт	Шовковиста	3 <input type="checkbox"/>
		чорне black	Лінкор	Букурія	4 <input type="checkbox"/>
		пурпурове medium purple			5 <input type="checkbox"/>
		темно- пурпурове dark purple			6 <input type="checkbox"/>
5.4 (25)	Колос: інтенсивність забарвлення за достижання	біле white	Прозорий, Лінкор	Династія	1 <input type="checkbox"/>
		слабко забарвлена slightly colored	Партеніт, Крейсер	Славута	2 <input type="checkbox"/>
		сильно забарвлена strongly colored	Гардемарин, Бурштин	Прикраса, Спадщина	3 <input type="checkbox"/>
5.5 (30)	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле absent or very light	Андромеда	Леванте	1 <input type="checkbox"/>
		світле light		Шовковиста	3 <input type="checkbox"/>
		помірне medium		Чадо	5 <input type="checkbox"/>

		темне dark			7 <input type="checkbox"/>
		дуже темне very dark			9 <input type="checkbox"/>
5.6 (31)	Тип розвитку	озимий winter type	Босфор		1 <input type="checkbox"/>
		дворучка (альтернативний) alternative type			2 <input type="checkbox"/>
		ярий spring type		Чадо, Славута	3 <input type="checkbox"/>

6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявки відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

Назва(и) сорту(ів) подібного(их) до сорту-кандидата Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety	Ознака(и), за якою (якими) сорт-кандидат відрізняється від подібних сортів Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(y) Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) сорту-кандидата Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Коментарі Comments	_____		

7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці ознаки)
(if yes, please provide details)

7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці умови)
(if yes, please provide details)

7.3. Інша інформація (широке використання)

Other information

Main use

(надати детальну інформацію)
(please provide details)

8. Дозвіл на використання

Autorization for release

а) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?

a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?

Так

Yes

Hi

No

б) чи було одержано такий дозвіл?

b) Has such authorization been obtained?

Так

Yes

Hi

No

Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту

Information on use of GMOs for creating a variety

а) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?

a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?

Так

Yes

Hi

No

б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?

b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?

Так

Yes

Hi

No

Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику.

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертизу

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так

Yes

Hi

No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявики не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Комpetентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| a) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма) | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди) | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| в) культури тканини | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| c) Tissue culture | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| г) інших факторів | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| g) Other factors | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так"

Please provide details for where you have indicated "yes"

10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявики, призначений для експертизи, перевіреним на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так
Yes

(просимо надати деталі)
(please provide details as specified
by the Authority)

Hi
No

Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною
I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

Ініціали та прізвище уповноваженої особи
Applicant's name

Підпис
Signature

Дата
Date

**МЕТОДИКА
проведення експертизи сортів пшениці щільноколосої (*Triticum compactum*
Host) на відмінність, однорідність і стабільність**

Загальні рекомендації

1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів пшениці щільноколосої (*Triticum compactum* Host).

2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси

1) Комpetентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 2,5 кг. Крім того, на другий рік експертизи заявник надсилає 100 колосів пшениці ярої і 150 – озимої.

Для гібридів додатково надають по 0,3 кг кожного батьківського компонента.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

3. Метод експертизи

1) Тривалість експертизи. Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій цикл.

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібриду – дві вихідні лінії, трилінійного гібриду – простий гібрид та три лінії, подвійного гібриду – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію, що успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис, польові дослідження зазначененої вище лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявитика, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст, розвиток рослин і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає близько 2 000 рослин, які поділяють на два повторення. За проведення експертизи колосових рядків обстежують щонайменше 100 таких рядків.

Для визначення типу розвитку використовують не менше ніж 300 рослин.

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN,

псевдоякісні – PQ). Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

6) *Кількість рослин / частин рослин.* Експертизі підлягає щонайменше 2 000 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 2 000 рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

4. Оцінка відмінності, однорідності та стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

1) Експертиза на відмінність

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізняним з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнати сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

2) Експертиза на однорідність

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності сортів і ліній приймається популяційний стандарт 0,3 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається десять нетипових. Для оцінки однорідності колосових рядків приймається популяційний стандарт 1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається три нетипові. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Однорідність оцінюють у два етапи. Спершу обстежують 20 рослин або частини 20 рослин. Якщо виявлено 1–3 нетипові рослини, необхідно додатково обстежити 80 рослин або частини 80 рослин. Якщо виявлено понад три нетипові рослини, сорт вважається неоднорідним. За відсутності нетипових рослин сорт визнають однорідним. *Не застосовується до ознак 24 (Зернівка: забарвлення) та 25 (Зернівка: забарвлення у фенолі).*

Для оцінки однорідності гібридів приймається популяційний стандарт 10 % за рівня ймовірності 95 %. Розмір вибірки для оцінки однорідності гібридів може бути зменшений до 200 рослин. У вибірці з 200 рослин допускається 27 нетипових. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 15 нетипових.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

3) Експертиза на стабільність

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти групують за найвідміннішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіють або дуже слабко варіють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- соломина – виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом) (ознака 10);
- колос – остюки або зубці нижніх квіткових лусок (ознака 14);
- колос – забарвлення (ознака 16);
- тип розвитку (ознака 26);
- нижня колоскова луска – опушення зовнішньої поверхні (ознака 28).

Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

6. Умовні позначення

(*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залищаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливлюють;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

7. Таблиця ознак сортів пшениці щільноколосої

Назва ознаки		Ступінь виявлення ознаки	Код	Сорт-еталон
1	2	3	4	5
1.	Колеоптиль: (+)	відсутня або дуже слабка	1	
QN	антоціанового забарвлення L, VS 09–11	слабка	3	
		помірна	5	
		сильна	7	
		дуже сильна	9	
2.	Рослина: габітус (+)	прямий	1	
PQ	(форма куща) VG (Б) 25–29	напівпрямий	3	
		напіврозлогий	5	
		розлогий	7	
		сланкий	9	
3.	Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок VG (A) 49–51	відсутнє або дуже слабке	1	
QN		слабке	3	
		помірне	5	
		сильне	7	
		дуже сильне	9	
4.	Кількість рослин із зігнутим пропорцевим листком VG (A) 47–51	відсутня або дуже мала	1	
QN		мала	3	
		середня	5	
		велика	7	
		дуже велика	9	

1	2	3	4	5
5. (*) (+) QN	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) VG (A), 50–52	дуже ранній	1	
		ранній	3	
		середній	5	
		пізній	7	
		дуже пізній	9	
6. (*) QN	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві VG (A) 60–65	відсутній або дуже слабкий	1	
		слабкий	3	
		помірний	5	
		сильний	7	
		дуже сильний	9	
7. (*) QN	Колос: восковий наліт VG (A) 60–69	відсутній або дуже слабкий	1	
		слабкий	3	
		помірний	5	
		сильний	7	
		дуже сильний	9	
8. (*) QN	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі VG (A) 60–69	відсутній або дуже слабкий	1	
		слабкий	3	
		помірний	5	
		сильний	7	
		дуже сильний	9	
9. (*) QN	Рослина: за висотою (стебло і колос)	дуже низька	1	
		низька	3	
		середня	5	

1	2	3	4	5
	MG (A) 75–92	висока	7	
		дуже висока	9	
10. (*) (+) QN	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом) VS (A), 80–92	слабко виповнена помірно виповнена виповнена	3 5 7	
11. (*) (+) PQ	Колос: форма (вигляд збоку) VS (A) 92	яйцеподібна піраміdalна напівбулавоподібна булавоподібна веретеноподібна	1 2 3 4 5	
12. (*) (+) QN	Колос: за щільністю VS або MS 80–92	дуже нещільний нешільний середній щільний дуже щільний	1 3 5 7 9	
13. QN	Колос: за довжиною (без остюків і зубців) MS (A), 80–92	дуже короткий короткий середній довгий дуже довгий	1 3 5 7 9	
14. (*) (+)	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	обоє відсутні наявні зубці наявні остюки	1 2 3	

1	2	3	4	5
QL	VG (A) 80–92			
15. (*) (+) QN	Колос: зубці/ остюки на верхівці за довжиною VG (A), 80–92	дуже короткі	1	
		короткі	3	
		середні	5	
		довгі	7	
		дуже довгі	9	
16. (*) PQ	Колос: забарвлення VG (A) 90–92	біле або солом'яно- жовте	1	
		червоне	2	
		сіро-димчасте	3	
		чорне	4	
17. (+) QN	Соломина: опущення опуклої поверхні верхнього вузла VS (A) 80–92	відсутнє або дуже слабке	1	
		слабке	3	
		помірне	5	
		сильне	7	
		дуже сильне	9	
18. (+) QN	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса) VS (A), 80–92	відсутнє або дуже вузьке	1	
		вузьке	3	
		середнє	5	
		широке	7	
		дуже широке	9	
(+) PQ	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
		округле	2	
		пряме	3	

1	2	3	4	5
	VS (A) 80–92	піднесене піднесене з наявністю другої вершини	4 5	
20. (+) QN	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий короткий середній	1 3 5	
	VS (A) 80–92	довгий дуже довгий	7 9	
21. (+) PQ	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий ледь зігнутий середньо зігнутий	1 3 5	
	VS (A) 80–92	сильно зігнутий дуже сильно зігнутий	7 9	
22. (+) QN	Нижня колоскова луска: опущення внутрішньої поверхні	слабке помірне сильне	3 5 7	
	VS (A) 80–92			
23. (+) PQ	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	прямий ледь зігнутий середньо зігнутий	1 2 3	
	VS (A) 80–92	дуже зігнутий з дуже значним перегином	4 5	


1	2	3	4	5
24. (*) (+) PQ	Зернівка: забарвлення VG (A) 92	біле	1	
		червоне	2	
		коричневе	3	
		сизе	4	
		інше	5	
25. (+) QN L VS 92	Зернівка: забарвлення у фенолі помірне темне дуже темне	відсутнє або дуже світле	1	
		світле	3	
		помірне	5	
		темне	7	
		дуже темне	9	
26 (*) (+) PQ	Тип розвитку VG (Г)	озимий	1	
		дворучка (альтернативний)	2	
		ярий	3	
27. (+) QL листоцвіті пластинки VS (A), 60-65	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки VS (A), 60-65	відсутній або дуже слабкий	1	
		слабкий	3	
		помірний	5	
		сильний	7	
		дуже сильний	9	
28. QL	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні VS (A), 69-92	відсутнє	1	
		наявне	9	

8. Пояснення до Таблиці ознак сортів пшениці щільноколосої

До 1. Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення

Метод визначення антоціанового забарвлення (лабораторія або теплиця): 20 насінин для визначення відмінності є 100 – для визначення однорідності кладуть у чашки Петрі на вологий фільтрувальний папір, закривають і пророщують у темряві.

Коли довжина колеоптиля досягне 1 см, чашки з насінням виставляють на постійне штучне освітлення (12000–15000 Lux) упродовж 3–4 діб, за температури +15...+20 °C. Оцінюють у стадії 09–11 паралельно з контрольним сортом.



До 2. Рослина: габітус (форма куща)

1 прямий

3 напівпрямий

5 напіврозлогий

7 розлогий

9 сланкий

Габітус визначають візуально за кутом розміщення листків і пагонів за відношенням до уявної вертикальної осі.



3



5



7



9

До 4. Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком

- 1 – прапорцеві листки прямі в усіх рослин;
- 3 – приблизно 1/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 5 – приблизно 1/2 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 7 – приблизно 3/4 рослин мають зігнутий прапорцевий листок;
- 9 – усі прапорцеві листки зігнуті.



1



3



5



7






9

До 5. Час початку колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів)

Варто враховувати, що в окремих зразків пшениці щільноколосої на момент початку колосіння прaporцевий листок перебуває в вертикальному положенні, а колос з'являється під кутом, що знижує його видимість.

До 10. Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)



3

слабко виповнена



5


помірно виповнена




7


виповнена

До 11. Колос: форма







До 12. Колос: за щільністю



До 14. Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок

Примітка: *Світлини належать Любичу В. В., Тимошенко О. В., 2016 р.



1*

обоє відсутні



2*

наявні зубці



3*

наявні остюки

До 15. Колос: зубці/ остюки на верхівці за довжиною

Спостереження здійснюють на верхівці колоса на сортах з відсутніми зубцями та остюками.



1

дуже короткі



3

короткі



5

середні



7


довгі



9

дуже довгі

До 17. Соломина: опущення опуклої поверхні верхнього вузла



1

відсутнє або дуже
слабке

3

слабке

5

помірне

7


сильне

9

дуже сильне

слабке

До 18. Нижня колоскова луска. Плече: за ширину (колосок у середині колоса)



1

відсутнє або
дуже вузьке

3

вузьке

5

середнє

7

широке

9

дуже широке

До 19. Нижня колоскова луска. Плече: за формою



1

скошене

2

округле

3

пряме


4

піднесене


5

піднесене з
наявністю другої
вершини


До 20. Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною




До 21. Нижня колоскова луска. Зубець: за формою



До 22. Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні



До 23. Нижня квіткова луска. Зубець: за формою



1	2	3	4	5
прямий	ледь зігнутий	середньо зігнутий	сильно зігнутий	з дуже значним перегином

До 24. Зернівка: забарвлення

Забарвлення зернівки визначають на сухих насінинах. Для більш чіткого визначення ознаки можливо визначати за допомогою розчину NaOH (насіння занурюють на 10 хвилин при 60 °C або на 60 хвилин при кімнатній температурі в 5M розчині NaOH).



1	2	3	4
біле	червоне	коричневе	сизе

До 25. Зернівка: забарвлення в фенолі

Для дослідження потрібно 20 насінин для визначення відмінності й 100 насінин для визначення однорідності.

- Обладнання: чашки Петрі (діаметр 9 см).
- Підготовка насіння: замочити на 16–20 год. у воді, воду злити, насіння підсушити, помістити в чашки борозенкою донизу, закрити чашки кришкою.
- Концентрація розчину: 1 %-ий розчин фенолу (свіжоприготований).
- Кількість розчину: насіння має зануритись у розчин на 3/4.
- Місце дослідження: лабораторія.
- Освітлення: денне світло без прямих сонячних променів.
- Температура: +18...+20 °C.
- Час досліджень: через 4 год. після занурення в розчин.
- Визначення ступеня забарвлення: дивіться ознаку 25.
- Примітка: визначення ступеню забарвлення фенолом варто проводити їй для стандарту.

До 26. Тип розвитку

Оцінюють на одній чи кількох висіяних навесні ділянках. До експертизи обов'язково залишають сорти-еталони. Коли найпізніший ярий сорт-еталон досягне повного розвитку (фаза 91/92), оцінюють фазу розвитку сорту-кандидата. Ступені виявлення ознаки: озимий тип – повністю досягнув фази 45, дворучка – рослини, як правило, пройшли фазу 75 і перебувають загалом у фазі 90, ярий тип – рослини пройшли фазу 90.

До 27. Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки

Спостереження проводять на нижній поверхні листкової пластинки.

9. Додаткова інформація

1) Типи ділянок для пшениці щільноколосої

Тип ділянки	Назва ділянки	Вид експертизи	Примітки
A	рядкова	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявителя відповідно до року врожаю
A ₁	рядкова	стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням заявителя первого року врожаю
Б	пунктирна	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявителя відповідного року врожаю
В	колосова 1 (волотева 1)	однорідність стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів (волотей), надісланих заявителем
Г	колосова 2	відмінність однорідність стабільність	для ботанічних таксонів групи зернових озимого типу розвитку весняної сівби, експертизи на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявителем
Д	колосова 3 (волотева 3) (спеціальна)	однорідність	висівають на другий рік експертизи насіння з колосів (волотей), які відбирають з усіх нетипових рослин.
E _к	колосова 4 (волотева 4) (спеціальна)	однорідність (контроль)	Для встановлення причин неоднорідності висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту

2) Необхідна кількість рослин пшениці щільноколосої для експертизи на ВОС

Тип ділянки	Схема розміщення рослин		Кількість рослин, шт.			
	ширина міжряддя, см	відстань між рослинами в рядку, см	на ділянці, шт.	для обліку на:		
				відмінність	однорідність	стабільність
Перший рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2 500	2 000*	2 000*	—
Б	15–20	10,0	240	20	100	—
Другий рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2 500	2 000*	2 000*	2 000*
A ₁	15–20	≈2,0	2 500	—	—	1 000
Б	15–20	10,0	240	20	100	100
В	15–20	10,0	2 000	—	2 000	20
Г	15–20	10,0	1 000	20	1 000	1 000
Д	15–20	10,0	x	y	y	y
E _к **	15–20	10,0	x	y	y	y

* За візуальної одноразової оцінки групи рослин;

** Параметри ділянки E_к повністю відповідають параметрам ділянки Д;

х, у – значення цих показників перемінне та залежить від кількості нетипових рослин;

А – у двох повтореннях;

A₁, Б, В, Д, Г, E_к – в одному повторенні.

3) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВІДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52*)

Двозначний код	Загальний опис	Шкала Фіке	Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса та рису
1	2	3	4
	Проростання		
00	Сухе насіння		
01	Початок набрякання		
02			
03	Повне набрякання		
04			
05	Поява зародкового корінця		
06			
07	Поява колеоптиля		
08			
09	На верхівці колеоптиля помітний листок		
	Ріст паростка		
10	Поява першого листка з колеоптиля	}	Другий листок (< 1 см)
11	Перший листок розгорнувся		

1	2	3	4
12	2 листки розгорнулись		
13	3 листки розгорнулись		
14	4 листки розгорнулись		
15	5 листків розгорнулись		
16	6 листків розгорнулись		
17	7 листків розгорнулись		
18	8 листків розгорнулись		
19	Розгорнулись 9 або більше листків		
	Кущіння		
20	Розвивається лише головний пагін		
21	Головний пагін та один бічний		
22	Головний пагін та два бічних		
23	Головний пагін та три бічних		
24	Головний пагін та чотири бічних		
25	Головний пагін та п'ять бічних		
26	Головний пагін та шість бічних		
			Цей розділ може бути використа- ний для доповнення спостере- жень інших розділів таблиці
27	Головний пагін та сім бічних		«Паралельні коди»
28	Головний пагін та вісім бічних		
29	Головний пагін та дев'ять або більше бічних		
	Видовження стебла		
30	Піднімається несправжнє стебло (починається розтягнення)	4–5	У рисі: фаза вегетатив- ної затримки

1	2	3	4
31	1-й вузол	6	Етапи закладання вузла
32	2-й вузол	7	Вузли вище основи стебла
33	3-й вузол		
34	4-й вузол		
35	5-й вузол		
36	6-й вузол		
37	Наявність прапорцевого листка	8	
38			
39	Язичок прапорцевого листка помітний	9	Стадія перед колосінням У рису: стадія, коли вушка останнього та передос- тannього листків розташовані одне навпроти одного
	Набрякання колоса		
40			Невелике збільшення суцвіття, стадія раннього набухання колоса

1	2	3	4
41	Піхва прaporцевого листка довшає		
42			
43	Помітне набрякання піхви листка		
44			
45	Набрякання піхви листка		
46			
47	Відкрито піхву прaporцевого листка		
48			
49	Перший остюк помітний		
	Колосіння		викидання волоті
50	Перший колосок суцвіття помітний	N	
51	{	S	
52	З'явилось 1/4 суцвіть	N 10,2	N -
53	{	S	несинхронні види
54	З'явилось 1/2 суцвіть	N 10,3	S - синхронні види
55	{	S	
56	З'явилось 3/4 суцвіть	N 10,4	
57	{	S	
58	Ріст суцвіть закінчений	N 10,5	
59	{	S	

1	2	3	4
	Цвітіння		Для ячменю встановити нелегко
60 61 62	Початок цвітіння }	N 10,51 S	Для рису: як правило, після цього відразу виявляється волоть
63			
64 65	Середина цвітіння }	N 10,52 S	
66			
67			
68 69	Кінець цвітіння }	N 10,53 S	
	Фаза молочної стиглості		
70			
71	Зернівка водостигла	10,54	
72	Зернівка втрачає зелений колір		
73 74 75 76 77 78 79	Рання молочна стиглість Поява клітинної будови ендосперму Середина молочної стиглості Пізня молочна стиглість Завершення формування ендосперму	11,1	

1	2	3	4
	Фаза воскової стиглості		
80			
81			
82			
83	Рання воскова стиглість		Можливо
84			розрізання
85	М'яка воскова стиглість		зернівки
86			нігтем, але
87	Тверда воскова стиглість		не відбиток
			Розрізання
			зернівки
			нігтем
			неможливе,
			але
			можливий
			відбиток;
			у суцвіттях
			зменшується
			вміст
			хлорофілу
88			
89			
	Достигання		
90			

1	2	3	4
91	Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3))	11,3	Для рису: досягають колоски на верхівці
92	Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4))	11,4	Для рису: 50 % колосків досягло
93	Зернівка вдень відокремлюється (5)		Для рису: досягає 90 % колосків
94	Перестиглість, соломина відмирає		
95	Насіння в стадії спокою		Можлива втрата насіння внаслідок обсипання
96	Насіння життездатне (50 % схожість)		
97	Насіння пробуджене		
98	Настає вторинний спокій		
99	Вторинний спокій закінчується		

10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.) (TG /3/11+Corr UPOV) // Geneva. 1994-10-04 + 1996-10-18. – 21 P. // URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf
2. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Wheat (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.) (TG /3/12 UPOV) // Geneva. 2017-04-05. – 39 P. // URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg003.pdf
3. Шелепов В. В. Пшеница: история, морфология, биология, селекция/ В. В. Шелепов, В. С. Кочмарский. – Мироновка: ЗАТ Мироновская типография, 2009. – С. 135 – 146.
4. Watson L., Dallwitz MJ *Triticum* L. – delta intkey.com/grass/www/triticum.htm (Англ.). The grass genera of the world: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval; including synonyms, morphology, anatomy, physiology, phytochemistry, cytology, classification, pathogens, world and local distribution, and references. Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (23 April 2010).

11. Технічна анкета

Номер заявки

(не заповнюється заявником)

Annex to Application

(not to be filled in by the applicant)

ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY

Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заяви, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.

Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.

In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.

1. Предмет Технічної анкети

1. Subject of the Technical Questionnaire

1.1. Ботанічний таксон

(вид)

(латинською мовою)

1.1 Botanical name species
(in Latin Language)

Triticum compactum Host

1.2. Ботанічний таксон

(вид)

(українською мовою)

1.2 Botanical name species
(in Ukrainian Language)

Пшениця щільноколоса

2. Заявник(и)

2. Applicant(s)

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

Name (denomination)

Автор(и)

Autor(s) _____

3. Назва сорту

3. Variety denomination

4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту

4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety

4.1. Схема селекції

4.1. Breeding scheme

Сорт, одержаний в результаті:

Variety resulting from:

4.1.1. схрещування

crossing

а) контролюване схрещування.....

a) controlled cross

(точно вказати батьківські сорти)
(please state parent varieties)

б) частково відоме схрещування.....

b) partially known cross

(вказати відомий батьківський
сорт(и))
(please state known parent variety(ies))

в) невідоме схрещування

v) unknown cross

4.1.2. мутація

mutation

(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)

4.1.3. виявлення та поліпшення

discovery and development

(точно визначити, де і коли
виявлено та як поліпшено)

(please state where and when discovered
and how developed)

4.1.4. інше

other

(надати деталі)

(please provide details)

4.2. Метод розмноження сорту:

method of propagating the variety

4.2.1. сорти, що розмножуються насінням

seed-propagated varieties

а) самозапилення

a) self-pollination

б) перехресне запилення

b) cross-pollination

популяція

population

синтетичний сорт

synthetic variety

в) гібрид

c) hybrid

Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида:

In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.

Простий гібрид $\text{♀} \times \text{♂}$ Трьохлінійний гібрид $\text{♀} \times \text{♂} \rightarrow (\text{♀} \times \text{♂}) \times \text{♂}$ і має визначати, зокрема:

Single Hybrid Three-Way Hybrid

and should identify in particular:

а) будь-які чоловічі стерильні лінії

a) any male sterile lines

б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній

b) maintenance system of male sterile lines.

г) інші

d) other

(надати детальну інформацію)

(please provide details)

4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно:

vegetative propagation

а) живці

a) cuttings

б) розмноження *in vitro*

b) *in vitro* propagation

в) інші (установлений метод)

c) other (state method)

4.2.3. інші

other

(надати детальну інформацію)

(please provide details)

5. Ознаки сорту Variety characteristics				
Назва ознаки Variety denomination		Ступінь проявлення Manifestation	Сорт-еталон Example variety	Код Code
1	2	3	4	5
5.1. (10)	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і найближчим вузлом) Straw: pith in cross section (halfway between base of ear and stem node below)	слабко виповнена thin		3 <input type="checkbox"/>
		помірно виповнена medium		5 <input type="checkbox"/>
		виповнена thick		7 <input type="checkbox"/>
5.2. (14)	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок Awns or scurs: presence	обоє відсутні both absent		1 <input type="checkbox"/>
		наявні зубці scurs present		2 <input type="checkbox"/>
		наявні остюки awns present		3 <input type="checkbox"/>
5.3. (16)	Колос: забарвлення Ear: color	біле або солом'яно- жовте white or straw yellow		1 <input type="checkbox"/>
		червоне red		2 <input type="checkbox"/>
		сіро-димчасте gray and smoky		3 <input type="checkbox"/>
		чорне black		4 <input type="checkbox"/>
5.4. (26)	Тип розвитку Seasonal type	озимий winter type		1 <input type="checkbox"/>
		дворучка (альтернативний) alternative type		2 <input type="checkbox"/>
		ярий spring type		3 <input type="checkbox"/>
5.5. (28)	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні Lower glume: hairiness on external surface	відсутнє absent		1 <input type="checkbox"/>
		наявне present		9 <input type="checkbox"/>

6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявки відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

Назва(и) сорту(ів) подібного(их) до сорту- кандидата Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety	Ознака(и), за якою (якими) сорт-кандидат відрізняється від подібних сортів Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(у) Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) сорту- кандидата Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety
_____	_____	_____	_____

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Коментарі Comments	_____		
7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту Additional information which may help in the examination of the variety			
7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?			
In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?			
Так <input type="checkbox"/>	Hi <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Yes (якщо так, описати ці ознаки) (if yes, please provide details)	_____		
7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи? Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?			
Так <input type="checkbox"/>	Hi <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Yes (якщо так, описати ці умови) (if yes, please provide details)	_____		
7.3. Інша інформація (широке використання) Other information Main use			

(надати детальну інформацію) (please provide details)			
8. Дозвіл на використання Authorization for release			
a) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?			
a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?			
Так <input type="checkbox"/>	Hi <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Yes			
б) чи було одержано такий дозвіл?			
b) Has such authorization been obtained?			
Так <input type="checkbox"/>	Hi <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Yes			
Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization			
9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту Information on use of GMOs for creating a variety			
a) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?			
a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?			
Так <input type="checkbox"/>	Hi <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Yes			
б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?			
b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?			
Так <input type="checkbox"/>	Hi <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Yes			
Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику. If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization			

10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертизу

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Tak

Hi

Yes

No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявики не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Комpetентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| a) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма)..... | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| b) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди)..... | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| v) культури тканини..... | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| c) Tissue culture | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| g) інших факторів..... | Tak <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| g) Other factors | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано “так”
Please provide details for where you have indicated “yes”

10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявики, призначений для експертизи, перевіреним на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Tak

Yes

(просимо надати деталі)
(please provide details as specified
by the Authority)

Hi

No

Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

Ініціали та прізвище уповноваженої особи
Applicant's name

Підпись
Signature

Дата
Date

_____ - _____ - _____

**Методика
проведення експертизи сортів тритикале (*Triticosecale* Witt.)
на відмінність, однорідність і стабільність групи зернових на відмінність,
однорідність і стабільність**

Загальні рекомендації

1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів тритикале *Triticosecale* Witt.

2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси

1) Компетентний орган визначає скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння для одного закладу експертизи має становити 3 кг для сортів та гібридів та 0,3 кг ліній. Для гібридів додатково надають 0,3 кг кожного батьківського компонента. Крім того, на другий рік експертизи заявник надсилає (за необхідності) 150 колосів.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

4) Рослинний матеріал нічим не обробляють.

3. Метод експертизи

1) *Тривалість експертизи.* Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій.

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом з гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібрида – дві вихідні лінії, трилінійного гібрида –

Використано документ UPOV TG /121/3, 1989, TG /121/4/2020. Сорти-еталони тритикале виділені: Гринів С.М. к. с.-г. н., Камінська Л.В., УІЕСР, Власюк А.В., Житомирський ОДЦЕСР, 2014. Зміни й доповнення внесені : Костенко Н. П., канд. с.-г. наук, Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб., Ткачик С. О., канд. с.-г. наук, УІЕСР, 2021.

простий гібрид та три лінії, подвійного гібрида – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію (успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис) – польові дослідження вище зазначененої лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявника, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах досліджень (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст і розвиток рослин, і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожній експертизі загалом підлягає 2 000 рослин, що розподіляються на два чи більше повторень.

На колосових ділянках обліковують щонайменше 100 окремих колосових рядків.

Для визначення типу розвитку використовують не менше ніж 300 рослин на колосовій ділянці (Γ).

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

Типи ділянок

Тип ділянки	Назва ділянки	Вид експертизи	Примітка
A	рядкова	відмінність однорідність	висівають першого та другого років експертизи насінням заявника відповідно до року врожаю
A ₁	рядкова	стабільність	висівають на другий рік експертизи насінням заявника первого року врожаю
B	колосова 1	однорідність стабільність	засівають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів, надісланих заявником
Г	колосова 2	відмінність однорідність стабільність	для трикале озимого весняної сівби, експертиза на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявником

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ). Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG: разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS: вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG: візуальна разова оцінка групи рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин;

L – лабораторні дослідження.

б) *Кількість рослин / частин рослин.* Експертизі підлягає щонайменше 2000 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG: разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин (наприклад, висота);

MS: вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG: візуальна разова оцінка 2 000 рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

4. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

1) *Експертиза на відмінність*

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко виріznити сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

Оцінка відмінності гібридів, попередня експертиза на основі батьківських ліній і за формулою може бути здійснена відповідно до наступних рекомендацій:

(а) опис батьківських ліній відповідно до Методики;

(b) перевірка оригінальності (відмінності) батьківських ліній у порівнянні з довідково-інформаційним фондом, на основі ознак з Розділу 7 Методики для перевірки найближчих інbredних ліній;

(c) перевірка оригінальності (відмінності) формули гібрида в порівнянні з загальновідомими гібридами з урахуванням найближчих інbredних ліній;

(d) оцінка відмінності на рівні гібриду з близькою формулою.

2) Експертиза на однорідність

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності сортів і інbredних ліній приймається популяційний стандарт 0,6 %, за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається 18 нетипових.

Для оцінки однорідності колосових рядків приймається популяційний стандарт 6% за рівня ймовірності 95%. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 10 нетипових. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо в рядку є одна нетипова рослина.

Однорідність рослин, розміщених на рядковій ділянці А оцінюють у два стапи. *Не застосовується до ознак 2 (Колеоптиль: антоцианове забарвлення) та 25 (Зернівка: забарвлення у фенолі).*

Спершу обстежують 20 рослин або частини 20 рослин. За відсутності нетипових рослин сорт вважають однорідним. Якщо виявлено понад шість нетипових рослин, сорт вважають неоднорідним.

Якщо виявлено від 1 до 6 нетипових рослин, проводять додаткове обстеження 80 рослин або частини 80 рослин.

У випадку оцінювання однорідності рослин на рядковій ділянці В розмір вибірки може бути зменшений до 200 рослин.

Для оцінки однорідності гібридів приймається популяційний стандарт 10 % за рівня ймовірності 95 %. Для оцінки однорідності гібридів у вибірці з 200

рослин допускається 27 нетипових. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 15 нетипових.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

3) Експертиза на стабільність

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

У разі виникнення сумніву можуть бути проведені додаткові дослідження з експертизи на стабільність.

За необхідності або у випадку сумніву стабільності гібрида, проводять додаткові дослідження з визначення однорідності й стабільності його батьківських компонентів.

5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти групують за найвідмінішими морфологічними ознаками для кожного сорту, використовуючи ознаки, які, як відомо з практики, не варіюють або дуже слабко варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин) (ознака 6);
- стебло: опущення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю (ознака 13);
- нижня колоскова луска – опущення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса) (ознака 19);
- зернівка: забарвлення у фенолі (ознака 25);
- тип розвитку (ознака 26).

1) Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

6. Умовні позначення

(*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залишаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливлюють;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

7. Таблиця ознак сортів тритикале

Назва ознаки		Ступінь виявлення ознаки	Код	Сорт-еталон	
				озимий	ярий
1.	2	3	4	5	6
1. (*) QN	Рослина: плоїдність L VS, 05–07	тетраплоїд	4		
		гексаплоїд	6		
		октоплоїд	8		
2. (+) QN	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення L VG 09–11	відсутня або дуже слабка	1	Візерунок	Ландар
		слабка	3	Амур	Оберіг харківський
		помірна	5	Ратне	Коровай харківський
		сильна	7		Соловей харківський
		дуже сильна	9		
3. (*) (+) QN	Рослина: габітус VG (A) 25–29	прямий	1	Візерунок	
		напівпрямий	3	Амур	Всеволод
		напіврозлогий	5	Раритет	
		розлогий	7	Аякс	
		сланкий	9		
4. (+) QN	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками VG (A)	відсутня або дуже мала	1		
		мала	3	Аякс	Хлібодар харківський
		середня	5	Амур	Харків ABIAC
		велика	7	Візерунок	Всеволод

1	2	3	4	5	6
	47–51	дуже велика	9		Сонцедар харківський
5. QN	Пропорцевий листок: інтенсивність антоцианового забарвлення вушок VG (A) 47–55	відсутня або дуже слабка	1	Візерунок	Сонцедар харківський
		слабка	3	Раритет	Лебідь харківський
		помірна	5	Амос	Легінь харківський
		сильна	7	Шаланда	
		дуже сильна	9		
6. (*) QN	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин) MG/VG (A) 50–52	дуже ранній	1		
		ранній	3		Коровай харківський
		середній	5	Ратне	Соловей харківський
		пізній	7	Аякс	
		дуже пізній	9		
7. QN	Пропорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві VG (A), 55–65	відсутня або дуже слабка	1		Коровай харківський
		слабка	3	Амос	
		помірна	5	Аякс	Харків АВІАС
		сильна	7	Раритет	Ландар
		дуже сильна	9	Ратне	
8. QN	Остюки: інтенсивність	відсутня або дуже слабка	1	Шаланда, Візерунок	Лебідь харківський

1	2	3	4	5	6
	антоціанового забарвлення VG (B) 60–69	слабка	3	Амур	Оберіг харківський
		помірна	5	Полянське	Всеволод
		сильна	7		
		дуже сильна	9		
9. QL	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення VG (A) 60–65	відсутня або дуже слабка	1	Візерунок	Коровай харківський
		слабка	3	Аякс	Легінь харківський
		помірна	5	Ратне	Соловей харківський
		сильна	7		
		дуже сильна	9		
10. QN	Пропорцевий листок: листкова пластиинка за довжиною MS (B) 60–69	дуже коротка	1	Візерунок	
		коротка	3	Аякс	Сонцедар харківський
		середня	5	Раритет	Всеволод
		довга	7	Ладне	Ландар
		дуже довга	9	Ратне	
11. QN	Пропорцевий листок: листкова пластиинка за ширину MS (B) 60–69	дуже вузька	1		
		вузька	3	Амур	Соловей харківський
		середня	5	Раритет	Хлібодар харківський
		широка	7		
		дуже широка	9		

1	2	3	4	5	6
12. QN	Колос: інтенсивність воскового нальоту VG (A) 60–69	відсутня або дуже слабка	1		
		слабка	3		Харків ABIAC
		помірна	5	Vізерунок	Коровай харківський
			7	Амур	
		дуже сильна	9		
13. (*) (+) QN	Стебло: опущення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю VG (A) 60–69	відсутнє або дуже нещільне	1	Vізерунок	
		нешільне	3	Інтерес	
		помірно щільне	5	Полянське	Оберіг харківський
			7	Шаланда	
		дуже сильно щільне	9	Амос	Хлібодар харківський
14. (*) (+) QN	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями) MG (A), 75–92	дуже коротка	1	Шаланда	Ландар
		коротка	3	Раритет	Всеволод
		середня	5	Ратне	Коровай харківський
		довга	7		
		дуже довга	9		
15. (*) (+) QN	Колос: розміщення остюків VS (A) 80–92	на верхівці	1		
		у верхній половині	2	Шаланда, Амос	
		за всією довжиною	3	Vізерунок	Ландар

1	2	3	4	5	6
16. (*) QN	Остюки: за довжиною відносно колоса VS (A) 80–92	дуже короткі	1		
		короткі	3	Інтерес	Сонцедар харківський
		середні	5	Раритет	Всеволод
		довгі	7	Амур	
		дуже довгі	9		
17. (*) (+) QN	Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса) VG (B) (a), 80–92	дуже короткий	1		
		короткий	3	Раритет	Оберіг харківський
		середній	5	Інтерес	Лебідь харківський
		довгий	7	Візерунок	Всеволод
		дуже довгий	9		Харків АВІАС
18. (+) QN	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса) VG (B) (a), 80–92	відсутній або дуже малий	1	Ратне	Лебідь харківський
		малий	3	Раритет	Сонцедар харківський
		середній	5	Інтерес	Ландар
		великий	7		
		дуже великий	9		
19. (*) QN	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні (на колосках із	відсутнє	1	Візерунок	Харків АВІАС
		наявне	9	Раритет	Всеволод

1	2	3	4	5	6
	середньої третини колоса)VG (B) (a) 80–92				
20. (+) QN	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса й верхнім вузлом) VG (B), 90–92	порожниста	3	Раритет	Всеволод
		середньо виповнена	5	Амур	Оберіг харківський
		виповнена	7		
21. PQ	Колос: забарвлення VG (A) 90–92	біле	1	Полянське	Оберіг харківський
		сіро-димчасте	2	Аякс	Ландар
		червоне	3	Шаланда	
		чорне	4		
22. QN	Колос: за щільністю MS/VG (A) 80–92	нешільний	3	Шаланда	Лебідь харківський
		помірно щільний	5	Амур	Сонцедар харківський
		щільний	7	Раритет	
23. QN	Колос: за довжиною (без остюків і зубців) MS/VG (A), 80–92	короткий	3		
		середній	5	Ратне	Соловей харківський
		довгий	7	Раритет	Ландар

1	2	3	4	5	6
24.	QN шириною (вигляд збоку) VS (A) 92	вузький	3	Інтерес	Легінь харківський
		середній	5	Раритет	Коровай харківський
		широкий	7	Ратне	
25.	(*) (+) QN забарвлення у фенолі VG (B) L 00	відсутнє або дуже світле	1		Соловей харківський
		світле	3	Аякс	Коровай харківський
		помірне	5	Візерунок	
		темне	7	Раритет	Ландар
		дуже темне	9		
26.	(*) (+) PQ типу розвитку VG (Г)	озимий	1	Раритет, Інтерес	
		дворучка (альтернатив- ний)	2		
		ярий	3		Легінь харківський, Ландар
27.	(*) QN формою VS (A) 92	піраміdalний	1	Аякс	Соловей харківський
		циліндричний	2	Ратне	
		напівбулавоподібний	3		

1	2	3	4	5	6
		булаво-подібний	4		
		веретеноподібний	5		
28. QL	Колос: остюки VG (A) 90–92	відсутні	1		
		наявні	9	Раритет, Інтерес	Легінь харківський, Ландар
29. QN	Вісь колоса: за міцністю VS (A), 90–92	ламка	1		
		гнучка	9	Раритет, Інтерес	Легінь харківський, Ландар
30. QN	Колосок: кількість квіток MS (A) 64–65	мала	3	СВ Талентро	Лебідь харківський
		середня	5	Раритет, Інтерес	Сонцедар харківський
		велика	7	Харроза	
31. QL	Колосок: плідність квіток VS (A) 52–57	плідні	1	Аякс, СВ Талентро	Легінь харківський, Ландар
		стерильні	9		
32. PQ	Зернівка: за формою VS (A) 92	округла	1	Візерунок	
		яйцеподібна	3	Харроза	
		видовжена	5	Гарне	Всеволод, Ландар
		дуже видовжена	7		

1	2	3	4	5	6
		горбата	9		
33. PQ VS (A) 92	Зернівка: забарвлення	жовто-біле	1	Раритет	
		світло-коричневе	3	СВ Талентро	Харків АВІАС
		коричневе	5		Всеволод
		темно-коричневе	7		
		зелене	9		
34. QL VS (A) 92	Зернівка: за характером поверхні	сильно деформована	1		
		деформована	3	Ладне	
		зморшкувата	5	Візерунок	Всеволод
		слабко зморшкувата	7	Амос, Шаланда	Лебідь харківський
		гладенька	9		
35. QN VS (A) 92	Зернівка: за крупністю	дуже дрібна	1		
		дрібна	3		
		середня	5	Харроза	Лебідь харківський
		крупна	7	Амур	Оберіг харківський
		дуже крупна	9	Гарне	
36. QN VS (A)	Колос: положення в просторі	пряме	1		Лебідь харківський
		напівпряме	3	Візерунок	Коровай харківський

1	2	3	4	5	6
	90–92	горизонтальне	5	Гарне, Ратне	
		напівпоникле	7	Інтерес	Хлібодар харківський
		поникле	9	Раритет	Сонцедар харківський
37. QN	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки VG (A), 55–65	відсутня або дуже слабка	1		
		слабка	3		
		помірна	5		
		сильна	7		
		дуже сильна	9		
38. (*) (+) QN	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною MS/VG (A) 80–92	дуже короткі	1		
		короткі	3		
		середні	5		
		довгі	7		
		дуже довгі	9		

8. Пояснення до Таблиці ознак сортів тритикале

До 2. Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення


Метод для визначення антоціанового забарвлення

Кількість зерен для експертизи: 20 зерен для визначення відмітності, 100 зерен для визначення однорідності

Підготовка зерен:	зерна, що пройшли післязбиральне дозрівання, розміщують на вологому фільтрувальному папері в чашках Петрі для проростання
Місце:	лабораторія або вегетаційний будинок
Світло:	за досягнення довжини колеоптилів 1 см у темряві, їх ставлять під штучне освітлення, аналогічне денному (12000–15000 Lux) на 3–4 доби
Температура:	15...20°C
Час реєстрації даних:	колеоптилі повністю розвинені (блізько 1 тижня), на стадіях 09–11
Шкала реєстрації:	дивись оз. 2 у Таблиці ознак

До 3. Рослина: габітус


Оцінюють візуально, за кутом, утвореним зовнішніми листками та пагонами й уявною віссю.



До 4. Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками

- 1 – усі прапорцеві листки прямі;
- 5 – приблизно 1/4 рослин з похилими прапорцевими листками;
- 6 – приблизно 1/2 рослин з похилими прапорцевими листками;
- 7 – приблизно 3/4 рослин з похилими прапорцевими листками;
- 9 – усі прапорцеві листки похилі.

До 13. Стебло: опущення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю



1 відсутнє або
дуже нешільне
3 нешільне
5 помірно
щільне
7 сильно
щільне
9 дуже сильно
щільне

До 14. Рослина: за довжиною

Довжина рослини включає стебло, колос із остюками та зубцями.

До 15. Колос: розміщення остюків




1 на верхівці 2 у верхній половині 3 за всією довжиною

До 17. Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)




До 18. Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)




До 20. Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса й верхнім вузлом)

Виповнення соломини в поперечному перерізі слід обстежувати посередині між основою колоса та верхнім вузлом. Перевіряють усі стебла рослин та фіксують найвищий код прояву показника по сорту.




3

порожниста



5

середньо виповнена



7

виповнена

До 22. Колос: за щільністю

Щільність колоса визначають за співвідношенням кількості колосків до довжини колоса.

До 23. Колос: за довжиною (без остюків і зубців)

Довжину колоса вимірюють, виключаючи довжину остюків і зубців.

До 25. Зернівка: забарвлення у фенолі

Метод визначення забарвлення у фенолі. Для дослідження потрібно 20 насінин для визначення відмітності і 100 насінин для визначення однорідності. Насіння не обробляють хімічними препаратами.

Обладнання:

чашки Петрі (діаметр 9 см)

Підготовка насіння:

замочити на 16–20 год у воді, воду злити, насіння підсушити, помістити в чашки борозенкою донизу, закрити чашки кришкою

Концентрація розчину: 1%-ий розчин фенолу (свіжовиготовлений)

Кількість розчину: насіння має зануритись у розчин на $\frac{3}{4}$

Місце дослідження: лабораторія

Освітлення: денне світло без прямих сонячних променів

Температура: 18...20°C

Час досліджень: через 4 год після занурення в розчин

Визначення ступеня

забарвлення:

дивись оз. 25 у Таблиці ознак

Примітка: визначення ступеня забарвлення фенолом варто проводити і для стандарту.

До 26. Тип розвитку

Тип розвитку (необхідність у яровизації) слід оцінювати на ділянках, висіяних навесні. Для опису сортів–кандидатів до експертизи обов'язково залишають сорти-еталони. Коли найпізніший сорт-еталон ярого типу розвитку досягне повного розвитку (фаза, що відповідає десятковому коду 91-92 розвитку злакових видів за шкалою Zadoks), візуально оцінюють фазу росту і розвитку сортів-кандидатів, порівнюючи їх із сортом-еталоном.

Тип розвитку оцінюють наступним чином:

1 – озимий тип (сильна потреба в яровизації) – рослини повністю досягли фази 45 (набрякання піхви листка) за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів;

2 – дворучка або альтернативний тип (часткова потреба в яровизації) – рослини пройшли фазу 75 (молочної стигlosti зерна) і перебувають загалом у фазі 90 (достигання зернівки) за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів;

3 – ярий тип (відсутня або зовсім слабка потреба в яровизації) – рослини пройшли фазу 90 (достигання зернівки) за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів.

До 38. Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною

Спостереження здійснюють на верхівці колоса на сортах з відсутніми зубцями та остюками.



1

дуже короткі



3

короткі



5

середні



7

довгі



9

дуже довгі

9. Додаткова інформація

1) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВІДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52; Zadoks et al., 1974*)

Двозначний код	Загальний опис	Шкала Фіке	Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса, тритикале та рису
1	2	3	4
	Проростання		
00	Сухе насіння		
01	Початок набрякання		
02			
03	Повне набрякання		
04			
05	Поява зародкового корінця		
06			
07	Поява колеоптиля		
08			
09	На верхівці колеоптиля помітний листок		
	Ріст паростка		
10	Поява першого листка з колеоптиля	} 1	Другий листок (< 1 см)
11	Перший листок розгорнувся		

1	2	3	4
12	2 листки розгорнулись		
13	3 листки розгорнулись		
14	4 листки розгорнулись		
15	5 листків розгорнулись		
16	6 листків розгорнулись		
17	7 листків розгорнулись		
18	8 листків розгорнулись		
19	Розгорнулись 9 або більше листків		
	Кущіння		
20	Розвивається лише головний пагін		
21	Головний пагін та один бічний		
22	Головний пагін та два бічних		
23	Головний пагін та три бічних		
24	Головний пагін та чотири бічних		
25	Головний пагін та п'ять бічних		
26	Головний пагін та шість бічних		
27	Головний пагін та сім бічних		«Паралельні коди»
28	Головний пагін та вісім бічних		
29	Головний пагін та дев'ять або більше бічних		
	Видовження стебла		
30	Піднімається несправжнє стебло (починається розтягнення)	4–5	У рису: фаза вегетативної затримки
31	1-й вузол		
32	2-й вузол	6	Етапи закладання вузла
		7	

1	2	3	4
33	3-й вузол		Вузли вище основи стебла
34	4-й вузол		
35	5-й вузол		
36	6-й вузол		
37	Наявність прапорцевого листка	8	
38			
39	Язичок прапорцевого листка помітний	9	Стадія перед колосінням У рису: стадія, коли вушка останнього та передостаннього листків розташовані одне навпроти одного
	Набрякання колоса		
40			Невелике збільшення суцвіття, стадія раннього набухання колоса
41	Піхва прапорцевого листка довшає		
42			
43	Помітне набрякання піхви листка	{ } 10	
44			
45	Набрякання піхви листка		

1	2	3	4
46			
47	Відкрито піхву пропорцевого листка	} 10,1	Тільки для остистих форм
48			
49	Перший остюк помітний		
	Колосіння		викидання волоті
50	Перший колосок суцвіття помітний	N	
51	{	S	
52	З'явилося 1/4 суцвіть	N 10,2	N -
53	{	S	несинхронні види
54	З'явилося 1/2 суцвіть	N 10,3	S - синхронні види
55	{	S	
56	З'явилося 3/4 суцвіть	N 10,4	
57	{	S	
58	Ріст суцвіть закінчений	N 10,5	
59	{	S	
	Цвітіння		Для ячменю встановити нелегко
60	Початок цвітіння	N 10,51	Для рису: як правило, після цього відразу
61		S	

1	2	3	4
62	{		ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ВОЛОТЬ
63			
64	Середина цвітіння	N 10,52	
65	{	S	
66			
67			
68	Кінець цвітіння	N 10,53	
69	{	S	
	Фаза молочної стиглості		
70			
71	Зернівка водостигла	10,54	
72	Зернівка втрачає зелений колір		
73	Рання молочна стиглість		
74	Поява клітинної будови ендосперму		
75	Середина молочної стиглості		
76			
77	Пізня молочна стиглість		
78	Завершення формування ендосперму		
79		11,1	
	Фаза воскової стиглості		
80			
81			

1	2	3	4
82			
83	Рання воскова стиглість		Можливо розрізання зернівки нігтем, але не відбиток
84			
85	М'яка воскова стиглість		
86			
87	Тверда воскова стиглість	11,2	Розрізання зернівки нігтем неможливе, але можливий відбиток; у суцвіттях зменшується вміст хлорофілу
88			
89			
	Достигання		
90			
91	Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3))	11,3	Для рису: досягають колоски на верхівці
92	Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4))	11,4	Для рису: 50 % колосків досягло
93	Зернівка вдень відокремлюється (5)		Для рису: досягає 90 % колосків
94	Перестиглість, соломина відмирає		

1	2	3	4
95	Насіння в стадії спокою		Можлива втрата насіння внаслідок обсипання
96	Насіння життєздатне (50 % схожість)		
97	Насіння пробуджене		
98	Настає вторинний спокій		
99	Вторинний спокій закінчується		

10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Triticale (\times *Triticosecale* Witt.) (TG /121/3 UPOV) // Geneva. 1989–10–06. – 33 P. // URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg121.pdf
2. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Triticale (\times *Triticosecale* Witt.) (TG /121/3 UPOV) // Geneva. 2020–05–20. – 29 P. // URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg121.pdf

11. Технічна анкета

Номер заявки

(не заповнюється заявником)

Annex to Application

(not to be filled in by the applicant)

ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY

Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявлання, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.

Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.

In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.

1. Предмет Технічної анкети

1. Subject of the Technical Questionnaire

1.1. Ботанічний таксон (вид)

(латинською мовою)

1.1 Botanical name species

(in Latin Language)

Triticosecale Witt.

1.2. Ботанічний таксон (вид)

(українською мовою)

1.2 Botanical name species

(in Ukrainian Language)

Тритикале

2. Заявник(и)

2. Applicant(s)

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

Name (denomination)

—

Автор(и)

Autor(s)

—

3. Назва сорту

3. Variety denomination

—

4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту

4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety

4.1. Схема селекції

4.1. Breeding scheme

Сорт, одержаний в результаті:

Variety resulting from:

4.1.1. схрещування

crossing

а) контролюване схрещування

a) controlled cross

(точно вказати батьківські сорти)

(please state parent varieties)

—

б) частково відоме схрещування

b) partially known cross

(вказати відомий батьківський сорт(и))

(please state known parent variety(ies))

—

в) невідоме схрещування.....	<input type="checkbox"/>
v) unknown cross	
4.1.2. мутація.....	<input type="checkbox"/>
mutation (визначити батьківський сорт) (please state parent variety)	<input type="text"/>
4.1.3. виявлення та поліпшення.....	<input type="checkbox"/>
discovery and development (точно визначити, де і коли виявлено та як поліпшено) (please state where and when discovered and how developed)	<input type="text"/>
4.1.4. інше.....	<input type="checkbox"/>
other (надати деталі) (please provide details)	<input type="text"/>
4.2. Метод розмноження сорту: method of propagating the variety	
4.2.1. сорти, що розмножуються насінням seed-propagated varieties	
a) самозапилення.....	<input type="checkbox"/>
a) self-pollination	
б) перехресне запилення	<input type="checkbox"/>
b) cross-pollination	
популяція.....	<input type="checkbox"/>
population	
синтетичний сорт.....	<input type="checkbox"/>
synthetic variety	
в) гібрид.....	<input type="checkbox"/>
c) hybrid	
Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида: In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.	
Простий гібрид $\text{♀} \times \text{♂}$	Трьохлінійний гібрид $\text{♀} \times \text{♂} \rightarrow (\text{♀} \times \text{♂}) \times \text{♂}$
Single Hybrid	Three-Way Hybrid
і має визначати, зокрема: and should identify in particular:	
а) будь-які чоловічі стерильні лінії	
a) any male sterile lines	
б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній	
b) maintenance system of male sterile lines.	
г) інші.....	<input type="checkbox"/>
d) other	
(надати детальну інформацію) (please provide details)	<input type="text"/>
4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно: vegetative propagation	
a) живці.....	<input type="checkbox"/>
a) cuttings	
б) розмноження <i>in vitro</i>	<input type="checkbox"/>
b) <i>in vitro</i> propagation	
в) інші (установлений метод).....	<input type="checkbox"/>
c) other (state method)	<input type="text"/>
4.2.3. інші.....	<input type="checkbox"/>
other (надати детальну інформацію) (please provide details)	<input type="text"/>

5. Ознаки сорту

Variety characteristics

Назва ознаки Variety denomination	Ступінь проявлення Manifestation	Сорт-еталон Example variety		Код Code
		озимий winter	ярий spring	
5.1 (6) Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин) Time of ear emergence (first spikelet visible on 50% of plants)	дуже ранній very early			1 <input type="checkbox"/>
	ранній early		Коровай харківський	3 <input type="checkbox"/>
	середній medium	Ратне	Соловей харківський	5 <input type="checkbox"/>
	пізній late	Аякс		7 <input type="checkbox"/>
	дуже пізній very late			9 <input type="checkbox"/>
5.2 (13) Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю Stem: density of hairiness of neck	відсутнє або дуже нещільне absent or very sparse	Візерунок		1 <input type="checkbox"/>
	нешільше sparse	Інтерес		3 <input type="checkbox"/>
	помірно щільне medium dense	Полянське	Оберіг харківський	5 <input type="checkbox"/>
	сильно щільне strong dense	Шаланда	Хлібодар харківський	7 <input type="checkbox"/>
	дуже сильно щільне very strong dense	Амос	Ландар	9 <input type="checkbox"/>
5.3 (19) Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса) Lower glume: hairiness on external surface (spikelet in mid-third of ear)	відсутнє absent	Візерунок	Харків АВІАС	1 <input type="checkbox"/>
	наявне present	Раритет	Всеволод	9 <input type="checkbox"/>
5.4 (25) Зернівка: забарвлення у фенолі Grain: coloration with phenol	відсутнє або дуже світле absent or very light		Соловей харківський	1 <input type="checkbox"/>
	світле light	Аякс	Коровай харківський	3 <input type="checkbox"/>
	помірне medium	Візерунок		5 <input type="checkbox"/>
	темне dark	Раритет	Ландар	7 <input type="checkbox"/>
	дуже темне very dark			9 <input type="checkbox"/>

5.5 (26)	Тип розвитку Seasonal type	озимий winter type	Раритет, Інтерес		1 <input type="checkbox"/>
		дворучка (альтернативний) alternative type			2 <input type="checkbox"/>
		ярий spring type		Легінь харківський, Ландар	3 <input type="checkbox"/>

6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявління відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

Назва(и) сорту(ів) подібного(их) до сорту-кандидата Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety	Ознака(и), за якою (якими) сорт-кандидат відрізняється від подібних сортів Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(y) Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) сорту-кандидата Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Коментарі
Comments

7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізняти сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці ознаки)
(if yes, please provide details)

7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці умови)
(if yes, please provide details)

7.3. Інша інформація (широке використання)

Other information

Main use

(надати детальну інформацію)
(please provide details)

8. Дозвіл на використання

Autorization for release

а) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?

a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?

Так Hi
Yes No

б) чи було одержано такий дозвіл?

b) Has such authorization been obtained?
Так Hi
Yes No

Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту

Information on use of GMOs for creating a variety

а) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?

a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?

Так Hi
Yes No

б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?

b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?

Так Hi
Yes No

Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику.

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертізу

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо.

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так Hi
Yes No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заяви не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Комpetентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

а) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма)..... Так Hi
a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)..... Yes No

б) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди)..... Так Hi
b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide)..... Yes No

в) культури тканини..... c) Tissue culture г) інших факторів..... g) Other factors	Так <input type="checkbox"/> Hi <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Hi <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так" Please provide details for where you have indicated "yes" <hr/>	
10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заяви, призначений для експертизи, перевіреним на наявність вірусу або інших патогенів? Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?	
Так <input type="checkbox"/> Yes	
(просимо надати деталі) (please provide details as specified by the Authority)	
Hi <input type="checkbox"/> No	
Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct	
Ініціали та прізвище уповноваженої особи Applicant's name	
Підпис Signature	Дата Date

**МЕТОДИКА
проведення експертизи сортів ячменю звичайного (*Hordeum vulgare L.*)
на відмінність, однорідність і стабільність**

Загальні рекомендації

1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів ячменю звичайного (*Hordeum vulgare L.*).

2. Необхідний рослинний матеріал – насіння, колоси

1) Компетентний орган визначає: скільки, якої якості, коли й куди постачається рослинний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість насіння на один пункт дослідження закладу експертизи має становити 3 кг для сортів і гібридів та 1,5 кг для інбриедної лінії. Для гібридів додатково надають 0,3 кг кожного батьківського компонента. Окрім того, на другий рік заявник надсилає 100 добре розвинених типових колосів ярого ячменю і 150 – озимого.

3) Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо посівних і сортових характеристик.

Рослинний матеріал нічим не обробляють.

3. Метод експертизи

1) *Тривалість експертизи.* Польові дослідження для всіх категорій сортів (гібридів F1, ліній, сортів), на які набуваються права, мають тривати щонайменше два незалежні вегетаційні цикли. За необхідності експертизу продовжують на третій цикл.

Використано документ UPOV TG /19/10, 1994, TG /19/11, 2018. Сорти-еталони ячменю звичайного виділені: Гринів С.М., к. с.-г. н., Камінська Л.В., УІЕСР, Батрак В.В., Ульяновська лабораторія Кіровоградського ОДЦЕСР, 2014. Зміни й доповнення внесенні: Гринів С. М., канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб., Костенко Н. П., канд. с.-г. наук, Лікар С. П., Душар М. Б. УІЕСР, 2019.

З метою оцінки однорідності та стабільності гібридів першого покоління F1 разом із гібридом, заявленим для набуття прав, мають бути надані батьківські компоненти: для простого гібрида – дві вихідні лінії, трилінійного гібрида – простий гібрид та три лінії, подвійного гібрида – два простих гібриди та чотири лінії, які є складовими простих гібридів.

Якщо гібрид, який подається для набуття прав, містить у своєму складі зареєстровану лінію (успішно пройшла експертизу на відмінність, однорідність та стабільність і має офіційний морфологічний опис) – польові дослідження вищезазначеної лінії тривають один незалежний цикл.

У випадку, коли лінія входить як батьківський компонент до складу декількох гібридів одного заявитика, її польові дослідження з визначення ознак, наведених у пункті 7 даної методики, здійснюють один раз.

2) *Місце експертизи.* Експертизу проводять у двох пунктах дослідження закладу експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови для проведення експертизи.* Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст і розвиток рослин, і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи.* Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає 2 000 рослин, які поділяють на два або більше повторень. На колосових ділянках обліковують не менше, ніж 100 колосових рядків.

Для визначення типу розвитку використовують не менше, ніж 300 рослин на колосовій ділянці (Γ).

Під час експертизи можуть бути проведені додаткові дослідження.

5) *Метод дослідження.* Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN,

псевдоякісні – PQ). Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG – разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS – вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG – візуальна разова оцінка групи рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин.

6) *Кількість рослин / частин рослин.* Експертизі підлягає щонайменше 2 000 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG – разове вимірювання 20 рослин або частин 20 рослин;

MS – вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин;

VG – візуальна разова оцінка 2 000 рослин;

VS – візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

4. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності

Ознаки, що використовують для оцінки відмінності, однорідності й стабільності та ступені їх виявлення наведені в Таблиці ознак 7. Кожному ступеню виявлення ознаки присвоєно коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

1) Експертиза на відмінність

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку

заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису первого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізнем з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнати сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

Оцінка відмінності гібридів, попередня експертиза на основі батьківських ліній і за формулою може бути здійснена відповідно до наступних рекомендацій:

- (a) опис батьківських ліній відповідно до Методики;
- (b) перевірка оригінальності (відмінності) батьківських ліній у порівнянні з довідково-інформаційним фондом, на основі ознак з Розділу 7 Методики для перевірки найближчих інbredних ліній;
- (c) перевірка оригінальності (відмінності) формули гібрида в порівнянні з загальновідомими гібридами з урахуванням найближчих інbredних ліній;
- (d) оцінка відмінності на рівні гібриду з близькою формулою.

2) Експертиза на однорідність

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження, рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності сортів та інbredних ліній приймається популяційний стандарт 0,1 %, за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається п'ять нетипових.

Для оцінки однорідності інbredних ліній з чоловічою стерильністю приймається популяційний стандарт 0,2 %, за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається вісім нетипових.

Для оцінки однорідності інbredних ліній з чоловічою стерильністю простих гібридів, які є складовим батьківським компонентом 3-х лінійного гібриду приймається популяційний стандарт 0,5 %, за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 2 000 рослин допускається 15 нетипових.

Для оцінки однорідності на колосових ділянках приймається популяційний стандарт 1 %, за рівня ймовірності 95 %. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається три нетипові рослини/колосові рядки. Колосовий рядок розглядають як нетиповий, якщо у рядку є більше, ніж одна нетипова рослина.

Для ознак, що визначають на колосових ділянках однорідність оцінюють у два етапи. Спершу обстежують 20 рослин або частини 20 рослин. Якщо виявлено 1–3 нетипові рослини, необхідно додатково обстежити 80 рослин або частини 80 рослин. Якщо виявлено понад три нетипові рослини, сорт вважається неоднорідним. За відсутності нетипових рослин сорт визнають однорідним.

Для оцінки однорідності гібридів приймається популяційний стандарт 10 % за рівня ймовірності 95 %. Розмір вибірки для оцінки однорідності гібридів може бути зменшений до 200 рослин. У вибірці з 200 рослин допускається 27 нетипових. У вибірці зі 100 колосових рядків, рослин або частин рослин допускається 15 нетипових.

Допустима кількість нетипових рослин

Походження	Популяційний стандарт за рівня ймовірності 95 %, %	Кількість обстежуваних рослин, шт.	Допустима кількість нетипових рослин, шт.
1	2	3	4
Сорти, інbredні лінії	0,1	2 000	5
Інbredні лінії з чоловічою стерильністю	0,2	2 000	8
Інbredні лінії з чоловічою стерильністю простих гібридів, які є складовим	0,5	2 000	15

1	2	3	4
батьківським компонентом 3-х лінійного гібриду			
Гібриди	10	200	27
Сорти, інбредні лінії, інбредні лінії з чоловічою стерильністю	1	100 колосових рядів	3
Гібриди	10	100 колосових рядів	15

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

3) Експертиза на стабільність

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначенні в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти-кандидати групують із подібними загальновідомими сортами на групи для полегшення оцінки відмінності. Для групування використовують ознаки, які, як відомо з практики, не варіють або дуже слабко варіють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Для групування рекомендовано такі ознаки:

- нижні листки – опущення піхви (ознака 2);
- час початку колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів) (ознака 7);
- остюки: антоціанове забарвлення кінчиків (ознака 8);
- рослина – за довжиною (стебло, колос та остюки) (ознака 12);
- колос – кількість рядів (ознака 13);

- зернівка – волоски основної щетинки за довжиною (ознака 22);
- зернівка – плівчастість (ознака 23);
- зернівка – опущення центральної боріздки (ознака 26);
- тип розвитку (ознака 29).
- колос – розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів) (ознака 42).

Для чіткого виявлення ознак поряд із сортами-кандидатами необхідно висівати сорти-еталони.

6. Умовні позначення

(*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди застосовуються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або умови довкілля це унеможливлюєть;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

7. Таблиця ознак сортів ячменю звичайного

Назва ознаки		Ступінь виявлення ознаки	Код	Сорт-еталон	
				озимі	ярі
1	2	3	4	5	6
1. (*) QN	Рослина: габітус (форма куща) VG (Б) 25–29	прямий	1		Святогор, Селеніт
		напівпрямий	3	Айвенго, Лестер	Авгій, Всесвіт
		напіврозлогий	5	Амарена, Маскара	Себастьян
		розлогий	7		KBC 09/410
		Сланкий	9		
2. (*) QL	Нижні листки: опушенні піхви VS (Б) 25–29	відсутнє	1	Айвенго, Маскара	Себастьян
		наявне	9	Амарена, Герлах	
3. (*) QL	Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок VG (A) 45–49	відсутнє	1	Амарена, Майбрід	Галичанин
		наявне	9	Айвенго, Жерар	Авгій, Всесвіт
4. (*) (+)	Пропорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	Абориген	
		слабка	3	Буревій	KBC 09/410
		помірна	5	Борисфен	Святогор
		сильна	7	Добриня 3	Себастьян

1	2	3	4	5	6
QN	вушок VG (A) 45–49	дуже сильна	9		Авгій
5. (+) QN	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком VG (A) 47–51	відсутня або дуже мала	1	Борисфен, Буревій	Себастьян, Селеніт
		мала	3	Айвенго	Святогор
		середня	5	Добриня 3	Галичанин
		велика	7	Селена стар	Аграрій
		дуже велика	9		Авгій
6. QN	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві VG (A) 50–60	відсутній або дуже слабкий	1		
		слабкий	3	Лестер	Водограй
		помірний	5	Селена стар	Командор
		сильний	7	Добриня 3, Ахиллес	Галичанин, Всесвіт
		дуже сильний	9		Приазовський 9
7. (*) QN	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів) VG/MG (A) 50–52	дуже ранній	1	Селена стар	Гатунок
		ранній	3	Айвенго	Водограй
		середній	5	Снігова королева	Командор
		пізній	7	Амарена, Ахиллес	Володар, Всесвіт
		дуже пізній	9		

1	2	3	4	5	6
8. (*) QL	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків VG (A) 60–65	відсутнє наявне	1 9	Буревій, Амарена Дориня 3, Селена стар	Галичанин Водограй
9. (*) QN	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків VG (A) 60–65	відсутня або дуже слабка слабка помірна сильна дуже сильна	1 3 5 7 9		Козацький Гатунок Водограй Авгій Командор
10. (*) QN	Колос: восковий наліт VG (A) 65–75	відсутній або дуже слабкий слабкий помірний сильний дуже сильний	1 3 5 7 9	Борисфен, Абориген Жерар Айвенго Ахиллес	Козацький Святогор Сварог Себастьян, Модерн
11. (+) QN	Колос: положення в просторі VG (A) 70-80	пряме напівпряме горизонтальне напівпоникле	1 3 5 7	Абориген Селена стар Борисфен	Козацький Сварог, Мономах Гатунок, Статок КВС 09/410, Водограй

1	2	3	4	5	6
		поникле	9		
12. (*) QN MG (A) 80–92	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	дуже коротка	1	Добриня 3, Екзистенс	Селеніт
		коротка	3	Герлах	Командор, Себастьян
		середня	5	Буревій, Ахиллес	Приазовський 9, Авгій
		довга	7	Амарена, Скарпія	Крок
		дуже довга	9	Айвенго	
13. (*) QN VG/VС (A) 80–92	Колос: кількість рядів	два	1	Вінтмальт	Крок, Мономах
		шість	2	Герлах, Буревій	Вакула, Галичанин
14. (+) PQ 80–92	Колос: форма VG/VС (A) 80–92	піраміdalьна	3	Майбрід	Себастьян
		циліндрична	5	Снігова королева	Вакула
		веретеноподібна	7		Всесвіт
		напівпіраміdalьна	9		
15. (*) (+) QN MS/VG (A) 80–92	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1	Мастер Зернограда	Авгій
		нешільний	3	Абориген	Всесвіт, Крок
		середній	5	Жерар	Сварог
		щільний	7	Добриня 3	
		дуже щільний	9		

1	2	3	4	5	6
16. (+) QN MS/VG (A) 80-92	Колос: за довжиною (з остюками)	короткий	1	Мастер Зернограда	Галичанин
		середній	2	Снігова королева	Козацький, Сварог
		довгий	3	Екзистенс	Всесвіт, Гатунок
17. (*) (+) QN MS/VG (A) 80–92	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	короткі	3		Володар
		середні	5	Майбрід	Гатунок
		довгі	7	Вінтмальт	Галичанин, Аграрій
18. QN	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента MG/MS (A, B) 92	короткий	3	Айвенго	Вакула, Селеніт
		середній	5	Екзистенс, Жерар	Себастьян, Приазовський 9
		довгий	7	Мастер Зернограда	Командор, Авгій
19. (+) QN VG/VS (A, B) 92	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	відсутній або дуже малий	1	Снігова королева	Вакула
		малий	3	Буревій	Козацький, Крок
		помірний	5	Жерар	Селеніт, Всесвіт
		великий	7		Водограй, Мономах
		дуже великий	9		

1	2	3	4	5	6
20. (*) QN	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) VG/VS (A) 80-92	паралельне	1	Маскара	Гатунок, КВС 09/410
		від паралельного до ледь відхиленого	2	Вінтмальт	Козацький, Мономах
		відхилене	3		Крок, Всесвіт
21. (+) QN	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки VG/VS (A, B) 92	коротші	1		Модерн
		рівні	2	Жерар, Герлах	Володар, Аграрій
		довші	3	Майбрід, Айвенго	Водограй, Мономах
22. (*) QN	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною VG/VS (A, B) 80–92	короткі	1	Селена стар, Вінтмальт	Водограй, Галичанин
		довгі	2	Абориген, Амарена	Мономах
23. (*) QL	Зернівка: плівчастість VG/VS (A, B) 92	відсутня	1	Ахиллес	Гатунок, Козацький
		наявна	9	Лестер, Буревій	Модерн, Крок

1	2	3	4	5	6
24.	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски VG/VS (A, B) 80–92	відсутня або дуже слабка	1	Майбрід, Герлах	Мономах
QN		слабка	3	Вінтмальт	Водограй, Гатунок
		помірна	5	Жерар	Себастьян, Аграпій
		сильна	7	Екзистенс	Соборний
		дуже сильна	9	Мастер Зернограда	
25.	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски VG/VS (A, B) 80-92	відсутнє або дуже слабке	1	Маскара, Ахиллес	Мономах
QN		слабке	3	Герлах, Буревій	Святогор
		помірне	5	Айвенго	Інклузив, Енріке
		сильне	7	Скарпія	
		дуже сильне	9		
26.	Зернівка: опущення центральної боріздки VG/VS (A, B) 92	відсутнє	1	Скарпія, Абориген	Інклузив, Мономах
QL		наявне	9		Псьол
27.	Зернівка: розташування	фронтальне	1	Жерар, Майбрід	Соборний, Авгій

1	2	3	4	5	6
QN	лодикул VS (A) 92	охоплююче	2	Вінтмальт, Скарпія	Вакула, Мономах
28. (+) PQ	Зернівка: забарвлення алейронового шару VG/VS (A, B) 85-92	білясте	1	Айвенго, Буревій	Селеніт, Водограй
		слабке забарвлення	2	Скарпія, Амарена	Соборний, Гатунок
		сильне забарвлення	3	Маскара, Герлах	Енріке
29. (*) PQ	Тип розвитку VG (Г)	озимий	1	Герлах, Скарпія	
		дворучка (альтернативний)	2		
		ярий	3		Сєбастіян
30. QL	Колос: остюки VS (A) 80–92	відсутні	1		Модерн
		наявні	9	Герлах, Буревій	Вакула, Соборний
31. PQ	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення VS (A) 80–92	зубці	3		Модерн
		остюки	5	Маскара, Герлах	Гатунок, Крок
		фурки (метаморфози)	7		
32. PQ	Зернівка: форма VS (A), 92	округла	1		
		еліптична	3		Приазовський 9
		видовжено-	5	Екзистенс,	Командор,

1	2	3	4	5	6
		еліптична		Борисфен	Себастьян
		ромбічна	7	Мастер Зернограда	Святогор, Інклюзив
		видовжено- ромбічна	9		KBC 09/410
33. PQ	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски VS (A), 92	тонкоzemоршкувата	1	Амарена, Скарпія	Володар, Галичанин
		грубоземоршкувата	9	Буревій	Енріке, Модерн
34. QL	Тільки для плівчастих сортів Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски VS (A), 92	відсутнє	1		Приазовський 9
		наявне	9	Снігова королева, Буревій	Всесвіт, Командор
35. PQ	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка VS (A) 92	різкий	1		
		поступовий	2	Борисфен, Селена стар	Аграрій, Енріке
		широкий (біля основи остюка напливи)	3		


1	2	3	4	5	6
36. PQ VS (Б) 12–19	Вушка: форма верхівки 12–19	тупа	1		
		загострена	2	Буревій	Інклузив, Себастьян
		шилоподібна	3	Скарпія	Всесвіт, Аграпій
37. QN VS (Б) 12–19	Вушка: охоплення соломини 12–19	неповне	1	Вінтмальт	Сварог
		повне	2	Маскара	Гатунок, Приазовський 9
		перекриваюче	3	Герлах, Скарпія	Галичанин, Крок
38. QN VS (Б) 12–19	Язичок: ступінь виявлення 12–19	відсутній або слабкий	1		
		слабкий	3	Буревій	Крок, Модерн
		середній	5	Амарена, Айвенго	Володар, Енріке
		сильний	7	Майбрід, Вінтмальт	Всесвіт, Статок
39. QN VS (A) 60–69	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом) VS (A) 60–69	слабко виповнена	3	Майбрід, Вінтмальт	Гатунок, Крок
		проміжна	5		Козацький, Енріке
		виповнена	7		Статок, Всесвіт

1	2	3	4	5	6
40. QL	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) VS (Б) 60–65	відсутнє наявне	1 9	Лестер, Ахиллес	Галичанин, Аграрій
41. QN	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення VG (A) 25-29	слабка помірна сильна	3 5 7		
42. QL	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів) VG (A) 80-92	відсутній або рудиментарний розвинутий	1 2		
43. (+) QL	Квіткова луска: форма основи VG (A, B) 92	не скошена скошена	1 2		


8. Пояснення до Таблиці ознак сортів ячменю звичайного

До 1. Рослина: габітус (форма куща)


Обстеження габітусу здійснюють візуально за загальним положенням листків до поверхні ґрунту. Визначають кут між уявною віссю розташування зовнішніх листків, стебел і поверхнею ґрунту.



До 2. Нижні листки: опушення піхви




До 4. Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок



До 5. Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком

- 1 – усі листки прямі;
- 2 – приблизно 1/4 рослин із похилими листками;
- 3 – приблизно 1/2 рослин із похилими листками;
- 4 – приблизно 3/4 рослин із похилими листками;
- 5 – усі листки похилі.


До 11. Колос: положення в просторі




До 12. Рослина: за довжиною (стебло, колос та остику)

Визначають довжину, що включає стебло колос і остику та порівнюють із загальновідомими сортами.

До 14. Колос: форма




До 15. Колос: за щільністю



До 16. Колос: за довжиною (з остюками)

До 17. Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)



a – довжина остюків;

b – довжина колосу.



1
короткі




2
середні



3
довгі

До 19. Стрижень колосу: вигин першого сегмента



1



3



5



7



9

відсутній або

малий

помірний


великий

дуже малий

дуже великий

До 20. Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)

Положення стерильних колосків слід спостерігати лише для сортів з повністю розвинутими колосками. Спостереження проводять у середній третині колоса.



1

паралельне




2

від паралельного
до ледь відхиленого

3

відхилене

До 21. Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки



1

коротші



2


рівні



3

довші

До 22. Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною



короткі

довгі

До 24. Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски



відсутня або

дуже слабка


слабка


помірна

сильна

дуже сильна

25. Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски





1

відсутнє або
дуже слабке

3

слабке

5

помірне

7

сильне

9

дуже сильне

Зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски зернівки вважається відсутнє або дуже слабке, коли відсутні або наявні 1 або 2 малих зазублень; дуже сильне – наявні 10 і більше великих зазублень.

До 26. Зернівка: опушення вентральної борізdkи



1


відсутнє



9

наявне

До 27. Зернівка: розташування лодикул



До 28. Зернівка: забарвлення алейронового шару

Забарвлення алейронового шару оцінюють візуально після витримування у воді протягом 12 годин. За потреби варто користуватися лупою.

До 29. Тип розвитку

Тип розвитку (необхідність у яровизації) слід оцінювати на ділянках, висіяних навесні. Для опису сортів–кандидатів до експертизи обов'язково залишають сорти-еталони. Коли найпізніший сорт-еталон ярого типу розвитку досягне повного розвитку (фаза, що відповідає десятковому коду 91-92 розвитку злакових видів за шкалою Zadoks EUCARPIA 1974), візуально оцінюють фазу росту і розвитку сортів-кандидатів, порівнюючи їх із сортом-еталоном.

Тип розвитку оцінюють наступним чином:


1 – озимий тип (сильна потреба в яровизації) – рослини повністю досягли фази 45 за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів (набрякання піхви листка);

2 – дворучка або альтернативний тип (часткова потреба в яровизації) – рослини пройшли фазу 75 і перебувають загалом у фазі 90 за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів (рослини пройшли фазу середньої молочної стигlosti зерна та перебувають досягання зернаївки);

3 – ярий тип (відсутня або зовсім слабка потреба в яровизації) – рослини пройшли фазу 90 за шкалою Zadoks фази розвитку злакових видів рослини пройшли фазу досягання зернівки).

До 43. Квіткова луска: форма основи

Спостереження слід проводити на середній третині колоса. Що стосується шестириядних сортів, спостереження проводять в середньому рядку колоса.



9. Додаткова інформація

1) Типи ділянок для ячменю звичайного

Тип ділянки	Назва ділянки	Вид експертизи	Примітки
A	рядкова	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявителя відповідно до року врожаю
A ₁	рядкова	стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням заявителя першого року врожаю
B	пунктирна	відмінність однорідність	закладають першого і другого років експертизи насінням заявителя відповідного року врожаю
B	колосова 1 (волотева 1)	однорідність стабільність	закладають на другий рік експертизи насінням із 100 колосів (волотей), надісланих заявителем
Г	колосова 2	відмінність однорідність стабільність	для ботанічних таксонів групи зернових озимого типу розвитку весняної сівби, експертизи на яровість: засівають на другий рік насінням із 50 колосів, надісланих заявителем

Д	колосова 3 (волотева 3) (спеціальна)	однорідність	висівають на другий рік експертизи насіння з колосів (волотей), які відбирають з усіх нетипових рослин. Для встановлення причин неоднорідності висівають на другий рік експертизи для контролю до ділянки Д насіння колосів (волотей), відібраних з типових рослин сорту
---	--	--------------	--

2) Необхідна кількість рослин ячменю звичайного для експертизи на ВОС

Тип ділянки	Схема розміщення рослин		Кількість рослин, шт.			
	ширина міжряддя, см	відстань між рослинами в рядку, см	на ділянці, шт.	для обліку на:		
				відмінність	однорідність	стабільність
Перший рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2500	2000*	2000*	—
Б	15–20	10,0	240	20	100	—
Другий рік експертизи						
A	15–20	≈2,0	2500	2000*	2000*	2000*
A ₁	15–20	≈2,0	2500	—	—	1000
Б	15–20	10,0	240	20	100	100
В	15–20	10,0	2000	—	2000	20
Г	15–20	10,0	1000	20	1000	1000
Д	15–20	10,0	x	y	y	y
E _к **	15–20	10,0	x	y	y	y

* за візуальної одноразової оцінки групи рослин;

** параметри ділянки E_к повністю відповідають параметрам ділянки Д;

х, у – значення цих показників перемінне та залежить від кількості нетипових рослин;

А – у двох повтореннях;

А₁, Б, В, Д, Г, Е_к – в одному повторенні.

3) ДЕСЯТКОВИЙ КОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ ВИДІВ (*EUCARPIA Bulletin №7, 1974, pp. 49–52*)

Дво-знач-ний код	Загальний опис	Шкала Фіке	Додаткові помітки для пшениці, ячменю, жита, вівса та рису
1	2	3	4
	Проростання		
00	Сухе насіння		
01	Початок набрякання		
02			
03	Повне набрякання		
04			
05	Поява зародкового корінця		
06			
07	Поява колеоптиля		
08			
09	На верхівці колеоптиля помітний листок		
	Ріст паростка		
10	Поява першого листка з колеоптиля	1	Другий листок (< 1 см)
11	Перший листок розгорнувся		

1	2	3	4
12	2 листки розгорнулись		
13	3 листки розгорнулись		
14	4 листки розгорнулись		
15	5 листків розгорнулись		
16	6 листків розгорнулись		
1	2	3	4
17	7 листків розгорнулись		
18	8 листків розгорнулись		
19	Розгорнулись 9 або більше листків		
	Кущіння		
20	Розвивається лише головний пагін		
21	Головний пагін та один бічний		
22	Головний пагін та два бічних		
23	Головний пагін та три бічних		
24	Головний пагін та чотири бічних	3	2
25			
26	Головний пагін та п'ять бічних		
	Головний пагін та шість бічних		
27	Головний пагін та сім бічних		«Паралельні коди»
28	Головний пагін та вісім бічних		
29	Головний пагін та дев'ять або більше бічних		
	Видовження стебла		
30	Піднімається несправжнє стебло (починається розтягнення)	4–5	У рису: фаза вегетативної затримки

1	2	3	4
31	1-й вузол		
32	2-й вузол		
33	3-й вузол		
34	4-й вузол		
35	5-й вузол		
36	6-й вузол		
1	2	3	4
37	Наявність прапорцевого листка	8	
38			
39	Язичок прапорцевого листка помітний	9	Стадія перед колосінням У рису: стадія, коли вушка останнього та передостаннього листків розташовані одне навпроти одного
	Набрякання колоса		
40			Невелике збільшення суцвіття, стадія раннього набухання колоса
41	Піхва прапорцевого листка довшає		
42			

1	2	3	4
43	Помітне набрякання піхви	}	10
44	листка		
45	Набрякання піхви листка		
46			
47	Відкрито піхву прaporцевого	}	Тільки для остюкових форм
48	листка		
49	Перший остюк помітний		
	Колосіння		викидання волоті
50	Перший колосок суцвіття помітний	N	
51	{	S	
52	З'явилося 1/4 суцвіть	N 10,2	N - несинхронні
53	{	S	види
54	З'явилося 1/2 суцвіть	N 10,3	S - синхронні види
55	{	S	
56	З'явилося 3/4 суцвіть	N 10,4	
57	{	S	

58	Ріст суцвіть закінчений	N 10,5	
59	{	S	
	Цвітіння		Для ячменю встановити нелегко
60	Початок цвітіння	N 10,51	Для рису: як
61	{	S	правило, після
62			цього відразу виявляється волоть
63			
64	Середина цвітіння	N 10,52	
65	{	S	
66			
67			
68	Кінець цвітіння	N 10,53	
69	{	S	
	Фаза молочної стигlosti		
70			
71	Зернівка водостигла	10,54	
72	Зернівка втрачає зелений колір		

1	2	3	4
73	Рання молочна стиглість		
74	Поява клітинної будови ендосперму		
75	Середина молочної стиглості		
76			
77	Пізня молочна стиглість		
78	Завершення формування ендосперму		
79			
	Фаза воскової стиглості		
80			
81			
82			
83	Рання воскова стиглість		
84			
85	М'яка воскова стиглість		
86			
87	Тверда воскова стиглість		
88			
89			
	Достигання		
90			

1	2	3	4
91	Зернівка тверда (важко розрізати нігтем (3))	11,3	Для рису: досягають колоски на верхівці
92	Зернівка тверда (важко подряпати нігтем (4))	11,4	Для рису: 50 % колосків досягло
93	Зернівка вдень відокремлюється (5)		Для рису: досягає 90 % колосків
94	Перестиглість, соломина відмирає		
95	Насіння в стадії спокою		Можлива втрата насіння внаслідок обсипання
96	Насіння життєздатне (50 % схожість)		
97	Насіння пробуджене		
98	Настає вторинний спокій		
99	Вторинний спокій закінчується		

10. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Barley (*Hordeum vulgare* L. sensu lato) (TG /19/10, UPOV) // Geneva. 1994–11–04. – 36 P. // (TG /19/11, UPOV) // Geneva. 2018-09-20. – 42 P. //URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg019.pdf

11. Технічна анкета

Номер заявки

(не заповнюється заявником)

Annex to Application

(not to be filled in by the applicant)

ТЕХНІЧНА АНКЕТА СОРТУ

TECHNICAL QUESTIONNAIRE VARIETY

Щодо гібридних сортів, які є об'єктом заявлання, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт.

Технічна анкета заповнюється на кожен батьківський компонент.

In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders' rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.

1. Предмет Технічної анкети

1. Subject of the Technical Questionnaire

1.1. Ботанічний таксон

(вид)

(латинською мовою)

1.1 Botanical name species
(in Latin Language)

Hordeum vulgare L.

1.2. Ботанічний таксон

(вид)

(українською мовою)

1.2 Botanical name species
(in Ukrainian Language)

Ячмінь звичайний

2. Заявник(и)

2. Applicant(s)

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

Name (denomination)

Автор(и)

Autor(s)

3. Назва сорту

3. Variety denomination

4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту

4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety

4.1. Схема селекції

4.1. Breeding scheme

Сорт, одержаний в результаті:

Variety resulting from:

4.1.1. схрещування

crossing

а) контролюване схрещування

a) controlled cross

(точно вказати батьківські сорти)

(please state parent varieties)

б) частково відоме схрещування

b) partially known cross

(вказати відомий батьківський

сорт(и))

(please state known parent variety(ies))

в) невідоме схрещування
v) unknown cross

4.1.2. мутація
mutation

(визначити батьківський сорт) (please state parent variety)

4.1.3. виявлення та поліпшення
discovery and development

(точно визначити, де і коли виявлено
та як поліпшено)
(please state where and when discovered and how
developed)

4.1.4. інше
other

(надати деталі)
(please provide details)

4.2. Метод розмноження сорту:
method of propagating the variety

4.2.1. сорти, що розмножуються насінням
seed-propagated varieties

а) самозапилення
a) self-pollination

б) перехресне запилення
b) cross-pollination

ПОПУЛЯЦІЯ
population

синтетичний сорт
synthetic variety

в) гібрид
c) hybrid

Щодо гібридних сортів схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити
детальну інформацію про всі батьківські компоненти, що потрібні для розмноження гібрида:

In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the
parent lines required for propagating the hybrid e.g.

Простий гібрид $\text{♀} \times \text{♂}$ Трьохліній гібрид $\text{♀} \times \text{♂} \rightarrow (\text{♀} \times \text{♂}) \times \text{♂}$ і має визначати, зокрема:
Single Hybrid Three-Way Hybrid and should identify in particular:

a) будь-які чоловічі стерильні лінії

a) any male sterile lines

б) систему підтримки чоловічих стерильних ліній

b) maintenance system of male sterile lines.

г) інші

d) other

(надати детальну інформацію)

(please provide details)

4.2.2 сорти, що розмножуються вегетативно:
vegetative propagation

а) живці
a) cuttings

б) розмноження *in vitro*
b) *in vitro* propagation

в) інші (установлений метод)
c) other (state method)

4.2.3. інші
other

(надати детальну інформацію)

(please provide details)

5. Ознаки сорту

Variety characteristics

Назва ознаки Variety denomination		Ступінь проявлення Manifestation	Сорт-еталон Example variety		Код Code
			озимі	ярі	
5.1 (2)	Нижні листки: опушення піхви Lowest leaves: hairiness of leaf sheath	відсутнє absent	Айвенго, Маскара	Себастьян	1 <input type="checkbox"/>
		наявне present	Амарена, Герлах		9 <input type="checkbox"/>
5.2 (7)	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів) Time of ear emergence (first spikelet visible on 50 % of ears)	дуже ранній very early	Селена стар	Гатунок	1 <input type="checkbox"/>
		ранній early	Айвенго	Водограй	3 <input type="checkbox"/>
		середній medium	Снігова королева	Командор	5 <input type="checkbox"/>
		пізній late	Амарена, Ахиллес	Володар, Всесвіт	7 <input type="checkbox"/>
		дуже пізній very late			9 <input type="checkbox"/>
5.3 (8)	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків Awns: anthocyanin coloration of tips	відсутнє absent	Буревій, Амарена	Галичанин	1 <input type="checkbox"/>
		наявне present	Дориня 3, Селена стар	Водограй	9 <input type="checkbox"/>
5.4 (12)	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки) Plant: length (stem, ear and awns)	дуже коротка very short	Добриня 3, Екзистенс	Селеніт	1 <input type="checkbox"/>
		коротка short	Герлах	Командо, Себастьян	3 <input type="checkbox"/>
		середня medium	Буревій, Ахиллес	Приазовський 9, Авгій	5 <input type="checkbox"/>
		довга long	Амарена, Скарпія	Крок	7 <input type="checkbox"/>
		дуже довга very long	Айвенго		9 <input type="checkbox"/>
5.5 (13)	Колос: кількість рядів Ear: number of rows	два two	Вінтмальт	Крок, Мономах	1 <input type="checkbox"/>
		шість six	Герлах, Буревій	Вакула, Галичанин	2 <input type="checkbox"/>
5.6 (22)	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною Grain: rachilla hair type	короткі short	Селена стар, Вінтмальт	Водогра, Галичанин	1 <input type="checkbox"/>
		довгі long	Абориген, Амарена	Мономах	2 <input type="checkbox"/>
5.7 (23)	Зернівка: плівчастість Grain: type	відсутня non-husked	Ахиллес	Гатунок, Козацький	1 <input type="checkbox"/>
		наявна husked	Лестер, Буревій	Модерн, Крок	9 <input type="checkbox"/>
5.8 (26)	Зернівка: опушення центральної боріздки Grain: hairiness of ventral furrow	відсутнє absent	Скарпія, Абориген	Інклузив, Мономах	1 <input type="checkbox"/>
		наявне present		Псьол	9 <input type="checkbox"/>

5.9 (29)	Тип розвитку Seasonal type	озимий winter type	Герлах, Скарпія		1 <input type="checkbox"/>
		дворучка (альтернативний) alternative type			2 <input type="checkbox"/>
		ярий spring type		Себастьян	3 <input type="checkbox"/>
5.10 (42)	Колос: розвиток стерильних колосків (Лише для дворядних сортів) Ear: development of sterile spikelets (Only applicable for two-row varieties)	відсутній або рудиментарний none or rudimentary			1 <input type="checkbox"/>
		розвинутий full			2 <input type="checkbox"/>

6. Подібні сорти та відмінності між ними

6. Similar varieties and differences from these varieties

Цю таблицю та рядок коментарів використовувати для надання інформації про те, як об'єкт заявки відрізняється від сорту (сортів), який (які) з вашої точки зору є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести експертизу на відмінність більш ефективним методом
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way

Назва(и) сорту(ів) подібного(их) до сорту-кандидата Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety	Ознака(и), за якою (якими) сорт-кандидат відрізняється від подібних сортів Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) подібних(ого) сортів(y) Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)	Прояв ознак(и) сорту-кандидата Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Коментарі
Comments

7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety

7.1. Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізити сорт, крім інформації, що надана в розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці ознаки)
(if yes, please provide details)

7.2. Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?

Так

Hi

Yes

No

(якщо так, описати ці умови)
(if yes, please provide details)

7.3. Інша інформація (широке використання)

Other information

Main use

(надати детальну інформацію)
(please provide details)

8. Дозвіл на використання

Autorization for release

a) чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?

a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?

Так

Yes

Hi

No

б) чи було одержано такий дозвіл?

b) Has such authorization been obtained?

Так

Yes

Hi

No

Якщо відповідь на підпункт «б» є позитивною, просимо надати копію дозволу

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

9. Інформація щодо використання ГМО при створенні сорту

Information on use of GMOs for creating a variety

a) чи був генетичний матеріал змінений за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються у природних умовах?

a) Has the genetic material been altered by artificial means of transferring genes that do not occur in natural conditions?

Так

Yes

Hi

No

б) чи потребує сорт державної реєстрації ГМО згідно із законодавством?

b) Does a variety need to have GMO state registration in accordance with the law?

Так

Yes

Hi

No

Якщо відповідь на пункт «б» є позитивною, просимо надати науково обґрунтовану оцінку ризику.

If the answer to «b» is yes, please attach a copy of the authorization

10. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи поданий на експертизу

Information on plant material to be examined or submitted for examination

10.1. Прояв ознаки або декількох ознак сорту може перебувати під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева тощо. The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc

Так

Yes

Hi

No

Зазначити такі ознаки, фактор впливу та прояв

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

10.2. Посадковий матеріал об'єкта заявики не має зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки Комpetентний орган дозволить або запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про ней має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що посадковий матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| a) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма) | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| a) Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| b) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди) | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| b) Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| в) культури тканини | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| c) Tissue culture | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| г) інших факторів | Так <input type="checkbox"/> | Hi <input type="checkbox"/> |
| g) Other factors | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |

Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так"

Please provide details for where you have indicated "yes"

10.3. Чи був посадковий матеріал об'єкта заявики, призначений для експертизи, перевіреним на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?

Так

Yes

(просимо надати деталі)
(please provide details as specified
by the Authority)

Hi
No

Інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct

Ініціали та прізвище уповноваженої особи

Applicant's name

Підпис
Signature

Дата
Date