

МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

КАТАЛОГ
СОРТІВ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ
В УКРАЇНІ у 2007 р.

КИЇВ 2007

МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

КАТАЛОГ
СОРТІВ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В
УКРАЇНІ у 2007 р.

КИЇВ 2007

Каталог сортів рослин придатних для поширення в Україні видається на виконання Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” з метою організації інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин.

Поширюється для селекціонерів, власників сортів, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насіннєвих фірм, науково-дослідних інститутів, вузів, технікумів, а також представляє інтерес для господарств різних форм власності та городників і садівників.

Каталог підготували: Гончар О. М., Загинайло М. І., Жаркова Г. Г., Лисікова В. М., Здольник Н. В., Рибалко Я. М., Гопчак В. О., Леонова О. М., Жаркова О. Ю., Головачук Т.В., Мельничук С.Л., Бельдій Н. М., Рябенка Л. А., Павлюк Н. В., Зрібняк М. М., Васківська С. В., Безручко О. І., Майстер Н. В., Києнко З.Б., Ілюченко О. С., Гоцуєнко Л. М.

Адреса засновника та редакційної колегії:

Вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
Державна служба з охорони прав на сорти рослин,
Український інститут експертизи сортів рослин
тел.:257-99-33, 258-34-56, факс:257-99-63
e-mail: sops@sops.gov.ua, www.sops.gov.ua

Зареєстровано 23 січня 2003 року

Державним комітетом інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія **КВ № 6889**

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2007 р. – К.: Алефа, 2007. – 348 с.

© Український інститут експертизи сортів рослин, 2007

Підписано до друку 30.05.2007 року. Наклад 1000 пр. Формат 60x84 1/8

Папір офсетний. Гарнітура Times. Ум. др. арк. 21,75

Віддруковано у видавництві “Алефа” з оригінал-макету замовника.

Адреса видавництва: 01042, Україна, м. Київ, вул. Празька, 18, офіс 3, тел./факс: 528-80-30, 573-32-69

Свідоцтво серія ДК № 306 від 28.12.2000 р.

ЗМІСТ

Скорочення термінів	17
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2007 р.	19
Сільськогосподарські: злаки	
Пшениця м'яка озима	20
Пшениця м'яка яра	20
Пшениця тверда озима	24
Пшениця тверда яра	25
Жито озиме	26
Жито яре	26
Тритикале озиме	27
Тритикале яре	27
Овес ярий	28
Ячмінь озимий	29
Ячмінь ярий	29
Кукурудза	30
	33
Сільськогосподарські: бобові	
Горох	44
Сочевиця	44
Нут	46
Чина	46
Квасоля звичайна	47
	47
Сільськогосподарські: круп'яні	
Гречка	47
Просо	47
Сорго зернове	48
Сориз	48
Рис	49
	50

Сільськогосподарські: олійні та прядивні	50
Соняшник	50
Соя	57
Ріпак озимий	60
Ріпак ярий	61
Льон кудряш	62
Рижій ярий	63
Гірчиця сарептська	63
Гірчиця біла	63
Рицина	64
Мак	64
Арахіс	65
Кунжут індійський	65
Суріпиця яра	65
Льон-довгунець	65
Коноплі	66
Бавовник	66
Гірчиця сарептська озима	67
Гірчиця чорна	67
Смикавець їстівний	67
Сільськогосподарські: буряк	67
Буряк цукровий	67
Буряк кормовий	70
Сільськогосподарські: картопля	71
Картопля	71
Сільськогосподарські: кормові	75
Пайза	75
Сорго віничне	75

Сорго цукрове	76
Суданська трава	76
Сорго-суданські гібриди	76
Пажитниця однорічна (Вестервольдська)	77
Грястиця збірна	77
Костриця східна	77
Костриця лучна	77
Костриця очеретяна	78
Мітлиця велетенська	78
Очеретянка звичайна	78
Пирій видовжений	78
Райграс високий	78
Пажитниця багаторічна	79
Костриця червона мінлива	80
Костриця овеча	80
Костриця червона	80
Костриця тонколиста	81
Костриця шорстколиста	81
Мітлиця повзуча	81
Тонконіг лісовий	81
Тонконіг лучний	81
Тонконіг фіолетовий	82
Стоколос безостий	82
Тимофіївка лучна	82
Трава Колумба	82
Пажитниця багатоквіткова	83
Боби кормові	83
Горошок (Вика озима)	83
Горошок (Вика яра)	83
Пелюшка	84
Конюшина відкритозіва	84

Конюшина олександрійська	84
Люпин білий	84
Люпин жовтий	85
Люпин вузьколистий	85
Серадела	85
Горох кормовий	85
Буркун білий	86
Еспарцет	86
Люцерна мінлива	86
Козлятник східний	86
Конюшина лучна	87
Конюшина гібридна	87
Конюшина повзуча (біла)	88
Люцерна посівна	88
Люцерна хмелевидна	89
Лядвенець рогатий	89
Щириця	89
Віниччя справжнє	90
Мальва кучерява	90
Топінамбур	90
Фацелія	90
Гарбуз кормовий	90
Пирій середній	90
Люцерна жовта (серповидна)	90
Еспарцет закавказький	90
Сільськогосподарські: овочеві	90
Баклажан	90
Буряк столовий	91
Вівсяний корінь	92

Гарбуз	92
Горох овочевий	93
Диня	93
Кабачок	95
Кавун	95
Капуста білоголова	97
Капуста броколі	100
Капуста качанна (червоноголова)	100
Капуста кольрабі	101
Капуста пекінська	101
Капуста савойська	101
Капуста цвітна	101
Квасоля овочева	102
Крес-салат	103
Кукурудза розлусна	103
Кукурудза цукрова	103
Морква	104
Огірок	106
Пастернак	110
Патисон	111
Перець гіркий	111
Перець солодкий	111
Петрушка	113
Помідор	113
Ріпа	119
Редиска	120
Редька посівна	121
Редька олійна	121
Салат головчастий	121
Салат латук	122
Селера листкова	122

Тиква звичайна	122
Фізаліс	122
Хрін	123
Цибуля батун	123
Цибуля городня	123
Цибуля порей	125
Цибуля скорода	125
Цибуля шалот	125
Часник	125
Чорнушка посівна ь(Нігела)	126
Шпинат	126
Щавель	126
Гарбуз мускусний	126
Квасоля багатоквіткова	126
Сільськогосподарські: інші	126
Аніс	126
Васильки справжні	126
Змієголовник	127
Катран Стевена	127
Кмин	127
Коріандр	127
Котяча м'ята	127
Кріп	128
Лаванда	128
Лаконос американський	128
Меліса лікарська	128
Меліса лимонна	129
Молочай чиновий	129
М'ята	129
Полин лимонний	129

Рожа рожева	
Сафлор красильний	129
Троянда дамаська	129
Тютюн	130
Фенхель	130
Хміль	130
Хризантема ефіроолійна	131
Хризантема увінчана	131
Цмин італійський	132
Чабер гірський	132
Чебрець камфорний	132
Чорнобривці прямостоячі, повняки	132
Шавлія мускатна	132
Монарда трубчаста	132
	133
Плодові та ягідні	
Яблуна	133
Груша	133
Айва	135
Хеномелес	137
Абрикос	137
Алича	137
Вишня	138
Черешня	138
Слива	138
Персик	140
Нектарін	140
Кизил	141
Агрус	141
Жимолость	141
Калина	142
	142

Малина	142
Обліпіха	143
Порічки (червоні і білі)	143
Смородина чорна	143
Суниця	145
Горіх грецький	146
Гранат	146
Інжир	146
Ківі	146
Маслина	146
Мигдаль	146
Хурма східна	147
Актинідія пурпурна х актинідія гостра	147
Яблуня (підщепа)	147
Виноград	147
Виноград	147
Декоративні та лікарські	151
Азалія	151
Белладонна	152
Бузок	152
Валеріана лікарська	152
Вовчуг польовий	152
Декоративна яблуня	152
Еремур	152
Ехінацея пурпурова	152
Женьшень	153
Жовтушник лакфіолевидний	153
Звіробій	153
Калістефус китайський	153

Канна індійська	
Ломиніс	154
Льон великоквітковий (декоративний)	154
Наперстянка пурпурова	155
Наперстянка шерстиста	155
Оман високий	155
Півники	155
Персик декоративний	155
Подорожник блошиний	155
Подорожник великий	155
Ехінацея бліда	156
Розторопша плямиста	156
Ромашка аптечна	156
Ротики садові	156
Солодка гола	156
Соняшник декоративний однорічний	156
Стевія	156
Троянда	157
Тюльпан	157
Тютюн крилатий	158
Хризантема	159
Целозія гребінчаста	159
Цмин пісковий	160
Чебрець повзучий	160
Шавлія лікарська	160
Щириця Мантегацца	160
Рицина декоративна	160
Полин кримський	160
Полин лікарський	160
Череди трироздільна	161
	161

Лісові	161
Дуб	161
Кедр атласний	161
Модрина	161
Сосна звичайна	161
Сосна кедрова	161
Ялиця біла	161
Ялиця бальзамічна	161
Ясен вузьколистий	161
Інші	161
Глива звичайна	161
Печериця	162
Шії-таке	162
Шовковиця	162
Характеристики сортів рослин, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2007 році	163
Сільськогосподарські: злаки	164
Пшениця м'яка озима	164
Пшениця м'яка яра	173
Пшениця тверда озима	175
Пшениця тверда яра	175
Жито озиме	176
Тритикале озиме	177
Тритикале яре	178
Овес ярий	180
Ячмінь озимий	182
Ячмінь ярий	184
Кукурудза	189

Сільськогосподарські: бобові	
Горох	207
	207
Сільськогосподарські: круп'яні	
Гречка	210
Сорго зернове	210
Рис	211
	212
Сільськогосподарські: олійні та прядивні	
Соняшник	213
Соя	213
Ріпак озимий	228
Ріпак ярий	233
Льон кудряш	234
Мак	235
Арахіс	236
Льон-довгунець	237
Коноплі	238
Бавовник	239
	240
Сільськогосподарські: буряк	
Буряк цукровий	241
Буряк кормовий	241
	254
Сільськогосподарські: картопля	
Картопля	254
	254
Сільськогосподарські: кормові	
Сорго віничне	257
Сорго цукрове	257
Сорго-суданські гібриди	257
	259

Костриця східна	260
Костриця лучна	260
Пажитниця багаторічна	261
Горошок (вика яра)	261
Еспарцет	262
Люцерна мінлива	262
Костриця овеча	263
Костриця червона	264
Люцерна жовта (серповидна)	265
Сільськогосподарські: овочеві	265
Баклажан	265
Буряк столовий	266
Диня	267
Кабачок	271
Кавун	271
Капуста броколі	273
Морква	273
Огірок	274
Помідор	288
Цибуля городня	291
Гарбуз волоський	292
Сільськогосподарські: інші	292
Васильки справжні	292
Коріандр	293
Котяча м'ята	294
Тютюн	294
Цмин італійський	295
Чабер гірський	296
Чебрець камфорний	296

Монарда трубчатa	297
Плодові та ягідні	
Яблуна	297
Груша	297
Алича	301
Черешня	303
Слива	304
Агрус	312
Малина	313
Порічки червоні	313
Смородина чорна	316
Суниця	316
Горіх грецький	318
Яблуна (підщепа)	321
	322
Виноград	
Виноград	323
	323
Декоративні та лікарські	
Ехінацея пурпурова	329
Розторопша плямиста	329
Троянда	330
Шавлія лікарська	331
Полин кримський	335
Полин лікарський	336
	336
Адреси заявників, власників, підтримувачів сорту та інші	337

СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Зона - Рекомендована зона вирощування

П	Полісся
Л	Лісостеп
С	Степ
Кр	Крим
ЗГр	захищений ґрунт
1....15	тимчасові виноградарські зони
гідроп	гідропоніка
К	Карпати
ЗГр(СТ)	захищений ґрунт (скляна теплиця)
ЗГр(ПТ)	захищений ґрунт (плівкова теплиця)

Характеристика 1 - Продуктивність

7-9	висока
5	середня
<5	нижче середньої

Характеристика 2 - Напрямок використання

впв	весняного промислового використання
оз	озимий
ЗПВ	для зон промислової вигодівлі
уц	урожайно-цукристий
цукр	цукристий
++	технічного напрямку
спц	спеція
парф	парфумерна промисловість
пер	переробка
фарм	фармацевтична промисловість
зпл	запилювач
слн	сильний
дф	добрий філер
цін	цінний
ф	філер
зерн	зерновий
зк	зерно-кормовий
пв	пивоварний
зф	задовільний філер
х	харчовий
фж	фуражний
олн	олійний

конд	кондитерський
вол	високоолеїновий
тхн	технічний
лік	лікарський
стл	столовий
тхст	технічно-столовий
сал	салатний
конс	консервний
зс	для соління
ун	універсального призначення
свж	споживання у свіжому вигляді
сил	силосний
лп	луко-пасовищний
мед	медонос
ск	сінокісний
піщ	піщаний
закав	закавказький
зак	залуження схилів та еродованих земель
овоч	овочевий
зх	захисний
прм	промисловий
зріз	зріз
озл	озеленення
аром	ароматичний
склт	скелетний
нц	напівцукровий
корм	кормовий
він	віничний
дкр	декоративного оформлення
лпв	для літнього промислового використання
сд	сидерат
зрош	на зрошуваних землях
хп	для харчової промисловості
всш	придатний для високоштамбової культури
г	гостра
нг	напівгостра
со	солодка
цу	цукристо-урожайний

Характеристика 3 - Група стиглості

дп	дуже пізній
др	дуже ранній
зим	зимовий
літ	літній
нр	надранньостиглий
осін	осінній
пс	пізньостиглий
рс	ранньостиглий
рсдн	ранньосередній
скс	скоростиглий
сп	середньопізній
зр	середньоранній
сс	середньостиглий

Характеристика 4 - Зимостійкість/Холодостійкість

7-9	висока
>5	вищесередньої
5	середня
<5	низька

Характеристика 5 - Стійкість до посухи

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 6 - Стійкість до полягання

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 7 - Стійкість до осипання

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 8 - Стійкість до хвороб

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 9 - Якість

вбіл	високобілковий
------	----------------

сбіл	середньобілковий
вкліт	висококлітковинний
скліт	середньоклітковинний
мал	малоалкалоїдний
сал	середньоалкалоїдний
вдек	високодекоративний
дек	декоративний
вщі	з високою щільністю покриття
сщі	з середньою щільністю покриття
влеж	високолежкий
слеж	середньолежкий
вц	високоцукристий
сц	середньоцукристий
вкр	висококрохмальний
скр	середньокрохмальний
вл	високоолійний
сл	середньоолійний
бол	безопійний
лік	лікарський
о	низькоеруковий
++	високоеруковий
о+	середньоеруковий
нгл	низькоглюкозинолатний
сгл	середньоглюкозинолатний
цін	цінний
ф	філер
зрош	на зрошуваних землях
слн	сильний
слн	сильний

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2007 р.

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації			Заявник / Підтримува	Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиг- лості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посу- хи							поля- ган- ня	осипання	хвороб	

Сільськогосподарські: злаки

Пшениця м'яка озима - 134

Астел	01007037	2006	404 /	СЛ	7	зерн	ср	7-9	7-9	7-9	8-9	7-9	сли
Апогей Луганський	® 02007020	2006	309 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	8	6-8	8-9	7-8	сли
Азінброс одеський	86007002	1990	378 / 378	СЛ	7	зерн	ср	7-8	5	5	7-9	5	сли, зрош
Білоцерківська паніварнікова	® 94007028	1999	1097 / 1097, 335	ЛП	7	зерн	рс	7	5	7-9	5	5	цін
Білюсінка	01007017	2006	315 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-9	8-9	8-9	8-9	7-9	сли
Белюга І	59007001	1959	25 / 1112	С	5	зерн	ср	<5	5	7-9	7-9	5	сли
Богдана	® 03007018	2006	355 /	СЛП	8-9	зерн	сс	7-9	8-9	8-9	8-9	7-9	сли
Батько	02007029	2006	25 / 1112	С	5-7	зерн	рс	5-7	8	8-9	8-9	7-9	сли
Василіна	® 01007038	2005	404 / 404	ЛП	7-8	зерн	сс	8-9	7-8	8	8	8-9	сли
Вигязь	® 93007003	1998	520 / 520	С	5	зерн	рс	7-8	7-9	5	7-9	5	цін
Віта	03007026	2007	25 / 1112	СЛ	7	зерн	ср	7-9	8	8-9	8-9	7	цін
Вікторія одеська	® 93007001	1998	378 / 378	Л	9	зерн	ср	6-7	7	5	7-9	5	цін
Веста	00007004	2003	341 / 341	ЛП	9	зерн	сс	7	5	7-9	7-9	5	цін
Вдала	® 03007009	2006	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7-8	сли
Володарка	02007006	2005	355 /	ЛП	7-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	8-9	цін
Веснянка	02007007	2005	355 /	СЛП	6-7	зерн	рс	7	8	8	8-9	7-8	сли
Господиня	04007006	2007	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7	8	8-9	8-9	5-7	сли
Глибовчанка	98007008	2002	388 /	Л	7	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	сли
Донецька 48	93007045	1997	315 /	СЛ	9	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	цін
Дар Луганщини	01007005	2005	309 /	С	7	зерн	ср	8-9	8	8	8	7	сли
Дончанка 3	92007046	1995	315 /	С	5	зерн	ср	7	7-9	5	7-9	5	сли
Деметра	® 00007005	2005	341 / 1025, 341	ЛП	7-8	зерн	сс	7	7	8-9	9	7-8	цін
Доля	97007003	2001	312 /	С	7	зерн	рс	<5	7-9	7-9	7-9	5	цін
Дріада І	® 00007001	2004	1123 / 1123	С	9	зерн	рс	7-9	7-9	7-9	7-9	7	сли
Донецький сюрізіз	01007023	2006	212 / 1112	СЛ	7	зерн	рс	7-9	7-9	8-9	8-9	7-9	сли

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Дальницька	00007015	2005	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7	8	8	8-9	8	снп
Диканька	® 02007013	2005	386 /	Л	7	зерн	сс	8-9	7	8	9	8	снп
Добірна	02007008	2005	355 /	СЛП	7	зерн	сс	7	8	8	9	8-9	снп
Донецька 46	86007014	1990	315 /	СЛ	7	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	снп
Елегія	® 99007003	2003	335 /	ЛП	7	зерн	сс	7	7	7-9	7-9	7	пін
Єрмак	01007025	2005	212 / 1112	СЛ	7-9	зерн	ср	8	8	8-9	8	8-9	снп
Зразкова	® 03007005	2007	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7	снп
Зерноградка 11	01007028	2005	212 / 1112	С	8	зерн	ср	7-8	8-9	8-9	9	8-9	снп, зрощ
Зіра	01007001	2005	340 /	СЛ	7	зерн	ср	7-8	8	7-8	8-9	8	пін
Знахідка одеська	® 96007005	2001	378 / 378, 378	С	7	зерн	рс	>5	7-9	6-7	7-9	5	снп
Збруч	90007012	1994	355 /	Л	5-7	зерн	сс	5-7	7	7	7-9	7	пін
Золотоколоса	® 03007020	2006	355 /	СЛП	9	зерн	сс	7	7	8-9	9	7-9	пін
Зміна	® 03007006	2007	922 /	С	7-9	зерн	ср	5-7	8-9	8-9	8-9	7	снп
Землячка одеська	® 03007007	2006	922 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8-9	8-9	8-9	7-8	пін
Зустріч	® 98007010	2002	378 / 378	СЛ	9	зерн	ср	5	7-9	7-9	7-9	5	снп
Застава одеська	® 98007011	2002	378 /	ЛП	7	зерн	ср	5-6	7-9	5	7-9	5	снп
Зимоярка	® 04007010	2007	355 /	Л	7-9	зерн	сс	<5	7-8	9	8-9	7	снп
Київська 7	94007006	1998	355 /	П	7	зерн	ср	7	5	5	7-9	5	лф
Київська остиста	92007018	1995	355 /	ЛП	5	зерн	сс	5	5	7-9	7-9	5	снп
Колумбія	® 00007010	2003	355 / 341	СЛП	9	зерн	рс	5-6	5	7-9	7-9	7-9	снп, зрощ
Київська 8	97007014	2001	355 /	СЛП	9	зерн	сс	7-8	7-9	7-9	7-9	5	снп
Куяльник	® 99007007	2003	378 /	СЛ	9	зерн	ср	5	7-9	7	7-9	7	снп
Коломак 5	93007039	1997	386 / 386	Л	7	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	снп
Кірія	00007017	2004	378 /	С	8-9	зерн	ср	7	8	8-9	9	7	снп
Красуня одеська	93007011	1997	378 / 378	СЛ	7	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	снп
Комплімент	® 03007022	2007	807 /	П	7-9	зерн	сп	5	7-8	8-9	9	7-9	пін
Коломак 3	93007038	1997	386 / 386	СЛП	7	зерн	сс	7-8	5	7-9	7-9	5	снп
Кольчуга	® 03007011	2007	1192 /	С	5-7	зерн	рс	7-8	8	8-9	9	7	пін
Краснодарська 99	03007027	2006	25 / 1112	С	7-8	зерн	рс	7	8	8-9	8-9	7-8	снп

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресет-рації			Заявник / Підтримувач	Продук-тивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	поля-гання						осипання	хвороб		
Красота	02007030	2007	25 / 1112	Л	7-9	зерн	ср	7-8	7-8	8-9	8-9	7	слн
Крижинка	® 98007004	2002	341 / 341	ЛП	9	зерн	сс	8-9	5	5	7-9	5	цін
Копилівчанка	98007007	2003	345 / 345	ЛП	5	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	цін
Ларе	® 00007020	2005	926 / 926	П	7-8	зерн	сс	6	7	8-9	9	8-9	цін
Лузанівка одеська	® 97007007	2001	378 / 378	С	7	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	слн
Лузанчанка	01007004	2005	309 /	С	7-8	зерн	ср	8-9	8	7-8	8-9	8	слн
Леля	® 94007022	2000	378 / 378	С	7	зерн	ср	6	7-9	5	7-9	5	слн
Левада	® 01007007	2005	386 /	Л	7-8	зерн	сс	8-9	7	8	9	8	слн
Ліона	01007019	2005	378 /	СЛ	8-9	зерн	ср	6-7	8	8	8	8	слн
Либідь	® 03007021	2006	335 /	СЛП	7-9	зерн	сс	7-9	7-8	7-9	7-9	7	слн
Ласуня	02007009	2007	355 /	СЛ	5-7	зерн	сс	7-9	7-8	9	8-9	7	слн
Лист 25	® 03007023	2007	1059 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7	цін
Мирхад	® 95007004	2000	341 / 341	П	7	зерн	сс	5	5	7	7-9	7-9	ф
Мирич	94007013	1999	341 / 341	П	7	зерн	сс	5	5	5	7-9	5	лф
Миронівська 65	® 95007005	2000	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс	6-7	5	5	7-9	5	цін
Миронівська 66	® 95007006	2000	341 / 341	П	7	зерн	сс	6	5	5	7-9	5	цін
Миронівська 30	92007042	1995	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс	6	5	5	7-9	5	ф
Миронівська 33	94007014	1998	341 / 341	П	7	зерн	сс	6	5	5	7-9	7-9	лф
Миронівська 61	86007024	1989	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	цін
Миронівська остиста	87007027	1992	341 / 341	ЛП	5	зерн	сс	6-7	5	5	7-9	5	цін
Миронівська 67	98007003	2002	341 / 341	П	9	зерн	сс	6	5	5	7-9	5	цін
Миронівська ранньостигла	® 98007012	2002	341 / 341	ЛП	5	зерн	рс	6	5	5	7-9	5	цін
Миронівська 808	61007001	1963	341 /	ЛП	5	зерн	сс	7-9	5	5	7-9	7	слн
Національна	01007016	2005	350 /	ЛП	7	зерн	сс	8-9	8	8-9	8	8	цін
Нікопія	® 95007003	2000	378 / 378	С	9	зерн	ср	6-7	7-9	7-9	7-9	5	слн
Находка 4	93007014	1996	411 /	С	7	зерн	ср	5	7-9	5	7-9	5	цін,зрош
Нела	94007001	1998	946 /	П	9	зерн	сп	5	5	7-9	7-9	5	цін
Олеся	® 97007009	2001	1097 / 335, 1097	ЛП	9	зерн	ср	6-7	7-9	7-9	5	5	цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-тації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Одеська 267	93007033	1997	378 / 378	СЛ	9	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	елн
Оксана	01007013	2007	378 /	С	5-7	зерн	ср	5-7	8	8-9	9	7	цпн
Пошана	® 00007018	2004	378 / 378	С	7-9	зерн	ср	5	7-9	7	7-9	7	елн
Переяславка	01007014	2004	355 / 341	СЛП	7-9	зерн	ср	7-8	7	7-9	9	7-9	елн
Победа 50	97007024	2005	25 / 1112	СЛ	7	зерн	ср	6-7	8	7-8	9	7	елн
Подольська	® 00007009	2003	355 / 341	СЛП	9	зерн	ср	7-8	7-8	7-8	7-9	7	елн
Повага	® 99007008	2003	378 /	СЛП	9	зерн	ср	6-7	8	8	9	7-8	елн, зрпн
Панна	® 99007006	2003	378 /	С	5	зерн	ср	5-6	7-9	6-7	7-9	7	елн
Палма	96007015	2002	720 / 1112	ЛП	9	зерн	сп	5	5	7-9	7-9	7-9	цпн
Писанка	® 01007011	2006	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8-9	7-8	8-9	7-9	елн
Почесна (Престиж)	03007038	2007	209 / 1112	СЛ	7	зерн	ср	7-9	8-9	8-9	8-9	7	елн
Перлина лісостепу	® 98007013	2001	335 / 1097, 335	ЛП	9	зерн	сс	7	5	5	7-9	5	цпн
Поліська 90	90007028	1994	345 / 345	ЛП	5	зерн	сс	7	5	5	7-9	5	цпн
Понелюшка	® 03007004	2007	315 /	СЛ	7-9	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7	елн
Пивна	® 03007019	2006	355 /	ЛП	8-9	зерн	сс	7-8	7-8	8-9	8-9	7-9	ф
Ремеслівна	® 00007007	2004	341 / 341	СЛП	7-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	9	7-8	елн
Ренан	92007049	2006	1155 /	Л	7	зерн	сс	5-7	7	9	8-9	8-9	елн
Росинка тарасівська	03007036	2007	209 / 1112	С	7-8	зерн	ср	7-8	8	7-8	8-9	7	елн
Росинка	® 02007040	2007	412 /	С	7-8	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7	елн
Сніжана	00007003	2004	341 / 341	ЛП	5	зерн	сс	7-9	5	7-9	7-9	7	філср
Столична	01007003	2005	345 / 345	ЛП	7-9	зерн	сс	7-8	7	7-8	8	8-9	цпн
Станична	01007033	2005	212 / 1112	С	7	зерн	рс	7	8	8	8	8	елн
Співанка	00007019	2005	312 /	С	7-9	зерн	ср	5-6	8	8	8	7-8	елн
Селянка	® 97007008	2001	378 / 378	С	9	зерн	ср	5-6	7-9	5	7-9	5	елн
Сирена одеська	® 97007006	2002	378 / 378	С	7	зерн	ср	6-7	7-9	5	7-9	5	елн
Смулянка	01007015	2004	355 / 341	СЛП	9	зерн	ср	6	7-9	9	7-9	7-9	елн
Супутниця	® 02007019	2006	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	8-9	8-9	8-9	7-9	елн
Саскія	98007017	2002	946 /	ЛП	9	зерн	сп	5	5	7-9	7-9	7-9	цпн
Снігурка	® 04007012	2007	355 /	СЛ	8-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	7	елн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Скарбіння	04007003	2007	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	8	7-8	8-9	8-9	7	сли
Світланок I	® 02007001	2006	1124 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	7-9	8-9	8-9	7-9	сли
Скіф'янка	89007039	1993	25 / 1112	С	7	зерн	ср	5	7-9	7-9	7-9	5	сли,зрош
Тронка	00007032	2005	1124 / 1159, 659	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	8	8-9	8	8	сли
Українка Полтавська	® 94007026	2000	294 / 308, 294, 295, 386, 513, 511	Л	7	зерн	сс	8	5	5	7-9	5	сли
Українка одеська	92007002	1995	378 / 378	СЛП	7	зерн	ср	7	7-9	5	7-9	5	цін
Фантазія одеська	92007056	1996	378 / 376, 378	С	9	зерн	ср	6-7	7-9	7-9	7-9	5	сли
Фарандоль	02007027	2006	1155 /	ЛП	7-9	зерн	сс	>5	7	9	8-9	8-9	цін
Фаворитка	02007010	2005	355 /	ЛП	8	зерн	сс	7	7	8-9	8-9	8-9	цін
Фінгт	02007028	2007	25 / 1112	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7	сли
Хуртовина	® 04007011	2007	355 /	СЛ	8-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	7	сли
Харківська 105	96007010	2001	404 / 404	Л	7	зерн	сс	7	5	<5	7-9	5	ф
Херсонська 99	99007011	2005	411 /	С	7	зерн	ср	7	8	8	8-9	7-8	цін, зрош
Херсонська безоста	97007005	2002	411 /	СЛП	9	зерн	ср	7	5	7-9	7-9	5	цін,зрош
Харківська 96	95007017	1999	404 / 404	Л	7	зерн	сс	7	5	5	7-9	5	лф
Херсонська остиста	92007032	1995	411 /	С	7	зерн	рс	5-6	7-9	7-9	7-9	5	цін,зрош
Харус	® 99007004	2002	404 / 404	СЛ	9	зерн	сс	7-8	7	7-9	7-9	7-8	цін
Херсонська 86	87007046	1991	411 /	С	7	зерн	рс	6	5	5	7-9	5	цін
Циганка	94007005	1998	355 /	ЛП	7	зерн	пе	<5	5	5	7-9	7-9	цін
Шестоналівка	® 03007001	2007	1124 / 1159	СЛ	8-9	зерн	рс	8	8	8-9	8-9	7	сли
Юна	89007044	1993	25 / 1112	СЛ	7	зерн	ср	5	7-9	7-9	7-9	5	сли
Ятрань 60	97007010	2001	355 /	СЛП	9	зерн	сс	6-7	7-9	7-9	7-9	5	сли
Ясочка	01007039	2006	335 /	Л	8	зерн	сс	7-8	7-8	8-9	8-9	7-9	цін

Пшениця м'яка яра - 28

Ажурная	® 03007028	2006	920 /	ЛП	6	зерн	сс	-	7	8	8-9	7-9	сли
Аранка	® 04007027	2007	888 /	СЛП	7-9	зерн	сс	-	7-8	8-9	8	7	сли
Вітка	® 99007015	2003	345 / 345	П	7	зерн	рс		5	7	7-9	7	цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-тації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Венера	03007013	2005	879 / 879	Л	7	зерн	ср	-	7	9	8	8	цпн
Героїня	® 02007036	2005	404 / 404	С	5-7	зерн	сс	-	7	9	8	7-8	слн
Дніпрянка	79007052	1982	345 / 345	Л	7	зерн	рс		5	5	7-9	5	слн
Епод	® 03007029	2006	341 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8	8-9	8-9	7-9	цпн
Елегія миронівська	® 00007023	2004	341 / 341	ЛП	7-9	зерн	сс		7	7	7-9	7	слн
Колективна 3	® 96007002	2000	341 / 341	Л	7	зерн	сс		5	7-9	7-9	7	цпн
Краса Полісся	® 00007022	2003	430 / 1112, 430	П	7	зерн	сс		5	7-9	7-9	7	цпн
Катюша	90007050	1996	305 /	Л	7	зерн	рс		5	5	7-9	7	ф
Легуан	95007032	2000	946 /	Л	9	зерн	сс		5	7-9	7-9	7-9	цпн
Миронівчанка	95007021	1999	341 / 341	Л	7	зерн	сс		5	7-9	7-9	7	цпн
Миронівська яра	75007040	1978	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс		5	5	7-9	5	цпн
Недра	® 03007034	2007	345 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	7-8	8	8-9	7	цпн
Печерянка	00007025	2004	305 /	Л	5	зерн	сс	-	7	7	7-9	7	цпн
Рання 93	93007063	1996	345 / 345	ЛП	7	зерн	ср		5	7	7-9	7	цпн
Скороспілка 98	97007018	2001	345 / 345	Л	7	зерн	ср		5	7-9	7-9	7	ф
Сюїта	® 04007047	2007	341 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8-9	6-8	8-9	7	слн
Стависька	® 04007042	2007	350 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8	7-8	8-9	7	цпн
Скороспілка 95	95007022	2000	345 / 345	П	7	зерн	рс		5	7	7-9	7	цпн
Срібнянка	® 03007031	2006	1112 / 1112	Л	7-8	зерн	сс	-	7-8	8-9	8-9	7-9	ф
Скороспілка 99	® 99007010	2003	345 / 345	ЛП	7	зерн	рс		5	7	7-9	7	цпн
Трізо	® 01007036	2004	807 /	ЛП	7-9	зерн	сс	-	7	7-9	7-9	7-9	цпн
Харківська 30	® 99007009	2003	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7-9	5	7-9	7	цпн
Харківська 26	96007019	2000	404 / 404	СЛ	7	зерн	сс		5	7-9	7-9	7	цпн
Харківська 28	® 98007021	2002	404 / 404	Л	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7	цпн
Ясна	® 04007001	2005	279 /	ЛП	7-9	зерн	сс		7	9	8	8-9	ф
Пшениця тверда озима - 12													
Буштин	® 03008001	2007	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	5	8	8-9	8-9	7	х
Гардемарин	02008001	2006	378 /	СЛ	7	зерн	ср	5	8	8-9	9	7-9	х

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м вико- ристан- ня	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Лагуна	01008001	2005	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	4-5	7	7-8	8	8	х
Алії парус	89008001	1994	378 / 378	С	9	зерн	ср	5	5	5	7-9	5	х
Айсберг одеський	85008001	1990	378 / 378	С	7	зерн	ср	5	7	5	7-9	5	х
Аргонавт	98008001	2002	378 /	С	7	зерн	ср	<5	5	5	7-9	5	х
Дельфін	94008006	2000	378 / 378	С	7	зерн	ср	<5	5	5	7-9	5	х
Дніпряна	94008002	2000	411 /	СЛ	9	зерн	ср	5	5	5	7-9	5	х
Золоте руно	00008001	2004	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	5	7	8-9	8-9	7	х
Леукурум 21	97008003	2001	25 / 1112	С	9	зерн	ср	5	5	5	7-9	5	х
Перлина одеська	99008001	2002	378 /	С	9	зерн	ср	5	7-9	7-9	7-9	5	х
Харківська 32	92008005	1997	404 / 404		7	зерн	сс	>5	5	5	7-9	5	х

Пшениця тверда яра - 11

Букурія	00008004	2004	430 / 1112, 430	П	5	зерн	ср		5	7-9	7-9	7	х
Дарина	01008006	2004	309 /	Л	7	зерн	ср		7-9	7	7-9	7	х
Ізольда	00008003	2004	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс		7	7	7-9	7	х
Кучумовка	04008001	2007	404 /	СЛ	7-8	зерн	ср	-	8-9	8	8-9	7	х
Неодор	92008003	1996	943 /	СЛ	9	зерн	сп		5	7-9	7-9	7-9	х
Спадщина	03008003	2006	404 /	СЛ	5-7	зерн	сс		8	7-8	8-9	7-9	х
Харківська 41	99008002	2003	404 / 404	Л	7	зерн	сс		7-9	7	7-9	7	х
Харківська 27	94008005	1999	404 / 404	СЛ	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7	х
Харківська 23	91008005	1995	404 / 404	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5	х
Харківська 39	98008002	2002	404 / 404	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	7	х
Чайдо	00008002	2004	404 / 404	Л	7	зерн	сс		7	7	7-9	7	х

Жито озиме - 28

Богуславка	91003010	1995	430 /	СЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Боротьба	87003001	1993	429 /	СЛП	7	зерн	сс	7	7	5	5	5	зерн
Воля	91003008	1996	430 /	П	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Верхняцьке 94	96003003	2000	422 /	Л	7	зерн	сс	7	7	5	5	5	зерн
Велитень	01003002	2005	422 /	ЛП	7	зерн	сс	8	7	7	7,5	7	зерн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Верхняцьке 32	68003002	1976	422 /	СЛП	7	зерн, сил	сс	5	5	5	5	5	зерн
Древлянське	93003005	1997	808 /	ЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Дозор	® 00003001	2005	430 / 430	ЛП	7	зерн	сс	7	7	8	7	8	зерн
Інтенсивне 99	99003002	2002	345 / 345	ЛП	7	зерн	сс	7	5	7	5	5	зерн
Інтенсивне 95	95003005	1999	345 / 345	П	7	зерн	сс	7	7	5	7	5	зерн
Ірина	01003001	2004	307 /	ЛП	8	зерно	сс	8	8	7	8	8	зерно
Клич	00003002	2003	320 /	П	7	зерн	сс	7	7	5	7	5	зерн
Київське 93	92003001	1997	345 / 345	Л	7	зерн	сс	7	7	5	7	5	зерн
Київське 90	89003002	1995	345 / 345	ЛП	7	зерн	сс	7	5	5	5	5	зерн
Київське кормове	93003002	1998	350 /	Л	8	корм	рс	7	7	7	7	6	скліт
Матадор	® 01003004	2004	926 / 926	ЛП	8	зерно	сс	7	8	7	8	7	зерн
Нива	76003002	1981	422 /	СЛ	7	зерн, сил	сс	7	7	5	5	5	зерн
Ніка	86003001	1992	320 /	П	7	зерн	сс	7	5	5	5	5	зерн
Полі 2	01003003	2005	422 /	ЛП	7	зерно	ср	7,5	7,5	7	7	7,5	зерн
Паллада	® 91003009	1996	307 / 307	ЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Полікросне	99003003	2003	422 /	П	9	зерн	сс	7	7	7	7	7	зерн
Синтетик 38	® 03003003	2006	430 /	СЛП	8	зерн	сс	8	7	7	7	7	зерн
Сіверське	® 03003001	2007	345 /	СЛП	5	зерн	сс	8	7	5	5	7	зерн
Хасто	® 99003001	2002	404 / 404	Л	9	зерн	сс	7	7	7	7	5	зерн
Харківське 98	94003004	1999	404 / 404	СЛП	7	зерн	сс	7	7	5	7	5	зерн
Хамарка	04003001	2007	404 / 1112	С	7	зерн	ср	7	7	7	7	7	зерн
Хлібне	® 03003002	2007	430 /	СЛП	7	зерн	сс	7	7	7	7	7	зерн
Юр'вець	04003002	2007	404 / 404	СП	7	зерн	сс	7	7	6	7	5	зерн
Жито яре	-	2											
Веснянка	93003001	1997	305 /	ЛП	7	корм	рс		7	7	7	7	скліт
Тетянка	94003005	1997	305 /	ЛП	7	корм	сс		7	7	7	7	скліт
Тритикале озиме	-	24											
Амфідиплоїд 52	95011010	2000	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс	7	5	5	7-9	7-9	зерн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
Амфідинлоїд 51	97011001	2000	404 / 404	СЛП	7	корм	сс	7	7	5	7	5	скліт
Амфідинлоїд 44	89011009	1993	404 / 404	СЛП	8	корм	сп	7	7	7	7	6	вкліт
А/ДМ 8	93011006	1998	341 / 341	П	7	зерн	сс	5	5	5	7-9	7-9	зерн
А/ДМ 11	95011014	2000	341 / 341	Л	9	зерн	сс	>5	5	7-9	7-9	7-9	зерн
А/ДМ-9	93011007	2002	341 / 341	СЛП	8	корм	сс	7	8	7	7	7	вкліт
Алкід	02011002	2006	736 /	СЛП	7-8	зерн	сс	8-9	8-9	7-8	8-9	8-9	зерн
А/ДМ 5	89011002	1993	341 / 341	С	7	зерн	сс	5	5	5	7-9	7-9	зерн
А/ДМ 4	89011001	1994	341 / 341	СЛП	7	зерн	сс	5	5	5	7-9	7-9	зерн
Амфідинлоїд 256	98011004	2001	404 / 404	СЛП	9	зерн	сс	7	7-9	7-9	7-9	7-9	зерн
Благодатний	01011005	2005	309 /	С	7	зерн	сп	7-8	8	8-9	8	8	зерн
Гарне	® 01011008	2004	404 / 404	ЛП	7-9	зерн	сс	9	7	9	9	7-9	зерн
Зеніт одеський	92011001	1995	378 / 378	СЛП	7	зерн	сп	5	7-9	5	7-9	7-9	зерн
Київське раннє	95011007	1998	355 /	ЛП	7	зерн	рс	5	5	7-9	7-9	7-9	зерн
Ладне	99011004	2002	404 / 404	ЛП	9	зерн	сс	>5	7-9	7-9	7-9	7-9	зерн
Мудрець	02011006	2007	25 / 1112	Л	7-8	зерн	сп	8-9	8-9	8-9	8-9	8	зерн
Поліський кормовий	01011007	2002	345 / 345	ЛП	7	корм	сп	7	5	5	6	6	скліт
Прорив	02011005	2006	25 / 1112	СЛ	7-8	зерн	сп	8-9	8-9	8-9	8-9	7-9	зерн
Пансуєвська	® 03011003	2005	376 /	СЛП	7-9	корм,зерн	сс	7-9	7-9	7-9	9	7-9	біл. вкліт,зерн
Поліський 7	98011003	2002	345 / 345	Л	9	зерн	сс	>5	5	5	7-9	7-9	зерн
Раннє	® 03011002	2007	404 /	СЛП	8-9	зерн	сс	9	8	7-8	8-9	8	зерн
Славетне	01011002	2004	430 /	ЛП	7	зерн	сс	7-9	7	7	7-9	7-9	зерн
Сувенір	® 98011002	2002	378 /	Л	7	зерн	сс	5	7-9	5	7-9	7-9	зерн
Союз	02011004	2006	25 / 1112	СЛ	7-8	зерн	сп	7-8	8-9	8-9	8-9	7-9	зерн

Тритикале яре

- 11

Аїст харківський	91011001	1995	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7	7	7	9	зерн
Арсенал	99011005	2002	920 /	П	7	зерн	сс		7	7-9	7	7-9	зерн
Вікторія	00011004	2003	430 /	П	7	зерн	сс		7	7	7	7-9	зерн
Жайворонок харківський	® 98011005	2002	404 / 404	Л	7	зерн	рс		7	7	7	7-9	зерн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
Згурівський	® 03011009	2007	1027 /	П	7-8	зерн	сс	-	8	8-9	8-9	7	зерн
Кобзар	® 03011005	2007	1159 /	ЛП	7	зерн	сс	-	8	8-9	8-9	7	зерн
Коровай харківський	® 04011006	2007	404 /	СЛП	7-8	зерн	сс	-	8-9	8-9	8-9	7	зерн
Лосинівське	® 04011005	2007	350 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8	8-9	8-9	7	зерн
Микола	® 02011007	2006	1112 /	С	6	зерн	сс	-	7	9	9	7-9	зерн
Соловей Харківський	® 03011006	2006	404 /	СЛП	7-8	зерн	сс	-	8-9	8-9	8-9	7-9	зерн
Хлібодар харківський	® 00011005	2003	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7	7	7	7-9	зерн

Овес ярий

- 17

Аркан	03005001	2007	371 /	Л	7-8	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Анг	02005001	2006	371 /	П	7	зерн	сс		7-9	7-9	9	5-7	цін
Декамерон	03005002	2007	422 /	ЛП	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Львівський 1	80005007	1983	371 /	Л	5	зерн	сп		5-7	5-7	5-7	5	цін
Нестун	01005003	2005	430 /	П	7-9	зерно	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Ранньостиглий	96005001	2000	950 /	П	7	зерн	рс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Саргон	® 04005003	2007	376 /	Л	7-8	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Самуель	® 04005001	2007	1174 /	Л	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Саломон	® 04005002	2007	1174 /	Л	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Чернігівський 28	92005014	1996	429 /	СЛП	7-9	корм	сс		7	7	7	>5	склп
Чернігівський 27	86005014	1990	429 /	СП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Абель	96005003	2000	946 /	П	5-7	зерн	ср		5-7	7-9	5-7	5-7	цін
Синельниківський 68	93005001	1996	340 /	Л	7	зерн	ср		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Славутич	95005002	2000	950 /	П	7	зерн	ср		5	5-7	5-7	5-7	фж
Деснянський	95005001	1998	430 /	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Райдужний	98005002	2001	430 /	П	5-7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Синельниківський 1321	91005009	1994	311 /	ПЛ	5	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	цін

Ячмінь озимий

- 23

Абориген	® 02012011	2007	378 /	С	7	зерн	ср	7	7	8	8	8	зерн
Бемір 2	81012002	1987	341 / 341	ЛП	5	зерн	ср	5	5	5	7	5	зерн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Борисфен	® 02012015	2006	341 /	ЛП	8	зерн	рс	7	7	7	7	8	зерн
Достойний	® 02012002	2006	378 /	СЛ	7	зерн	рс	7	8	7	8	8	зерн
Добриня 3	01012005	2005	25 / 1112	СЛП	7	зерн	сс	7	8	7	8	8	зерн
Дністер	01012002	2002	371 /	СЛП	9	корм	рс	7	8	7	8	8	вкліт
Зимовий	® 00012006	2005	378 /	СЛП	7	зерн	сс	7	8	7-8	8	8	зерн
Кормовий	93012019	1997	371 /	СП	8	корм	сс	7	7	7	7	7	скліт
Ковчег	® 03012001	2007	341 /	С	7	зерн	ср	5	7	7	7	7	зерн
Луран	97012009	2000	946 /	СЛП	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	зерн
Метелиця	® 00012004	2003	378 /	СЛ	7	зерн	ср	5	7	7	7	5	зерн
Михайло	97012019	2001	25 / 1112	СЛП	7	зерн	ср	5	7	7	7	5	зерн
Морозко	04012023	2007	25 / 1112	С	7	зерн	ср	5	8	8	7	7	зерн
Миронівський 87	92012018	1995	341 / 341	СЛП	7	зерн	сс	5	7	5	7	5	зерн
Основа	90012008	1994	378 / 378	С	7	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Павлілун 77	® 94012018	1999	341 / 341	П	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	зерн
Радон	90012009	1994	341 / 341	ЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Росава	83012006	1988	378 / 378	СЛП	7	зерн	сс	5	7	5	5	5	зерн
Селена стар	® 02012013	2006	922 /	СЛП	8	зерн	рс	7	7	7	5	7	зерн
Тамань	91012006	1995	378 / 378	СЛ	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Трудівник	® 02012001	2006	378 /	СЛП	8	зерн	сс	7	8	7	7	8	зерн
Фантаст	04012024	2007	25 / 1112	С	5	зерн	ср	5	5	7	7	5	зерн
Широколистий	82012028	1987	371 /	СП	7	корм	сс	7	6	6	7	6	скліт
Ячмінь ярий			- 81										
Аскольд	97012020	2001	341 / 341	П	5-7	зерн	сс		5	5-7	5-7	5-7	пв
Аннабель	® 01012018	2004	926 / 926	П	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Аланг	94012008	1998	378 / 378	С	5-7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5	фж
Асторія	98012025	2002	1048 / 1174	ЛП	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Аспект	® 03012011	2007	404 /	ЛП	5-7	зерн	ср		5-7	5-7	5-8	5-8	пв
Бадьорий	96012004	1999	404 / 404	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	пв

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
Барке	® 98012011	2003	1149 /	ЛП	7-9	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Вінницький 28	00012016	2004	306 / 791	П	7	зерн	ср		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Віват	® 04012006	2007	1112 / 1112	П	7-8	зерн	пв		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Варіант	® 00012013	2004	430 / 430	П	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Вакула	® 00012005	2003	378 /	СЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Віскор	03012003	2005	1141 /	Л	7	зерн	п		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Водограй	® 02012012	2005	378 / 378	ЛП	9	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Галактик	® 94012015	1999	378 / 378	СЛП	5-7	зерн	сс		7-9	7-9	5-7	5-7	пв
Геліос	® 03012008	2006	922 /	СЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	9	5-7	пв
Гегьман	® 98012020	2001	378 / 378	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Дніпровський 257	94012013	1998	311 /	Л	5	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	фж
Донецький 14	97012003	2000	315 /	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5	пв
Джерело	96012003	1999	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5-7	пв
Донецький 12	96012001	1999	315 /	СЛ	5	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Данута	® 00012017	2003	926 / 926	СЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Джерзей	® 96012013	2000	740 / 740	СЛП	7-9	зерн	сп		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Докучаєвський 15	98012023	2003	405 /	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	пв
Донецький 15	98012017	2002	315 /	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	5-7	5	пв
Ефект	® 98012006	2002	404 / 404	П	5-7	зерн	сп		5	5-7	5-7	5	пв
Етикет	® 02012008	2006	404 / 404	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	7	пв
Жозефін	03012006	2006	1048 /	ЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Зоряний	® 97012004	2000	378 / 378	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	пв
Здобуток	® 03012015	2007	404 /	ЛП	5-7	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Звершення	94012010	1997	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	пв
Командор	® 04012012	2007	378 /	ЛП	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Корона	98012002	2000	1174 /	Л	7-9	зерн	ср		5-7	7-9	5-7	5-7	пв
Казковий	® 01012010	2005	378 /	ЛП	9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	7-9	пв
Калікс	01012001	2004	1048 / 1174	П	7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Караг	94012024	1998	307 /	П	7	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	фж

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Козак	00012009	2004	405 /	ЛП	7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	7-9	пв
Княжий	00012008	2003	371 / 371	П	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Ксанаду	® 02012016	2005	926 / 926	ЛП	9	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Канган	® 89012009	1994	306 / 306	П	5-7	зерн	сс		5	5-7	5-7	5-7	пв
Лотос	97012002	2000	306 /	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Лорант	® 02012007	2006	306 /	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	7	5-7	пв
Миронівський 86	91012015	1995	341 / 341	Л	7	зерн	ср		5-7	5-7	7-9	5	пв
Миронівський 92	93012014	1996	341 / 341	СЛ	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Мономах	® 03012016	2007	405 /	Л	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7	пв
Мальз	® 04012007	2007	946 /	ЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Надія	94012003	1998	371 /	П	5	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	пв
Неофіт	® 94012017	1999	306 / 306	ЛП	5	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Носівський 21	® 97012014	2002	430 /	Л	7	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5	пв
Незабудка	® 03012010	2007	306 /	П	5-7	зерн	п		5-7	5	5-7	5-7	пв
Оболонь	® 98012021	2001	378 / 378	ПЛ	7-9	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Подolian	91012007	1995	306 /	П	7	зерн	сп		7-9	5-7	5-7	5	пв
Неяс	97012012	2001	946 /	СЛП	7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Південний	® 98012004	2001	378 / 378	СЛ	7	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Персей	® 00012012	2004	341 / 341	П	7	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5	фж
Приазовський 9	® 04012005	2006	212 / 1112	Л	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	7	5-7	фж
Подільський 14	87012038	1990	306 /	Л	5	зерн	сп		5-7	5-7	5-7	5	пв
Престиж	® 02012006	2004	465 /	П	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	7-9	пв
Пасадена	® 98012009	2003	824 / 824	ЛП	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	5-7	5-7	пв
Прерія	89012017	1992	378 / 376, 378	С	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	цн
Соборний	® 00012011	2004	341 / 341	П	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Сталкер	93012009	1997	378 / 378	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Сонцедар	® 03012007	2007	341 /	ЛП	7-9	зерн	сп		7-9	5-7	7-9	5-7	пв
Стиг	94012007	1997	350 /	Л	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5	пв
Санктрум	® 04012001	2006	376 /	ЛП	7	зерн	сс		7	7-9	7-9	5-7	пв

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
СН 28	96012007	2000	356 /	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5	фж
Селеніт	® 01012008	2004	378 / 922, 378	ЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Скарлет	98012010	2001	1149 / 1159, 1174	СЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Султан	98012024	2002	1048 /	СЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Скіф	® 99012004	2003	306 / 306	П	5	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	пв
Тройчан	® 04012011	2007	376 /	Л	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Терен	95012002	1998	306 /	ЛП	5	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Толар	98012003	2001	946 /	ЛП	7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Тюрінгія	® 96012015	2000	926 / 926	П	7	зерн	сс		5	5-7	5-7	5-7	пв
Токада	® 03012017	2007	824 /	ЛП	7-9	зерн	п		7-8	7-9	7-9	5-7	пв
Табора	98012013	2001	1048 /	СЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Фенікс	97012005	2000	404 / 404	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5	фж
Філадельфія	® 03012018	2006	824 /	ЛП	7-9	зерн	сп		5-7	7-9	7-9	7-9	пв
Цезар	95012003	1998	341 / 341	ЛП	7	зерн	сп		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Чарівний	® 01012007	2004	378 /	ЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Чудовий	® 99012003	2002	378 / 378	Л	7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Юкатан	® 04012021	2007	341 /	Л	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв

Кукурудза

- 322

Агро Стар	98004077	2001	806 /	СП	9	зерн	рс (150)	>5	7	7		7	
Борисфен 191 МВ	96004001	1999	411 /	Л	7	зерн	рс (190)	7	5	7		7	
Бліц 160 МВ	® 02004050	2006	962 /	Л	7-8	зерн	р/с/160/	5-7	5-7	8.8		9.0	
Бц 178	05004024	2007	993 /	ЛП	8,5	зерн	р/с/170/	8-9	9.0	9.0		7-8	
Буг СВ	04004043	2007	345 /	Л	7-8	зерн	р/с/180/	7,5	8,6	8,9		7-8	
Гомера	01004002	2003	806 /	ЛП	9	зерн	рс (190)	7	7	7		7	
Гран 220	00004017	2003	736 /	Л	7	зерн	рс (190)	5	5	5		7	
Говерла МВ	03004014	2005	345 / 345	СЛ	9	зерн	р/с(190)	8	8	9		9	
Дніпровський 187 МВ	95004011	1998	311 /	СЛ	5	зерн	рс (180)	>5	5	5		7	
Дніпровський 196 СВ	00004023	2003	311 /	ЛП	7	зерн	рс (190)	7	7	7		7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Дніпровський 181 СВ	99004018	2002	311 /	П	7	зерн	рс (180)	7	7	7			7
Денугат МВ	03004013	2005	345 / 345	СЛП	8	зерн	р/с (195)	7	8	9			9
Егізо	95004080	1999	806 /	ЛП	7	зерн	рс (170)	7	5	7			7
Ерлі Стар	01004001	2003	806 /	ЛП	9	зерн	рс (150)	7	7	7			7
ЕКСП 178 (ТК 178)	92004043	1995	901 /	Л	5	зерн	рс (170)	5	5	5			7
Зорень	01004012	2004	355 /	єлп	7-9	зерн	рс/180/	7-9	8,6	8,9			9
ЗНТК 196	80004032	1999	936 /	Л	7	зерн	рс (190)	7	5	7			7
Заліщицький 191 СВ	® 04004060	2007	311 /	ЛП	9,0	зерн	р/с/190/	8,9	8,5	8,7			9,0
Книшун СЦ 4194	97004005	2001	998 /	ЛП	7	зерн	рс (160)	>5	5	7			5
Колізей 180 ВС	® 04004098	2007	954 /	ЛП	8-9	зерн	р/с/180/	8,8	8,6-9,0	8,8			8,5
Кадр 195 СВ	98004111	2001	311 /	Л	9	зерн	рс (190)	>5	7	7			7
МОС 182 СВ	® 02004060	2006	966 /	СЛП	7-9	зерн	р/с/180/	7-9	8,5	8,9			7-9
Матус	03004050	2006	938 /	СЛП	9	зерн	р/с/185/	7-9	8,8	9,0			7-9
НС 208	® 03004018	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	р/с (190)	9	9	9			9
НС 101	98004087	2001	879 / 879	СЛ	7	зерн	рс (110)	5	5	7			5
Остер СВ	04004042	2006	345 /	ЛП	7-9	зерн	р/с/190/	7-8	8,9	8,9			7-9
Оксана (SZL TC 191)	95004029	1998	937 /	П	7	зерн	рс (160)	7	7	7			7
Планета 180	95004084	1998	355 /	СЛ	7	зерн, сил	рс (180)	7	7	7			7
ПР39Г12	00004042	2003	767 /	ЛП	9	зерн	рс (180)	7	7	7			7
Поліський 177 МВ	01004013	2004	355 /	єлп	7	зерн	рс/170/	7-9	9	9			9
Петрівський 169 СВ	® 98004041	2001	1028 /	СЛП	7	зерн, сил	рс (170)	>5	5	5			7
Премія 190 МВ	® 02004049	2005	962 /	СЛП	9	зерн	р/с (190)	9	9	9			9
ПР39Г32	02004028	2005	767 /	СЛП	9	зерн	рс/180/	7-9	8	9			9
Радіус	95004079	1998	806 /	П	7	зерн	рс (150)	>5	5	7			5
Ромальдіс	02004001	2004	806 /	лп	7-9	зерн	рс/180/	5-7	9	8,9			9
Руно 198 СВ	® 02004041	2005	311 /	СЛП	8	зерн	р/с (190))	8	8	9			9
Сурський 197 МВ	01004027	2004	311 /	єл	7-9	зерн	рс/190/	5-7	8,5	8,8			9
Садіп	03004035	2007	432 /	ЛП	7	зерн	р/с/190/	7-9	8,3-8,5	8,6-8,7	-		7-9
Слун СВ	03004015	2005	345 / 345	СЛП	9	зерн	р/с (195)	9	8,6	9			9

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Товтряньський 188 СВ	® 04004054	2007	311 /	ЛП	8-9	зерн	p/c/180/	8,5	8,6-9,0	8,8-9,0		8,5	
ТОСС 156 МВ	92004115	1997	1109 / 345	С	5	зерн	pc (150)	5	5	5		7	
ТОСС 235 М	91004087	1994	1109 /	Л	5	зерн, сил	pc (200)	5	5	5		5	
ТОСС 218 МВ	90004053	1994	345 / 345	П	5	зерн, сил	pc (200)	5	5	5		5	
Ушицький 167 СВ	04004062	2007	311 /	СЛ	8,7	зерн	p/c/160/	8,5	8,7	8,5		8,8	
Філу	03004007	2005	924 /	СЛП	9	зерн	p/c (180)	8	8	9		9	
Фрівол	97004029	2000	806 /	ЛП	5	зерн	pc (190)	5	5	5		5	
Харківський 195 МВ	98004095	2002	404 / 404	Л	5	зерн	pc (190)	5	5	5		5	
Явір 180 СВ	® 04004013	2006	355 /	СЛП	9	зерн	p/c/180/	7-9	8,6	8,9		7-9	
Яринин 176 СВ	® 04004071	2007	1028 /	ЛП	8,5-8,8	зерно	p/c	8,6	8,5	9,0		8,6	
Лнтії	97004030	2002	806 /	СЛП	9	зерн	cp (260)	7	7	7		7	
Лвангард	00004001	2003	938 /	ЛП	7	зерн	cp (260)	>5	5	5		5	
Лбонданс	00004002	2003	1079 /	ЛП	9	зерн	cp (200)	7	7	7		7	
Аробас	03004047	2006	1079 /	СЛП	9	зерн	c/p/230/	9	7-9	9		9	
Агро 200 СВ	99004021	2003	1112 /	ЛП	7	зерн	cp (200)	5	5	7		5	
Аталіс	02004002	2004	806 /	лп	7-9	зерн	cp/230/	5-7	9	9		9	
Авіас 277 СВ	® 04004063	2007	311 /	СЛП	8,6	зерн	c/p/270/	8,8	8,7	8,8		8,9	
Асор	98004137	2002	806 /	ЛП	9	зерн	cp (220)	7	7	7		7	
Бц 288 Б	05004025	2007	993 /	СЛП	8,8	зерн	c/p/290/	8,8	8,5	8,6		8,8	
Богун	01004015	2004	355 /	слп	7-9	зерн	cp/250/	5-7	8,7	9		9	
Бц 282	05004023	2007	993 /	СЛП	8,7	зерн	c/p/280/	8,8	8,5	8,7		9,0	
БМ 281 АСВ	96004016	1999	432 /	Л	7	зерн	cp (280)	>5	5	5		7	
БМ 281 СВ	93004011	1996	432 /	СЛ	5	зерн, сил	cp (280)	5	5	5		5	
Бершадь	99004016	2003	345 /	Л	7	зерн	cp (260)	>5	7	7		7	
Богатир	01004045	2006	938 /	СЛП	7-9	зерн	c/p/240/	7-9	8,6	8,8		7-9	
Базальт 270 ВС	04004096	2007	954 /	ЛП	8,5-8,9	зерн	c/p/270/	9,0	8,7	8,8		8,9	
Бестселер 287 СВ	® 04004059	2007	311 /	СЛ	9,0	зерн	c/p/280/	8,8	8,6	8,7		9,0	
Борисфен 250 МВ	99004031	2003	1070 /	Л	9	зерн	cp (270)	7	7	7		7	
Білозірський 295 СВ	® 02004040	2005	311 /	СЛП	9	зерн	c/p (290)	9	9	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресет- рації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посу- хи	поля- гання	осипання	хвороб	
Василів 273 СВ	00 02004076	2006	1028 /	СЛП	7-9	зерн	с/р/270/	7-9	8,5	8,8		7-9	
Газель	03004046	2006	1079 /	СЛП	9	зерн	с/р/220/	7-9	7-9	9		9	
Гран 310	00004019	2003	736 /	Л	7	зерн	ср (280)	5	5	5		5	
Гексер	00 04004002	2006	1194 /	ЛП	7-9	зерн	с/р/240/	7-9	8,5	9		7-9	
Гран 1	98004035	2001	736 /	Л	7	зерн, сил	ср (230)	5	5	5		7	
Гран 6	99004026	2002	736 /	Л	7	зерн	ср (260)	>5	5	7		5	
Гран 5	98004110	2001	736 /	Л	5	зерн	ср (260)	5	5	5		7	
Григорів 270 СВ	00 02004073	2005	1028 /	СЛП	9	зерн	с/р (270)	9	8,6	9		9	
Гаїті	98004135	2002	806 /	ЛП	9	зерн	ср (210)	>5	7	7		7	
Десна СВ	98004018	2002	841 / 345	Л	7	зерн	ср (280)	>5	5	7		7	
Дерезуватський 291 СВ	00 04004056	2007	311 /	СЛ	8,8	зерн	с/р/290/	8,9	8,5	8,7		9,0	
Дельфін	04004003	2006	806 /	СЛП	9	зерн	с/р/240/	7-9	8,4	7-9		7-9	
Деррік	93004129	1996	924 /	Л	7	зерн	ср (270)	7	8	8		7	
Джерба	98004078	2002	806 /	П	7	зерн	ср (200)	>5	5	7		7	
ДК 315	03004002	2005	437 /	СЛП	9	зерн	с/р (290)	9	9	9		9	
Дніпровський 293 МВ	99004020	2002	311 /	Л	7	зерн	ср (290)	>5	5	7		5	
Дніпровський 223 СВ	99004019	2002	311 /	Л	7	зерн	ср (220)	>5	5	7		7	
ДК 243	03004003	2007	437 /	СЛ	9,0	зерн	с/р/240/	8,9	8,8	9,0		9,0	
Елегія МВ	00004038	2003	378 /	ЛП	7	зерн	ср (240)	>5	7	7		7	
Еліта	98004007	2000	767 /	ЛП	9	зерн	ср (270)	7	7	7		7	
Еден Стар	00004044	2003	806 /	ЛП	9	зерн	ср (220)	7	7	7		7	
Емліо	03004051	2007	938 /	СЛП	8,9	зерн	с/р/250/	9,0	8,9	9,0		9,0	
Євростар	98004138	2001	806 /	СЛ	7	зерн	ср (210)	7	7	7		7	
Жавір 290 МВ	02004044	2005	962 /	СЛП	9	зерн	с/р (290)	9	9	9		9	
ЗІГК 256	88004044	1996	936 /	С	5	зерн	ср (250)	5	5	7		7	
ЗІГК 209	86004025	1999	936 /	П	7	сил	ср (200)	7	7	5		7	
Імпакт (КХ 2105)	93004133	1996	938 /	Л	7	сил	ср (210)	>5	5	7		7	
Іннагуа	98004076	2001	806 /	С	7	зерн	ср (210)	>5	5	7		7	
Кий 250 СВ	98004042	2001	1028 /	П	7	зерн, сил	ср (250)	>5	5	7		7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- трації			Заявник / Підтримувач	Продук- тивність	Напрям викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	поля- гання						осипання	хвороб		
Контур 250 ВС	® 04004097	2007	954 /	СЛ	9,0	зерн	с/р/250/	8,9	8,5	8,7		9,0	
КАМПАЛІА	04004009	2007	793 /	СЛП	9,0	зерн	с/р/240/	8,6	8,5	8,7		8,6	
Креміль 200 СВ	00004026	2003	311 /	ЛП	7	зерн	ср (210)	>5	7	7		7	
Консул	91004135	1994	938 /	П	7	зерн	ср (240)	7	5	7		5	
Кишкун ТЦ 190	91004057	1994	998 /	С	7	зерн	ср (200)	5	5	7		7	
Капітан	00004035	2004	938 /	лп	7-9	зерн	ср/220/	7-9	8,8	8,8		9	
Кишкун СЦ 4297	91004058	1994	998 /	С	5	зерн	ср (290)	5	5	7		7	
Кишкун ТЦ 4240	91004056	1994	998 /	С	7	зерн	ср (240)	5	5	7		5	
КВ 2704	04004106	2007	279 /	ЛП	9,0	зерн	с/р/260/	8,5	8,6	8,7		8,9	
Кадр 267 МВ	98004024	2001	311 /	Л	7	зерн, сил	ср (260)	>5	5	7		7	
Київський 271 М	90004025	1993	355 /	ЛП	5	зерн, сил	ср (270)	5	5	5		7	
Капітол (КХ 3345)	94004105	1999	938 /	П	7	зерн	ср (240)	5	5	7		7	
Король	99004050	2003	938 /	ЛП	7	зерн	ср (280)	>5	5	5		7	
Кадр 217 МВ	98004113	2002	311 /	Л	9	зерн	ср (220)	7	7	7		7	
Клантон	03004006	2005	924 /	СЛП	9	зерн	с/р (230)	9	9	9		9	
Канада	02004086	2005	1079 /	СЛП	9	зерн	с/р (290)	9	9	9		9	
Корнелі	05004010	2007	485 /	СЛП	9,0	зерн	с/р/250/	8,7	8,5	8,6		9,0	
Колективний 225 МВ	86004037	1990	1109 / 345, 841	ЛП	5	зерн, сил	ср (220)	5	5	5		5	
Кореунський 297 МВ	05004014	2007	355 /	СЛП	9,0	зерн	с/р/290/	9,0	8,7	8,9		9,0	
Коксімо	04004114	2007	1194 /	Сб,зрЛП	9,0	зерн	с/р/220/	8,9	8,5	9,0		9,0	
Кишкун СЦ 4291 (Ольга)	02004017	2005	998 /	СЛ	9	зерн	с/р (240)	8,5	8	9		9	
Кишкун СЦ 4280 (Ленчі)	02004015	2006	998 /	ЛП	7-8	зерн	с/р/260/	7	7	7-9		7-9	
Кишкун СЦ 4282 (Жужанга)	02004016	2006	998 /	ЛП	7	зерн	с/р/250/	5-7	7-9	7-9		7-9	
Луганський 222 МВ	95004010	1998	309 /	С	7	зерн	ср (220)	>5	5	5		7	
Латізіана	04004006	2007	793 /	ЛП	8,5	зерн	с/р/230/	8,8	8,5	8,6		9,0	
ЛГ 3409	04004008	2007	793 /	СЛП	8,9	зерн	с/р/250/	8,8	8,6	8,7		8,9	
Луганський 287 МВ	94004009	1997	309 /	СЛ	5	сил	ср (280)	5	5	5		5	
Лелека МВ	04004085	2007	404 / 404	ЛП	8,5	зерн	с/р/260/	8,4	8,5	8,7		8,6	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресет- рації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м вико- рис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
				посухи					поля- гання	осипання	хвороб		
Лактор	02004023	2005	924 /	ЛП	9	зерн	с/р (220)	9	8	9		9	
ЛП 2447	04004112	2007	793 /	Сб,зрЛП	8,9	зерн	с/р/250/	8,5	8,6	9,0		8,6	
Любава 279 МВ	® 04004057	2007	311 /	Л	9,0	зерн	с/р/270/	8,5	8,6	8,4		8,6	
Монкада	03004045	2006	1079 /	СЛП	9	зерн	с/р/240/	9	9	9		7-9	
МВ ТС 277	® 04004049	2006	720 / 1112	СЛП	9	зерн	с/р/270/	7-9	8,5	9		7-9	
МС 300 МВ	92004017	1996	355 /	С	5	сил	ср (300)	5	5	7		7	
МВ 251	® 04004047	2006	720 / 1112	СЛП	9	зерн	с/р/250/	7-9	7-9	9		7-9	
Міф 227 МВ	01004033	2004	311 /	сл	7	зерн	ср/220/	5-7	8,8	9		9	
Магіте	95004001	1999	1079 /	СЛ		зерн	с/р/260/						
Маїс 226 МВ	® 01004006	2004	962 / 962	СЛП	7-9	зерн	с/р (220)	5-7	8,3	9		9	
Монументал	99004004	2001	437 /	СП	7	зерн	ср (280)	7	7	7		7	
Модем МС 280	® 03004049	2006	962 /	СЛП	9	зерн	с/р/280/	7-9	8,6	9		7-9	
МЕЛІ 272 МВ	® 02004057	2005	966 /	СЛП	8	зерн	с/р (270)	9	9	9		9	
Мучо	02004085	2005	1079 /	СЛП	9	зерн	с/р (290)	9	9	9		9	
НХ 1480	02004003	2004	1079 /	лп	7-9	зерн	ср/250/	7-9	9	8,7		9	
НС 2012	05004007	2007	879 /	ЛП	8,5	зерн	с/р/240/	8,9	8,7	8,7		9,0	
Нестун СВ	96004002	1999	355 /	СЛП	5	зерн,сил	ср (280)	5	5	7		5	
Наутилус	00004016	2003	350 /	ЛП	7	зерн	ср (290)	>5	7	7		7	
НС 205	05004022	2007	879 /	СЛ	8,6	зерн	с/р/210/	8,9	8,6	9,0		9,0	
Новизна	02004078	2006	938 /	СЛП	9	зерн	с/р/230/	7-9	9	9		7-9	
Нексос	® 03004005	2006	1194 /	СЛП	/	зерн	с/р/230/	7-9	8,3	8,8		7-9	
НС 251	03004020	2005	879 / 879	ЛП	9	зерн	с/р (250)	9	9	9		9	
НК ЛУГАН	02004087	2005	1079 /	ЛП	9	зерн	с/р (260)	9	9	9		9	
Овідій 295 МВ	® 02004072	2006	378 /	СЛ	7-9	зерн	с/р/290/	7-9	8,3	9		7-9	
Ольхем	02004004	2004	1079 /	лп	7-9	зерн	ср/270/	7-9	9	9		9	
ОДН-1	99004045	2003	1083 / 1083	Л	7	зерн	ср (240)	>5	7	7		7	
Олегів 286 СВ	® 05004043	2006	1028 /	ЛП	9	зерн	с/р/280/	7-9	7-9	9		7-9	
ПР39Ф58	04004018	2007	767 / 767	СЛ	9,0	зерн	с/р/230/	8,5	8,7	8,8		9,0	
Прім 247 МВ	01004029	2004	311 /	л	7	зерн	ср/240/	7-9	9	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-тації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
ПР39Г83	04004019	2006	767 / 767	СЛП	9	зерн	ср/230/	7-9	7-9	9		9	
ПР39Т45	04004020	2007	767 / 767	СЛ	8,8	зерн	с/р/240/	8,9	8,4	8,7		9,0	
ПР39Н72 (Сандріна)	00004043	2003	767 /	Л	9	зерн	ср (220)	9	7	7		7	
П'ятихатський 270 СВ	® 03004025	2006	311 /	СЛП	9	зерн	с/р/270/	7-9	8,6	9		7-9	
ПР39Р86	® 02004029	2005	767 /	СЛП	9	зерн	с/р (275)	9	9	9		9	
ПР39Д81	98004102	2001	767 /	П	9	зерн	ср (260)	7	7	7		7	
Подільський 274 СВ	® 04004055	2007	311 /	СЛП	8,5-8,9	зерн	с/р/270/	8,6	8,5	9,0		8,9	
Піонер-Гран 3978	98004107	2001	736 /	Л	5	зерн	ср (260)	5	5	7		7	
Сатурн	94004014	1997	355 /	СЛП	5	зерн, сил	ср (240)	5	5	5		5	
Сидорів 251 МВ	® 00004040	2003	1028 /	Л	7	зерн	ср (250)	5	5	7		7	
Сталкер	® 03004021	2006	404 /	СЛП	7	крохмал	с/р/260/	7-9	7	7-9		7-9	
Солонянський 298 СВ	® 03004026	2006	311 /	СЛП	9	зерн	с/р/280/	7-9	7-8	9		7-9	
Сиваш	02004062	2005	411 /	СЛ	9	зерн	с/р (280)	8	8,6	9		9	
Сочава	05004012	2007	568 /	СЛП	8,8	зерн	с/р/240/	8,5	8,6	8,7		9,0	
Сплав МС 290	04004089	2007	962 /	СЛ	8,9	зерн	с/р/290/	9,0	8,6	8,7		8,6	
Сплендіс	98004136	2002	806 /	ЛП	9	зерн	ср (200)	7	7	7		7	
Союз	® 02004051	2005	311 /	СЛП	9	зерн	с/р (200)	9	9	9		9	
Тріумф	98004055	2001	938 /	П	7	зерн, сил	ср (220)	>5	5	5		5	
Тарас	01004010	2004	355 /	лп	7	зерно	ср/230/	7	9	9		9	
Тітус	94004054	1997	806 /	Л	7	зерн	ср (250)	7	7	7		7	
Титан 220 СВ	97004019	2000	355 /	СЛП	7	зерн	ср (220)	7	7	7		7	
Тясьмин МВ	97004018	2001	355 /	Л	7	зерн, сил	ср (250)	7	5	7		7	
ТОСС 231 МВ	92004116	1996	345 / 345, 841	С	7	сил	ср (230)	7	5	7		5	
Трістан	97004035	2000	938 /	П	7	зерн	ср (210)	>5	5	7		7	
Теофанів 295 СВ	01004047	2004	1028 /	слп	5-7	зерн	ср/290/	7	8	8,5		9	
Ударник	02004081	2006	938 /	СЛП	9	зерн	с/р/230/	7-9	8,5	8,6		7-9	
Флавіус	95004083	1998	806 /	Л	7	зерн	ср (210)	>5	5	5		7	
Фруктіс	03004008	2005	806 /	СЛП	9	зерн	с/р (230)	9	9	9		9	
Харківський 294 МВ	96004017	1999	404 / 404	П	5	сил	ср (290)	5	5	5		5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресетрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Харківський 250 МВ	94004021	1999	404 / 404	П	5	сил	ср (250)	5	5	5		5	
Харківський 295 МВ	98004051	2001	404 / 404	Л	5	зерн,сил	ср (290)	5	5	5		7	
Хелга	91004035	1996	767 /	Л	7	зерн	ср (300)	7	7	7		7	
Хмельницький	® 04004064	2007	311 /	Сб,зр,ЛП	8,9	зерн	с/р/250/	8,6	8,9	9,0		8,7	
Харківський 291 МВ	99004036	2003	404 / 404	Л	7	зерн	ср (290)	>5	5	5		7	
Челленджер	93004066	1997	437 /	П	7	зерн	ср (250)	7	7	7		7	
Чипиринський 267 СВ	05004015	2007	355 /	ЛП	8,6	зерн	с/р/260/	9,0	8,7	9,0		9,0	
Чемаровецький 260 СВ	® 04004053	2007	311 /	С,Л	8,5	зерн	с/р/260/	8,8	8,5	8,7		8,8	
Ювілейний 70 М	90004060	1993	355 /	СЛП	7	зерн,сил	ср (260)	7	5	7		7	
Ювілейний 60 МВ	84004105	1985	1109 /	ЛП	5	зерн,сил	ср (250)	5	5	5		5	
Альфа	95004027	1999	1079 /	С	7	зерн	сс (380)	7	7	7		7	
Аванс МС 350	04004090	2007	962 /	С	9,0	зерн	с/с/350/	8,9	8,7	8,9		8,6	
Арія МС 330	® 03004055	2006	962 /	СЛ	9	зерн	с/с/330/	7-9	8,9	9		7-9	
Айнібек	02004077	2006	938 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/320/	7-9	8,5	9		7-9	
Аманда	03004053	2007	938 /	СЛ	9,0	зерн	с/с/330/	8,9	8,6	9,0		9,0	
Борисфен 301 МВ	94004003	1997	411 /	С	7	зерн	сс (300)	5	5	7		7	
Борисфен 380 МВ	98004040	2001	411 /	Л	7	зерн,сил	сс (380)	>5	5	7		5	
Богдан	01004016	2004	355 /	сл	>7	зерн	сс/350/	7-9	8,9	9		9	
Веселка МВ	® 00004039	2003	378 /	Л	7	зерн	сс (340)	>5	5	7		7	
Верігіс	03004009	2006	806 /	СЛ	9	зерн	с/с/340/	9	8,4	9		7-9	
ВІЦ 380 МВ	® 03004028	2007	311 /	С	8,5	зерн	с/с/380/	8,5	8,4	8,6		8,8	
ВАР 330 МВ	® 02004056	2005	966 /	СЛ	8	зерн	с/с (330)	8	8	9		9	
Господар 360 СВ	03004031	2007	1167 /	С	8,5	зерн	с/с/360/	8,5	8,4	8,6		8,8	
Гунор	® 04004046	2006	720 / 1112	СЛ	9	зерн	с/с/330/	9	7-9	9		7-9	
ДКС 4626	03004004	2005	437 /	СЛ	9	зерн	с/с (360)	9	9	9		9	
ДК 443	97004037	2000	766 /	СЛ	9	зерн	сс (380)	7	7	7		7	
Долар	92004139	1995	1079 /	СЛ	7	зерн	сс (390)	7	7	7		7	
Дар 347 МВ	00004025	2003	311 /	ЛСзр	9	зерн	сс (340)	7	7	7		7	
ДК 391	02004007	2004	437 /	Л	9	зерн	сс/350/	7-9	8,6	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
ДК 440	99004007	2003	437 /	СзрЛ	9	зерн	сс (350)	7	7	7		7	
Екватор 338 МВ	01004024	2006	957 /	СЛ	9	зерн	с/с/330/	7-9	8,6	9		7-9	
Еврика МВ	® 02004071	2005	378 /	СЛ	8	зерн	с/с (390)	8	9	9		9	
СВРО 301 МВ	® 99004028	2003	962 / 962	Л	9	зерн	сс (300)	>5	7	7		7	
ЗІСК 330	88004020	2001	936 /	С	5	зерн	сс (330)	5	5	7		7	
ЗІСК 434	99004017	2002	936 /	С	7	зерн	сс (400)	7	5	7		7	
Злагода МВ	01004004	2005	404 / 404	СЛ		зерн	3(310)	9	8,4	9		9	
ЗУМ 0243	® 04004025	2006	926 /	СЛ	9	зерн	сс/350/	7-9	8,6	9		7-9	
ЗП 341	02004006	2004	936 /	сзрош,л	7-9	зерн	сс/340/	7-9	8,5	8,5		9	
Іскра МВ	® 02004067	2006	404 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/340/	7-9	7-8	9		7-8	
Кадр 327 МВ	97004009	2001	311 /	Л	7	зерн, сил	сс (330)	>5	5	7		5	
Кадр 328 МВ	98004028	2001	311 /	Л	7	зерн	сс (330)	>5	5	5		5	
Каліс	96004045	2000	806 /	С	5	зерн	сс (340)	>5	5	5		5	
Корона 350 МВ	® 01004007	2004	962 / 962	сл	7	зерн	сс/350/	5-7	8,5	9		9	
Кларіка	98004003	2000	767 /	СЛ	7	зерн	сс (340)	>5	5	7		7	
Кобза МВ	01004040	2005	378 /	С,Л		зерн	с/с (350)	7	9	9		9	
Круг 340 ВС	® 02004047	2006	962 /	СЛ	9	зерн	с/с/340/	7-9	8,6	9		9	
Комета МВ	99004023	2002	355 /	СЛ	9	зерн	сс (300)	9	7	7		7	
Кішкун СЦ 4340 (Лейла)	02004020	2006	998 /	СЛ	7	зерн	с/с/340/	7	7	9		7-9	
Лебідь МВ	96004019	2000	378 / 378	С	5	зерн	сс (340)	5	5	7		5	
Лаксот	04004113	2007	1194 /	Л	9,0	зерн	с/с	9,0	8,5	8,6		8,8	
Меридіан 341 МВ	01004020	2004	957 /	л	7-9	зерн	сс/340/	5-7	9	9		9	
Моналіза	98004009	2000	767 /	СЛ	9	зерн	сс (340)	7	7	7		7	
МВ 355	91004023	1994	720 / 1112	Л	7	зерн	сс (350)	7	7	7		7	
Моніка 350 МВ	® 03004029	2006	311 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/350/	7-9	8,5	9		7-9	
Метеор 317 МВ	03004011	2005	355 /	СЛ	9	зерн	с/с (310)	9	9	9		9	
Нива МВ	® 02004070	2005	404 / 404	СЛ	8	зерн	с/с (320)	7	8	9		9	
Новація МВ	® 03004039	2006	378 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/330/	7	8,6	9		7-9	
НС 300	97004038	2000	879 / 879	С	7	зерн	сс (300)	7	7	7		7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
ПК Термо	02004083	2005	1079 /	СЛ	9	зерн	с/с (390)	9	9	9		9	
ПС 301	03004019	2005	879 / 879	СЛ	9	зерн	с/с(300)	9	9	9		9	
ПС 400	98004086	2001	879 / 879	С	9	зерн	сс (400)	>5	5	5		7	
Одісей 324 МВ	01004039	2004	378 /	с	7	зерн	сс/320/	7-9	8,1	9		9	
ОдМа 310 М	84004085	1987	720 / 378	СЛ	7	зерн, сил	сс (350)	7	7	7		7	
Одеський 375 МВ	® 99004053	2002	378 /	СЛ	7	зерн	сс (380)	>5	5	5		7	
Оазис 315 СВ	01004021	2004	957 /	сл	>7	зерн	сс/350/	7-9	8,9	9		9	
Одеський 385 МВ	98004037	2001	378 / 378	С	7	зерн	сс (380)	>5	5	5		7	
Окегган	02004027	2004	1079 /	сл	9	зерн	сс/340/	7-9	8	9		9	
Одеський 346 МВ	92004019	1995	378 / 378	С	5	зерн	сс (360)	5	5	5		5	
Одеський 360 МВ	® 98004103	2002	378 / 378	С	7	зерн	сс (350)	>5	5	7		7	
Пелікан	95004008	1999	1079 /	Л	7	зерн	сс (310)	>5	7	7		7	
Петропавлівський 392 МВ	01004018	2004	957 /	с бог.зр	5-7	зерн	сс/360/	7-9	7,8	9		9	
Песо	98004061	2001	1079 /	СЛ	7	зерн, сил	сс (320)	>5	5	7		7	
ПР39К38 (Синонім: Валюга)	98004069	2001	767 /	Л	9	зерн	сс (300)	7	7	7		7	
ПР38/189 (Синонім: Анаста)	98004072	2001	767 /	Л	9	зерн	сс (330)	7	7	7		7	
Престиж 365 МВ	01004019	2004	957 /	л	7	зерн	сс/320/	7-9	9	9		9	
Платан МВ	94004013	1997	378 / 378	С	7	зерн	сс (340)	7	5	7		5	
ПР38В91	® 04004021	2007	767 /	С	9,0	зерн	с/с/330/	8,9	8,7	8,9		9,0	
ПР38Б85	® 04004015	2006	767 /	СЛ	7-9	зерн	сс/340/	7-9	7-9	9		9	
ПР38Г67	® 02004032	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с(370)	9	9	9		9	
ПР37/125	® 02004088	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с (390)	9	9	9		9	
ПР38Ф10	® 02004030	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с (330)	9	9	9		9	
ПР38Р92	® 02004031	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с (330)	9	9	9		9	
Сов 329 СВ	® 04004058	2007	311 /	СЛ	9,0	зерн	с/с/320/	8,9	8,7	8,6		9,0	
Селест	02004005	2004	1079 /	сл	9	зерн	сс /330/	7-9	8,5	9		9	
Сід 357 МВ	01004028	2004	311 /	сл	7-9	зерн	сс /350/	7-9	8,9	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
Січеславський 335 МВ	01004032	2004	311 /	сл		зерн	сс/330/	7	8,5	9,0		9,0	
СД 395 МВ	99004034	2002	1111 /	С	7	зерн	сс (390)	>5	5	5		7	
Стігзеп	02004021	2006	924 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/320/	7-9	8,5	9		7-9	
Топ 320 ВС	02004043	2005	962 /	СЛ	9	зерн	с/с (320)	9	9	9		9	
ГАР 349 МВ	03004022	2007	966 /	С	8,9	зерн	с/с/340/	8,8	8,5	8,9		9,0	
Фонд 404 МВ	02004045	2005	962 /	СЛ	9	зерн	с/с (400)	9	9	9		9	
Харківський 311 МВ	93004029	1996	404 / 404	С	5	зерн	сс (310)	5	5	7		5	
Харківський 329 МВ	99004038	2003	404 / 404	Л	7	зерн	сс (320)	>5	5	5		7	
Харківський 340 МВ	99004039	2002	404 / 404	Л	7	зерн	сс (340)	5	5	7		7	
Харківський 325 МВ	98004093	2002	404 / 404	Л	5	зерн	сс (330)	5	5	7		5	
Шаланди МВ	03004040	2006	378 /	СЛ	7	зерн	с/с/350/	7-9	7-9	9		7-9	
Юніон	03004027	2006	311 /	СЛ	9	зерн	с/с/340/	7-9	8,5	9		7-9	
Ярем 326 МВ	02004059	2006	966 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/320/	7-9	8,5	9		7-9	
Борисфен 433 МВ	92004001	1995	311 /	С		зерн	сп (430)	7	5	5		5	
Борисфен 430 ЛМВ	89004005	1993	411 /	С	5	зерн	сп (430)	5	5	5		5	
Бриз 396 МВ	01004026	2004	957 /	сзрош	7	зерн	сп/410/	7-9	-	9		9	
Базис	01004046	2005	938 /	С	9	зерн	с/п (400)	9	9	9		9	
Банкіровець	04004012	2006	355 /	С	9	зерн	с/п/420/	7-9	8,5	9		7-9	
Гейзер	04004011	2007	1079 /	С	9	зерн	с/п/430/	7-9	8,6	8,9		7-9	
Дніпровський 453 СВ	00004024	2003	311 /	Сзр	7	зерн	сп (450)	7	7	7		7	
Енергі Стар	02004008	2006	806 /	С	7-9	зерн	с/п/440/	9	8,6	9		7-9	
СВРО 401 СВ	99004029	2003	962 / 962	С	9	зерн	сп (400)	7	7	7		7	
ЗІГК 404	93004124	2001	936 /	С	7	зерн	сп (400)	7	7	7		7	
Квартал	03004010	2006	806 /	С	9	зерн	с/п/420/	7-9	8,6	9		7-9	
Карен	02004080	2006	938 /	С	9	зерн	с/п/430/	9	7-9	9		7-9	
Кадр 443 СВ	98004116	2001	311 /	С	7	зерн	сп (420)	5	5	5		5	
Капорал	02004022	2005	924 /	С	9	зерн	с/п (430)	9	8,5	9		9	
Кодацький 442 СВ	02004039	2005	311 /	С	8	зерн	с/с (430)	9	9	9		9	
Луч 471 МВ	88004072	1996	414 /	С	5	зерн	сп (470)	5	5	5		5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
МТІ	® 03004030	2007	311 /	С	8,8	зерн	с/п/440/	8,9	8,5	8,6		9,0	
НС 444	93004120	1997	879 / 879	С	7	сил	сп (440)	7	>5	7		7	
НС 4010	03004017	2005	879 / 879	С	9	зерн	с/п (420)	9	9	9		9	
Одеський 480 МВ	97004023	2001	378 / 378	С	5	зерн	сп (480)	5	5	5		5	
Південь 480 СВ	92004020	1996	411 /	ЛП	5	сил	сп (480)	5	5	5		5	
ПР38А24	00004041	2003	767 /	Сзр	9	зерн	сп (400)	7	7	7		7	
ПР37В05	04004023	2006	767 / 767	С	9	зерн	сп/420/	7-9	8,5	9		9	
Пульс МС 402	04004091	2007	962 /	С	9,0	зерн	с/п/400/	8,6	8,5	8,7		9,0	
ПР37К85	® 02004034	2005	767 /	С	9	зерн	с/п (410)	9	9	9		9	
ПР36В08	02004035	2006	767 /	С	7-9	зерн	сп/420/	9	7-9	9		9	
Соколов 407 МВ	01004031	2004	311 /	сзрош	7	зерн	сп/400/	9	9,0	9		9	
Стіра	94004102	1999	767 /	СЛ	5	зерн	сп (420)	5	5	7		5	
Світ 400 МВ	® 01004008	2004	962 / 962	с/зрош/	7-9	зерн	сп/400/	5-7		9		9	
Сенаг	03004054	2007	938 /	С	9,0	зерн	с/п/410/	9,0	8,9	8,9		9,0	
Сіско	02004084	2005	1079 /	С	8	зерн	с/п (420)	9	9	9		9	
Фуріо	91004126	1993	1079 /	С	7	зерн	сп (450)	7	5	7		7	
Аметист	01004009	2004	355 /	С	7-9	зерн	пс/520/	7	8,8	9		9	
Борисфен 600 СВ	® 99004032	2003	311 /	Сзр	9	зерн	пс (550)	7	7	7		7	
Бора (МС 02)	04004014	2006	273 /	С	9	зерн	п/с/500/	9	9	9		7-9	
ЗПСК 704	95004048	1999	936 /	С	7	зерн	пс (600)	>5	5	7		7	
Леоніс	02004009	2004	806 /	с	7-9	зерн	пс/520/	7-9	8,5	9		9	
Надніпрянська 50	78004038	1982	411 /	С	5	зерн, сил	пс (570)	5	5	5		5	
НС 640	93004045	1997	879 / 879	С	7	зерн	пс (600)	7	7	7		7	
НС 420	93004043	1997	879 / 879	С	7	зерн	пс (600)	7	5	7		7	
Перекоп СВ	85004057	1990	411 /	С	7	зерн	пс (600)	7	7	7		7	

Сільськогосподарські: бобові

Горох

- 46

Аскет	® 03001009	2007	404 /	П	7-8	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
-------	------------	------	-------	---	-----	------	----	--	-----	-----	-----	-----	----

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
Банан	99001001	2003	404 / 404	Л	5	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Вінець	00001002	2004	309 /	СЛП	7	зерн	сп		5	5	5-7	5-7	фж
Готівський	02001003	2006	946 /	СЛ	7-9	зерн	се		5-7	5-7	5-7	7	фж
Девіз	® 03001007	2007	404 / 404	СП	7-8	зерн	се		7-8	5-7	7-9	5-7	фж
Дамир 3	97001004	2000	1182 / 1182	Л	7	зерн	сп		5-7	7-9	5-7	5	фж
Дамир 2	97001003	2000	1184 /	СЛ	7-9	зерн	сп		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Дамир 1	97001002	2000	1174 / 1159, 1174	С	7	зерн	се		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Ескіз	® 03001006	2007	404 /	П	7-8	зерн	сп		5-7	5-7	7-8	5-7	фж
Елегант	98001002	2002	305 /	Л	5-7	зерн	рс		5-7	5	5-7	5-7	фж
Ефектний	® 02001001	2006	404 / 404	ЛП	7	зерн	се		5-7	5	5-7	5-7	фж
Зекон	79001006	2000	880 /	СЛП	7-9	зерн	се		7-9	7-9	5-7	5-7	цін
Інтенсивний 92	92001006	1996	404 / 404	СЛП	5-7	зерн	се		7-9	5	5	5	цін
Йезеро	03001001	2005	879 / 879	Л	7-9	зерно	се		5-7	7-9	7-9	7-9	фж
Комет	95001002	1999	946 /	СЛП	7	зерн	сп		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Красноградський 8	92001003	1996	399 /	П	5	зерн	се		5	5	5-7	5	фж
Конго	® 03001011	2006	912 /	Л	5-7	зерн	се		5	7	7	5-7	фж
Комбайновий 1	99001003	2003	1121 /	Л	7	цін	се		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Камертон	01001004	2005	404 / 404	ЛП	7	зерно	се		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Камелот	® 04001004	2006	888 /	ЛП	5-7	зерн	се		5	7	7	5-7	фж
Кео	96001003	2004	1153 /	СЛ	7	зерн	сп		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Кардіфф	96001004	2004	1153 /	СЛ	7-9	зерн	сп		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Луганський	99001002	2003	309 /	СЛ	5-7	зерн	сп		7-9	5-7	5-7	5-7	фж
Лазер	® 98001006	2001	912 / 912	Л	7	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	фж
Модус	01001003	2004	404 / 404	Л	7	зерн	се		5-7	7-9	5-7	5-7	фж
Мадонна	® 00001004	2003	912 / 912	СЛП	9	зерн	сп		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Менгір	95001003	2000	946 /	СПП	7	зерн	рс		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Мілснїїум	® 04001001	2006	809 /	Л	7-9	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Норд	88001009	1993	201 / 386	СЛП	7	зерн	се		7-9	7-9	5-7	5	цін
Надійний	90001005	1995	309 /	СЛП	7	зерн	се		7-9	5	5-7	5	цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Неосипаючий 1	74001010	1978	309 /	СЛП	5	зерн	сс		5-7	5	5-7	5	цін
Напарник	88001001	1993	309 /	С	5-7	зерн	сс		5-7	5	5-7	5	фж
Намисто	02001002	2006	334 /	П	5	зерн	сс		5	5	5-7	5	фж
Полтавець 2	94001003	1999	952 /	Л	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Ріалто	® 04001005	2006	1182 /	Л	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	7	фж
Сріпчик	01001006	2004	309 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Сантана	® 04001002	2006	824 /	Л	5-7	зерн	сс		7	7-9	7	7	фж
Світ	03001003	2006	378 /	П	5-7	зерн	сс		7	7	5-7	5-7	фж
Труженник	80001003	1984	309 /	СЛП	5	зерн	сс		5-7	5	5	5	цін
Фартус	® 04001007	2007	376 /	ЛП	7-8	зерн	сс		7-8	7-8	7-9	5-7	фж
Харків'янин	00001001	2003	404 / 404	СЛ	5-7	зерн	сс		7-9	5	5-7	5-7	цін
Харківський сталонний	97001008	2002	404 / 404	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Харлі	® 00001003	2004	912 / 912	СЛП	7-9	зерн	ср		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Харківський янтарний	94001007	1998	404 / 404	С	7	зерн	ср		7-9	5-7	5-7	5	фж
Харківський 376	97001007	2001	404 / 404	П	7	зерн	сс		5	5	5-7	5	фж
Явор	03001002	2005	879 / 879	ЛП	7-9	зерно	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Сочевіця			- 2										
Красноградська 49	91089001	1996	399 /	Л	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Любава	03089001	2005	309 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цінн
Нут			- 10										
Алгей	01088001	2004	378 / 378	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Добробут	01088002	2003	309 /	СЛ	7	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Колорит	97088003	2000	309 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Орнамент	94088001	2002	309 /	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5-7	фж
Пам'ять	99088001	2002	378 / 378	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Перас	® 03088002	2005	378 / 378	С	7	зерно	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Стоїк	00088001	2002	909 /	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Смачний	94088002	1999	309 /	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5-7	цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Тріумф	® 03088001	2005	378 / 378	С	7	зерно	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цпн
Чина	-	2											
Красноградська 8	99090001	2001	399 /	Л	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	цпн
Сподіванка	04090001	2006	311 /	Л	7	зерн	сс		5	5	5	5	цпн
Квасоля звичайна	-	7											
Буковинка	02087003	2004	432 /	ЛС	7	зерно	сс		7	7	7	7	
Докучасівська	94087004	2000	405 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5-7	цпн
Дніпрянка	03087001	2005	311 / 399, 311	С	7	зерно	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цпн
Красноградська кушов	00087001	2002	399 /	Л	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Мавка	98087004	2001	345 / 345	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	цпн
Надія	99087001	2001	432 /	Л	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	цпн
Перлина	04087003	2006	345 /	Л	5	зерн	сс		5	5	5	5	цпн
Сільськогосподарські: круп'яні													
Гречка	-	19											
Антарія	99002001	2002	1117 / 345	СЛП	7	зерн	ср	7	7	7	7	5	х
Астра	78002001	1983	345 / 345	Л	7	зерн	сс	5	5	7	5	5	цпн
Аеліта	72002001	1978	417 / 417	П	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	цпн
Вікторія	64002001	1969	371 /	ЛП	5	зерн	сн	5	5	5	5	5	х
Глюрія	67002001	1973	371 /	С	5	зерн	сп	5	5	5	5	5	х
Слена	00002004	2005	417 /	ЛП	7	зерн	сс	7	7-8	7-8	7-8	8	х
Зеленоквіткова 90	90002002	1995	417 / 417	П	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	х
Іванна	92002001	1997	392 /	С	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цпн
Крупинка	86002002	1990	392 /	СЛ	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цпн
Кара-Даг	91002001	1996	417 / 417	С	5	цпн	сс	5	5	5	5	5	цпн
Любава	89002003	1993	417 / 345, 417	СЛП	7	зерн	сс	7	5	7	7	5	цпн
Лада	73002004	1979	371 /	ЛП	5	зерн	сс	5	5	7	7	5	цпн
Оранта	® 05002002	2007	345 /	СЛП	5	зерн	ср	7	7	7	7	7	х

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Роксолана	94002004	2000	417 / 417	П	7	зерн	ср	7	7	7	7	5	х
Рубра	01002001	2004	417 / 417	ЛП	5	зерно	сс	7	7	7	7	7	х
Слобожанка	00002002	2004	392 /	СЛП	8	зерно	сс	7	8,2	7,9	7,8	8	цін
Сумчанка	80002003	1985	392 /	СЛ		зерн	рс	5	5	7	7	5	цін
Степова	92002005	1999	417 / 417	С	5	зерн	сс	5	5	7	7	5	х
Українка	92002007	1997	345 / 345	СЛП	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Просо - 20													
Веселоподільське 176	91006002	1995	388 /	СЛП	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Веселоподільське 16	97006001	2000	388 /	СЛП	7х	зерн	сп	5	5	7	7	5	х
Денківське	® 02006002	2006	334 /	П	5	зерн	сп		7	7	5-7	7	х
Золотисте	00006001	2003	388 /	Л	7	зерн	ср	7	7	7	7	7	цін
Золунка	® 01006002	2006	386 /	ЛП	7	зерн	рс		7	7	7	7	цін
Київське 96	96006002	1999	345 / 345	Л	7	зерн	рс	7	5	7	7	5	цін
Константинівське	® 02006001	2006	404 /	С	7	зерн	ср		7	5-7	7	7	цін
Київське 87	87006002	1991	345 / 345	СЛП	7	зерн	ср	7	7	5	7	5	цін
Лана	® 04006001	2006	334 /	Л	7	зерн	сс		5-7	7	7	7	х
Миронівське 51	69006002	1978	341 / 341	СЛП	7	зерн	сп	7	7	7	7	5	цін
Новокіївське 01	00006003	2004	345 / 345	ЛП	8	зерно	сс	7	8	8,2	7	8	зерно
Омріяне	® 02006003	2005	345 / 345	СЛП	7	зерн	ср	7	8	8	7,5	8	цін
Полтавське золотисте	® 01006001	2005	386 /	ЛП	7	зерн	ср	7	8	7	8	7	цін
Сяйво	91006001	1994	345 / 345	СЛП	7	зерн, корм	ср	7	7	7	7	5	цін
Східне	01006003	2006	309 /	С	7	зерн	сс		7	7	7	7	х
Слобожанське	98006004	2001	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Таврійське	® 04006002	2006	1192 /	С	7	зерн	ср		7	7	7	7	х
Харківське 31	93006002	1996	404 / 404	СЛ	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Харківське кормове	77006006	1980	404 / 404	СЛ	5	корм	сп		5	5	5	5	скліт
Харківське 57	84006003	1987	404 / 404	СЛП	7	зерн	сп	7	7	7	7	5	цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- трації			Заявник / Підтримувавч	Продук- тивність	Напря- м ви- корис- тання	Група стиг- лості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
			посу- хи	поля- гання						осипання	хвороб	

Сорго зернове - 21

Генічеський 5/11	89064001	1994	414 /	С	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	х.фр
Генічеське 209	99064003	2003	414 /	С	7,5	зерно	ср	7	7	7,5	7	7,6	х.фж
Донецьке 8	99064004	2003	909 /	С	7	зерно	ср	7	7,4	7,8	8	8	х.фж
Дніпровський 39	94064006	2000	340 /	С	7	х	сс	7	7	7	7	7	х.фж
Даш Е	03064001	2005	29 /	С	8	зерн	ср	7	7	8	8	8	х.фж
Кейрас F1	00064001	2003	806 /	С	7,5	зерно	ср	7,8	8	8	7,6	8	х.фж
Максим	® 01064002	2005	309 /	Л	7	зерн	ср	7	7	7	7	7	х.фж
Одеський 205	91064001	1995	378 / 378	С	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	х.фр
Слав'янське поле 210	02064001	2005	1039 /	С	7	зерн	ср	7	7	8	8	8	х.фж
Спринг 2	03064002	2005	29 /	С	8	зерн	ср	7	7	8	8	8	х.фж
Спринг W 341/22	03064003	2005	29 /	С	8	зерн	ср	7	7	8	8	8	х.фж
Степовий 8 F1	99064002	2003	340 /	С	7	х.фж	ср	7,5	7,8	7	7	7	х.фж
Анна	® 01064003	2004	309 / 361	С	7	зерно	ср	7	7,4	7,5	7,4	7	х.фж
Вінець	00064003	2004	414 /	С	7	зерно	ср	8	7,3	7,5	7,2	7,8	х.фж
Дніпрельстан	02064005	2006	311 /	СЛ	7	зерн	ср		7	7	7	8	х.фр
Ковчег	® 04064003	2007	414 /	СЛ	7	зерн	рн		7	7	7	8	х.фр
Красвид	01064001	2004	311 /	С	7	зерно	ср	7	8	7,5	7,4	7,4	х.фж
Космосол	03064004	2006	767 /	С	7	зерн	сс		7	7	7	7	х.фр
Лан 59	02064004	2007	311 /	СЛ	7	зерн	рн		8	7	7	8	х.фр
Прайм	04064001	2006	29 /	СЛ	7	зерн	рс		7	7	7	8	х.фр
Свіфт 380/79	04064002	2006	29 /	СЛ	7	зерн	рс		8	8	7	7	х.фр

Сориз - 10

Дарунок	00330002	2003	378 / 378	С	7	х	ср	5	5	7	7	7	х
Дружний	® 01330001	2005	378 / 378	С	7	х	рс	7	7	8	8	7	х
Ізумруд	00330001	2003	378 / 378	С	7	х	ср	5	7	7	7	7	х
Коричневе 11	00330005	2003	361 / 361	С	7	х	ср	7	5	7	7	7	х
Крупинка 10	00330003	2003	361 / 361	С	7	х	ср	5	7	7	7	7	х

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
			Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Одеський 302	95330002	1999	378 / 378	С	7	х	ср	7	5	7	7	7	х
Нерліна	03330001	2006	414 /	С	7	х	рс		7	7	7	7	х
Прогрес F1	00330004	2002	361 / 361	С	7	х	ср	5	5	7	7	7	х
Сюріриз	96330002	2001	378 / 378	С	7	х	ср	5	5	7	5	7	х
Самаран 6	® 04330002	2006	311 /	С	7	х	рс		7	7	7	7	х
Рис - 10													
Агат	® 04009001	2007	412 /	С		цін	рс	7		7	7	7	зерн
Аптей	® 02009009	2005	412 /	С	8	зерн	сп	7		7	7	8	цін
Дніпровський	99009001	2002	412 / 412	С	7	зерн	рс	7		7	5	5	зерн
Зубень	00009002	2003	412 / 412	С	7	зерно	рс	7		7	7	7	цін
Мутант 428	86009004	1989	412 / 412	С	7	зерн	рс	7		7	5	5	цін
Пам'яті Гічкана	® 02009008	2005	412 /	С	7	зерн	сс	7		7	7	8	харчовий
Славутин	00009001	2003	412 / 412	С	7	зерно	рс	5		7	7	7	цін
Спальчик	76009009	1990	15 / 412	С	7	зерн	сс	7		5	5	5	цін
Україна 96	96009003	2001	412 / 412	С	7	зерн	ср	7		7	7	5	х
Янгтарний	® 02009010	2005	412 /	С	7	зерн	рс	7		7	7	8	цін

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Соняшник - 185

Аліснор	98017003	2001	806 /	Л	8	олн	скс		5	7-9	8	5	вл
Альфа	02017016	2006	1169 /	Л	7	олн	скс		7	9	8	8	вл
Байда	98017039	2003	329 / 329	СЛ	5	олн	скс		6	8	8	5	вл
Візит	97017021	2000	879 /	С	5	олн	скс		5	7-9	7-9	5	вл
Гетьман F1	98017041	2001	1093 /	СЛ	8	олн	скс		6	7-9	8	6	вл
Донбас	® 01017015	2004	1083 /	СЛ	7	олн	скс		7	8	8	7	вл
Деркул	® 99017012	2004	1083 /	СЛ	7	олн	скс		7	8	8	7	вл
Елріка МЛ	00017009	2004	134 /	СЛ	7	конд	скс		7	8	8	7	сл
Еней	® 99017021	2002	404 / 404	СЛ	8	вол	скс		6	7-9	8	7	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
Заграва	04017010	2007	736 /	Л	8	олн	скс		8	8	9	8	олн
Зубр	01017029	2004	378 /	СЛ	7	олн	скс		8	8			вл
Захват	® 02017038	2006	378 /	СЛ	7	олн	скс		9	8	8	8	вл
Злива	® 99017008	2002	378 /	С	7	олн	скс		7	8	7-9	7	вл
Заклик	® 01017040	2004	1114 /	Л	7	олн	скс		8	9	8	7	вл
Завіт	® 02017040	2005	378 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	9	8	вл
Красень	97017020	2001	404 / 404	С	8	олн	скс		6	7-9	7-9	7	вл
Карат	® 04017056	2007	404 /	Л	9	олн	скс		8	8,8	8	8,5	вл
Кий	97017022	2000	404 / 404	С	7-9	олн	скс		5	8	8	7-9	вл
Логос	04017065	2007	1169 /	Л	8	олн	скс		8	8,8	9	8,5	вл
Міраж	® 03017009	2007	216 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	8	7	вл
Мірослав	® 04017034	2007	1141 /	СЛ	7	олн	скс		8	9	8	8	вл
Монарх	® 05017004	2007	879 /	СЛ	8	вол	скс		9	8,5	9	8	вл
Оберіг	04017054	2007	1093 /	СЛ	9	олн	скс		8	8,5	9	8,5	вл
Октава	® 01017021	2005	51 / 366, 51	СЛ	7	олн	скс		7	7	8	7	вл
Онїкс	® 04017067	2007	919 /	СЛ	7	конд	скс		8	8	8	8	сл
Прометей	97017033	2001	329 / 329	С	5	олн	скс		5	7-9	7-9	5	вл
ІР62А91	00017017	2003	767 /	СЛ	8	олн	скс		6	8	8	7	вл
Партнер	03017018	2005	126 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	9	7	вл
Русіч	04017052	2007	1093 /	СЛ	9	олн	скс		8	8,8	9	8,5	вл
Ранок	99017023	2003	1110 /	Л	5	конд	скс		5	7	8	6	сл
Соната	01017031	2004	1093 /	СЛ	7	олн	скс		8	8,5	8	8	вл
Сонячний настрій	04017011	2007	736 /	Л	7	олн	скс		8	8	9	8	вл
Славутич	02017033	2006	1093 /	С	7	олн	скс		7	7	9	8	вл
Сайво	® 99017009	2003	378 /	С	7	олн	скс		7	8	8	6	вл
Сувенір	02017007	2005	329 /	Л	7	олн	скс		8	8	7	7	вл
Сівер	99017022	2002	404 / 404	С	8	олн	скс		6	8	7-9	7	вл
Тіса	95017005	2000	879 / 879	С	7-9	олн	скс		5	7-9	7-9	5	вл
Тріумф	03017025	2007	16 / 1112	Л	7	олн	скс		8	8	8	7	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Українське сонечко	00017008	2004	736 /	Л	7	олн	екс		8	7	8	7	вл
Український скоростиглий	98017052	2001	736 /	СЛ	5	олн	екс		5	8	8	5	вл
Флокс	® 02017037	2005	1114 /	СЛ	7	олн	екс		7	8	9	8	вл
Форум	04017055	2007	1093 /	СЛ	9	олн	екс		8	8,7	8,5	8,5	вл
Харківський 49	88017007	1992	404 / 404	СЛ	5	олн	екс		5	5	7-9	5	вл
Ясон	® 04017042	2007	404 /	СЛ	9	олн	екс		8	8,5	9	8	вл
Айгана	00017002	2003	806 /	СЛ	8	олн	рс		6	8	8	6	вл
Альзан	98017004	2001	806 /	Л	8	олн	рс		6	7-9	7-9	5	вл
Альгес РМ	98017005	2002	806 /	Л	8	олн	рс		6	7	8	5	вл
Алісон	02017001	2006	806 /	С	8	олн	рс		8	9	8		вл
Аноне	® 02017028	2005	378 /	С	8	олн	рс		7	8	7	7	вл
Альянс	95017025	1999	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Анг	® 01017025	2004	404 / 404	СЛ	7	вол	рс		8	8	8	7,5	вл
Атланга	01017001	2004	806 /	Л	7	олн	рс		7	8	8	7	вл
Альмагзор	98017054	2002	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	8	8	5	вл
Алмаз	® 03017008	2005	1192 /	СЛ	8	конд	рс		8	8	7	7	вл
Балкан	00017013	2004	879 / 879	Л	8	олн	рс		7	7	8	7,5	вл
Весвіт	® 04017049	2007	404 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,5	9	8,5	вл
Віста	05017009	2007	485 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,7	9	8	вл
Відок	03017020	2005	924 /	СЛ	9	олн	рс		9	8	8	8	вл
Дует	® 01017023	2005	51 / 366	СЛ	7	олн	рс		7	9	7	7	вл
Діаболю	01017003	2003	793 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	8	8	7	вл
Дунай	92017043	1996	879 / 879	С	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Драган	® 02017011	2004	1141 /	Л	8	олн	рс		8	9	8	7,5	вл
Донський 60	82017010	1987	216 /	С	8	олн	рс		7	7	8	8	вл
Джасі	01017038	2004	1079 /	Л	9	олн	рс		8	9	8	7,5	вл
Дарій	® 02017024	2005	404 / 404	СЛ	8	вол	рс		7	8	9	8	вл
Енергик РМО	01017002	2004	806 /	Л	7	олн	рс		7	8	8	7	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації			Заявник / Підтримувач	Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
													посу- хи
Етюд	01017026	2005	404 /	СЛ	8	олн	рс		9	8	9	7	вл
Ес Карамба	03017012	2006	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		8	9	8	8	вл
Запорізький кондитерський	94017001	1998	329 / 329	Л	5	конд	рс		5	5	7-9	5	сл
Запорізький 28	97017035	2001	329 / 329	Л	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Залік	01017030	2005	378 /	СЛ	7	олн	рс		7	8	9	7	вл
Запорізький 26	97017024	2000	329 / 329	С	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Злата	01017039	2005	1114 /	Л	8	олн	рс		7	8	9	8	вл
Зевс	04017006	2007	879 /	Л	8	олн	рс		8	8,8	9	8,5	вл
Застава	01017041	2005	1114 /	СЛ	8	олн	рс		7	8	9	8	вл
Запорізький 32	98017038	2003	329 / 329	СЛ	5	олн	рс		5	8	8	5	вл
Захист	® 99017010	2003	1114 / 1114	С	8	олн	рс		6	8	8	6	вл
Знахідка	® 99017011	2002	1114 / 1114	С	8	олн	рс		6	8	8	6	вл
Златибор	® 04017021	2006	879 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	9	7	вл
Імператор	® 04017031	2006	1141 /	С	7-9	олн	рс		8	8	8	7	вл
Іберіко	04017028	2007	793 /	Л	8	вол	рс		8	8,5	9	8	вл
Красотка	91017023	1997	806 /	СЛ	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Ковчег	® 00017007	2003	404 / 404	Л	8	олн	рс		6	7-9	8	7	вл
Красотка РМ	98017028	1997	806 /	СЛ	5	олн	рс		5	8	8	5	вл
Каньон	® 04017032	2006	1141 /	СЛ	7-9	олн	рс		9	8	9	8	вл
Кеопс	02017002	2004	806 /	С	7	олн	рс		8	8,6	8	7	вл
КВС Гелія 04 РО	03017051	2007	938 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,6	9	8	вл
Косово	® 05017003	2007	879 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	8,5	9	8	вл
КВС Гелія 06	03017050	2006	938 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8	вл
Лейіла	® 05017007	2007	806 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,5	9	8	вл
Латіно	04017029	2007	793 /	Л	8	вол	рс		7	8	9	8	вл
Лакомка	03017022	2006	16 / 1112	Л	8	конд	рс		8	8	8	7	сл
Лайка	05017010	2007	485 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,8	9	8	вл
Морава	® 05017002	2007	879 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8,5	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Меридіан	04017007	2006	879 /	СЛ	8	олн	рс		8	8	9	8	вл
Мастер	03017023	2006	16 / 1112	Л	8	олн	рс		7	7	8	7	вл
Пой	97017032	2001	404 / 404	С	8	олн	рс		5	7-9	8	7	вл
Пібас	01017013	2004	765 /	Л	7	олн	рс		7	8,8	8	7,5	вл
Надійний	02017008	2004	329 / 329	Л	9	олн	рс		7,5	8	8	7	вл
Одеський 249	92017055	1998	378 / 378	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Одор	00017014	2005	378 /	С	7	вол	рс		7	8	7	7	вл
Олівер 90	® 02017031	2006	378 /	С	7	вол	рс		8	8	8	7	вл
Олетар РМ	98017057	2002	806 /	Л	8	олн	рс		6	8	7-9	6	вл
Одеський 122	85017006	1989	378 / 378	СЛ	5	олн	рс		7-9	5	7-9	7-9	вл
Оскіл	® 04017050	2007	404 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	8,7	9	8,5	вл
ІПР64Л63	00017020	2004	767 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	8	8	вл
ІПР63Л40	® 04017024	2007	767 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	9	9	8	вл
ІПР64І 45	04017027	2006	767 /	СЛ	8	вол	рс		8	9	9	8	вл
Несма	® 05017018	2007	1114 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8,5	вл
ІПР64І 51	00017019	2004	767 /	СЛ	8	вол	рс		8	9	8	8	вл
Петропавлівський	01017014	2004	765 /	СЛ	7	олн	рс		7	8	8	8	вл
ІПР63Л90	98017044	2001	767 /	Л	8	олн	рс		6	7-9	8	7	вл
Президент	® 04017033	2006	1141 /	С	8	олн	рс		8	9	9	7	вл
Роднік	03017024	2006	16 / 1112	С	7	олн	рс		7	7	8	7	вл
Рими	® 02017044	2005	879 / 879	СЛ	8	олн	рс		7	8	8	8	вл
Рімісол	® 02017043	2006	879 /	СЛ	7	олн	рс		8	9	8	8	вл
Символ	® 02017029	2006	378 /	СЛ	8	олн	рс		7	8	8	7	вл
Сирена (МС)	04017022	2006	273 /	Л	7	олн	рс		8	8	9	8	вл
Слав'янин	94017042	1999	329 / 329	СЛ	5	вол	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Сула	97017037	2001	879 / 329	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Сержан	04017008	2006	879 /	Л	8	олн	рс		8	9	9	8	вл
Світоч	92017004	1996	404 / 404	СЛ	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Савінка	94017009	1999	1079 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Старобільський	02017004	2005	1083 /	Л	8	олн	рс		7	7	8	7	вл
Саша	® 05017019	2007	1114 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8	вл
Терра	® 05017005	2007	806 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8,5	вл
Тітанік	® 02017009	2004	1141 /	Л	9	олн	рс		8	9	8	7,5	вл
Тайфун	® 03017010	2006	216 /	С	7	олн	рс		8	8	9	8	вл
ТРК 1804	01017044	2005	1000 /	СЛ	8	олн	рс		8	8	9	8	вл
Теїде	98017055	2002	806 /	Л	8	вол	рс		6	8	8	7	вл
Український F1	97017018	2001	736 /	СЛ	5	олн	рс		5	8	8	5	вл
Фрагмент	® 02017034	2005	1114 /	СЛ	7	олн	рс		8	8	9	8	вл
Франкасол	® 94017027	1999	437 / 437	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Флагман	03017026	2006	16 / 1112	Л	8	олн	рс		7	8	8	8	вл
Хорс	04017009	2006	879 /	Л	8	олн	рс		8	9	8	8	вл
ЧаС	® 03017047	2007	919 /	Л	7	олн	рс		8	8	9	7	вл
Ягуар	94017021	1999	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Аліїум РМ	04017013	2006	806 /	С	7	олн	сп		8	8	9	7	вл
Абсолют	04017039	2007	938 /	С	9	олн	сп		8	9	9	8	вл
Арена ПР	01017012	2003	1079 /	СЛ	8	олн	сп		6	7-9	8	7	вл
Арена	97017025	2000	1079 /	С	7-9	олн	сп		5	8	6	7	вл
Аламо	94017019	1999	806 /	СЛ	7-9	олн	сп		5	7-9	7-9	5	вл
Белград	® 02017012	2004	1141 / 879	Л	8	олн	сп		8	8,5	8	7,8	вл
В 306	92017046	2000	901 /	С	5	олн	сп		5	5	7-9	5	вл
Вранац	® 03017016	2006	879 /	Л	8	конд	сп		8	9	8	8	СЛ
Гена	00017011	2003	879 / 879	СЛ	7	олн	сп		5	8	8	6	вл
Днєпр	92017042	1997	879 / 879	СЛ	5	олн	сп		5	7-9	7-9	5	вл
Згода	92017005	1996	378 / 378	С	5	олн	сп		5	7-9	7-9	5	вл
Конгрес	05017042	2007	1141 /	СЛ	9	олн	сп		8,5	9	9	8,5	вл
Казіо	79017016	1998	1079 /	СЛ	7-9	олн	сп		5	7-9	7-9	5	вл
КВС Гелія 04	98017018	2002	938 /	СЛ	8	олн	сп		5	8	7-9	5	вл
Лан 26	98017053	2001	1096 / 1083	С	5	олн	сп		6	8	8	7	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Мілуґін	® 02017010	2005	1141 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	9	7	вл
НК Долбі	04017059	2007	1079 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	9	8,5	вл
НК Ферті	04017061	2007	1079 /	С	9	вол	ср		9	9	9	8	вл
Оріон	89017004	1993	216 / 1192, 1059	СЛ	5	олн	ср		5	5	5	5	вл
Одеський 504	92017006	1997	378 / 378	СЛ	7-9	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
Одеський 123	85017007	1990	378 / 378	СЛ	5	олн	ср		5	5	7-9	5	вл
Ньоя	04017048	2007	404 / 404	СЛ	9	вол	ср		8,5	8,5	9	8,5	вл
НР64Г91	® 04017023	2007	767 /	СЛ	8	вол	ср		8	8	9	8	вл
Погляд	94017002	1999	404 / 404	С	7-9	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
НР64А44	01017046	2004	767 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	8	7	вл
НР64А71	® 02017014	2005	767 /	Л	9	олн	ср		9	8	9	8	вл
НР64А10 (Синонім: Міхаїл)	98017043	2001	767 /	С	8	олн	ср		7	7-9	8	7	вл
НР64А58	02017013	2006	767 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	9	8	вл
Самфир	® 03017039	2006	378 /	Л	8	олн	ср		8	8	9	8	вл
Термінатор	05017041	2007	1141 /	СЛ	9	олн	ср		8,5	8,5	9	8,5	вл
АК 0324	® 01017045	2005	938 /	СЛ	9	олн	сс		8	8	9	7	вл
Дністр	95017003	2000	879 / 879	СЛ	7-9	олн	сс		5	7-9	7-9	5	вл
Донський крупнопісний	89017003	1993	216 / 1059, 1192	СЛ	5	конд	сс		5	5	5	5	сл
Сврофлор	93017003	1998	806 /	Л	7-9	олн	сс		5	7-9	7-9	5	вл
ЛХА 252/11	04017068	2007	793 /	СЛ	9	олн	сс		8	9	9	8	вл
Макао	® 03017019	2006	924 /	С	9	олн	сс		7	9	9	7	вл
НК Роккі	03017046	2006	1079 /	СЛ	8	олн	сс		8	9	9	8	вл
НК Мелдімі	04017058	2007	1079 /	СЛ	9	олн	сс		9	9	9	8	вл
Нікозі	02017042	2005	1079 /	СЛ	9	олн	сс		8	8	9	8	вл
НК Бріо	01017037	2004	1079 /	СЛ	9	олн	сс		8	8,8	8	8	вл
Опера НР	02017005	2005	1079 /	Л	9	олн	сс		9	9	9	8	вл
НР64А78	® 04017025	2007	767 /	СЛ	9	олн	сс		7,5	9	9	8	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
								посу- хи	поля- гання	осипання	хвороб	
ПР64А83	00017001	2002	767 /	Л	8	олн	сс	5	7-9	8	7	вл
Ригасол	98017026	2001	437 /	Л	8	олн	сс	6	8	8	5	вл
Санай	03017001	2006	1079 /	С	7	олн	сс	8	8	9	8	вл
Флай	99017003	2001	437 /	СЛ	8	олн	сс	5	7-9	8	7	вл
Харківський 3	90017011	1994	404 / 780	СЛ	5	олн	сс	5	5	7-9	5	вл
Хортиця	92017045	1996	879 / 879	СЛ	7-9	олн	сс	5	7-9	7-9	5	вл
Соя - 82												
Аннушка	® 04018007	2007	416 /	СЛП	7-8	зерн	ске	8	9	9	9	сл
Діона	® 03018016	2007	411 /	ЛП	7-8	зерн	рс	8	9	9	9	сл
Єлена	® 01018003	2004	345 / 345	СЛП	7-9	зерн	ске	7	7,5	7	8	сл
Знахідка	® 02018001	2005	356 /	СЛП	7-9	зерн	ске	8	7	8	9	сл
Ксеня	01018002	2004	432 /	СЛП	7	зерн	ске	7	7,5	7,5	8	сл
Устя	® 98018003	2002	345 / 345	П	7-9	зерн	ске	6	6	6	5	сл
Фея	® 01018001	2004	404 / 404	СЛП	7-9	зерн	ске	7	6,5	8	8	сл
Аметист	94018009	1998	399 / 540	СЛ	6	зерн	рс	5	6	6	5	сл
Алмаз	® 04018013	2007	462 /	Л	7-8	зерн	рс	8	9	9	9	сл
Анжеліка	® 04018010	2007	345 /	ЛП	7-8	зерн	рс	8	9	8	9	сл
Аполон	99018002	2003	411 /	СЛП	7-9	зерн	рс	7	6	6	5	сл
Блисканиця	00018006	2004	355 / 378	СЛП	7	зерн	рс	7	8	7	8	сл
Бояна	03018004	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс	8	7	8	9	сл
Донька	® 99018005	2003	378 /	СЛ	7-9	зерн	рс	7	6	6	5	сл
Київська 91	90018016	1996	345 / 345	Л	5	зерн	рс	5	6	5	5	сл
Київська 98	® 97018008	2001	345 / 345	ЛП	7	зерн	рс	5	6	6	5	сл
Краса Поділля	94018003	1999	305 /	СЛП	7	зерн	рс	5	6	6	5	сл
Корада	® 03018006	2005	142 /	СЛП	9	зк	рс	8	8	8	9	сл
КиВін	® 04018009	2007	305 /	Л	7	зерн	рс	8	8	9	9	сл
Лара	03018001	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс	8	8	8	9	сл
Медя	94018005	1998	356 /	СЛ	6	зерн	рс	6	5	5	5	сл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Мрія	95018001	1999	404 / 404	СЛ	7	зерн	рс		6	6	6	5	сл
ОЛІ-Віжюні	® 03018007	2006	142 /	Л	9	харч/корм	рс		8	8	8	9	сл
Прийнять	® 03018017	2007	1001 /	ЛП	7-8	зерн	рс		8	9	9	9	сл
Протейка	03018003	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс		8	8	8	9	сл
Романтика	94018008	1998	404 / 404	СЛ	7	зерн	рс		6	6	6	5	сл
Седміца	03018002	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс		8	7	8	9	сл
Скеля	® 03018014	2007	404 /	Л	7-8	з/к	ср		8	8	9	9	сл
Святкова	02018004	2005	736 /	СЛП	7-9	зерн	рс		8	8	7	9	сл
Фастон	95018002	2000	411 /	СЛП	7	зерн	рс		6	6	5	5	сл
Харківська 35	86018004	1991	404 / 404	С	5	зк	рс		5	5	5	5	сл
Юг 30	87018007	1990	411 /	СЛП	5	зк	рс		6	5	5	5	сл
Ювілейна	® 02018002	2005	356 /	СЛП	9	зерн	рс		8	7	8	9	сл
Ясельда	01018004	2005	1001 /	СЛП	9	зерн	рс		8	8	7	8	сл
Артемід	97018003	2001	399 /	С	7	зерн	ср		6	6	6	5	сл
Аркадія одеська	83018001	1986	378 / 378	С	5	зерн	ср		7-9	5	5	5	сл
Берегиня	® 99018001	2002	378 /	С	7	зерн	ср		7	6	6	5	сл
Валентія	00018008	2003	355 / 378	СЛ	7-9	зерн	ср		7	6	6	5	сл
Версія	® 04018015	2007	404 /	ЛП	7-9	зерн	ср		8	7	9	9	сл
Валюта	97018002	2001	356 /	С	7	зерн	ср		5	6	6	5	сл
Васильківська	00018007	2003	378 / 345, 378	СЛП	7-9	зерн	ср		7	6	6	5	сл
Вілана	04018005	2007	16 / 1112	СЛ	7-9	зерн	ср		9	8	9	9	сл
Величава	® 04018014	2007	404 /	ЛП	7-8	зерн	ср		8	9	9	9	сл
Горлиця	® 03018012	2006	950 /	СЛП	7-9	зерн	ср		8	8	8	9	сл
Горизонт	® 98018002	2002	404 / 404	С	7-9	зерн	ср		6	7	6	5	сл
Дельта	04018004	2007	16 / 1112	Л	9	зерн	ср		8	7	9	9	сл
Ельдорадо	® 02018003	2005	378 /	СЛП	9	зерн	ср		8	7	8	9	сл
Золотиста	00018005	2004	305 /	СЛП	7-9	зерн	ср		7	8	8	8	сл
Ізмрудина	90018004	1995	356 /	С	5	зерн	ср		6	5	5	5	сл
Іванка	91018001	1996	345 /	Л	5	зерн	ср		5	6	6	5	сл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-трації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Київська 27	86018003	1990	345 / 345	ЛП	5	зк	ср		5	5	5	5	сн
Оксана	97018004	2001	411 /	С	7	зерн	ср		6	6	6	5	сн
Офелія	00018001	2003	329 / 329	С	7	зерн	ср		7	6	6	5	сн
Омега вінницька	® 04018008	2007	305 /	Л	7	зерн	ср		8	8	8	9	сн
Особлива	® 03018010	2006	950 /	ЛП	7-9	зерн	ср		8	8	8	9	сн
Оріана	98018001	2002	305 /	С	7	зерн	ср		6	6	6	5	сн
Подільська 416	® 96018003	2001	950 /	Л	7	зерн	ср		5	6	6	5	сн
Прикарпатська 96	97018005	2001	330 /	С	6	зерн	ср		5	6	6	5	сн
Равніца	03018005	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	ср		8	8	8	9	сн
Стратегія	® 00018003	2004	950 /	СЛП	7-9	зерн.	ср		7	8	8	7	сн
Супра	® 03018008	2006	142 /	СЛП	9	харч/корм	ср		9	9	8	9	сн
Сонячна	92018005	1997	329 / 329	СЛ	5	зерн	ср		6	6	5	5	сн
Східна	00018002	2004	404 / 404	СЛП	7-9	зерн	ср		7	8	7	8	сн
Спринг	99018003	2003	329 / 329	СЛ	7	зерн	ср		6	6	6	5	сн
Харківська зерно кормова	90018003	1994	404 / 404	СЛП	5	зк	ср		6	6	5	5	сн
Чернівецька 9	96018002	2001	432 /	СЛ	7	зерн	ср		5	6	6	5	сн
Юг 40	83018013	1987	411 /	С	5	зк	ср		6	5	5	5	сн
Ятрань	® 03018009	2006	378 /	СЛП	7-9	зерн	ср		9	8	9	9	сн
Анатоліївка	97018007	2001	305 /	С	7	зерн	сс		6	5	6	5	сн
Агат	94018017	2000	399 /	СЛ	7	зерн	сс		5	6	6	5	сн
Витязь 50	88018009	1992	411 /	С	5	зерн	сс		5	5	5	5	сн
Вінничанка	® 03018011	2006	950 /	ЛП	7-9	зерн	сс		9	8	8	8	сн
Деймос	94018002	1998	411 /	С	7	зерн	сс		6	6	5	5	сн
Маша	® 03018013	2006	329 /	ЛП	7-9	зерн	сс		9	9	8	8	сн
Мар'яна	94018001	1999	345 / 378	П	7	зерн	сс		6	5	6	5	сн
Мельпомена	® 04018012	2007	378 /	Л	9	зерн	сс		8	7	9	9	сн
Одеська 150А	97018011	2001	378 / 378	ЛС	7	зерн	сс		6	6	6	5	сн
Подільська 1	92018017	1997	417 /	СЛ	5	зерн	сс		6	5	5	5	сн
Подолянка	94018004	1999	950 /	П	7	зерн	сс		5	6	6	5	сн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Срібна	99018004	2003	329 / 329	СЛ	7	зерн	сс		6	6	6	6	сл
Феміда	00018004	2004	305 /	СЛ	5	зерн	сс		7	8	8	7,5	сл
Чернівська 8	89018019	1994	432 /	Л	5	зерн	сс		5	5	6	5	сл
Ріпак озимий	-	42											
Аліот	® 04016003	2007	350 /	СЛП	7-9	олн		8-8,5	7,9-8,7	8,3-9,0	8,0-8,9	8,9	00
Анна	02016011	2007	329 /	Л,П	8-9	олн		8,0	8,5	8,6	7,5-8,4	8,4-9,0	00
Артус	® 03016004	2006	912 / 912	СЛП	5	олн		8	8	9	8	8	00
Ангарія	03016002	2006	306 /	СЛП	5	олн		9	9	8	8	6	00
БЕ 18098	® 03016005	2006	912 / 912	СЛП	5	олн		9	8	9	8	7	00
Вектра	® 04016004	2007	1213 /	Л,П	8-9	олн		7,8-8,3	8,5-8,8	8,7-8,8	7,8-8,0	9,0	00
Гелю	01016002	2005	423 /	СЛП	9	олн		8,7	8,5	9	9	9	00
Дембо	01016001	2005	332 /	СЛП	9	олн		8,5	8	8,7	9	8,7	00
ЕС Астрід	03016008	2006	806 /	СЛП	5	олн		8	9	8	8	6	00
Контакт	97016018	2001	437 /	ЛП	7	олн		7,5	7	8	7,8	9	00
Ландар	01016003	2005	350 /	СЛП	9	олн		8,5	8,7	8,6	8,7	9	00
Митницький 2	73016002	1998	350 /	П	5	тхн		5	7	7	5	5	++
НІПЦ 9800	® 00016004	2005	912 / 912	СЛП	9	олн		9	9	9	9	9	00
Сенатор Люкс	02016008	2006	345 /	П	5	олн		8	8	8	8	8	00
Таурус	® 04016007	2007	912 / 912	Л,П	8-9	олн		7,8-8,3	8,5-8,8	8,8-9,0	7,8-8,0	8,5-9,0	00
Трабант	® 03016006	2006	912 / 912	СЛП	5	олн		9	8	9	9	9	00
Чемпіон України	02016009	2006	345 /	ЛП	5	олн		8	8	8	8	8	00
Алігатор	97016024	2001	938 /	П	7	олн		7-9	7	>5	7	7	00
Атлант	97016010	2001	329 / 329	Л	7	олн		7	>5	>5	5	7	00
Бажаний	94016001	1998	306 /	Л	5	олн		5	>5	>5	>5	7	0
Воган	92016008	1997	912 /	П	7	олн		7	>5	7	7	>5	00
Валсека	94016002	2001	926 /	Л	7	олн		7	7	5	7	7	00
Гібрид соколівський	97016009	2001	350 /	Л	5	олн		5	5	5	5	5	0
Галицький	92016004	1997	332 /	СЛ	7	олн		7	5	7	5	5	0

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Горизонт	92016002	1997	306 /	СЛ	5	олн		7	>5	>5	>5	5	00
Горинський	99016023	2003	1115 /	СЛП	7	олн		7	7	7	5	7	00
Дангал	97016013	2001	332 /	ЛП	7	олн		>5	>5	5	5	7	00
Елвіс	98016012	2001	806 /	ЛП	7	олн		7-9	7	7	>5	7	00
Еліт	98016013	2002	806 /	СЛП	7	олн		7	7	7	7	7	00
Ксаверівський	90016006	1995	350 /	ЛП	5	олн		5	>5	5	>5	5	0
Капітоль	97016017	2001	437 /	Л	7,5	олн		8	8	8	8,5	9	00
Кронос	® 99016019	2003	912 /	СЛП	9	олн		9	7	7	7	7	00
Ліраджет	92016011	2001	807 /	П	7	олн		7	7	>5	>5	7	00
Лібеа	® 98016022	2001	807 /	П	7	олн		7	7	7	>5	7	00
Надія	99016011	2003	350 /	СЛП	7	олн		>5	>5	>5	>5	7	00
Оділа	99016012	2002	946 /	Л	7	олн		7-9	7	>5	>5	7	00
Ранок Поділля	97016023	2002	306 / 791	ЛП	7	олн		7-9	>5	>5	7	7	00
Світоч	90016017	1995	306 / 791	ЛП	5	олн		5	5	7	>5	5	00
Свста	88016008	1995	332 /	ЛП	5	олн		5	>5	>5	5	>5	00
Тисменицький	84016001	1989	332 /	СЛП	7	олн		7	>5	>5	>5	>5	00
Федорівський полішений	92016015	1998	350 /	СЛ	5	олн		>5	7	>5	>5	5	0
Чорний велетень	97016022	2002	306 / 791	ЛП	7	олн		7	>5	7	7	7	00
Ріпак ярий	-	34											
Айдар	02016006	2006	736 /	ЛП	5	олн		7	8	9	8	9	00
Абілігі	® 04016001	2006	807 /	ЛП	6	олн		9	8	9	9	9	00
Арїон	91016002	1996	332 /	Л	7-9	олн		7	7	7	7	7	00
Аїра	03016003	2005	306 /	СЛП	9	олія		9	9	9	9	9	00
Болеро	97016004	2001	926 /	П	7-9	олн		7-9	7	9	9	7	00
Байкал	® 98016002	2001	912 / 912	ЛП	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
ВНІС 100	01016004	2004	736 /	ПЛ	7	олн		7	7-9	9	9	9	00
Герос	® 04016009	2006	1213 /	ЛП	5	олн		9	9	9	8	9	00

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- трації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
				посухи					поля- гання	осипання	хвороб		
Гайди	® 03016013	2006	912 / 912	ЛП	5	олн		9	9	9	8	9	00
Добробут	01016005	2004	736 /	ПЛ	7	олн		7	9	9	7-9	9	00
Клітинний 1	91016009	1996	350 /	СЛП	5	олн		5-7	5	7	5	7	00
Калинівський	90016015	1994	350 /	СЛП	5-7	олн		5	5	7	5-7	7	00
Квантум	97016003	2001	926 /	Л	7-9	олн		7	7-9	7	7	7	00
Кліф	® 00016005	2003	912 / 912	СЛП	9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Клітинний 8	95016001	2000	350 /	ЛП	5-7	олн		5	5	5-7	7	7	00
Ліга	97016014	2001	332 /	П	5-7	олн		5	5	7	7	7	00
Ліколі	95016002	2000	807 /	П	7-9	олн		7-9	7-9	9	9	9	00
Лужок	98016005	2003	332 /	СЛП	5-7	олн		5-7-	7	7	9	9	00
Марія	99016018	2003	1106 /	СП	7-9	олн		7-9	7-9	7-9	9	9	00
Микитинський	92016017	1997	332 /	СП	6,5	олн		5	5	5	5-7	7	00
Матан	02016007	2005	345 / 345	СЛП	8,6	олн		9	8,7	8,6	9	9	00
Ольга	® 97016005	2001	912 / 912	П	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Отаман	94016026	1999	329 / 329	С	7-9	олн		7	7	7-9	7	7-9	00
Оксамит	99016017	2003	1106 /	СП	5-7	олн		7	7	9	9	9	00
Обрій	03016012	2006	329 /	ЛП	5	олн		7	8	9	8	9	00
Отма	® 03016010	2006	350 /	ЛП	5	олн		7	9	9	8	9	00
РІС 003/Сари	® 04016008	2006	1213 /	ЛП	5	олн		9	9	9	9	9	00
Сісета F1	® 99016009	2002	912 / 912	СЛП	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Сіріус	® 03016009	2006	350 /	ЛП	5	олн		7,5	8	9	9	8-9	00
Сріблястий 1	® 03016011	2007	350 /	С,Л,П	8-9	олн		8	8,5	8,5	8,5	9,0	00
Терра	® 99016010	2002	912 / 912	СЛП	9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Форте	87016003	2001	938 /	Л	7-9	олн		5-7	7	9	9	7	00
Фаворит	99016022	2003	1115 /	П	7	олн		7	7-9	9	7	9	00
Льон кудряш			- 13										
Айсберг	00094001	2001	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	7	7	
Блакитно помаранчевий	® 06094002	2007	345 /	СЛП	8	олн			7	8	8	9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації			Заявник / Підтримувач	Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	поля- гання						осипання	хвороб		
ВНІМК 620	05094002	2007	16 / 1112	СЛП	8	олн			7	8	8	7	
Дебют	99094002	2001	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	8	7	
Еврика	03094001	2004	345 / 345	СЛП	7	олн			8	9	8	7-9	
Золотистий	03094002	2005	329 /	СЛ	8	олн			7	5	7	8	
Ківіка	® 05094003	2007	329 /	С	8	олн			7	7	8	8	
Ліріна	00094002	2002	807 /	СЛ	7-9	олн			7	8	8	7	
Надійний	® 06094001	2007	216 /	СЛ	8	олн			8	8	8	9	
Орфей	00094004	2002	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	8	7	
Південна ніч	99094001	2001	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	8	7	
Славний	® 05094001	2006	329 /	С	8	олн			7	7	8	8	
Симпатик	® 06094003	2007	345 /	СЛП	8	олн			8	8	8	9	
Рижій ярий	-	5											
Гірський	97097001	2000	332 /	СЛ	7	олн			6	8	8	6	
Клондайк	03097001	2004	345 / 345	СЛ	7	олн			8	9	9	7	
Міраж	94097001	2000	329 / 329	СЛП	7	олн			6	8	8	6	
Престиж	05097001	2006	329 /	СЛП	7	олн			8	7	7	8	
Степовий 1	92097001	1996	329 / 329	СЛП	5	олн			5	7	7	5	
Гірчиця сарептська	-	5											
Мрія	94144003	2000	329 / 329	СЛ	7	олн			6	8	8	7	
Роксолана	94144002	1999	332 /	С	5	олн			6	7	7	5	
Світлана	03144003	2005	329 /	СЛ	7	олн			7	7	5	7	
Тавричанка	92144001	1996	329 / 329	СЛ	5	олн			5	7	7	5	
Чорнява	04144004	2006	466 /	СЛ	7	олн			8	7	7	7	
Гірчиця біла	-	5											
Еталон	03092001	2004	345 / 345	СЛП	7	олн,сд			7	9	8	8	
Кароліна	90092002	1994	305 /	СЛП	5	олн			6	7	8	5	
Підпечерська	94092001	2000	332 /	Л	8	олн			5	7	8	6	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Талісман	94092002	2000	329 / 329	ЛП	7	олн			6	8	7	5	
Юлія	02092001	2003	1115 /	СЛП	8	олн			6	8	8	6	
Рицина	-	4											
Олеся	00098002	2001	329 / 329	СЛ	7	олн			6	8	8	6	
Хортицька 1	92098002	1996	329 / 329	С	5	олн			6	7	8	6	
Хортичанка	00098001	2001	329 / 329	СЛ	7	олн			6	7	8	6	
Хортицька 3	98098001	2001	329 / 329	СЛ	7	олн			6	7	8	6	
Мак	-	22											
Беркут	92095001	1996	332 /	СЛ	5	олн			5	6	7	5	боп
Вікторія	04095003	2005	1115 /	СЛП	8	олн			7	7	9	8	боп
Грей	® 05095004	2006	583 /	Л	7	олн			7	7	9	8	боп.
Європейський	® 05095002	2007	711 /	ЛП	8	олн			8	8	7	8	боп
Жар	® 05095008	2006	329 /	С	7	озл.			7	8	9	9	
Корал	97095001	2001	329 / 389, 329	СЛ	6	олн			5	7	8	5	боп
Кристал	99095002	2002	389 / 389, 329	СЛ	5	олн			6	7	7	5	боп
Камея	® 05095007	2007	711 /	ЛП	8	олн			7	8	7	8	боп
Кривотульський	99095007	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Колорит	® 05095009	2006	329 /	СЛ	7	олн			7	8	9	8	боп
Меркурій	04095001	2005	1115 /	СЛП	8	олн			7	7	9	9	боп
Марс	99095006	2002	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Поділля	® 05095003	2006	583 /	Л	8	олн			7	7	9	7	боп.
Сатурн	99095004	2002	1108 /	ЛП	7-9	лік			8	8	9	7	
Скорпіон	04095002	2005	1115 /	СЛП	7	олн			9	9	9	8	боп
Снартак	04095004	2005	1115 /	СЛП	8	олн			7	7	9	7	боп
Тарновецький	99095005	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Уран	99095008	2002	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Франківський	99095003	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Шарго	® 05095010	2007	654 /	ЛП	8	олн			8	8	7	8	боп

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Юпітер	99095009	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	бон
Ямгорів	01095001	2006	332 /	ЛП	8	олн,конд			7	8	8	7	бон
<u>Арахіс</u>	-	3											
Валар	® 06091001	2007	29 /	СЛП	9	олн,х			9	9		8	
Клинський	97091001	2002	410 /	С	5	олн,конд			7	7	7-9	5	
Лінар 90	® 06091002	2007	29 /	СЛП	8	олн,х			9	9		8	
<u>Кунжут індійський</u>	-	5											
Боярин	05093002	2006	329 /	С	8	олн			7	9	8	7	
Гусар	05093001	2006	329 /	С	8	олн			7	9	8	8	
Ілона	05093003	2006	329 /	С	8	олн			7	9	8	7	
Кадег	05093004	2006	329 /	С	7	олн			7	9	6	7	
Надія	98093001	2001	329 / 329	ЛС	7	олн			7	8	7	5	
<u>Суріпиця яра</u>	-	1											
Горянка	98145002	2001	332 /	П	7	олн			6	7	8	5	
<u>Льон-довгунець</u>	-	21											
Батист	® 05015001	2007	345 /	П	7	пряд			7	8	8	8	
Вручий	03015001	2007	345 /	П	8	пряд			7	8	8	8	
Глазур	01015001	2005	393 /	П	8	пряд	рс		7	8	8	8	
Глухівський ювілейний	92015003	1996	393 / 393	ЛП	5	пряд	сс		5	7	7	5	
Зоря 87	82015001	1988	371 /	Л	5	пряд	пс		5	6	6	5	
Ірма	95015001	1999	320 /	П	6	пряд	ср		5	7	7	5	
Київський	79015001	1991	345 / 345	П	5	пряд	ср		5	6	6	5	
Каменяр	99015001	2003	371 /	П	7	пряд	ср		6	7	7	5	
Могильовський 2	88015004	1993	454 / 461	П	5	пряд	пс		5	6	6	5	
Персей	94015001	1999	320 /	ЛП	6	пряд	рс		5	7	7	6	
Рушничок	97015001	2000	345 / 345	ЛП	7	пряд	рс		5	7	7	5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
								посухи	полягання	осипання	хвороб	
Синільга	91015001	1995	320 /	П	5	пряд	сс	5	6	6	5	
Український 3	92015001	1997	345 /	ЛП	5	пряд	сс	5	6	6	5	
Український ранній	94015002	1999	345 / 345	ЛП	6	пряд	рс	5	7	7	5	
Чарівний	92015002	1996	393 / 393	ЛП	5	пряд	сс	6	6	7	5	
Борец	® 04015004	2007	461 /	П	7	пряд	ср	7	8	8	8	
Гіліум	00015002	2004	393 / 393	ЛП	7-9	пряд.	ср	7	8	8	7-9	
Довіра	® 04015003	2007	461 /	П	7	пряд	ср	7	8	8	8	
Ліра	02015002	2005	320 / 320	П	7	пряд	ср	7	8	8	8	
Прометей	® 04015002	2007	461 /	П	7	пряд	ср	7	8	8	8	
Світланок	00015001	2004	320 /	ЛП	7-9	пряд.	ср	7	8	8	7-9	
Конопля			-	10								
Глухівські 46	97014001	2000	393 / 393	Л	7-9	пряд		7	7	7	5	
Глухівські 33	92014001	1997	393 / 393	Л	7	пряд		6	7	7	5	
Гляна	05014001	2007	393 /	ЛП	8	пряд		9	9	7	8	
Гієра	01014001	2004	393 / 393	ЛП	7-9	пряд.		8	7	7	7	
Дніпровські одиодомні 14	91014001	1995	393 /	Л	5	пряд		7	7	7	5	
Золотоніські одиодомні 11	79014001	1984	393 / 393	Л	5	пряд		5	7	7	5	
Золотоніські 15	94014002	1998	393 / 393	Л	5	пряд		7	7	7	5	
Зоряна	05014002	2007	393 /	Л	9	пряд		9	9	8	8	
ЮСО 31	82014002	1987	393 / 393	Л	5	пряд		7	7	7	5	
ЮСО 14	75014001	1981	393 / 393	Л	5	пряд		5	7	7	5	
Бавовник			-	4								
Валент	® 06366002	2007	29 /	С	7	пряд		9	9		7	
Дніпровський 5	97366001	2001	411 /	С	5	пряд		7	7-9	7	7	
Підозерський 4	® 03366001	2007	411 /	С	7	пряд		9	9		8	
Рейкот 22	® 06366001	2007	29 /	С	7	пряд		9	9		7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- тації			Заявник / Підтримувач	Продук- тивність	Напря- м вико- рис- тання	Група стиг- лості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
			посу- хи	поля- гання						осипання	хвороб	

Гірчиця сарептська озима 5

Аннушка	04144002	2006	329 /	СЛП	8	олн		7	8	8	8	9	
Венера	04144003	2006	329 /	СЛП	8	олн		7	8	6	8	8	
Деметра	® 04144001	2005	329 / 329	СЛ	8	олн		7	7	7	5	8	
Новинка	02144001	2004	329 / 329	ЛСП	9	олн		7	8	9	9	7	
Романтика	03144002	2005	345 / 345	СЛП	8	олн		7	7	9	7	9	

Гірчиця чорна - 1

Софія	05428001	2006	332 /	ЛП	8	олн			8	7	6	6	
-------	----------	------	-------	----	---	-----	--	--	---	---	---	---	--

Смикавець їстівний (Чуфа) 1

Новинка	05436001	2006	329 /	С	8	олн., х			8	9		8	
---------	----------	------	-------	---	---	---------	--	--	---	---	--	---	--

Сільськогосподарські: буряк

Буряк цукровий - 90

Аратта	94013096	2001	736 /	ЛП	8	уц							
Аббатіса	00013030	2003	736 /	СЛП	9	уц						5-7	сц
Аватар	94013095	1999	736 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Анічка	00013019	2003	334 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Ахаг	02013034	2006	829 /	СЛП	9	ц						7	сц
Арій І	98013056	2002	736 /	Л	8	уц						6-9	сц
Аспікард	02013028	2006	334 /	С	9	уц						5-7	сц
Авторитетний	02013030	2006	736 /	СЛП	9	уц						6-9	сц
Білоцерківський однонасіінний 45	79013001	1984	335 / 334	П	8	уц						6-9	сц
Борута	03013022	2007	1086 /	СЛП	9	у						5-7	сц
Бакара	04013012	2007	743 /	СЛП	8	уц						6-7	сц
Білоцерківський ЧС 90	94013093	1999	335 / 334	СЛ	8	уц						5-7	ср
Білоцерківський ЧС 57	91013011	1995	335 / 334	Л	7	уц						5-7	сц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресетрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
БТС 903 УА	99013001	2002	1032 /	Л	8	уц						5-7	сц
Ворскла	00013013	2003	334 /	ЛП	9	уц						7	сц
Верхнянський ЧС 63	91013004	1996	422 / 334	Л	7	уц						5-7	сц
Веселоподолянський однонасінний 29	71013002	1979	388 / 334	СЛП	8	уц						5	сц
Вінцент	03013012	2007	829 /	СЛП	8	уц						6	сц
Весто	98013049	2001	1082 /	Л	8	уц						5-7	сц
Галина	92013006	1998	334 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Галілео	03013002	2006	1032 /	СЛП	9	уц						6-9	сц
Газета	03013016	2007	1086 /	СЛП	6	у						6-7	сц
Двіна	97013002	2001	743 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Джорджина	00013037	2004	938 /	СЛП	9	уц						7-8	вц
Доброслава	03013024	2006	230 /	СЛП	9	цу						6-9	сц
Дана	92013097	1997	879 / 879	Л	7	уц						5-7	сц
Делеїта	03013023	2007	1086 /	СЛП	7	уц						6-7	сц
Елюді	99013034	2002	796 /	П	8	цукр						5-7	вц
Елюді	02013026	2006	334 /	С	8	уц						6-9	сц
Еквінокс	02013038	2006	938 /	СЛП	9	уц						6-9	сц
Світця	01013024	2005	938 /	СЛП	9	уц						7-9	сц
Зоряний	03013025	2007	230 /	СЛП	8	уц						6-7	сц
Іванівсько- Веселоподільський ЧС 84	95013002	1999	394 / 334	ЛП	8	уц						5-7	сц
Іванівський ЧС 33	87013002	1993	394 / 334	ЛП	8	уц						5-7	сц
КВ Ялгушків	94013049	1999	938 /	СЛП	9	уц						5-7	сц
Кубанський ЧС 36	88013002	1995	736 /	СЛ	8	уц						5-7	сц
Кузявська	01013017	2003	884 /	СЛП	9	уц						7	сц
Кобра	94013024	1999	829 /	П	8	уц						5-7	сц
Каньйон	05013002	2007	743 /	СЛП	9	уц						7-8	вц
Кармеліта	04013020	2007	938 /	СЛП	9	уц						6-7	вц

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресет- рації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря м вико рис- тання	Група стиг лості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посу хи	поля- ган ня	осипан ня	хвороб		
Ківа	92013063	1997	938 /	СЛП	9	уц								
Каверось	94013005	1998	938 /	Л	8	уц							5-7	сц
Константа	01013015	2004	334 /	СЛП	9	уц							5-7	сц
Крістал	91013099	1996	788 / 788	ЛП	8	цукр							8	вц
Класика	03013010	2007	938 /	ЛП	7	уц							5-7	вц
КВ-Збруч	98013036	2001	1082 /	Л	8	уц							6	сц
Казино	01013030	2007	788 /	СЛП	8	у							5-7	сц
Крокодил	02013016	2005	743 /	СЛП	9	ур							8	сц
Люміна	03013003	2006	796 /	СЛ	9	уц							7-9	сц
Ленора	98013064	2002	938 /	СЛП	9	уц							5-9	сц
Лавінія	02013037	2006	938 /	СЛП	9	уц							5-7	сц
Ліберо	03013015	2007	829 /	СЛП	8	уц							6-9	сц
Максим	01013004	2004	334 /	СЛП	8-9	уц							6-7	сц
Масстро	92013069	1996	788 / 788	Л	7	уц							7-8	вц
Мерак	02013035	2006	829 /	ЛП	9	уц							5-7	сц
Мозаїк	03013014	2007	829 /	СЛП	7	уц							6-9	сц
Мілан	02013033	2006	829 /	СЛ	9	уц							6	сц
Настя	03013009	2007	938 /	ЛП	7-8	уц							5-9	сц
Орікс	88013012	1993	743 /	ЛП	8	уц							6-7	сц
Олександрія	92013058	1997	394 / 334	ЛП	8	уц							5-7	сц
Орегон	03013001	2005	1032 /	СЛП	9	уц							5-7	сц
Ольжич	02013027	2006	334 /	СЛ	8	уц							6-9	сц
Прізма	91013058	1997	788 / 788	ЛП	8	цукр							6-9	сц
Портланд	05013007	2007	504 /	СЛП	9	уц							5-7	вц
Пірат	99013049	2003	829 /	ЛП	8	уц							6-8	вц
Ризольт	® 04013010	2007	334 /	С	6	уц							5-7	сц
Рубін	95013032	2000	788 / 788	Л	7	уц							5	сц
Роберта	95013017	2000	938 /	ЛП	8	уц							5-7	сц
Ромул	02013009	2005	334 /	СЛП	8	уц							5-7	сц
													5-9	сц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
								посухи	полягання	осипання	хвороб		
Слов'янський ЧС 94	88013017	1992	304 / 334	ЛП	8	уц					5-7	сц	
Сідней	95013069	2000	788 / 788	Л	8	уц					5-7	сц	
Сара	00013033	2004	879 / 879	СЛП	9	цукр					8	вц	
Середале	97013008	2001	1032 /	Л	7	уц					5-7	сц	
Стабіла	03013006	2006	796 /	СЛ	9	уц					6-9	сц	
Стіжана	03013011	2007	938 /	ЛП	8	уц					6-7	сц	
Свіфт	98013060	2002	743 /	ЛП	8	уц					5-7	сц	
Травіата	03013021	2007	1086 /	СЛП	7	цукр					6	сц	
УЛВ ЧС 37	88013003	1993	304 / 334	Л	7	уц					5-7	сц	
Уладівський одіонасінний 35	73013005	1979	304 / 334	П	7	уц					5	сц	
Український ЧС 72	99013030	2002	334 / 334	Л	8	уц					5-7	сц	
Уладівський ЧС 35	98013058	2002	736 /	Л	8	уц					5-7	сц	
Фертіла	03013004	2006	796 /	СЛ	9	уц					5-9	сц	
Хамбер	05013005	2007	504 /	СЛП	9	уц					6-7	вц	
Шевченківський	99013023	2002	334 / 334	СЛ	8	ур					5-7	сц	
Юстіна	02013036	2006	938 /	ЛП	9	уц					6-9	сц	
Ялтушківський ЧС 72	92013108	1997	872 /	ЛП	8	уц					5-7	сц	
Яміра	92013098	1997	884 /	СЛ	8	уц					5-7	сц	
Ялтушківський одіонасінний 64	94013001	1992	303 / 334	Л	7	уц					5-7	сц	
Яриса	04013027	2007	884 /	СЛ	7	ур					6-8	ср	
Япола	04013028	2007	884 /	СЛ	7	ур					6-7	ср	
Буряк кормовий	-	23											
Адра	97046004	2001	736 /	Л	7	корм					8		
Болеро	90046012	1993	713 /	СЛП	9	корм					8		
Бізон Полі	05046002	2007	598 /	слп	9	корм					8		
Галицький	00046002	2004	371 /	СЛП	8	корм					7-8		
Дарина	99046001	2003	345 / 345	Л	7	корм					7		

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
Екендорфський жовтий	37046003	1947	812 / 330	СЛП	8-9	корм						7-8	
Київський	72046001	1979	345 / 345	ЛП	8	нц						8-9	
Козіма	95046004	1999	938 /	С	7	корм						8	
Кракус	95046008	1999	991 /	С	8	корм						7-8	
Кірос	97046001	2000	788 /	Л	8	нц						7-8	
Кацлер	02046001	2005	991 /	СЛП	8	корм						7-9	
Львівський жовтий	72046002	1977	371 /	СЛП	9	корм						8	
Полтавський напівцукровий	82046001	1985	387 /	ЛП	8	нц						7-8	
Полтавський білий	58046001	1959	387 /	СЛП	8-9	корм						7	
Переможець	40046001	1947	387 /	СЛП	9	корм						7	
Полтавський 71	90046010	1995	387 /	СЛП	9	корм						6-8	
Рекорд-Полі	95046007	2000	991 /	СЛП	8	корм						8	
Селена	94046005	2000	345 / 345	Л	7	корм						8	
Сонет	00046001	2004	334 / 345	СЛП	8	корм						7-8	
Солідар	02046002	2004	991 /	СЛП	8	корм						7-9	
Тамара	92046001	1999	938 /	С	8	корм						7	
Урсус Полі	95046009	1999	991 /	С	8-9	корм						7-8	
Центаур Полі	95046010	1999	991 /	СЛ	9	нц						8-9	

Сільськогосподарські: картопля

Картопля

- 107

Альвара	96031015	2001	1006 /	П	9	стл	ср	5	5			9	вкр
Арієль	02031005	2007	741 /										
Адретта	77031007	1985	1011 /	П	9	стл	ср	5	5			5	вкр
Аноста	94031010	1999	741 /	ЛП	7	тхст	рс	5	5			5	скр
Астерікс	91031009	1996	738 /	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Аграрна	01031013	2006	919 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	скр
Агаве	® 02031015	2004	1011 /	П	9	стл	рс	9	9			9	вкр

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Билина	01031010	2006	347 /	СЛП	7	стл	сс	7	7			7	скр
Беллароза	® 00031013	2003	1046 /	ЛП	9	стл	рс	7	7			9	вкр
Бернадетте	02031010	2005	1006 /	СЛ	7-9	стл	пс		7			9	скр
Божедар	92031014	1996	319 /	СЛП	9	стл	рс	5	9			9	вкр
Бородинська рожева	89031011	1993	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	вкр
Багряна	® 98031008	2001	347 / 347	СЛП	7	стл	сс	5	5			9	вкр
Воля	00031006	2004	369 /	ЛП	7	стл	сс	7	7			7-9	вкр
Веста	00031009	2003	319 / 319	СЛ	9	стл	рс	7	5			9	вкр
Велоке	97031001	2001	938 /	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	скр
Віриня	® 97031013	2001	347 / 347	П	7	стл	сс	5	5			9	скр
Віра	97031011	2001	371 /	П	7	стл	сс	7	5			9	вкр
Вігара	® 00031011	2003	1046 /	ЛП	9	стл	рс	5	5			9	вкр
Водограй	91031004	1995	347 / 347	ЛП	5	стл	ср	5	5			5	скр
Вінста	® 97031003	2001	1046 /	СЛП	9	стл	рс	7	5			9	вкр
Дубравка	97031015	2001	319 /	П	5	стл	сп	5	5			5	скр
Дара	00031008	2004	319 / 319	СЛП	7-9	стл	сс	7	7			7-9	скр
Делікат	® 02031014	2004	1011 /	П	9	стл	ср	9	9			9	вкр
Добровичин	91031006	1995	319 /	СЛП	7	стл	ср	5	5			9	вкр
Дзвін	94031001	2000	320 /	П	7	тхст	сп	5	5			9	вкр
Джаерла	94031012	1998	738 /	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Древлянка	79031003	1984	320 /	П	5	стл	пс	5	5			5	скр
Дарина	98031005	2002	320 /	П	7	стл	сп	5	5			5	вкр
Дніпрянка	® 98031009	2002	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	скр
Жеран	03031005	2006	319 /	П	7-9	стл	рс	7	7			7	скр
Золушка F1	01031004	2003	751 /	П	9	стл	сс	7	5			9	скр
Загалка	01031009	2006	347 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	скр
Західний	92031002	1998	369 /	П	5	стл	сс	>5	>5			5	скр
Зов	84031008	1989	319 / 319	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	вкр
Забава	® 01031011	2004	347 /	СЛП	7-9	стл	ср	9	9			9	вкр

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Імпала	95031001	2000	741 /	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вср
Коллетта	® 97031004	2001	1046 /	СЛП	9	стл	рс	7	5			9	вкр
Косень 95	94031019	1999	319 /	СЛП	7	стл	рс	5	7			9	вкр
Карлена	92031020	1997	1011 /	СЛ	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Космос	94031006	1999	741 /	СЛП	7	стл	ср	5	5			5	скр
Кобза	91031003	1995	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	вкр
Кондор	83031001	1999	741 /	СЛП	9	стл	сс	5	5			5	вкр
Каталіна F1	01031005	2003	751 /	П	7	стл	сс	5	5			9	вкр
Карлик 04	04031011	2007	319 /										
Каратоп	® 02031012	2004	1011 /	П	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Луговська	82031003	1987	347 / 347	ЛП	5	стл	сс	5	5				скр
Лілея	® 00031003	2003	347 /	ЛП	9	стл	сс	7	5			9	вкр
Лікарія	92031024	1997	1011 /	П	7	стл	рс	5	5			5	вкр
Ластівка	® 99031001	2002	919 / 919	Л	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Лелека	® 99031005	2002	347 / 347	СЛП	7	стл	сс	5	5			5	вкр
Ліщина	02031011	2006	369 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	вкр
Леді Розетта	® 98031004	2001	995 / 995	П	9	тхст	сс	7	7			9	вкр
Марфона	88031002	1999	741 /	П	7	стл	сс	5	5			5	вкр
Малинська біла	01031017	2005	319 /	Л	7-9	стл	ср	7	7			7	вкр
Молодіжна	® 92031018	1996	919 / 919	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Мавка	77031002	1982	371 /	ЛП	5	стл	ср	5	5			5	скр
Малич	94031005	1998	319 / 319	ЛП	7	стл	ср	5	5			5	вкр
Мелодія	® 02031007	2005	347 /	СЛП	7-9	стл	рс	7	7			7	вкр
Моллі	® 02031013	2004	1011 /	П	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Надійна	® 02031009	2006	347 /	СЛП	9	стл	сс	7	7			7	скр
Незабудка	77031004	1981	347 / 347	СЛ	5	стл	рс	5	5			5	скр
Немішайвська 100	® 00031004	2004	347 /	СЛП	7-9	стл	рс	7	7			9	вкр
Оксамит 99	99031002	2002	371 /	СЛП	9	стл	сп	7	7			9	вкр
Ольвія	94031018	1999	347 / 347	СЛП	5	стл	сс	5	5			5	скр

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Обрій	® 92031013	1997	347 / 347	СЛП	7	стл	ср	5	5			5	вкр
Пост 86	87031002	1991	319 / 319	СЛП	7	стл	ср	5	5			9	вкр
Норап	97031016	2001	319 /	СЛП	7	стл	рс	7	5			9	скр
Новинь	® 96031001	2000	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	7	5			9	вкр
Промінь	® 02031008	2006	347 /	СЛ	7	стл	сп	7	7			9	вкр
Провенто	92031043	1997	741 /	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Палма	96031016	2001	1006 /	ПС	7	стл	ср	5	5			9	вкр
Пандя	01031007	2003	927 /	Л	7	стл	сс	5	5			9	вкр
Пікассо	94031008	1998	741 /	СЛП	7	стл	сп	5	5			5	скр
Поліська рожева	74031002	1978	319 / 319	П	7	стл	сп	5	5			9	вкр
Поліська 96	96031005	2001	319 /	СЛП	7	стл	ср	7	5			9	вкр
Подолянка	® 03031003	2006	347 /	ЛП	9	стл	рс	7	7			7-9	скр
Престо	® 00031014	2004	1046 /	СЛП	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Поляна	® 99031006	2002	347 / 347	СЛП	7	стл	ср	5	5			5	скр
Роко	® 02031004	2006	741 /	П	7-9	стр	сс	7	7			7	скр
Ракурс	93031001	1997	347 / 347	ЛП	7	стл	сп	5	5			9	вкр
Рікса	96031017	2001	1006 /	ПС	7	стл	рс	5	5			5	скр
Радич	92031004	1997	319 / 319	Л	5	стл	ср	5	5			5	скр
Рая	92031037	1997	741 /	П	7	стл	ср	5	5			9	вкр
Розалінд	® 00031010	2004	1046 /	ЛП	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Розара	92031023	1997	927 /	Л	9	стл	рс	7	7			9	вкр
Рів'єра	® 04031001	2007	741 /										
Санте	95031003	2000	741 /	СЛП	9	стл	ср	5	5			9	вкр
Серпанок	® 97031014	2001	347 / 347	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Сантана	00031001	2003	1127 /	СЛП	9	стл	сс	5	5			9	вкр
Світанок київський	82031002	1987	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Сатіна	97031002	2001	938 /	П	5	стл	ср	5	5			5	скр
Солара	® 97031005	2001	1046 /	СЛП	9	стл	ср	7	5			5	вкр
Слов'янка	® 94031017	1999	347 / 347	СЛП	7	стл	сс	5	5			5	вкр

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-тації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Сатурна	98031010	2001	1087 /	П	7	тхст	сп	5	5			9	вкр
Тирас	01031015	2004	319 /	СЛП	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Тетерів	99031004	2002	319 /	СЛП	9	стл	сп	7	7			9	вкр
Фермерська	01031014	2006	919 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	скр
Фантазія	® 98031007	2001	347 / 347	СЛП	7	тхст	сп	5	5			9	вкр
Червона рута	01031012	2005	347 /	СЛ	7-9	стл	сп		7			9	вкр
Явір	® 96031002	2000	347 / 347	СЛП	7	стл	сс	5	5			9	вкр
Довіра	® 03031008	2007	347 /										
Левада	® 03031004	2007	347 /										
Нагорода	® 04031009	2007	428 /										
Легенда	® 04031005	2007	371 /										
Марлен	02031003	2007	741 /										
Поліська ювілейна	04031010		319 /										

Сільськогосподарські: кормові

Пайза

- 2

Лебедина 2	95126001	1998	320 /	ЛП	7	сил	пс		7	7	5	7	скліт
Надія	98126001	2000	371 /	ЛП	7	корм	сс		7	7	5	7	скліт

Сорго віникове

- 9

Карликове 45	94135001	1999	311 /	ЛП	7	він	рс	-	5	7	7	5	-
Красень	® 04135001	2007	311 /	СЛП	7-9	він	рс	-	7-9	7	7	7-9	-
Любиме 80	00135001	2003	361 / 361	СЛ	7	він	сп	-	7-9	7	7	7	-
Раївське	01135001	2003	309 /	СЛ	7-9	він	сп	-	7-9	7	7	7	-
Таврійське 2	99135001	2003	414 /	СЛ	7	він	рс	-	7	7	7	7	-
Таврійське 1	94135002	1999	414 /	СЛ	7	він	сп	-	7	7	7	7	-
Українське 20	90135001	1995	361 / 361	С	7	він	сп	-	7-9	5	5	7	-
Фермерське	99135002	2003	909 /	СЛ	7	він	сп	-	7	5	5	5	-
Фараон	® 05135001	2007	414 /	СЛП	7-9	він	сс	-	7-9	7-9	7-9	7-9	-

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- трації			Заявник / Підтримував	Продук- тивність	Напря- м ви- корис- тання	Група стиг- лості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посу- хи	поля- гання						осипання	хвороб		

Сорго цукрове - 10

Сс 506	06010001	2007	1079 /	С	7-9	корм	пс	-	7-9	7-9	7	7	сбіл, скліт
Аграрний 5F	00010001	2004	361 / 361	СЛ	7-9	корм	пс	-	7-9	7-9	7	7	вкліт, сбіл
Г 1990	06010002	2007	1079 /	С	7-9	корм	сп	-	7-9	7	7-9	7	сбіл, скліт
Кримське 15	98010001	2001	361 / 361	С	7	корм	сс	-	7-9	7	7	7	скліт, сбіл
Медовий F1	95010001	1998	378 / 378	С	7-9	корм	сп	-	7-9	7	7	7	вкліт, сбіл
Сило 700Д	04010001	2007	29 /	СЛ	7-9	корм	сс	-	7	7-9	7	7-9	сбіл, вкліт
Сиваський 85	85010005	1991	414 /	С	5	корм	сп	-	7	7	7	7	скліт, сбіл
Силосне 42	99010002	2003	311 /	Л	7	корм	сс	-	7-9	7-9	7	7	вкліт, сбіл
Троїстий	03010001	2007	311 /	СЛ	7	корм	сс	-	7-9	7	7	7	сбіл, вкліт
Фаворит	99010001	2003	378 / 378	Л	5	корм	сс	-	5	7	7	7	скліт, сбіл

Суданська трава - 8

Голубівська 25	97067002	2002	311 /	СП	7	корм	сп		7	7		7	вкліт, сбіл
Дніпровська 54	00067001	2004	340 /	СЛ	7	корм	сс		7-9	7		>5	вкліт, сбіл
Донецька 5	78067001	1984	315 /	Л	5	корм	сс		5	5		5	скліт, сбіл
Луганка 3	99067001	2003	909 /	СЛ	7-9	корм	сс		7	7		7	вкліт, сбіл
Миронівська 36	78067002	1983	341 / 341	СЛ	5	корм	сс		5	5		5	скліт, сбіл
Меотид	03067001	2006	414 /	СЛ	7-9	корм	сс		7-9	5		5	сбіл, вкліт
Одеська 221	86067003	1991	378 / 378	С	7	корм	сс		7	7		7	вкліт, сбіл
Фіолета	90067002	1996	361 / 361	СЛ	7	корм	сс		7	7		5	скліт, сбіл

Сорго-суданкові гібриди - 9

Арабат	04063002	2007	414 /	Л	7-9	корм	сс	-	7-9	7-9	-	7	сбіл, вкліт
ДССГ 90	89063002	1995	340 /	С	7	корм	сс	-	7-9	7	-	7	вкліт, сбіл
Кадан 19	03063001	2007	311 /	Л	7	корм	сс	-	7-9	7	-	7-9	сбіл, вкліт
Присиваський 4	02063002	2006	414 /	СЛ	7	корм	сс	-	7-9	8	-	7	вкліт, сбіл
Почин II	00063001	2004	340 /	С	7	корм	сс	-	9	7	-	7	вкліт, сбіл
Слав'янське поле 15	02063001	2005	1039 /	Л	7-9	корм	сс	-	7-9	7-9	-	7	сбіл, вкліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Чудовий ВМР	04063001	2007	29 /	СЛ	7-9	корм	сс	-	7-9	7-9	-	7	сбл, вкліт
Ювілей 50	94063001	1998	361 / 361	СЛП	7	корм	сс	-	7	7	-	7	скліт, сбл
Ювілейний 75	98063001	2001	361 / 361	Л	7	корм	рс	-	5	7	-	7	скліт, сбл
Пажитниця однорічна (Вестервольдська) - 4													
Еней	87397005	1991	371 /	П	7	ск, лп	сс		7	7	7	7	скліт
Орсол	97397001	2000	305 /	ЛП	7	ск, лп	сс		7	7	7	7	вкліт
Росавій	92397004	1997	371 /	ЛП	7	ск, лп	сс		7	7	7	7	скліт
Тиверський	91397001	1996	305 /	ЛП	7	ск, лп	сс		7	7	7	7	вкліт
Грястиця збірна - 8													
Дрогобичанка	73049001	1979	370 /	СП	5	лп	сс	5	5	5		5	скліт
Київська рання 1	71049002	1979	337 /	СЛП	5	ск, лп	рс	5	5	5		5	скліт
Лідакта	94049004	2000	600 / 807	ЛП	9	ск, лп	сп	5	7	7		7	вкліт
Муравка	95049001	2001	337 /	ЛП	7-9	лп, ск	сп	7	9	7		7	вкліт
Наташка	00049001	2005	337 /	ЛП	7	ск	сс	7	5	7	7	5	вкліт
Олешка 14	94049001	2001	411 /	СЛП	7	ск	сс	7	7	7		5	вкліт
ФРКЛ-1	94049002	2000	971 /	Л	7	ск, лп	сп	5	7	7		7	вкліт
Херсонська рання 1	84049002	1994	411 /	С	7	ск, лп	сс	5	7	7		7	скліт
Костриця східна - 1													
Лиманська	06110001	2007	317 /	С	7	ск	сп	7	7	8		7	сбл
Костриця лучна - 11													
Веселоподолянська 1883	50054001	1961	388 /	СЛП	5	ск, лп	рс	5	5	5	5	5	скліт
Венера	00054001	2005	392 /	ЛП	5	ск	сс	7-9	7	7-9	7	5	вкліт
Діброва	03054001	2007	305 /	ЛП	7-9	ск, лп	сс	7	7-8	7	-	7-9	вкліт
Звездочка 5	90054002	1997	411 /	П	7	ск, лп	рс	5	7	7	7	7	скліт
Козаровицька	65054002	1973	337 /	П	7	ск, лп	рс	7	5	5	5	5	скліт
Ліфара	97054001	2002	600 / 807	ЛП	7	ск	рс	5	7	7	7	7	вкліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Літава	95054001	2001	337 /	ЛП	7	ск, лп	ре	5	7	7	7	7	скліт
Росинка	92054001	1998	392 /	ЛП	7	ск, лп	ре	7	8	8	5	7	скліт
Сіверянка	00054002	2005	337 /	ЛП	7-9	ск	се	7	5	7-9	7	7	вкліт
Сарненська 134	68054001	1979	390 /	П	5	ск, лп	се	5	5	5	5	5	скліт
Фіола	94054001	2000	971 /	Л	8	ск, лп	се	5	7	7	7	7	вкліт
Костриця очеретяна	-	9											
Дометіка	00109001	2001	337 /	СЛП		озл	се	7-9	7-9			7	дек,вщі
Людімила	97109001	2001	305 /	Л	7	ск, лп	ре	5	5	7	7	7	вкліт
Мустанг	99109002	2001	971 /	СЛП		озл	се	5	7			7	дек,сщі
Меандр	05109001	2006	600 /	СЛП		озл	се	7	7			8	дек,сщі
Ода	97109002	2003	305 /	ЛП	7	ск,лп	сп	7	7	7	7	7	скліт
Садівничанка	92109001	1998	392 /	ЛП	9	ск, лп	се	7	7	7	7	7	вкліт
Смерічка	99109003	2003	370 /	ЛП	7-9	ск	се	7	7	7	7	7	вкліт
ФРРСЦ I	94109001	2000	971 /	ЛП	7	ск, лп	се	5	7	7	7	7	скліт
Чабанська	01109001	2003	345 / 345	ЛП	9	ск,лп	се	7	7-9	7	7	7	вкліт
Мітлиця велетенська	-	1											
Галичанка	91123001	1997	370 /	П	7	лп	се	7	7	5	7	7	скліт
Очеретянка звичайна	-	2											
Київська	69125001	1977	337 /	ЛП	7	лп	се	5	7	7-9	7	7	скліт
Сарненська 40/100	92125001	1998	390 /	ЛП	7-9	лп	се	7	7	5	5	7	вкліт
Пирій видовжений	-	1											
Сарматський	04345001	2006	317 /	С	7-9	ск	пе	7	7	7-9		7-9	сбіл,скліт
Райграс високий	-	2											
Дронго	03060001	2004	305 /	ЛП	7	лп	се	7-9	7	7	5	7	вкліт
Полтавський 521	65060001	1982	387 /	С	5	лп, зак	се	5	5	5	5	5	скліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресестрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Пажитниця багаторічна - 26													
Андріана- 80	02062001	2003	337 /	СЛП	7	лп, озл	сс	7-9	7	7	7	7	скліт, вдек
Граффіті	05062002	2006	598 /	СЛП	-	озл	сс	>5	5	-	-	7	дек, сні
Геркулес	94062003	2000	971 /	П	7	ск, лп	сп	5	5	5	5	7	скліт
Генрієтта	99062004	2001	971 /	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	вдек
Грілла	05062001	2006	598 /	СЛП	-	озл		>5	7	-	-	7	дек, сні
Дрогобицький 16	91062001	1997	370 /	П	7	лп	сс	5	7	>5	7	5	скліт
Дрогобицький 2	67062001	1974	370 /	ЛП	5	лп	сс	5	5	5	5	5	скліт
Дрогобицький 1	66062001	1976	371 /	П	5	лп	рс	5	5	5	5	5	скліт
Ексел	99062003	2001	971 /	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	дек
Інка	98062005	2001	991 /	СЛП	-	озл		>5	7	-	-	7	вдек
Квінтус	05062003	2006	600 /	СЛП	-	озл		7	7	-	-	7	дек, сні
Литвинівський 1	79062001	1986	337 /	Л	7	лп, озл	сс	7	7	7	7	7	вкліт
Лізуна	97062002	2001	600 / 807	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	вдек
Ліфранс	05062005	2006	600 /	СЛП	-	озл		7	7	-	-	7	дек, сні
Лібронко	05062006	2006	600 /	СЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек, сні
Лета	99062008	2002	337 /	ЛП	7	лп, озл	рс	>5	9	7	>5	7	вкліт, дек
Ніра	99062006	2001	1104 /	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	дек
Ніра	® 06062002	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек
Оріон	00062002	2001	337 /	ЛП	-	озл		7	7-9	-	-	5	вдек
Обрій	97062001	2001	305 /	Л	7	ск, лп	сс	5	7	7	7	7	скліт
Плезір	99062005	2001	600 / 807	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	дек
Руслана	04062001	2005	305 /	СЛП	-	озл	сс	7-9	7	-	-	7	дек
Святошинський	89062002	1995	345 / 345	ЛП	7	ск, лп	сс	5	7	5	>5	7	скліт
Талго	99062007	2001	971 /	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	вдек
Тітус	05062004	2006	600 /	СЛП	-	озл		7	7	-	-	7	дек, сні
Фієста 3	® 04062002	2006	914 /	СЛП	-	озл	сс	>5	5	-	-	7	дек, сні

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Костриця червона мінлива 5													
Аїда	99186001	2001	971 /	СЛП		озл		7	7-9			7	вдек,сщі
Дарвін	98186001	2000	740 /	СЛ		озл		7	7			7	вдек,сщі
Ліфалла	97186002	2000	600 / 807	СЛ		озл		7-9	7			7	вдек,вщі
Лікато	99186006	2001	600 / 807	СЛП		озл	сс	7-9	7			7-9	вдек,сщі
Луцінда	05186001	2006	600 /	СЛП		озл	сс	7	8			7	вдек,вщі
Костриця овеча - 6													
Борніто	99331002	2001	600 / 807	СЛП	-	озл	сс	5	7-9	-	-	7	дек,сщі
Дева	05331002	2006	337 /	СЛП	-	озл	сс	8	8		-	7	дек,сщі
Забава	94331001	1998	305 /	СЛП	5	озл, лп	сс	5	7	7	7	7	скліт,дек
Менгтор	05331001	2006	600 /	СЛП	-	озл	сс	8	8	-	-	7	дек,сщі
Поні	® 06331001	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7-9	7-9	-	-	7	вдек,вщі
Спарган	99331001	2001	971 /	СЛП	-	озл	сс	5	7	-	-	7	дек,сщі
Костриця червона - 18													
Агата	94111001	1999	305 /	ЛП	5	лп, озл	ср	7	8	7	7	7	вкліт, дек,сщі
Адіо	® 06111001	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,вщі
Богданка	00111001	2001	337 /	ЛП	-	озл	ср	7-9	7	-	-	7-9	вдек,вщі
Гросс	05111004	2006	598 /	СЛП	-	озл		7	8	-	-	7	вдек,вщі
Гробла	05111003	2006	598 /	СЛП	-	озл	сс	8	8	-	-	7	вдек,вщі
Древлянська	97111001	2001	320 /	ЛП	7	лп	ср	7	7	7	5	7	скліт
Джаспер II	® 04111001	2006	914 /	СЛП	-	озл	сс	7	8	-	-	7-9	дек,сщі
Лівніус	99111005	2000	600 / 807	СЛП	-	озл	сс	7	5	-	-	7	вдек,сщі
Ліфайн	99111004	2001	600 / 807	СЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	вдек,сщі
Лінроза	97111003	2000	600 / 807	СЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	вдек,вщі
Лео	® 06111002	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,вщі
Лівізюл	05111005	2006	600 /	СЛП	-	озл	сс	7	8	-	-	8	вдек,вщі
Пімба	99111009	2001	1104 /	СЛП	-	озл	сс	7-9	7	-	-	7	дек,сщі

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресет-рації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Оленка	02111001	2003	337 /	СЛП	-	озл	сс	7-9	7	-	-	7-9	влек, сні
Роланд	99111008	2001	971 /	СЛП	-	озл	пс	7-9	7	-	-	7	дек, сні
Руфілла	99111007	2001	971 /	СЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7-9	дек, сні
Сава	® 06111003	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7	7-9	-	-	7	дек, сні
Янка	94111002	1999	305 /	ЛП	5	лп, озл	скс	7	7-9	7	7	7	дек, сні
Костриця тонколиста - 1													
Барва	04295001	2005	305 /	СЛП	-	озл	сс	7	7			5	дек
Костриця шорстколиста - 2													
Борнадо	99364001	2001	971 /	СЛП		озл		5	7			7	влек
Саманта	98364002	2000	740 /	СЛ		озл		7	5			5	влек
Мітлиця повзуча - 1													
Като	99352001	2001	971 /	СЛП		озл		7	7			5	дек
Тонконіг лісовий - 1													
Шадю	99343001	2001	971 /	СЛП		озл		5	7-9			7	влек
Тонконіг лучний - 11													
Альпіна	® 04069002	2006	914 /	СЛП		озл	сс	7	7			7	дек, сні
Аліція	99069001	2001	1104 /	СЛП		озл	сс	7-9	7			7	дек, сні
Еска	98069005	2000	991 /	СЛ		озл	сс	>5	7			7	дек, сні
Лілі	97069001	2000	600 /	СЛ		озл	ср	7-9	7			7	влек, сні
Лімузине	97069002	2000	600 / 807	СЛ		озл	сс	7	7-9			7	влек, сні
Лімерік	05069002	2006	600 /	СЛП		озл	сс	5	7			7	влек, сні
Меркурій	® 04069004	2006	914 /	СЛП		озл	сс	7	5			7	дек, сні
Макс-1	00069001	2001	337 /	ЛП		озл	рс	7-9	7			7	влек, сні
Орфео	05069001	2006	600 /	СЛП		озл	сс	7	7			8	дек, сні
Тачдаун	® 04069003	2006	914 /	СЛП		озл	сс	7	5			7	влек, сні
Улич	04069001	2005	305 /	СЛП		озл	сс	7	7	7	-	5	дек, сні

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Тонконіг фіолетовий - 1													
Алексе	02402001	2003	337 /	СЛП		озл		7-9	7			7	вдск
Стоколос безостий - 11													
Вингородський	90065001	1997	337 /	ЛП	7-9	ск, лп	сс	7	7	7	7	7	вкліт,сбіл
Веселав	97065001	2002	305 /	СЛП	7	ск	ср	7	7	7	7	7	вкліт, сбіл
Геліус	00065001	2004	337 /	СЛ	9	ск	сс	7-9	7-9	7		>5	вкліт,сбіл
Козаровицький	54065002	1980	337 /	ЛП	5	ск, лп	сс	7	7	7	7	7	скліт
Марс	97065002	2001	305 /	Л	7	ск, лп	екс	7	5	7	7	5	вкліт,вбіл
Полтавський 52	81065004	1987	387 /	ЛП	7	лп	сс	7	5	5	5	5	скліт,сбіл
Полтавський 30	60065003	1967	387 /	Л	5	ск, лп	сс	5	5	5	5	5	скліт, сбіл
Полтавський 5	98065001	2002	387 /	СЛП	7-9	ск	ср	7	7	7	7	7	вкліт,сбіл
Скіф	00065003	2004	873 /	С	7-9	ск	сс	7	9	9		7	скліт,вбіл
Таврійський	95065001	2000	411 /	С	7	ск, лп	рс	5	7	7	7	7	скліт,сбіл
Тоназ	00065002	2004	337 /	СЛП	7	ск	сс	9	7	9		7	вкліт,сбіл
Тимофіївка лучна - 9													
Аргента	91068001	1996	337 /	ЛП	7	ск,лп	сс	7	7	7	7	7	вкліт, сбіл
Вингородська	94068003	2001	337 /	ЛП	7-9	ск, лп	сс	7	7	7	7	7	вкліт, сбіл
Витава	02068001	2006	305 /	П	7	ск,лп	сс	7-9	7	7-9		7	вкліт
Каріна	00068001	2005	337 /	ЛП	7	ск	сс	7-9	7-9	7-9	7	5	вкліт,вбіл
Козаровицька	54068001	1979	337 /	П	7	ск, лп	сс	7	5	7	5	7	скліт,сбіл
Ліпка	97068001	2001	600 / 807	ЛП	7-9	ск, лп	ср	5	7	7	7	7	вкліт, сбіл
Підгірянка	99068002	2004	370 /	ЛП	7	ск,лп	сс	7	7-9	9		7-9	вкліт, сбіл
Сарненська 35	68068001	1980	390 /	ЛП	7	ск, лп	сс	5	5	5	5	5	скліт, сбіл
ФРВЛ-1	94068001	1999	971 /	ЛП	7	ск, лп	ср	5	7	5	7	7	вкліт, сбіл
Трава Колумба - 1													
Надсєда Востока	91139001	1995	909 /	С	7	сил		7	7	7	7	7	скліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- трації			Заявник / Підтримувач	Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
			посу- хи	поля- гання						осипання	хвороб	

Пажитниця багатоквіткова 4

Жайвір	98061001	2003	371 /	П	7	ек	сс	7	7	7		7	екліт, сбіл
Київський	92061001	1999	345 / 345	ЛП	7	ек, лп	сс	5	>5	7	>5	7	вкліт, сбіл
Мирослав	90061005	1997	345 / 345	П	7	ек, лп	сс	7	5	5	7	7	екліт, сбіл
Мальмі	92061003	1997	912 /	П	7	ек, лп	сс	5	7	5	7	7	вкліт, сбіл

Боби кормові - 8

Білун	98043001	2000	330 /	ЛП	7	корм	екс		5	7	7	7	вбіл
Візир	03043001	2005	305 /	ЛП	7-9	корм	сс	-	7	7	7	7	вбіл
Карадаг	97043002	1999	357 / 357	СЛП		ун	сс						
Оріон	97043003	1999	305 /	ЛП	7	корм	сс		5	7	5	7	вбіл
Прикарпатські 4	82043001	1986	332 /	ЛП	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Пікуловицькі 1	58043003	1962	371 /	П	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Українські слобідські	97043001	1999	357 / 357	СЛП		ун	сс						
Янкель білий	02043001	2003	1081 /	СЛП		ун	рс						

Горошок (Вика озима) - 8

Вусата	94047006	1999	371 /	С	7	корм	сс	7	7	5	7	>5	сбіл
Лебедина пісня	00133001	2003	387 /	СЛ	9	корм	сс	7	7	5	7	7	вбіл
Львів'янка	92047001	1997	371 /	СП	7	корм	сс	7	7	5	5	7	сбіл
Полтавська 77	80047005	1987	387 /	СЛ	9	корм	сс	7	7	5	5	5	сбіл
Полтавська 25	63047001	1976	387 /	СЛ	5	корм	сс	7	7	5	5	7	сбіл
Приморка	98047001	2001	305 /	Л	7	корм	сс	7	7	5	7	>5	сбіл
Степна	90047005	1996	387 /	П	7	корм	сс	7	7	5	7	7	сбіл
Ювілейна	97047004	2001	387 /	СЛ	9	корм	сс	7	7	5	6	7	вбіл

Горошок (Вика яра) - 16

Аріадна	99047001	2003	306 /	ЛП	9	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Білоцерківська 34	94047005	1998	335 /	СЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Білоцерківська 7	97047002	2000	335 /	СЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	вбіл
Білоцерківська 10	00047002	2003	335 /	ЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Білоцерківська 96	98047004	2001	335 /	ЛП	9	корм	сс		5	5	5	7	вбіл
Віаріка	01047001	2005	306 / 791	ЛП	7	корм	сс	-	7-9	5	7	7	вбіл
Гібридна 97	92047002	1999	387 /	СЛП	9	корм	сс		5	5	5	7	сбіл
Гібридна 85	99047002	2002	387 /	СП	7	корм	сс		5	5	5	7	вбіл
Ірина	® 03047002	2007	306 /	СЛП	7-9	корм	сс		>5	5	7-9	7-9	вбіл
Маргарита	94047003	1999	306 /	ЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Подільська 9	94047002	2000	306 /	СЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Подільська 18	92047003	1998	306 /	П	8	корм	сс		5	5	7	7	вбіл
Прибузька 19	92047004	1997	306 / 791	СЛ	9	корм	сс		7	5	5	7	сбіл
Світлана	02047001	2006	306 /	ЛП	7-9	корм	сс		7-9	5	7	7	вбіл
Ярослава	03047001	2006	335 /	ЛП	7-9	корм	сс		7	5	7	7	вбіл
Пелюшка	-	2											
Зв'язельська	01048001	2003	320 /	ЛП	5	корм	пс		7	5	7	8	сбіл
Поліська 1	98048002	2000	320 /	ЛП	5	корм	ср		7	5	5	7	сбіл
Конюшина відкритозіва	-	1											
Діана	97361001	1999	305 /	ЛП	7	ск	сс	7	7	5	7	7	сбіл
Конюшина олександрійська		1											
Оріана	92143001	1996	305 /	ЛП	7	корм	сс	5	7	5	7	7	вбіл
Люпин білий	-	12											
Борки	97055002	2000	345 / 345	ЛП	7-9	х,корм	екс		5	7	7	7	сбіл
Володимир	94055001	1998	345 / 345	ЛП	7	х,корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Вересневий	99055001	2003	345 / 345	ЛП	7-9	корм	сс		7	7	9	7	вбіл
Гарант	94055002	1998	429 /	ЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Діста	94055003	2004	345 / 345	ЛП	7-8	корм	екс		7-9	9	7-9	7	вбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Козелецький	87055008	1993	429 /	ЛП	7	х,корм	пс		7	5	7	7	сбіл
Либідь	00055001	2002	429 /	ЛП	7-9	корм	сс		7	7	7	7	сбіл
Олсжка	84055007	1989	345 / 345	ЛП	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Піщовий	81055002	1987	345 / 345	ЛП	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Синій парус	87055003	1991	345 / 345	П	7	корм	рс		5	5	5	7	сбіл
Серпневий	® 03055001	2006	345 /	ЛП	7	корм	екс		7	7-9	7	5	вбіл
Туман	99055002	2002	345 / 345	ЛП	7	корм	сс		7	7-9	9	>5	сбіл
Люпин жовтий	-	7											
Бурштин	01057001	2004	345 / 345	ЛП	7	корм	екс		7	9	7-9	7	вбіл
Волинський І	82057001	1985	307 /	ЛП	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Індустріальний	85057001	1991	320 /	П	5	корм	рс		5	5	5	7	сбіл
Круглик	01057002	2005	345 / 345	ЛП	7-9	корм	екс	-	7	7-9	7-9	7	вбіл
Лідер	98057001	2001	320 /	ЛП	7-9	корм	ср		7	7	7	7	сбіл
Обрій	98057002	2002	345 / 345	ЛП	>5	корм	сс		9	7	9	7	вбіл
Чернігівець	97057001	2001	429 /	ЛП	5	корм	екс		7-9	7	7	7	сбіл
Люпин вузьколистий	-	1											
Зірковий	® 04056001	2005	345 / 345	ЛП	7-9	сд	екс	-	7	7-9	7	7	сбіл
Серадела	-	1											
Іскорость	02132001	2003	320 /	ЛП	5	корм	рс		5	5	5	5	сбіл
Горох кормовий	-	7											
Богун	88048006	1993	305 /	СЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Люлінецький І	83048001	1986	304 /	С	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Подільський	81048005	1986	305 /	СЛ	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Резонатор	92048004	1997	404 / 404	СЛ	9	корм	сс		7	5	7	7	вбіл
Усатий 90	90048012	1994	404 / 404	СЛП	7	корм	сс		7	9	7	5	сбіл
Фундагор	03048001	2005	376 /	СЛП	7-9	корм	сс	-	7-9	7	7-9	7	вбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Харківський 74	73048002	1978	404 / 404	СЛП	5	корм	сп		5	5	5	5	сбіл
Буркун білий	-	2											
Ірзінський	87044002	1992	320 /	П	7	ск, лп	сс	5	7	5	5	5	сбіл
Іней	87044003	1992	305 /	СЛ	7	ск, лп	сс	7	7	5	7	7	сбіл
Еспарцет	-	8											
Аметист донецький	99050001	2004	315 /	С	7	корм	сс	>5	7-9	7	-	7	вкліт, сбіл
Ігульський	71050001	1978	356 /	С	5	корм	сп	7	9	7	5	5	сбіл, вкліт
Кіровоградський 83	67050001	1974	356 /	СЛ	7	корм	сп	5	7	5	7	7	сбіл, вкліт
Кіровоградський 27	87050002	1994	356 /	С	9	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл, вкліт
Костянтин	90050003	1996	356 /	С	7	корм	сп	5	7	7	7	7	сбіл, вкліт
Кіровоградський 22	98050001	2002	356 /	СЛ	9	корм	сс	5	7-9	7	5	7	сбіл, вкліт
Піншаний 1251	40050001	1948	388 / 388	СЛП	7	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл, вкліт
Смарагд	04050001	2007	356 /	СЛ	7	ск	сс	7-9	7-9	7	-	7	вбіл
Люцерна мінлива	-	9											
Веселка	92392001	1998	411 /	С	7	ск	сс	5	7	7	7	7	вбіл
Вавіловка 2	90392001	1996	411 /	СЛ	7-9	ск	сс	7	7-9	7	7	7	вбіл
Лідія	00392001	2005	387 /	СЛП	7	ск	сс	7-9	7	7	7-9	7	вбіл
Ласка	® 06392001	2007	378 /	СЛ	7-9	ск	сс	7-9	7	7	-	7	вбіл, вкліт
Люба	04392001	2007	378 /	СЛП	7	ск	сп	9,0	9,0	7,0	-	7	сбіл, вкліт
Росинка	03392001	2007	378 /	СЛ	5	ск	рс	7-9	7-9	7	-	7	сбіл, вкліт
Синьська	80392001	1986	411 /	СЛ	7-9	ск	рс	5	7	7	7	7	вбіл
Унітро	89392001	1995	411 /	ЛП	9	ск	сс	7	7	7	7	7	вбіл
Херсонська 9	74392001	1979	411 /	С	5	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Козлятник східний	-	1											
Донецький 90	90321001	1996	909 /	С	7	ск	сс	7	7-9	5	5	5	сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	

Конюшина лучна - 22

Атлас	75052001	1983	429 /	ЛП	7	корм	сс	>5	5	5	>5	5	сбіл
Алітра	94052001	1999	305 /	ЛП	5	корм	ср	>5	>5	7	7	>5	сбіл
Агрос 12	87052001	1993	429 /	СЛП	7	корм	сс	>5	7	7	5	7	сбіл
Дарунок	84052002	1991	345 / 345	ЛП	7	корм	рс	7	7	7	6	7	сбіл
Кварта	94052004	2000	971 /	ЛП	8	корм	сп	>5	7	7	7	7	сбіл
Кумач	82052002	1989	345 / 345	ЛП	7	корм	рс	7	>5	7	7	7	сбіл
Красуня	02052001	2006	334 /	ЛП	7-9	ск	рс	7	7	8		8	вбіл
Мрія	97052003	2001	341 / 341	Л	7	корм	рс	7	5	7	5	7	сбіл
Мільвус	97052002	2002	807 / 807	ЛП	7	корм	рс	>5	>5	7	7	7	сбіл
Маруся	92052002	1998	345 / 345	ЛП	7-9	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл
Миронівська 5	94052003	2000	341 / 341	ЛП	7	корм	рс	>5	>5	7	7	5	сбіл
Миронівська 45	68052001	1975	341 / 341	СЛ	5	корм	рс	5	>5	7	7	>5	сбіл
Носівська 4	64052001	1971	429 /	ЛП	5	корм	рс	5	>5	7	7	7	сбіл
Носівська 5	51052002	1961	429 /	ЛП	>5	корм	рс	7	7	7	7	>5	сбіл
Предкарпатська 33	71052003	1977	371 /	П	5	корм	рс	5	5	7	7	7	сбіл
Полтавська 75	60052003	1968	387 /	Л	7	корм	рс	>5	7	7	7	7	сбіл
Передкарпатська 6	92052003	1997	370 /	Л	7	корм	сс	7	5	7	7	>5	сбіл
Поліс	92052001	1996	345 / 345	ЛП	7-9	корм	рс	7	7	7	7	7	вбіл
Полянка	98052001	2003	345 / 345	П	7-9	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл
Спарта	99052001	2002	305 /	ЛП	7	корм	рс	7	>5	7	7	7	вбіл
Темпус	94052007	2000	946 /	ЛП	5	корм	сс	5	7	7	7	7	сбіл
Фалкон	03052001	2006	430 /	ЛП	7-9	ск	рс	7	8	7		7	вбіл

Конюшина гібридна - 3

Левада	94051001	2000	305 /	П	7	корм	рс	7	5	8	7	7	сбіл
Придністровська	01051001	2002	370 /	ЛП	9	корм	сс	7	7-9	7	7	7	вбіл
Рожева 27	73051001	1979	330 /	П	5	корм	сс	5	7	7	5	7	сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації			Заявник / Підтримував	Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
			посухи	поля- гання						осипання	хвороб	

Конюшина повзуча (біла) - 4

Даная	94053004	2000	305 /	ЛП	7	корм	рс	7	5	7	7	7	вбіл
Лининянська	91053001	1997	370 /	П	7	корм	рс	7	5	7	7	7	вбіл
Ліфлекс	05053001	2006	600 /	СЛП		озл	рс	7	8			7	вдек
Предкарпатська І	67053001	1979	370 /	П	7	корм	рс	5	5	5	>5	5	сбіл

Люцерна посівна - 24

Алії	88058001	1996	429 /	П	5	ск	сп	5	5	5	5	7	сбіл
Верко	81058002	1986	971 /	ЛП	5	ск	сп	5	5	5	5	5	сбіл
Владислава	94058002	2001	430 /	СЛП	7-9	ск	сп	7	7	7	7	>5	вбіл
Власта	00058001	2004	912 /	С	7-9	ск	сс	7	7-9	7-9	7	7	сбіл
Віра	92058001	1999	387 /	СЛ	7	ск	сп	5	5	5	5	5	сбіл
Вінничанка	83058001	1989	305 /	Л	5	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Веселоподолянська ІІ	57058001	1960	388 /	СЛП	7	ск, лп	сс	7	7	7	7	7	вбіл
Сва	98058001	2002	378 / 378	ЛП	7	ск	сс	7	7	7	7	>5	сбіл
Зарниця	78058001	1982	378 / 378	С	5	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Зайкевича	25058001	1931	387 /	СЛП	5	ск, лп	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Капрі	97058001	2002	796 /	С	7	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Любава	90058021	1995	305 /	Л	5	ск, лп	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Мрія одеська	90058023	1996	378 / 378	Л	5	ск	сс	5	5	7	5	5	сбіл
Надсхід	78058003	1982	411 /	СЛП	5	ск	сп	7	7	7	7	7	вбіл
Ольга	94058001	2000	345 / 345	П	5	ск	сс	5	5	7	7	7	сбіл
Полтавчанка	83058004	1987	387 /	СЛП	7-9	ск	рс	7	7	7	7	7	вбіл
Планет	94058003	1999	600 / 807	СЛ	7-9	ск	сп	5	7	7	7	7	сбіл
Плато	94058004	2000	971 /	ЛП	7-9	ск	сп	5	7	7	7	7	вбіл
Роксолана	89058004	1997	345 / 345	ЛП	7	ск	сс	5	5	7	7	7	сбіл
Регіна	92058004	1997	305 /	СЛ	5	ск	сс	5	7	5	7	7	сбіл
Радуга	75058002	1979	378 / 378	С	5	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Світоч	92058002	1999	378 / 378	С	7	ск	сп	5	7	7	5	7	сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресетрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
													посухи
Серафіма	99058001	2004	411 /	СЛП	7-9	ск	сс	7-9	9	7	7	7-9	біл
Ярославна	82058002	1987	345 / 345	СЛП	7-9	ск	рс	7	7	7	7	7	вбіл
Люцерна хмелевидна	-	1											
Берегиня	94313002	1998	305 /	СЛП	7	лп	сс	7	7	7		7	сбіл
Лядвенець рогатий	-	6											
Аякс	97119001	2000	305 /	ЛП	7	лп	рс	7	7	5	5	7	сбіл
Анг	99119001	2001	305 /	СЛП	7	лп	сс	7	7	5	>5	7	вбіл
Динамо	01119001	2002	320 /	ПЛ	7	лп	сс	7	7	7	>5	7	вбіл
Лотос	90119001	1995	305 /	ЛП	7	лп	сс	7	7	5	7	7	сбіл
ОВіМарС-1	00119001	2002	324 /	ПЛ	7	ск	сп	5	7	5	5	>5	вбіл
ОВіМарС-2	00119002	2002	324 /	ПЛ	7	лп	сп	7	9	5	7	7	вбіл
Щириця	-	15											
Ацтек	94099001	1998	305 /	СЛП	5	зерн	сс		7	7	7	5	вкліт
Атлант	90099001	1994	305 /	ЛП	7	сил	сс		7	7	7	7-9	вкліт
Галицька	99099001	2002	371 /	ЛП	5	зерн	рс		7	5	5	7	скліт
Котигорошок	94099004	1999	305 /	Л	5	зерн	рс			5	7	7	скліт
Легінь	91099001	1996	305 /	СЛП	7	зерн	сс		7-9	7	7	5	скліт
Лєра	02099002	2003	405 /	СЛП	7	зерн	сс		7	7	7	7	вкліт
Надія	97099002	2000	405 /	СЛП		озл, зріз	сс		7	7	7	7	дек
Орхідея	94099005	1999	305 /	СЛ	5	зерн	сс		5	7	7	7	скліт
Поліщук	97099003	1999	320 /	ЛП	5	зерн	сс		7-9	7	7	7	скліт
Роганський	98099001	2001	405 /	СЛП		озл, зріз	сс		7	7	5	7	дек
Садівський	00099003	2003	392 /	ЛП	9	сил	пс		7	7		7	вкліт
Скіф	92099002	1998	371 /	П	7-9	сил	сс		7	7-9	7	7-9	скліт
Сем	02099001	2003	405 /	СЛП	7	зерн	сс		7	7	5	7	вкліт
Ультра	93099001	1998	405 /	СЛП	7-9	зерн	рс		7	7	7	7	скліт
Харківський І	97099001	2001	405 /	СЛП		лік	сс		7	7	5	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресет- рації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
<u>Віниччя справжнє</u>	-	1											
Істок	91113001	1995	909 /	С	7	сил	сп		7	7	5	7	скліт
<u>Мальва кучерява</u>	-	1											
Приазовська 84	91322001	1995	909 /	С	5	сил	сс		5	5	5	5	скліт
<u>Топінамбур</u>	-	1											
Подільський 94	94138001	1999	417 /	ЛП	7	корм	сп	7	7	7		7	вкліт
<u>Фацелія</u>	-	1											
Аліна	91199004	1995	302 /	ЛП	9	мед,корм	сс		7	5	7	7	скліт
<u>Гарбуз кормовий</u>	-	3											
Валок	88102002	1993	310 /	С	7	корм	сс		7			7	вкліт
Гібрид 72	55102001	1959	387 /	СЛ	5	корм	сс		5			5	скліт
Кавбуз Здоров'яга	99102002	2003	808 /	ЛП	9	корм	пс		7			7	вкліт
<u>Пирій середній</u>	-	1											
Вітас	04423001	2005	337 /	СЛП	7-9	ск,лп	сс	7-9	7-9	7	7	7	сбіл, вкліт
<u>Люцерна жовта (серповидна)</u>	-	1											
Наречена Півночі	® 05462001	2007	345 /	ЛП	7-9	ск,лп	сс	7-9	7	7-9		7	вбіл,вкліт
<u>Еспарнет закавказький</u>	-	1											
Білиск	01050001	2006	378 /	С	5-9	корм	сс	7	7	7	-	7	вбіл
<u>Сільськогосподарські: овочеві</u>													
<u>Баклажан</u>	-	20											
Анет F1	05022005	2006	753 /	СЛ	9	салат	рс	7	7			7-9	
Адоніс F1	98022004	2002	402 /	С	7-9	ун	рс	7-9	7-9			7	
Віола	® 04022003	2007	1054 /	ЗГр	7-9	ун	сп	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Вагомий	02022001	2004	1054 / 1054	ЗГр(ПТ)	7	салат	рн	7	7			7	
Спик F1	98022001	2005	744 /	С	7-9	ун	рс	7	7			7	
Кашалот	06022004	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Ліловий ранок	02022003	2005	736 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Лонг Поп	® 04022001	2006	1163 /	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	
Оріон	05022003	2006	1197 /	Зг	9	ун	рс	7	7			7	
Пушанський-60	® 04022002	2007	1054 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			9	ун
Робін Гуд	06022005	2007	703 /	ЗГр	5	ун	рс	5	5			5	
Сауран	® 03022001	2006	313 /	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	
Тірренія F1	05022004	2006	753 /	СЛ	9	ун	рс	7	7			7	ун
Ультраранній F1	98022003	2001	402 /	СЛП	7	пер	рс	7	7			7-9	ун
Фабіна F1	95022001	2000	900 /	СЛП	7	конс	ер	7-9	7-9			7	пер
Фарама F1	® 04022004	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	конс
Буряк столовий			- 31									7	
Астар F1	02023006	2006	1072 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Атоман	® 04023004	2006	293 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Бордо харківський	96023002	2000	402 /	СЛП	9	ун	сс	9	9			9	
Болівар	81023002	1999	753 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			7-9	
Бона	97023001	2001	969 /	ЛП	7-9	ун	сс	7-9	7-9			7	
Багряний	96023003	2000	402 /	СЛП	7	ун	сс	7-9	7-9			7	
Бордо київський	® 04023005	2007	343 /	СЛП	7	стл	сс	7	7			9	
Буллет	98023002	2002	1013 /	ЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Боро F1	® 02023005	2006	751 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			9	
Ворріор F1	97023005	2001	900 /	СП	9	ун	сс	9	9			9	
Водан F1	03023003	2006	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Двонасінний	75023001	1990	157 /	СЛП	5	ун	сс	7	7			7	
Делікатесний	90023006	1994	339 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Дій	81023001	1997	402 /	СЛП	7		сс	9	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість	
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)					
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Детройт 2 - Неро	03023001	2004	744 /	С,ЛП	9	свж	рс	7-9	7-9				9	
Стінос	® 02023002	2005	1163 /	СП	7-9	свж	рс	7	7				7	
Зміна	92023001	1996	339 /	СП	7	ун	сс	7	7				7	
Кадет	® 04023003	2006	293 /	СП	7	ун	сс	7	7				7	
Кедрі	® 02023003	2006	1163 /	СП	7	ун	сс	7	7				7	
Ларка	® 04023001	2007	1102 /	СП	7-9	стл	ер	7	7					7-9
Ліко	® 02023001	2006	339 /	СП	7	ун	сс	7	7				7	
Люма	® 04023002	2007	1102 /	СП	9	стл	рс	7	7				7	
Моніка	® 05023001	2006	888 /	СП	7	ун	сс	7	7				7	
Посівський плоский	34023001	1937	430 /	СП	5	ун	сс	5	5				7	
Регульський циліндр	03023002	2006	1081 /	СП	7	ун	сс	7	7				7	
Регала	92023007	1997	751 /	СП	7	ун	сс	7-9	7-9				7	
Ройал Циліндра F1	03023004	2005	744 /	С	7-9	стл	рс	7	7				7-9	
Скарлет Суприм F1	98023003	2005	744 /	С	7-9	свж	рс	7	7				7-9	
Цігделя	® 05023002	2007	888 /	СП	7-9	стл	сс	7	7					
Червона куля	65023001	1991	712 /	СП	7	ун	сс	7	7				7	
Вівсяний корінь			-	1										
Поляна	91146001	1994	339 /	СП	7	ун	сс	7	7				7	ун
Гарбуз			-	16										
Арабатський	80102002	1985	357 / 357	СЛ	5	ун	сс	5	5				5	
Альтаір	02102003	2004	410 /	С,Л	7	овоч	рс	7	7				7	
Гілея	92102001	1996	410 /	СП	7	ун	сс	7	7				7	
Гамлет	02102001	2004	310 /	С,Л	7	овоч	рс	7	7				7	
Диво	01102001	2004	410 /	С	7	овоч	ер	7	7				7	
Ждана	94102002	2000	310 /	СП	7	ун	сс	7	7				7	
Нель	94102001	1998	310 /	СП	7	ун	сс	7	7				7	
Мотолівський 15	49102003	1950	402 /	СП	5	ун	сс	5	5				5	
Повинка	84102001	1993	410 /	СП	5	ун	сс	5	5				5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Пиза	03102001	2004	1081 /	С,Л	7-9	овоч	рс	7	7				7	
Південний	99102003	2003	410 /	С	7-9	ун	рс	7	7				7	
Польовичка	97102002	2001	410 /	Л	7	ун	сс	7	7				7	
Славута	80102005	1987	310 /	СЛП	5	ун	сс	5	5				5	
Світень	99102001	2003	310 /	С	7	ун	сс	7	7				7	
Український багатоплідний	49102004	1950	310 /	СЛП	5	ун	сс	5	5				5	
Херсонський	73102001	1982	410 /	СЛП	5	ун	сс	5	5				5	
Горох овочевий		-	14											
Авола АС	97024003	1999	744 /	СЛП	7-9	конс	рс	7	7				7	
Віолена	92024003	1997	339 /	СЛП	5	конс	рс	5	5				5	
Вікма	97024005	2001	339 /	ЛП	7	конс	рс	7	7				7	
Гунтер	97024004	2001	969 /	П	7	конс	рс	7	7				7	
Гермес	89024001	1994	339 /	СЛП	5	конс	рс	5	5				5	
Дінга	92024004	1995	721 /	СЛП	5	конс	рс	5	5				5	
Добриня	03024001	2007	309 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Кеш	95024001	1999	900 /	Л	7	конс	рс	7	7				7	
Овочево диво	99024002	2003	1121 /	СЛП	7-9	конс	сс	7	7				7	
Пегас	89024005	1995	339 /	СЛП	5	конс	сс	5	5				5	
Селена	92024002	1996	339 /	СЛП	5	конс	сс	5	5				5	
Салют ДТР	01024002	2005	974 /	П	7-9	унів	рс	7	7				7	
Стригунок	02024001	2005	339 /	П	7	унів	рс	7	7				7	
Уладовський харчовик ов.	98024001	2001	304 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7				7	
Диня		-	33											
Сєга F1	06025002	2007	786 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7				7	
Алушта	84025002	1989	357 / 357	СЛ	5	свж	рс	5	5				5	
Альтанка	® 03025003	2006	313 /											

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Агізер F1	06025003	2007	786 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Амал F1	00 04025002	2007	900 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Борівчанка	05025005	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Берегиня	91025002	1995	310 /	Л	5	свж	сс	5	5			5	
Гонрінка	86025001	1991	410 /	С	5	свж	ср	5	5			5	
Годянка	85025003	1990	410 /	С	5	свж	рс	5	5			5	
Гридоу F1	00025002	2003	900 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
Дідона	03025002	2007	410 /	Сл	7	свж	рс	7	7			7	
Діана	00 02025003	2007	312 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Думка	00 02025004	2007	310 /	Сл	7	свж	рс	7	7			7	
Заряна F1	03025001	2004	744 /	С	7-9	стл	рн	7-9	7-9			7-9	
Злата	99025001	2003	310 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
Забавка	00 02025005	2007	310 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Інулка	99025003	2003	410 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7	
Інеся	88025001	1992	310 /	СЛ	5	свж	сс	5	5			5	
Криничанка	80025002	1985	402 /	СЛ	5	свж	рс	5	5			5	
Константа F1	00025004	2003	753 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7	
Киянка	00 02025001	2005	1054 /	С,ЗГ	7	унів	рс	7	7			7	
Лада	92025001	1998	410 /	СЛП	5	свж	сс	5	5			5	
Липісва	90025001	1995	310 /	СЛП	5	свж	рс	5	5			5	
Мулатка	00 02025006	2007	312 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Монарх	05025013	2007	840 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Ольвія	02025007	2007	410 /	Сл	7	ун	рс	7	7			7	
Полідор II F1	00025001	2001	744 /	С	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
Рада F1	02025002	2004	343 /	ЗГр(Пг)	7-9	стл	рн	7	7			7	
Супер Стар F1	97025002	2001	900 /	С	7-9	свж	рс	7	9			7-9	
Серіянка	89025003	1997	410 /	СЛП	5	свж	рс	5	5			5	
Самарська	82025001	1983	310 /	С	5	свж	сс	5	5			5	
Тітовка	94025003	2000	310 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викори- стання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посу- хи	поля- гання	осипання	хвороб	

Кабачок

- 16

Алія F1	03026001	2006	900 /	СЛ	7-9	ун	рс	7	7				7-9
Гайдамака	03026004	2007	410 /	СЛП	5	ун	сс	7	7				5
Грибовський 37	42026001	1955	149 /	СЛП	5	конс, стл	рс	5	5				5
Золотінка	87026001	1993	410 /	СЛП	5	конс, стл	рс	5	5				5
Искандер F1	00026001	2001	744 /	СЛП	7-9	ун	рс	7-9	7-9				7-9
Кавілі F1	00026003	2003	753 /	СЛ	7-9	ун	рс	7-9	7-9				9
Медуза F1	05026001	2007	786 /	СЛП	5	ун	сс	7	7				5
Нефріт F1	03026003	2004	1081 /	СЛ	7	стл	рн	7	7				7
Одеський 52	49026002	1950	381 /	СЛП	5	конс, стл	рс	5	5				5
Онал F1	03026002	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7
Садко F1	00026004	2006	1044 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7
Сорая	98026001	2001	1081 /	С	7	пер	рс	7	7				7
Таміно F1	00026002	2003	900 /	С	7-9	ун	сс	7	7				9
Чаклун	99026002	2002	402 /	ЛП	7-9	ун	рс	7	7				7

Кавун

- 56

Атлант	01027004	2004	410 /	СЛ	7	стл	рс	7	7				7
Альянс	02027002	2007	410 /	СЛ	7	ун	рс	7	7				7
Борчанський	79027002	1983	402 /	СЛП	5	свж, зс	рс	5	5				5
Восход	78027001	1987	410 /	СЛ	5	свж, зс	сс	5	5				5
Васко F1	05027001	2006	887 /	СЛ	7	ун	рс	7	7				7
Гарний	95027001	1999	402 /	СЛП	7	свж, зс	рс	7	7				7
Голопристанський	85027009	1990	410 /	СЛ	5	свж, зс	рс	5	5				5
Гетьман	97027005	2001	1067 /	СЛ	7	свж	рс	7	7				7
Дебют F1	01027010	2005	410 /	СЛ	7	свж	рс	7	7				7
Дарунок	01027002	2004	410 /	С	7	стл	рс	7	7				7
Думара F1	80027001	1999	753 /	СЛ	5	свж, зс	рс	5	5				5
Долбі F1	99027003	2002	753 /	СЛ	7	свж	рс	7	7				7

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Сврка F1	99027005	2001	744 /	С	7	свж	рс	7	7				-7
Зоряний	97027016	2001	310 /	С	7	свж	сс	7	7				7
Крімеон Світ ХМ	96027001	1999	1012 /	С	7-9	свж, зс	ср	7	7				7
Козацький	97027006	2001	1067 /	СЛ	7	свж	рс	7	7				7
Княжич	99027006	2003	410 /	С	7	свж	рс	7	7				7
Красень	85027003	1991	410 /	С	5	свж, зс	сс	5	5				5
Каховський	97027013	2001	410 /	С	7	свж	сс	7	7				7
Крісбі F1	94027002	1997	753 /	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5				5
Кримеон Глори F1	03027001	2004	744 /	С,Л	7-9	стл	рн	7	7				7-9
Легіон	97027004	2001	410 /	СЛ	7	свж	рс	7	7				7
Леді F1	98027002	2001	753 /	С	7-9	свж	рс	7	7				9
Мадера F1	97027009	2001	744 /	С	7	свж	рс	7	7				7
Мелітопольський 60	50027001	1953	310 /	СЛ	5	свж, зс	сп	5	5				5
Минутка	04027001	2007	1054 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7
Поворічний	01027001	2004	410 /	С,Л	7	стл	сс	7	7				7
Пікопольський	97027011	2001	310 /	С	7	свж	сс	7	7				7
Обрій F1	94027001	1998	310 /	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5				5
Орфей	92027001	1997	410 /	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5				7
Огоньок	55027004	1960	402 /	СЛ	5	свж, зс	рс	5	5				5
Парадіз F1	97027008	2001	900 /	С	7	свж	сс	7	7				7
Північне Сяйво	97027012	2001	310 /	С	7	свж	рс	7	7				7
Порційний	03027003	2006	410 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7
Рясний	91027003	1997	410 /	СЛП	5	свж, зс	сп	5	5				5
Ройал Меджести F1	98027003	2001	744 /	С	7-9	свж	рс	7	7				7
Ройал Кримеон Світ	03027002	2004	744 /	С	7-9	стл	рн	7	7				9
Сніжок	81027003	1987	410 /	С	5	свж, зс	сп	5	5				5
Скарб	94027003	2000	310 /	С	7	свж	рс	7	7				7
Січеслав	91027006	1995	310 /	П	5	свж, зс	сс	5	5				5
Серьоженка	91027004	1997	410 /	СЛП	5	свж, зс	рс	5	5				5

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Сотник	01027006	2003	410 /	С	7	свж	рс	7	7				7	
Стетсон F1	® 04027002	2007	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Таврійський	78027005	1982	410 /	СЛ	5	свж, зс	сс	5	5				5	
Трофі F1	84027004	1999	753 /	С	5	свж, зс	ер	5	5				5	
Фаворит	02027001	2006	310 /	СЛ	7	ун	рс	7	7				7	
Херсонський	01027007	2005	410 /	С	7	свж	рс	7	7				7	
Чорногорець	91027005	1997	402 /	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5				7	
Широнінський	86027002	1990	402 /	Л	5	свж, зс	сс	5	5				5	
Кенді MC F1	05027002	2007	786 /	СЛ	7	ун	рс	7	7				7	
Спаський	03027004	2007	410 /	СЛ	7	ун	рс	7	7				7	
Капуста білоголова	-	89												
Арос F1	97028001	2001	969 /	СЛП	9	ун	пе	7	7				9	
Амагер 611	37028001	1950	149 /	СЛП	5	зс	пе	7	7				5	
Амтрак F1	92028010	2001	751 /	СЛ	9	ун	пе	7	7				9	
Атрия F1	94028003	1997	744 /	СЛП	9	ун	пе	7	7				7	
Адмірал F1	95028002	2000	900 /	ЛП	7	сал	рс	7	7				7	
Аммон F1	03028009	2004	744 /	С	9	ун	пе	9	9				9	
Аніта F1	02028009	2006	1072 /	СЛП	7	свж	рс	7	7				7	
Арривист F1	98028010	2001	744 /	СЛ	7-9	сал	рс	7	7				9	
Балбро F1	01028002	2003	887 /	Л	7	ун	сс	7	7				9	
Бригадир F1	99028006	2003	900 /	ЛП	9	пер	сп	7	7				9	
Білосніжка	68028002	1974	402 /	СЛП	5-7	зс	пе	7	5				7	
Бартоло F1	92028011	1997	751 /	СЛП	7-9	зс	пе	9	9				9	
Бронко F1	94028010	1997	751 /	СЛП	7	зс	пе	7	7				7	
Брага F1	98028004	2002	1013 /	ЛП	7	ун	пе	7	7				7	
Бенсон F1	98028002	2001	751 /	СЛ	9	сал	рс	7	7				9	
Белтис F1	03028016	2005	744 /	С	7-9	унів	сс	7	7				7	
Бірюза	® 04028013	2006	293 /	СЛП	7	ун	сп	7	7				9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Віоланта	® 91028002	1995	343 / 343	СЛП	5-7	ун	пе	7	7			7	
Вестри F1	97028005	2001	744 /	П	9	сал	ре	7	7			9	
Веснянка	94028001	1997	339 /	СЛП	7	сал	ре	7	7			7	
Галакси F1	95028005	1998	744 /	СЛП	9	ун	пе	9	7			7	
Гермес F1	97028006	2001	744 /	П	9	ун	сп	7	7			9	
Граната F1	® 04028012	2006	293 /	СЛП	7	ун	се	7	7			7	
Дитмаршер фрюер	57028001	1966	721 /	СЛП	7	сал	ре	7	7			7	
Діта	94028006	1999	969 /	СЛП	9	сал	ре	7	7			9	
Дідон F1	03028013	2005	744 /	СЛ	7-9	свж	ре	7	7			7-9	
Ерлено F1	84028002	1996	1050 /	СЛП	9	ун	пе	7	7			9	
Ельвіра F1	® 04028015	2006	293 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			9	
Єсноувська	® 77028002	1982	343 / 343	СЛП	5	ун	сп	5	5			5	
Жозефіна	® 92028001	1997	343 / 343	СЛП	7	ун	сп	7	7			7	
Золотий Акр	® 02028005	2006	1163 /	СЛП	7	ун	ре	7	7			7	
Іксон F1	03028014	2005	744 /	СЛ	7-9	свж	ре	7	7			7-9	
Іоньська	67028002	1971	149 /	СЛП	5	сал	ре	5-7	5-7			5	
Каунт F1	® 03028003	2006	900 /	СЛП	9	ун	пе	7	7			9	
Коронет F1	96028001	1999	753 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			7-9	
Каунтер F1	03028012	2006	751 /	СЛП	7	ун	се	7	7			7	
Киягіння	94028016	2001	343 /	СЛП	7	ун	пе	7	7			7	
Краутман F1	92028015	1997	751 /	СЛП	7	зе	пе	7	7			7	
Калібро F1	01028006	2005	888 /	ЛП	7	унів	се	7	7			7	
Каліна F1	02028008	2005	1072 /	Л	7	унів	пе	7-9	7			7	
Капорал F1	® 03028002	2006	900 /	СЛП	7	свж	се	7	7			9	
Камінна голова	02028001	2004	1081 /	С,Л,П	9	ун	се	7	7			9	
Крігтон F1	05028001	2006	887 /	СЛП	7	ун	пе	7	7			9	
Крюмон F1	® 03028007	2006	964 /	СЛП	7	ун	пе	7	7			9	
Колобок F1	® 03028008	2006	964 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			7	
Ліка	80028001	1985	402 /	СЛП	5	зе	пе	5	5			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресестрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямовикористання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Лангдейкер децема	72028005	1989	999 /	СЛП	7	зс	пс	7	7				7	
Лсннокс F1	92028014	1999	751 /	Л	9	ун	пс	7	7				9	
Леся	95028001	1999	402 /	СЛП	7	ун	пс	7	7				7	
Лангесвіт Бевар ®	02028004	2006	1163 /	СЛП	7	ун	сп	7	7				9	
Ліон F1	02028003	2005	887 /	СП	7	унів	пс	7	7				7	
Мандарин F1	94028005	1997	900 /	СЛП	7-9	зс	пс	7-9	7				7-9	
Мегатон F1	92028021	1997	751 /	СЛП	9	ун	сс	7	7				9	
Марабу F1 ®	03028001	2006	900 /	СЛП	7	ун	пс	9	7				9	
Мидор F1	94028007	1999	969 /	СЛП	9	зс	сп	7	7				7	
Олімп	97028002	2001	969 /	СЛП	9	ун	пс	7	7				9	
Ольга ®	00028002	2003	343 /	СЛ	7	ун	пс	7	7				7	
Орион F1	03028010	2004	744 /	С	9	сал	рс	9	9				9	
Парел F1	90028012	1997	751 /	СЛП	7-9	сал	рс	7	7				7-9	
Пандіон F1	02028002	2003	744 /	СЛ	9	сал	рс	7	7				9	
Ринда F1	97028007	1999	744 /	П	9	сал	сп	7	7				9	
Росава	94028017	1999	343 /	СЛП	7	сал	сп	7	7				7	
Ріспект F1 ®	04028014	2006	293 /	СЛП	7	ун	сп	7	7				9	
Столична ®	79028005	1983	343 / 343	СЛП	5	зс	сп	5	5				5	
Сарагога F1	92028009	2001	751 /	ЛП	9	ун	пс	7	7				9	
Старт F1	99028001	2003	888 /	ЛП	9	сал	рс	7	7				7	
Славія ®	04028001	2006	1163 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				9	
Сілема F1 ®	04028010	2007	1102 /	СЛп	7	ун	сп	7	7				7	
Сюрприз F1	02028006	2005	751 /	СЛ	7	свж	рс	7	7				7	
Трансам F1	94028012	1999	751 /	Л	7	ун	пс	7	7				7	
Тетянка	94028015	2000	343 /	СЛП	7	ун	сп	7	7				7	
Тарас F1 ®	03028004	2006	647 /	СЛП	7	ун	сс	7-9	7				9	
Терас F1	03028015	2005	744 /	С	7-9	унів	сс	7	7				7-9	
Українська осінь	83028003	1987	402 /	СЛП	7	зс	пс	7	7				7	
Увертюра ®	04028006	2006	1163 /	СЛП	7	7	рс	7	7				7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- трації			Заявник / Підтримувач	Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	поля- гання						осипання	хвороб		
Фарао F1	91028003	2001	751 /	СЛ	9	сал	рс	7-9	7-9			9	
Футонки	98028008	2001	879 /	СЛП	9	сал	рс	7	7			9	
Хімова F1	92028005	1997	751 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Харківська зимова	71028002	1976	402 /	СЛП	7	зс	пс	7	7			7	
Харікейн F1	02028007	2006	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Чіз F1	94028004	1997	900 /	СЛП	7-9	ун	пс	7	7			7	
Ярославна	90028006	1993	402 /	СЛП	7	зс	пс	5	5			7	
Яна	® 99028008	2002	402 / 402	П	9	ун	пс	9	7			7	
Селма F1	® 04028008	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	сп	7	7			7	
Талема F1	® 04028009	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	сс	7	7			7	
Калюрама F1	® 04028011	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	пс	7	7			7	
Мостар F1	05028008	2007	786 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Перлина F1	05028006	2007	647 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Капуста броколі	-	7											
В'ярус	02148001	2003	1081 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			9	
Ледівка	® 04148001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Миледи F1	82148001	2005	744 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
ТМ-04/ФЛ	® 05148001	2007	888 /										
Трубалур	® 06148001	2007	647 /										
Цезар	03148001	2007	1081 /										
Капуста качанна (червоноголова)	-	8											
Ауторо F1	92030004	1997	751 /	СЛП	7	сал	сс	7	7			7	
Лангсвиг Ред	® 04030001	2006	1163 /	СЛП	7	ун	пс	9	7			7	
Олена	® 02030001	2006	339 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Реліант F1	83030001	1997	1050 /	СЛП	9	сал	сс	7	7			7	
Редма F1	® 04030003	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	сс	7	7			7	
Рокси F1	03030001	2004	744 /	С	9	стл	рн	9	9			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Топарані	® 04030002	2006	293 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				7	
Фуєго F1	99030002	2002	900 /	С	9	ун	ср	7	7				9	
Капуста кольрабі - 6														
Віденська біла 1350	61105001	1968	149 /	П	5	конс	сс	5	5				5	
Глобус	® 04105003	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7				7	
Наталка	® 04105002	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7				7	
Пурпурова	® 04105001	2005	1163 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7				7	
Сніжана	® 06105002	2007	647 /										7	
Фея	® 06105001	2007	647 /											
Капуста пекинська - 7														
Білко F1	03152002	2005	751 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7				7	
Вікторія F1	03152001	2004	744 /	С	7-9	ун	рн	7	7				7	
Гілтон	® 04152005	2006	888 /	СЛП	7	ун.	рс	7	7				7	
Мішель	® 04152001	2005	1163 / 1013, 1163	СЛП	7-9	свж	рс	7	7				7	
Манок F1	02152001	2004	751 /	С,Л,П	7-9	стл	рн	7	7				7	
Капуста савойська - 2														
Верто 1340	61153002	1966	149 /	П	7	ун	сс	7	7				7	
Отава	® 04153001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7				7	
Капуста цвітня - 30														
Амейзін F1	92029008	1997	751 /	СЛП	9	ун	сс	7	7				7	
Авізо	94029001	1997	900 /	СЛП	9	ун	сс	7	7				9	
Амеріго F1	01029001	2006	1050 /	СЛП	9	ун	рс	7	7				9	
Бейкер F1	05029002	2007	1050 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Балдо F1	03029006	2004	744 /	С,Л	9	ун	рс	9	9				9	
Барселона F1	02029002	2005	887 /	Л	7-9	свж	рс	7	7				7	
Вінсон F1	02029001	2003	744 /	СЛ	9	ун	рс	9	9				9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Гудмен	92029004	1999	751 /	СЛП	9	ун	сс	7	7				9	
Діадам F1	02029005	2005	751 /	Л	7-9	свж	сс	7	7				7	
Кортес	84029001	1997	1050 /	СЛП	9	ун	сс	7	7				9	
Лівінгстон F1	05029003	2007	1050 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Лейла F1	06029007	2007	786 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Мобілік F1	® 03029002	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				9	
Міньюон F1	® 03029001	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Малімба F1	98029003	2001	744 /	СП	9	ун	рс	7	7				9	
Мейфлауер F1	® 04029006	2007	900 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7				7	
Наутікус F1	00029001	2003	900 /	СЛ	9	ун	сс	9	9				9	
Немо F1	® 04029007	2007	900 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7				7	
Онал	® 04029002	2007	1102 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Планіта F1	97029005	2005	744 /	С	7-9	свж	рс	7	7				7	
Пролісок F1	® 04029003	2006	293 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Робер	98029002	2001	1081 /	СП	9	ун	рс	7	7				7	
Сновхед	® 04029001	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Сірія F1	95029001	1999	900 /	СЛП	9	ун	сс	9	9				9	
Скайвокер F1	02029004	2005	751 /	С	7-9	свж	рс	7	7				7	
Уніботра	® 04029004	2006	293 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Фремонт F1	97029001	1999	744 /	Л	9	ун	сс	9	9				9	
Фарго F1	92029007	1997	751 /	СЛП	9	ун	сс	9	7				9	
Фастнет F1	® 03029003	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Фані F1	06029006	2007	786 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Квасоля овочева			- 20											
Артемід	® 04087001	2005	1013 / 1013	СЛП	7-9	свж	рс	7	7				7	
Білозерна 361	52087001	1959	339 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				7	
Вид	98087003	2001	879 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Галюнка	02087001	2003	1081 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7				7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посу- хи	поля- гання	осипання	хвороб	
Даяна	02087008	2004	888 /	СЛП	9	унів	рс	7	7			7	
Зіронька	96087001	2000	405 /	ЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Загадка	02087004	2004	1163 /	СЛП	7	стл	рн	7	7			7	
Киліан	04087002	2005	1013 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Ксеня	94087003	2001	339 /	П	7	ун	сс	7	7			7	
Лібра	97087003	2001	1072 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Ляура	97087002	2001	1072 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Ольга	92087002	1997	721 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Присадибна	90087002	1994	339 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Поп Топ	02087005	2004	1163 /	СЛП	7	стл	рн	7	7			7	
Полька	02087002	2003	1081 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Пітра	02087007	2004	888 /	СЛП	9	стл	рс	7	7			9	
Сонеста F1	95087001	1999	1013 /	С	7	ун	рс	5	5			5	
Скуба	98087001	2002	1013 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Українка	94087005	1999	339 /	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	
Ювілейна 287	69087001	1973	402 /	ЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Крес-салат	-	1											
Вість	84157002	1990	402 /	СП	5	свж	рс	5	5			5	
Кукурудза розлусна	-	7											
Данієль	99033001	2003	402 /	Л	7	ун	сс	7	7			7	
Дніпровський 929	98033001	2002	311 /	С	7	стл	рс	7	7			7	
Ерліконт	94033001	1997	402 / 404	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	
Ірида F1	® 04033001	2006	404 /	ПЛС	7	ун	рс	7	7			7	
Люкс	® 02033001	2006	378 /	ПЛС	7	зерн.	рс	7	7			7	
Кукурудза цукрова	-	30											
Андріївський F1	00032003	2003	736 /	П	7	стл,конс	ср	7	7			7	
Бостон F1	01032001	2003	1050 /	Л	7-9	стл,конс	рс	7	7			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-трації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Брусниця	91032001	1995	339 /	СЛП	5	стл, конс	рс	5	5				5
Вега 1	00032002	2003	736 /	С	7	стл, конс	ср	7	7				7
Внесок	04032006	2007	311 /	СЛП	7	ун	ср	7	7				7
Вспілія	04032005	2007	311 /	СЛП	7-9	ун	ср	7	7				7
Дракон	01032002	2005	339 /	С	7-9	унів	ср	7	7				7
Дебют F1	94032001	1997	402 / 404	СЛП	7	стл, конс	рс	7	7				7
Джубілі F1	98032001	2001	1050 /	СЛ	7-9	стл, конс	рс	7	7				7
Дмитрик	03032001	2007	404 / 404	СЛП	7	ун	рс	7	7				7
Сль Торо F1	97032001	2000	744 /	СЛ	7	стл, конс	ср	7	5				5
ЗІСК 504 су	93033001	1997	936 /	СЛП	5	стл	рс	5	5				5
ЗІСК 311 су	94033002	1997	936 /	СЛП	5	стл	рс	5	5				5
Куліковський F1	84032002	1990	339 /	СЛП	5	стл, конс	сс	5	5				5
Кетдл F1	03032004	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7				7-9
Лежєнд F1	97032002	2001	900 /	С	7	стл, конс	ср	5	5				5
Ласуна одеська	94032002	2004	378 /	СЛ	7	стл	рн	7	7				7
Лукомор'є F1	98032002	2002	339 /	С	7	стл, конс	рс	7	7				7
Мадонна F1	04032001	2007	1013 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7
Мамалижний ®	98032005	2001	1028 / 336, 1028	СЛП	7	стл, пер	ср	7	7				7
Роставиця F1	92032004	1997	339 /	СЛП	5	стл, конс	рс	5	5				5
Роялті F1	01032003	2003	1013 /	Л	7	стл, конс	ср	7	7				7
Сквирка (Роксолана) F1	85032001	1990	339 /	СЛП	5	стл, конс	рс	5	5				5
Спокуса	02032001	2007	311 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7
Сюрприз	99032044	2003	311 /	С	7	стл, конс	рс	7	7				7
Спінріт	04032003	2006	1050 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7
Трофи F1	03032002	2004	744 /	С	7-9	стл	рн	7	7				7
Морква	-	58											
Ассоль	03034009	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7
Абако F1	03034005	2004	744 /	С	7-9	ун	рн	7	7				9

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
Бангор F1	94034004	1997	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Билбо F1	97034004	2005	744 /	С	7-9	унів	сс	7	7			7-9	
Байон F1	® 04034010	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Бюро F1	65034001	1997	753 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Берлікумер 2	02034001	2004	1081 /	СЛП	7-9	ун	рн	7	7			7	
Віта-Лонга F1	95034001	1997	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Викторія F1	82034004	2005	744 /	С	7-9	унів	пс	7	7			7	
Велес F1	® 04034013	2006	293 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Веста F1	03034002	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Голландка	® 04034008	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Дарунок F1	96034004	2001	402 /	П	7	ун	сс	7	7			7	
Дарина	05034002	2006	888 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Дли́нная красная	® 04034011	2006	293 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Кампо	78034002	1997	753 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Кримчанка	01034002	2004	402 /	Л	7	стл	рн	7	7			7	
Кораль	97034011	2001	1072 /	СП	7	ун	сс	7	7			7	
Колтан F1	05034007	2006	753 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			7	
Камаган F1	92034006	1997	751 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Карлена	91034002	1995	721 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Квітневська	00034001	2004	339 /	СЛ	7-9	стл	рн	7	7			7	
Колгоспниця	® 04034016	2007	984 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Карнавал	03034010	2006	647 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Купало F1	® 04034014	2006	293 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Красний велікан	® 04034015	2006	293 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Каротан	® 04034009	2007	1102 /	СЛП	7	ун	пс	7-9	7			9	
Кармен	03034011	2006	647 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			9	
Кадріль	® 03034004	2007	647 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Ласуня	01034003	2004	343 /	СЛ	7	рн	рн	7	7			7	
Лангесвіт Фріотфул	® 02034003	2005	1163 / 1013, 1163	С	7	унів	сп	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Майя F1	03034003	2006	900 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				7	
Мінос F1	03034001	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				9	
Нагіська харківська	49034001	1952	402 /	СЛП	5	ун	сс	5	5				5	
Нарбоне F1	92034002	1997	751 /	СЛП	5	ун	сс	5	5				5	
Наполі F1	92034010	1997	751 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Найда F1	01034001	2003	887 /	П	7	ун	рс	7	7				7	
Нагофі	® 04034006	2006	1163 /	СЛП	9	ун	рс	7	7				7	
Олімпіус	94034003	1999	969 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Оленка	92034001	1995	402 /	СЛП	5	ун	рс	5	5				5	
Осіння королева	® 04034005	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Перший збір	03034006	2006	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Перун F1	® 04034012	2006	293 /	СЛП	7	ун	пе	7	7				7	
Ранок F1	95034002	1998	402 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				7	
Ред Кор	54034001	1997	753 /	СЛП		ун	сс							
Ройал Форто	94034002	1999	744 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Ройал Шансон	97034003	1999	744 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				7	
Сіркана F1	05034006	2006	753 /	СЛП	9	ун	сп	7	7				7	
Світлан	04034003	2006	1163 /	СЛП	9	ун	сс	7	7				7	
Тінга	97034001	2001	969 /	СЛ	7	ун	сс	7	7				7	
Талісман	® 04034004	2007	888 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				7	
Флайові	® 04034007	2006	1163 /	СЛП	7	ун	сп	9	7				9	
Флаккенарія	® 02034002	2005	1163 / 1013, 1163	СП	7-9	унів	пе	7	7				7	
Чумак F1	98034006	2002	402 /	Л	7	ун	рс	7	7				7	
Шантеле сквірська	46034002	1949	339 /	СЛП	5	ун	сс	5	5				5	
Яскрава	96034001	2000	402 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				7	
Огірок	-	123												
/Бейо 2640 F1/	05035001	2007	751 /	СЛП	7	конс	рс	7	7				9	
Атлантик F1	97035002	2001	751 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість	
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-тації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)					
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб		
Астерікс F1	95035005	1999	751 /	СЛП	7	конс	рс	7	7				7	
Анулька F1	05035040	2007	1072 /	СЛП	7	ун	рс	7	5				7	
Аякс F1	74035001	1996	753 /	СЛП	7	конс	рс	7	7				7	
Аладін F1	® 02035002	2005	1178 /	С	7	унів	рс	7	7				7	
Анжеліна F1	05035019	2006	753 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7				9	
Акорд F1	00035007	2003	751 /	Л	7	конс,свж	рс	7	7				7	
Атлет F1	06035020	2007	898 /	ЗРг	7	сал	рс	7	7				7	
Аскольд F1	02035007	2005	888 /	ЛП	7-9	конс	сп	7	7				7	
Анніка F1	® 04035005	2006	293 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7				7	
Афіна F1	05035018	2006	753 /	СЛП	9	ун	рс	7	7				9	
Андрус F1	06035002	2007	1072 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				7	
Амур F1	02035004	2005	751 /	Л	7-9	унів	рс	7	7				7-9	
Буян F1	06035011	2007	703 /	ЗГр	7	конс	рс	7	7				7	
Борис F1	05035006	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Бобрик F1	06035021	2007	898 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Владко F1	97035011	2001	1072 /	СЛП	7	конс, свж	рс	7	7				7	
Внучок F1	05035020	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7				7	
Веслая Компанія F1	05035008	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Верніє Друзья F1	06035013	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Весна F1	05035011	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Веласко F1	06035025	2007	786 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Горностай F1	06035007	2007	703 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7				7	
Гінга F1	99035003	2004	721 /	ЗГр	7-9	конс	рн	7	7				7	
Гермес Скерневіцький F1	00035001	2001	1081 /	СЛП	7	конс, свж	пс	7	7				7	
Гейм	92035004	1997	402 /	СЛП	5	зс	сп	5	5				5	
Галіт F1	92035021	1999	402 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5				5	
Геркулес F1	06035009	2007	703 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7				7	
Гектор F1	99035013	2002	753 /	СЛП	7	ун	сп	7	7				7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість	
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)					
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Галина F1	03035001	2004	744 /	С	7	ун	рн	7	7				7	
Дездемона	01035002	2003	888 /	Л	7	ун	рс	7	7				7	
Деліна F1	00035002	2003	753 /	Л	7-9	конс,свж	рс	7	7				7	
Діва	93035003	1997	955 /	СЛП	5	конс	ср	5	5				5	
Дашіла	00035008	2003	888 /	Л	7	ун	рс	7	7				7	
Джерело	94035008	1999	402 /	СЛП	7	зс	рс	7	7				7	
Денек F1	05035012	2007	541 /	СЛП	7	зс	рс	7	7				7	
Джин F1	05035005	2007	541 /	СЛП	7	зс	рс	7	7				7	
Естафета F1	79035016	1983	157 / 964	ЗГр	5	сал	ср	5	5				5	
Ера	90035005	1997	429 /	СЛП	5	зс	сс	5	5				5	
Еліза F1	® 04035002	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				9	
Експеріор	05035038	2007	840 /	Згр	7	свж	рс	7	7				7	
Знарок F1	® 04035007	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7				7	
Зефір F1	® 03035012	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Іра	92035006	1997	721 /	СЛП	5	зс	ср	5	5				5	
Івід	98035001	2003	1081 /	П	7	ун	рс	7	7				7	
Крістіна F1	94035018	1997	753 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7				7	
Кронос Скерневіцький F1	® 03035004	2006	1081 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				9	
Комі F1	99035002	2004	721 /	ЗГр	7-9	ун	рн	7	7				9	
Ксана F1	® 99035011	2003	402 /	ЗГр(СТ,ПТ)	7	свж	сс	7	7				7	
Криниця F1	78035003	1985	402 /	Л	5	конс	рн	5	5				5	
Крак F1	97035010	2001	1072 /	СЛП	7	конс, свж	рс	7	7				7	
Кадет F1	06035019	2007	898 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Кураж F1	06035018	2007	898 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7				7	
Квартет F1	05035016	2007	541 /	СЛП	7	зс	рс	7	7				7	
Казанова F1	06035024	2007	898 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7				7	
Левина	94035001	1998	744 /	СЛП	7	конс	сс	7	7				7	
Левадний F1	® 03035007	2006	339 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресет- рації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напрям викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Лялюк	91035001	1995	402 /	СЛП	5	конс	сс	5	5			5	
Леон	96035005	2000	1013 /	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Лорд F1	06035008	2007	703 /	ЗГр	7	конс	рс	7	7			7	
Маша F1	00035003	2001	744 /	СЛ	7-9	ун	рс	9	9			9	
Мудрець F1	® 04035006	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Морин F1	94035016	1997	744 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Мона	93035001	1997	955 /	СЛП	7	конс	ср	7	7			7	
Морінга F1	99035004	2004	721 /	СЛП	7	конс	рн	7	7			7	
Маринда F1	94035002	1998	744 /	СЛП	7	конс	пс	7	7			7	
Матра F1	98035007	2001	900 /	ПТ	7	свж	рс	7	7			7	
Мирабелл F1	02035001	2004	744 /	С	7	ун	рн	7	7			7	
Мотильок F1	05035014	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Матильда F1	98035005	2001	744 /	СП	7-9	конс	рс	7	7			7	
Мальчик-с-пальчик F1	06035014	2007	703 /	ЗГр	7	конс	рс	7	7			7	
Марта F1	06035012	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Мила F1	03035002	2004	744 /	С	7	ун	рн	7	7			7	
Ніжинський 12	34035001	1937	402 /	СЛП	5	зс	сп	5	5			5	
Наташа F1	98035004	2001	744 /	СП	7-9	конс	рс	7	7			7	
Одис F1	® 03035005	2006	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Орлик F1	06035023	2007	898 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Олімпіада F1	06035015	2007	703 /	ЗГр	7	сая	рс	7	7			7	
Пасадена F1	97035006	1999	1050 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Парсіфал F1	01035001	2006	887 /	СЛП	9	ун	рс	7	7			7	
Поліна F1	05035015	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Пікобелло	04035009	2006	1197 /										
Паркер F1	75035001	1996	753 /	СЛП	7	конс	ср	7	7			7	
Потомак F1	03035009	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Регаль F1	95035002	1999	900 /	СЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Роял F1	66035001	1997	900 /	СЛП	5	конс	ср	5	5			5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Регія	94035006	1999	969 /	СЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Родос F1	05035004	2007	1081 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	
Старекс F1	05035017	2007	786 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Сквирський 1/27 F1	96035007	2000	1025 /	ЛП	5	конс	рс	5	5			5	
Смушковий F1	® 04035008	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Слобжанський F1	® 99035012	2002	402 /	СЛП	7-9	конс	рс	7	7			7	
Ссверянін	92035005	1996	402 /	СЛП	5	конс	сс	5	5			5	
Смак F1	® 99035017	2002	402 /	ЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Салтан F1	06035010	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Сандер F1	06035003	2007	1072 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Самородок F1	® 99035016	2002	402 /	С	7	ун	сс	7	7			7	
Син Полка F1	05035007	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Сувенір F1	® 03035008	2007	402 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			7	
Сремський F1	01035005	2003	712 /	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Тристан	05035037	2007	840 /	ЗГр	9	свж	рс	7	7			7	
Тітус F1	02035005	2005	1072 /	СП	7-9	унів	рс	7	7			7	
Тайга F1	06035016	2007	703 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Трембіта F1	06035022	2007	898 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Фермер F1	06035005	2007	703 /	ЗГр	7	конс	рс	7	7			7	
Філіппок F1	05035009	2007	541 /	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Хробри F1	06035004	2007	1072 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Шебелінський F1	89035007	1995	402 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5			5	
Щедрик F1	06035017	2007	898 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Ювіляр F1	94035010	1999	381 /	ЗГр	7	сал	рн	7	7			7	
Юліан F1	02035006	2006	1072 /	СЛп	7	ун	рс	7	7			7	
Язер F1	95035004	2000	751 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5			5	
Пастернак	-	3											
Гормон	02161001	2003	339 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Петрик	92161001	1995	402 /	СЛП	5	спц	сс	5	5				5	
Патисон	-	3												
Оранжевий	92162001	2000	410 /	СЛП	5	ун	сс	5	5				5	
Перлинка	01162001	2002	402 /	СЛП	7	пер	рс	7	7				7	
Поло F1	00162001	2001	1081 /	СЛП	7-9	пер	сс	7	7				7	
Перець гіркий	-	2												
Український гіркий	46036001	1947	402 /	СЛП	5	спц	сс	5	5				5	
Харківський	79036001	1983	402 /	СЛП	5	спц	сс	5	5				5	
Перець солодкий	-	59												
Арамис F1	05037018	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	5	5				5	
Боцман	06037003	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Бактянець	® 04037003	2007	323 /	СЛП	7	свж	рс	7	7				7	
Біанка	04037002	2006	840 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Бонета	05037002	2006	888 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Валюша	® 03037006	2006	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Ватаг	02037002	2004	1054 / 1054	ЗГр(ІІТ)	7	ун	рн	7	7				7	
Голубок	91037002	1997	402 /	СЛП	5	ун	ср	5	5				5	
Гранд F1	® 03037007	2006	313 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Геліос	® 03037008	2006	647 /											
Геркулес F1	® 04037004	2007	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Дружок	92037013	1990	402 /	ЗГр	5	ун	сс	5	5				5	
Добірний	05037021		1054 /	ЗГр	7	ун	ср	7	7				7	
Етюда	® 03037004	2005	1081 / 50, 1081	СЛП	7	ун	ср	7	7				7	
Еней	® 03037010	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Срошка	06037004	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Жовтий дивосвіт	® 02037005	2005	1163 / 1013, 1163	Л	7-9	унів	рс	7	7				7	
Злагода F1	01037001	2004	402 /	С	7	ун	рн	7	7				7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість	
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)					
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Зоряка	05037011	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Золоте руно	® 03037002	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Звезда Востока золотистая F1	05037004	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Звезда Востока оранжевая F1	05037014	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Звезда Востока біла F1	05037016	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Звезда Востока фіолетовая	05037013	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Звезда Востока F1	05037005	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Звезда Востока жовта F1	05037007	2007	541 /											
Звезда Востока шоколадная F1	05037012	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Купон	90037001	1995	357 / 357	СЛП	5	ун	сс	5	5				5	
Клаудіо F1	94037005	1997	753 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Ковбой F1	05037009	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Люкс	® 02037003	2006	357 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Миролубівський F1	99037003	2003	343 /	П	7	ун	рс	7	7				7	
Мадонна F1	® 03037001	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Міраж	05037017	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Монтекрісто F1	06037002	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Покпорн	® 03037005	2005	1081 /	Л	7-9	унів	сп	7	7				7	
Надія	95037001	1998	402 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				7	
Нікіта F1	06037001	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Обрій	94037004	1998	339 /	СЛП	5	ун	рс	5	5				5	
Ожарівський	00037002	2001	1081 /	СЛ	7-9	ун	рс	7	7				7	
Оленка	05037003	2007	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Полтавський	90037002	1995	402 /	СЛП	5	ун	сп	5	5				5	
Піонер	82037006	1990	402 /	ЗГр	5	ун	рс	5	5				5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-тації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб		
Подетоліна	00037001	2001	1081 /	СЛ	7	ун	рс	7	7				7	
Пігмаліон F1	05037010	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Сонар F1	95037002	1999	900 /	П	7	ун	сс	7	7				7	
Снігур	97037006	2001	402 /	ЛП	5	ун	рс	5	5				5	
Смарагд	98037009	2001	357 / 357	СЛП	7	ун	сс	7	7				7	
Сонячний	02037001	2004	1054 / 1054	ЗГр(ПТ)	7	ун	рн	7	7				7	
Світлячок	® 98037010	2002	402 /	П	7	ун	сс	7	7				7	
Тетяна	05037020	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	5	5				7	
Фламініо F1	97037007	2001	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Фунтік	06037005	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Червоний дивосвіт	® 02037004	2005	1163 / 1013, 1163	Л	7-9	унів	рс	7	7				7	
Петрушка - 19														
Астра	97163001	1999	969 /	СЛП	7	спц	рс	7	7				7	
Ароматна	02163004	2004	1163 /	СЛП	7	ун	рн	7	7				7	
Берлінія	02163002	2004	1163 /	СКГ	7-9	ун	рн	7	7				7	
Господиня	98163002	2000	357 / 357	СЛП	7	спц	рс	7	7				7	
Ігл	95163001	1999	751 /	СЛП	7-9	спц	рс	7	7				7	
Кучерявая Триплекс	03163001	2004	744 /	СЛП	7	ун	рн	7	7				7	
Листовая Комун-3	03163002	2004	744 /	СЛП	7	ун	рн	7	7				7	
Мосспоп	02163003	2004	1163 /	СЛП	7	ун	рн	7	7				7	
Оломунська	02163001	2003	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Росава	® 04163001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7				7	
Фреска	® 06163002	2007	647 /											
Харків'янка	92163001	1995	402 /	СЛП	5	спц	рс	5	5				5	
Цукрова	49163003	1981	149 /	СЛП	5	спц	рс	5	5				5	
Челеста	® 06163001	2007	647 /											
Помідор - 200														
Аврелій F1	97040019	2001	744 /	С	7	ун	сп	7	7				7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Антошка F1	94040028	1999	402 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5				5	
Атласний	94040021	2000	343 /	СЛП	7	конс	рс	7	7				7	
Аміко	94040002	1998	343 /	СЛП	7	ун	сс	7	7				7	
Аркадія F1	99040031	2002	1119 /	ЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Арфа F1	® 03040035	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Аламбра F1	98040018	2001	900 /	СЛП	7	ун	ср	7	7				7	
Астероїд	® 04040035	2007	402 /	СЛП	7	свж	рс	7	7				7	
Атоль	98040004	2001	1081 /	ЛП	7	ун	ср	7	7				7	
Алета	02040014	2006	313 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7	
Богун F1	® 99040017	2003	402 /	ЗГр,ПТ	7	сал	рс	7	7				7	
Барвінок F1	96040006	2000	343 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5				5	
Биг Биф F1	97040018	2001	744 /	С	7	ун	ср	7	7				7	
Беліс	04040011	2005	840 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7-9	унів	рс	7	7				7	
Буран	05040102	2007	840 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Бачка	98040009	2001	879 /	СЛП	5	ун	рс	5	5				5	
Болдвін	05040103	2007	840 /	ЗГр	7-9	ун	рс	7	7				7	
Водограй	00040007	2005	343 /	ЛП	7	унів	ср	7	7				7	
Вікторія	01040011	2004	1109 /	СЛ	7	ун	рн	7	7				7	
Весняний F1	01040009	2004	402 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7				7	
Верліока F1	86040030	1990	157 / 964	ЗГр	7	сал	рс	7	7				7	
Волном F1	98040016	2001	753 /	ЗГр	7	свж, сал	рс	7	7				7	
Гожий F1	05040039	2007	1054 /	ЗГр	7	ун	ср	7	7				7	
Голда	93040004	1997	955 /	СЛП	7	ун	рс	5	7				5	
Господар	92040001	1997	402 /	СЛП	5	ун	рс	5	5				5	
Ганія	05040116	2007	215 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7				7	
Грейс F1	03040005	2004	1197 /	ЗГр,СТ	7	ун	рн	7	7				7	
Гектор F1	® 03040004	2005	900 /	СЛ	7-9	унів	рс	7	7				7	
Дружба	92040005	1995	1109 /	СЛП	5	ун	рс	5	5				5	
Дельфін F1	97040015	2000	1050 /	Л	7-9	конс	рс	7	7				7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Добродій F1	05040038	2007	1054 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Дуєл Єрли F1	97040002	2001	744 /	С	7-9	ун	ср	7	7			7	
Доля F1	01040012	2004	343 /	ЗГр,ПТ	7	салат	рн	7	7			7	
Дораль	93040002	1997	955 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Джадело	05040114	2007	215 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Данило F1	00040004	2004	343 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Денар	99040012	2004	721 /	СЛ	7	ун	пс	7	7			7	
Дуєл Плас F1	03040008	2004	744 /	С	7-9	ун	рн	7	7			7	
Дієз F1	06040009	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Джина	03040032	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Елкоу F1	99040030	2003	900 /	С	7	ун	рс	7	7			7	
Ейджен	05040104	2007	840 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Ельф	02040006	2004	1054 / 1054	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Женарос F1	03040006	2004	1197 /	ЗГр,СТ	7	ун	рн	7	7			7	
Зорень	85040004	1991	343 /	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Золоте руно F1	97040005	2003	343 /	Л	7	пер	сс	7	7			7	
Золотий дощ	® 03040025	2004	1081 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7	конс, свж	рн	7	7			7	
Зоряний	99040036	2003	1109 /	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Імператор київський F1	97040020	2001	343 /	ЗГр,ПТ	7	свж	рс	7	7			7	
Ігранда	95040002	2000	721 /	СЛ	7	конс	рс	7	7			7	
Івет F1	05040076	2007	1050 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Інкас F1	83040009	1997	753 /	СЛП	7	конс	ср	7	7			7	
Іван Мазепа	02040013	2006	1157 /	СЛП	7	салат	ср	7	7			7	
Іришка	® 99040035	2003	402 /	Л	7	ун	рс	7	7			7	
КДС-5 F1	94040027	2000	402 /	ЗГр	7	сал	рс	7	5			7	
Княжич F1	® 99040016	2003	402 /	ЗГр,ПТ	7	сал	рс	7	7			7	
КДС-1 F1	94040026	2000	343 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Карстена	05040022	2007	122 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Карась	01040010	2004	402 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
Козачок F1	97040007	2000	343 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Красунчик	01040014	2004	736 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Кременчуцький	90040017	1993	402 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Класік F1	93040010	1997	753 /	СЛП	5	конс	ср	5	5			5	
КНЦЦ 45 F1	® 04040029	2007	343 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Кіммерієць	99040019	2007	411 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			5	
Кронос F1	99040020	2001	753 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7	свж	рс	7	7			7	
Клюндайк	® 04040032	2007	402 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Кміїц	98040002	2001	1081 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Лагоранж	® 03040029	2006	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Ласунчик	01040013	2004	736 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Любимий	82040008	1987	402 /	СЛ	5	ун	ср	5	5			5	
Лаурідса	05040027	2007	122 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Марфа F1	94040012	2001	744 /	ЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Миколка F1	00040005	2005	343 /	ЛП	7	унів	ср	7	7			7	
Мондіал	04040010	2005	840 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Марисса F1	03040013	2004	744 /	С	7	свж	рн	7	7			7	
Малинове Віканте	® 04040033	2007	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Муза F1	® 03040036	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Малік F1	® 03040001	2005	900 /	СЛП	7-9	унів	рс	7	7			7	
Мелі	02040021	2007	1109 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Макіївський	02040008	2007	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Миссури Оригінал	03040011	2004	744 /	С	7-9	салат	рн	7	7			7	
Надія	97040004	2000	1109 /	СЛ	7	конс	сс	7	7			7	
Ньютон F1	05040075	2007	1050 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Наско-2000	® 00040028	2003	1044 /	СЛ	7	ун	ср	7	7			7	
Надбужанський	® 04040025	2007	1109 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Незабудка F1	02040012	2006	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Надніпрянський 1	® 03040037	2007	411 /	СЛП	7	свж	сс	5	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Орко F1	97040022	2000	753 /	СЛ	7	ун	сс	5	5			5	
Оберіг	00040008	2005	343 /	ЛП	7	унів	ср	7	7			7	
Одета	97040023	2001	969 /	С	7	ун	сс	7	7			7	
Опера	05040115	2007	215 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Оксамит	02040010	2006	1054 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Попільнянський	99040018	2005	343 /	С	7	унів	сс	7	7			7	
Пето 86 Оригінал	79040001	1999	744 /	С	7	ун	ср	7	7			7	
Перлина	® 03040030	2006	1163 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Південна Пальміра	® 04040024	2007	381 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Побратим F1	00040006	2004	343 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Принадний	® 04040021	2007	1054 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Пинки Леди F1	03040014	2004	744 /	С	7	свж	рн	7	7			7	
Президент II F1	03040010	2004	744 /	С	7-9	салат	рн	7	7			7	
Пріма F1	® 03040002	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Перфектпил F1	03040018	2004	744 /	С	7	всж	рн	7	7			7	
Пинк Фортрест F1	98040013	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Плідний	02040004	2004	1054 / 1054	ЗГр,ПТ	7	салат	рн	7	7			7	
Платус F1	04040008	2005	1197 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Ред Хантер	76040010	1997	753 /	СЛП	5	конс	ср	5	5			5	
Раїса F1	97040016	1999	1050 /	ЗГр	7-9	сал	рс	9	7			9	
Радісний	03040028	2006	1109 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Ріо Грапо	® 02040017	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Румба Ожаровська	02040002	2004	1081 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Регіон	® 03040033	2006	313 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Розовіс щочки F1	06040011	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Ріо Гранде Оригінал	03040017	2004	744 /	С	7-9	свж	рн	7	7			7	
Раллі	04040023	2006	840 /	Зг	7	ун	рс	7	7			7	
Ріо Фуего Оригінал	98040011	2001	744 /	С	7-9	ун	ср	7	7			9	
Скарб F1	96040004	2000	343 /	ЗГр	7	сал	рс	7	5			5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Скіф F1	94040016	1997	753 /	СЛП	7	конс	ср	7	7			7	
Солероссо F1	05040014	2006	753 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Сергій 153 F1	® 04040030	2007	343 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Санетарг F1	01040001	2002	744 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
СХ-1	88040013	1996	1109 /	СЛП	5	конс	сс	5	5			5	
СХ-4	94040008	1998	1109 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Сілуєт F1	05040077	2007	1050 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Саньяго F1	00040001	2002	1050 /	С	7	ун	рс	7	7			7	
СХ-3	94040007	1998	1109 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Селебрити F1	00040002	2002	744 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Сергійевий	90040022	1996	402 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
СХ-2	91040005	1997	1109 /	СЛП	5	конс	рс	5	5			5	
Сяйво	® 02040009	2006	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Сапрайз F1	03040012	2004	744 /	С	7-9	прм	рн	7	7			7	
Стожар	02040005	2004	1054 / 1054	ЗГр,ПТ	7	салат	рн	7	7			7	
Саншайн F1	03040007	2004	744 /	С	7-9	ун	рн	7	7			7	
Святослав F1	99040038	2003	402 /	Л	5	ун	рс	5	5			5	
Толстой F1	02040019	2005	751 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Тамаріс F1	® 03040003	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Тесті F1	02040020	2005	751 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Траян	02040003	2005	964 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Унавський	86040003	1991	343 /	П	5	сал	рс	5	5			5	
Українець	77040013	1983	402 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5			5	
Флора	92040006	1996	343 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			5	
Флорида 47 P F1	03040031	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Фастівський І	® 03040026	2006	343 /										
Флейта F1	06040010	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Хиларіо F1	94040014	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Хорів	® 04040039	2007	343 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресетрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Хайпил 108 F1	03040009	2004	744 /	С	7-9	конс	рн	7	7			7	
Целсус F1	04040009	2005	1197 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7-9	унів	рс	7	7			7	
Цветік F1	® 04040034	2007	402 /	СЛП/ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Церасо F1	03040015	2004	744 /	С	7-9	салат	рн	7	7			7	
Цілао F1	06040007	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Чаусянський	03040027	2006	1109 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Чарівний F1	92040030	1999	402 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5			5	
Чарльстон F1	05040078	2007	1050 /	Згр	7	ун	рс	7	7			7	
Чайка	® 02040011	2007	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Шафер F1	05040037	2007	1054 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Шедєвр I	97040031	2001	1109 /	ЛП	5	ун	сс	5	5			7	
Шанс	97040030	2001	357 / 357	П	7	ун	рс	7	7			7	
Шевальє F1	® 04040031	2007	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Яки F1	03040016	2004	744 /	С	7-9	конс	рн	7	7			7	
Ягуар F1	98040014	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Достойний F1	05040036	2007	1054 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Донхосе F1	® 04040042	2007	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Колібри F1	04040043	2007	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Сіта F1	® 04040041	2007	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Фараон F1	01040008	2007	892 /										
Форсаж F1	06040005	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Хілма F1	06040006	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Щедрик F1	® 04040020	2006	293 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Левада	04040022	2007	432 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Магнус	04040044	2006	1197 /	Зг,Пт	7-9	ун	рс	7	7			7	
Айша F1	05040010	2007	786 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Pina	-	2											
Золота куля	02130001	2004	1163 /	СЛП	9	свж	рс	7	7			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Пурпурлеоп	02130002	2004	1163 /	СЛП	9	свж	рс	7	7			7	
Редиска	-	36											
18 Карат	02038002	2006	1163 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Базис	85038003	1989	402 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Богиня	90038003	1994	402 /	СЛП	5	свж, сал	рс	5	5			5	
Білосніжка	03038002	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Вайт Брекфаст	99038002	2002	721 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Дабел F1	05038004	2006	753 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Дует	99038001	2002	721 /	С	7	свж,сал	рс	7	7			7	
Еспресо F1	® 04038005	2006	293 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Ілка	92038003	1995	721 /	СЛП	5	свж, сал	ср	5	5			5	
Крімсон	® 04038002	2006	1163 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Катруся	95038001	2000	402 /	СЛП	5	свж, сал	рс	5	5			5	
Ксенія	90038004	1994	402 /	СЛП	7	свж, сал	рс	5	5			5	
Корал	55038001	1996	753 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Кампус	® 04038004	2007	1102 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Лада	00038001	2003	888 /	ЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Льодяна бурулька	50038002	1955	381 /	СЛП	5	свж, сал	ср	5	5			5	
Люцинка	02038001	2004	1081 /	СЛ	7	салат	рн	7	7			7	
Новиред	03038003	2005	744 /	СЛ	7-9	свж	рс	7	7			7	
Нася	05038002	2007	1081 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Покер	98038003	2000	751 /	СЛП	7	свж,сал	рс	7	7			7	
Рова	97038002	2001	1072 /	СЛП	5	свж	рс	5	5			5	
Рондар F1	05038008	2007	1050 /	СЛП	9	свж	рс	7	7			7	
Рубін	55038005	1947	402 /	СЛП	5	свж, сал	ср	5	5			5	
Рудольф	02038005	2005	751 /	С	7-9	свж	рс	7	7			7	
Ребел	98038004	2000	751 /	СЛП	7	свж,сал	рс	7	7			7	
Сора	96038001	1999	753 /	СЛП	7-9	свж, сал	рс	9	7			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Снежка	® 03038001	2006	1081 /	СЛП	7	свж	рс	7	7				7	
Селеста	05038007	2006	840 /	Зг	9	свж	рс	7	7				7	
Спарта	® 04038003	2007	888 /	СЛП	7	свж	рс	7	7				7	
Саксонія	® 04038001	2006	1163 /	СЛП	7	свж	7	7	7				7	
Тарзан	04038006	2006	840 /	Зг	9	свж	рс	7	7				9	
Фараон	05038001	2006	888 /	СЛП	9	свж	рс	7	7				7	
Френчлоп	02038003	2005	1163 /	СЛ	7-9	свж	рс	7	7				7	
Ютренка	05038010	2007	50 /	СЛП	7	свж	рс	7	7				7	
Ясочка	® 04038007	2007	343 /	СЛП	7	свж	рс	7	7				7	
Редька посівна			- 9											
Агата	00039001	2001	1081 /	СЛП	7	свж	сс,літ,зим	7	7				7	
Лебідка	97039001	1999	402 /	СЛП	7	свж, сал	сс,літ	7	7				7	
Одеська 5	51039001	1960	381 /	СЛП	5	свж	сс,літ	5	5				5	
Сквирська біла	73039001	1978	339 /	СЛП	7	свж, сал	пс,зим	7	7				7	
Сквирська чорна	73039002	1978	339 /	СЛП	7	свж, сал	пс,зим	7	7				7	
Сударушка	84039001	1993	402 /	СЛП	7	свж, сал	сс,літ	7	7				7	
Трояндова	97039002	1999	402 /	СЛП	7	свж, сал	сс,літ	7	7				7	
Редька олійна			- 2											
Журавка	97096001	2000	332 /	СЛ	7	олн, корм			6	7	8		6	
Ямайка	94096001	1998	430 /	Л	5	олн, корм			5	7	7		5	
Салат головчастий			- 4											
Етті	01165001	2002	888 /	СЛП	7	сал	сс	7	7				7	
Ларавера	® 04165001	2005	1163 / 1163	СЛП	7	свж	рс	7	7				7	
Ленто	01165002	2002	888 /	СЛП	7	сал	сс	7	7				7	
Смуглянка	® 03165001	2005	177 / 984, 177	СЛП	7	свж	рс	7	7				7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Салат латук - 15													
Вагомий	97291001	1999	357 / 357	СЛП	5	свж, сал	рс	5	5			5	
Гренада Ожаровська	98291001	2000	1081 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Думка	03291001	2004	1081 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Гвеліна	02291002	2003	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Зоренад	® 03291002	2005	177 / 984, 177	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Кучерявець одеський	53291001	1987	381 /	СЛ	5	свж, сал	сс	5	5			5	
Королева літа	02291001	2003	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Модесто	98291003	2000	1013 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Россла	01291002	2002	888 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Слободжанин	97291002	1999	357 /	СЛП	5	свж, тхст	рс	5	5			5	
Юстина	98291002	2000	1081 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Селера листкова - 8													
Албін	01167001	2002	888 /	СЛП	7	свж	сп	7	7			7	
Аніта	95167001	1999	721 /	СЛП	7	спц	сс	7	7			7	
Діамант	02167003	2004	751 /	СЛП	7	спц	рн	7	7			7	
Едвард	02167001	2003	1081 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Іванко	97167001	1999	402 /	СЛП	7	спц	сс	7	7			7	
Монарх	86167001	1999	753 /	СЛП	5	спц	сс	5	5			5	
Цілител	02167002	2003	339 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Чорномор	94167001	1997	339 /	СЛП	7	спц	сс	7	7			7	
Тиква звичайна - 1													
Чарівниця	01401001	2002	357 / 357	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Фізаліс - 1													
Дачний	92171001	1996	343 /	Л	7	конс	сс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Хрін	-	1											
Валківський	75172001	1977	402 /	СЛП	7	спц	рс	7	7				7
Цибуля батун	-	3											
Байа Верде	05174001	2006	744 /	ПЛС	7	ун.	рс	7	7				7
Изумрудний острів	03174001	2005	744 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7				7-9
П'єро	01174001	2003	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7				7
Цибуля городня	-	56											
Амфора	01041002	2004	402 /	ЛП	7	ун,гост	рн	7	7				7
Буран	91041002	1998	430 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7				7
Банко F1	92041018	1999	1050 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7				7
Браво F1	05041003	2006	887 /	СЛП	7	гостра	сс	7	7				7
Вольська	97041009	2001	1071 /	СЛП	7	ун,г	пе	7	7				7
Вікторія	00041006	2003	888 /	СЛ	7	ун,г	рс	7	7				7
Веселка	91041001	1994	402 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7				7
Володимир	04041002	2007	122 /	СЛП	7	стл	рс	7	7				7
Вольф F1	05041010	2007	887 /	СЛП	7	стл	озимий	7-9	7				7
Вікторія Скерневіц	05041006	2007	1081 /	СЛП	7	стл	сс	7	7				7
Глобус	94041001	1997	402 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7				7
Грандина	87041001	1992	429 /	П	5	ун,нг	сс	5	5				5
Дайтона F1	92041014	1997	751 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7				7
Дакапо F1	05041005	2006	887 /	СЛП	7	гостра	сп	7	7				7
Золотиста	66041001	1972	402 /	ЛП	5	ун,г	сс	5	5				5
Кенди F1	97041005	2001	744 /	СЛ	7-9	ун,г	пе	7	7				9
Кампіло F1	05041027	2006	753 /	СЛП	7	солодка	сп	7	7				7
Копра F1	88041004	1997	751 /	СЛП	5	ун,нг	сс	5	5				5
Комета F1	99041003	2002	753 /	СП	7	ун	рс	7	7				7
Лілія	96041003	1999	1019 /	СЛП	5	ун,нг	сс	5	5				5

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Львівська	03041002	2007	402 /	СЛП	7	стл	рс	7	7				-7
Любчик	03041001	2006	402 /	СЛ	7	гостра	рс	7	7				7
Маріна	96041004	1999	1019 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7				7
Марс F1	97041004	2001	744 /	Л	7	ун,нг	сс	7	7				7
Маяк	97041011	2001	984 /	ЛП	7	ун,г	пе	7	7				7
Мундіал F1	05041029	2007	1050 /	СЛП	7	стл	ср	7	7				7
Мавка	00041003	2003	402 /	С	5	ун,г	рс	5	5				5
Манас F1	05041001	2007	751 /	СЛП	7	стл	сс	7	7				7
Нерато F1	05041004	2006	887 /	СЛП	7	гостра	пе	7	7				7
Оліна	94041004	2001	969 /	Л	7	ун,г	сс	7	7				7
Пінакл F1	00041002	2002	744 /	С	7	ун,нг	рс	7	7				7
Пірожка	99041004	2002	1012 /	СЛ	7	ун,нг	сс	7	7				7
Рейсбургер Балстора	94041007	1997	751 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7				7
Ройал Опорто	95041001	1999	744 /	СЛП	7	ун,г	рн	7	7				7
Роккаде F1	98041009	2002	1013 /	П	7	ун,г	сс	7	7				7
Ред Барон	02041003	2005	751 /	П	7	унів	сс	7	7				7
Солоши F1	05041030	2007	1050 /	СЛП	7	стл	ср	7	7				7
Стерлінг F1	00041001	2002	744 /	С	7-9	ун,со	рс	7	7				7
Стригунівська посівська	37041007	1940	429 /	СЛП	5	ун,г	сп	5	5				5
Сквирська	52041001	1955	339 /	СЛП	5	ун,г	сп	5	5				5
Стакато F1	01041001	2005	887 /	П	7-9	унів	рс	7	7				7
Супра	98041001	2003	1081 /	ЛП	7	ун,г	рс	7	7				7
Слава Ожарова	05041007	2007	1081 /	СЛП	7	стл	рс	7	7				7
Сьєрра Бланка F1	03041004	2005	744 /	С	7-9	унів	сс	7	7				7
Спінг F1	02041002	2006	751 /	ЛП	7	гостра	рс	7	7				7
Тамара F1	03041003	2006	751 /	СЛП	7	гостра	ср	7	7				7
Ткаченківська	85041004	1991	402 /	Л	5	ун,г	сс	5	5				5
Тетон F1	78041003	2005	744 /	С	7	свж	рс	7	7				7
Тареско F1	05041002	2006	887 /	СЛП	7	гостра	сс	7	7	7			7

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Гогольська	03041005	2006	1072 /	Л	7	гостра	рс	7	7			7	
Універсо F1	99041002	2002	753 /	СП	7-9	ун	рс	7	7			9	
Харківська 82	90041005	1994	402 /	СЛП	5	ун,г	сс	5	5			5	
Черняківська	98041003	2001	1081 /	ЛП	7	ун,г	сп	7	7			7	
Ялтинська місцева	38041001	1950	357 / 357, 357	С	7	сал,со	рс	7	7			7	
Ялтинський рубін	® 04041003	2007	402 /	СЛП	7	стл	сп	7	7			7	
Цибуля порей	-	5											
Голст	01175001	2002	888 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Йолант	82175001	1997	751 /	СЛП	5	сал	сс	5	5			5	
Казімір	95175001	1999	721 /	СЛП	5	сал	сс	5	5			5	
Цибуля скорода	-	2											
Ельвіра	® 04177001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Приліпський	03177001	2005	402 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Цибуля шалот	-	4											
Забава	00176001	2002	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Кушівка місцева	90176002	1950	402 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Ліра	02176001	2004	402 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Сюрприз	00176002	2002	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Часник	-	9											
Дюшес	01042002	2004	402 /	СЛП	9	свж	рс	7	7			7	влеж
Лідер	94042001	2000	369 /	ЛП	7	спц	зим	5	5			9	влеж
Мереф'янський білий	01042001	2006	402 /	СЛП	7	ун.	зим	7	7			7	влеж
Промінь	92042001	1999	343 /	СЛП	7	спц	зим	7	5			5	влеж
Сакський	61042001	1961	357 / 357, 357	СЛ	5	спц	зим	5	5			5	слеж
Спас	93042001	1999	369 /	СЛП	7	спц	зим	9	5			5	слеж
Тройка	® 05042001	2006	293 /	СЛП		ун.							

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
													посухи
Харківський фіолетовий	90042001	1987	402 /	С	5	спц	зим	7	5			5	сlej
<u>Чорнушка посівна (Нігела) 1</u>													
Легенда	02280001	2004	357 / 357	СЛП		прм	сс	9				9	
<u>Шпинат - 2</u>													
Бос	97179001	1999	357 / 357	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Лазіо F1	02179002	2004	1163 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
<u>Щавель - 1</u>													
Одеський 17	63180001	1969	381 /	СЛП	7	свж, стл	рс	7	7			7	
<u>Гарбуз мускусний - 1</u>													
Яніна	03228001	2005	410 /	СЛП	7	унів	рс	7	7			7	
<u>Квасоля багатоквіткова - 2</u>													
Дністрівка	05463002	2007	334 /	Л	7-8	зерн	сс		5-7	5	5-7	5-7	цпн
Сокільчанка	05463001	2007	334 /	Л	7-8	зерн	сс		5-7	5	5-7	5-7	цпн
<u>Сільськогосподарські: інші</u>													
<u>Аніс - 2</u>													
Артек	94370001	1999	366 / 366	П		х, лік	сс						
<u>Васильки справжні - 8</u>													
Аметіст	® 05340001	2007	635 /	СЛП	5	ун	пс		4,3	4,7		9	
Бадьорий	98340001	2000	357 / 357	СЛП		свж, сал	рс						
Етруск	® 06340001	2007	647 /	СЛП	7	свж, сал	лп	5	5	5	5	9	
Кримські фіолетові	99340001	2001	357 / 357	СЛП		сал	рс						
Ніжний аромат	® 04340001	2005	317 /	С		спц	рс		9	9	9	9	
Пурпурова зоря	® 04340002	2005	317 /	С		спц	пс		9	9	9	9	
Філософ	06340002	2007	898 /	СЛ	5	ун	рс					8	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-тації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Юнга	00340001	2003	402 /	ЛП		х	сс						
Змісголовник	-	1											
Медоніс	00336002	2003	402 /	ЛП		х	сс						
Катран Стевена	-	1											
Кримський	68184001	1973	357 / 357	СЛП		спц	рс						
Кмин	-	4											
Пултівський	94156001	2000	305 /	П		тхн, х	сс						
Перевал	00156001	2004	909 /	С		х, фарм	сс	9	9			9	
Рубін	04156001	2005	1115 /	СЛП		тхн, х	сс	8	7	7	9	9	
Тонус	72156001	1994	339 /	СЛП		тхн, х, спц	сс						
Коріандр	-	12											
Айдар	95185001	1999	366 / 366	СЛП		тхн, х	сс						
Амерікано	® 05185001	2007	635 /	СЛП	5	ун	пс		4,2	4,6	5	4,8	
Гарант	97185001	2003	366 / 366	С		х	сс						
Кіровоградський	69185001	1973	356 /	СЛП		тхн, х	сс						
Лідер	04185001	2005	1115 /	СЛП		тхн, х	сс		5	5	5	8	
Міус	05185002	2007	366 /	СЛ	5	тхн, х, лік	сс		5	5	5	8	
Медун	98185001	2003	366 / 366	С		х	сс						
Нектар	90185002	1999	366 / 366	ЛП		тхн, х	сс						
Оксаніт	90185003	1997	356 /	С		тхн, х	сс						
Пікантний	97185002	1999	357 / 357	СЛП		сал, спц	рс						
Ранній	71185001	1980	366 / 366	С		тхн, х	сс						
Янтар	72185001	1980	366 / 366	СП		тхн, х	сс						
Котяча м'ята	-	3											
Первенець	82112001	1983	366 / 366	С		тхн, х	сс						
Переможець 3	® 04112001	2007	365 /	С	5	тхн, х	рс	5	4	5	5	9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Ювілей Вавилова	88112001	1991	366 / 366	С		тхн	сс						
Кріп	-	15											
Атлант	02158001	2004	1163 /	СЛП	9	спц	рс	7	7			7	
Грибовський	71158001	1978	149 /	СЛП		спц	рс						
Ліснотгородський	83158001	1988	149 /	СЛП		спц	рс						
Пахучий	83158002	1997	402 /	СЛП		спц	рс						
Ройал Дилл	03158001	2004	744 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Скіф	02158002	2004	366 / 366	СЛ	9	спц	сс	9	7			7	
Татран	® 04158001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Туркус	® 05158002	2006	1081 /	СЛП		свж, спц							
ТМ-04/Мор	® 05158001	2007	888 /										
Харківський 85	82158001	1986	402 /	СЛП		спц	рс						
Шмарагд	98158001	2000	1081 /	СЛП		спц	рс						
Лаванда	-	5											
Біда	92187001	2000	366 / 366	С		парф	сс						
Рекорд	57187001	1962	365 / 365	С		тхн, х	сс						
Рання	73187002	1983	366 / 366	С		тхн, х	рс						
Сінсва	86187002	1997	366 / 366	С		тхн, х	пс						
Степова	57187002	1962	366 / 366	С		тхн, х	сс						
Лаконос американський	-	1											
Кримський Південнобережний	97298001	2000	365 / 365	Кр	5	хп			6	6	7	5	
Меліса лікарська	-	2											
Мілана	99356001	2002	909 /	Кр		фарм., х., прм							
Цитронелла	00356002	2002	402 /	ЛП		лік							

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
<u>Меліса лимонна</u> - 1													
Соборна	00356001	2003	402 /	ЛП		х							
<u>Молочай чиновий</u> - 1													
Запорізький	00101001	2001	329 / 329	С	7	олн			8	8	7-9	7	
<u>М'ята</u> - 12													
Заграва	90116001	1995	427 /	СЛП		тхн, х	сс						
Краснодарська 2	61116001	1967	366 / 366	ЛП		тхн, х	сс						
Лубенчанка	83116001	1989	385 /	Л		тхн, х	сс						
Лідія	91116001	1999	385 /	Л		лік	пс						
Мама	98116002	2001	385 /	Л		лік	сс						
Прилуцька 6	49116001	1956	366 / 366	ЛП		тхн, х	сп						
Прилуцька 14	82116001	1988	427 /	ЛП		тхн, х	сп						
Прилуцька карвонна	97116002	2001	427 /	П		х	сс						
Симферопольська 200	84116002	1990	427 /	СП		тхн, х	сс						
Удайчанка	97116001	2001	427 /	СП		х	сс						
Українська перцева	92116001	1998	366 / 366	П		лік, х	сс						
Чорнолиста	78116002	1985	385 /	Л		лік	сс						
<u>Полин лимонний</u> - 1													
Еллада	92196001	2001	365 / 365	С		лік, х	сс						
<u>Рожа рожева</u> - 2													
Олександра	97297002	1999	365 / 365	С	5	хп			6	7	7	5	
Україночка	97297001	2001	365 / 365	С		хп							
<u>Сафлор красильний</u> - 3													
Професор Машанов	95323001	2000	365 / 365	С	5	хп			6	7	7	5	
Сонячний	99323001	2001	329 / 329	С	5	олн			6	7	7	5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
				посухи					полягання	осипання	хвороб		
Стеновий	® 05323001	2006	1192 /	С	7	олн			8	8	9	8	
Троянда дамаська - 3													
Лура	97238001	2001	366 / 366	С		тхн, х	сс						
Лань	86238001	1990	366 / 366	С		тхн, х	рс						
Радуга	90238001	1984	366 / 366	С		тхн, х	рс						
Тютюн - 15													
Американ 63	94019009	2000	360 /	С	5	аром			7	7		5	
Американ 307	75019002	1981	360 /	С	5	аром			7	7		8	
Американ 26	01019002	2004	360 /	С	9	скел., аром.			8	8		7	
Ароматний 1	98019001	2004	360 /	С	8	аром.			8	8		7	
Американ 14	01019001	2004	360 /	С	9	аром			8	8		7	
Галицький оригінальний	® 05019001	2007	396 /	СЛ	9	аром			9	9		8	
Дюбек 50	72019001	1979	360 /	С	5	аром			7	8		8	
Дюбек новий	86019002	1990	360 /	С	7	аром			7	8		7	
Ранішеспілий	98019002	2004	360 /	С	8	скел, аром.			8	8		7	
Берлей 38	97019002	2001	396 /	ЛП	7-9	аром			8	8		7-9	
Вірджинія 15	97019003	2002	396 /	Л	7-9	аром			8	8		7	
Крупнолистий 4	94019005	1999	396 /	Л	7-9	склт			8	8		7-9	
С-9	94019007	2002	396 /	Л	7-9	склт			8	8		7-9	
Тернопільський 14	94019008	1999	396 /	Л	7-9	склт			8	8		7-9	
Тернопільський 7	90019008	1995	396 /	Л	7	склт			8	8		7-9	
Фенхель - 4													
Зсфір	91200001	1996	357 / 357	СЛП		свж, сал	рс						
Кримський	78200001	1984	366 / 366	Л		тхн, х	сс						
Мерцишор	86200001	1999	366 / 366	П		тхн, х	сс						
Оксамит Криму	99200001	2003	366 / 366	С		х	сс						

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- трації			Заявник / Підтримувач	Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
			посу- хи	поля- гання						осипання	хвѳроб	

Хміль

- 25

Альта	90021004	1997	318 /	П	7	пв,пер	рс	>5	7			7-9	
Житомирський 75	03021002	2006	320 /	П	8	пв.	сс	6	7			8	т.аром.
Заграва	92021001	1999	318 /	П	7-9	пв,пер	сс	7	7			7	
Клон 18	65021003	1969	318 /	ЛП	5	пв	сс	>5	7			5	
Національний	® 03021003	2004	191 / 192, 191	П	7	аром.	сс	8	7			7	
Полісянка	98021005	2004	320 /	П	7-9	аром.	сс	7	7			7	
Пивовар	03021001	2006	320 /	ЛП	7-9	пив, хмел.	сс	6	7			8	т. Аром
Регент	90021007	1996	318 /	ЛП	5	пв	сс	>5	7			5	
Славянка	88021001	1995	318 /	ЛП	5	пв,пер	сс	7	7			7	
Хмелеслав	98021001	2004	320 /	П	7	аром.	сс	7	7			7,5	
Видибор	05021001	2006	320 /	П	8	пв.фарм.	сс	7	7			8	т.аром.
Зміна	90021003	2001	318 /	П	7-9	пв,пер	сс	7	7			7-9	
Злато Полісся	99021003	2002	1100 /	П	7-9	пв	сс	7	7			7-9	
Кумир	90021005	1995	318 /	ЛП	5	пв,пер	сс	5	7			5	
Надія	98021012	2004	320 /	П	7	гірк.	сс	6	6			7,5	
Назарій	98021010	2004	320 /	П	7-9	пром.	сс	7	7			7,5	
Оболонський	99021001	2003	1100 /	П	7-9	пв	сс	7	7			7	
Оскар	05021002	2006	320 /	П	8	пв. фарм.	сс	7	7			8	т.аром.
Промінь	92021002	2001	318 /	П	7-9	пв,пер	сс	7	8			7-9	
Тріумф	® 05021005	2006	1100 /	П	8	пв.фарм.	сс	7	7				т.аром.
Гайдамацький	94021003	1999	318 /	П	7-9	пв,пер	пс	7-9	7			7-9	
Граніт	85021001	1993	318 /	П	5	пв,пер	пс	>5	7			7	
Житич	85021006	1992	318 /	П	5	пв,пер	пс	>5	7			7	
Потіївський	90021008	1997	318 /	П	7	пв,пер	пс	7	7			7-9	
Руслан	99021002	2003	1100 /	П	7-9	пв	сс	7-9	8			7-9	

Хризантема ефіроолійна - 3

Тала 86-І	91250006	1999	906 /	С		парф	сс						
-----------	----------	------	-------	---	--	------	----	--	--	--	--	--	--

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
								посухи	поля- гання	осипання	хвороб		
Тала 86-4	91250009	1999	906 /	С		парф	сс						
Тала 86-3	91250008	1999	906 /	С		парф	сс						
<u>Хризантема увінчана</u>	-	1											
Еліксир	00382001	2002	357 / 357	СЛП		свж							
<u>Цмин італійський</u>	-	2											
ВІМ	99296001	2007	365 /	С	5	лік, тхн	сс	4	5			5	
Кристал	99296002	2007	365 /	С	5	лік	сс	4	5			9	
<u>Чабер гірський</u>	-	1											
Кримський Смарагд	99371001	2007	365 /	С	5	тхн, х	рс	5	5			5	
<u>Чебрець камфорний</u>	-	1											
Світлячок	00473001	2007	365 /	С	5	фарм	пс	5	5			5	
<u>Чорнобривці прямостоячі, повняки</u>		2											
Лимонний І	97363002	1999	365 / 365	С	5	хп		7	7-9	7-9		5	
Оранжевий І	97363001	1999	365 / 365	С	5	хп		6	7-9	7-9		7	
<u>Шавлія мускатна</u>	-	8											
Ай-Годор	98204001	2003	366 / 366	С		х	ср						
Дуаліст	99204001	2002	909 /	Кр		фарм	сс						
Кримська однорічна	92204001	2000	366 / 366	С		парф	сс						
Кримська пізня	81204001	1991	366 / 366	С		тхн, х	пс						
Мрія	96204001	2001	366 / 366	С		тхн	ср						
Однорічна	88204001	1995	366 /	С		тхн, х	сс						
С 785	61204001	1967	366 / 366	С		тхн, х	сс						
С 1112	90204001	1976	366 / 366	С		тхн, х	сс						

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
				посухи					полягання	осипання	хвороб	

Монарда трубчатая - 1

Прем'єра ® 05445001 2007 1067 / С 5 арф, тхн, лі рс 5 4 5

Плодові та ягідні

Яблуня - 63

Аскольда	88086001	1999	344 / 344	ЛП	свж	зим	9	7		7	9	влсж
Алі паруси	82086007	1994	359 / 359, 359	С	свж	літ	9	7			7	
Алкмене	84086009	1996	1010 / 344	ЛП	ун	осін	9	7		7	7	
Амулет	® 94086020	2006	344 /	СЛ	ун	рзим	9	9			9	9
Антонівка звичайна	90086015	1928	1010 / 344	ЛП	ун	осін	9	9		7	7	
Айдаред	73086026	1986	1010 / 344	СЛ	свж	зим	9	9		9	9	влсж
Аврора кримська	73086019	1977	359 / 359	С	свж	зим	9	9		9	9	влсж
Аполлон	® 05086001	2007	324 /	ЛП	свж, тхн	літ	9	7			8	9
Балаклавське	85086004	2001	359 / 359	С	свж	зим	9	7		7	7	влсж
Благодать	® 02086003	2006	424 /	СЛ	ун	зим	9	9			9	7
Гала	78086013	1993	1010 / 344	С	свж	осін	7	7		7	7	
Голден Делішес	66086002	1969	1010 / 344	СЛ	свж	зим	9	9		9	9	влсж
Гарант	® 01086004	2006	344 /	СЛП	ун	пзим	9	9			9	
Джонатан	47086010	1954	1010 / 344	Л	свж	зим	9	9		7	7	влсж
Д-471	88086002	2000	314 /	С	підщ.		9	9			9	
Д-1071	94086002	2000	314 /	С	підщ.		9	9			9	
Даринка	® 02086004	2006	424 /	СЛ	ун	зим	9	9			9	7
ЕМ-ІХ	75086010	1976	1010 / 344	С	підщ.		9	9			9	
Едера	97086007	2001	344 / 344	ЛП	свж	зим	9	9		7	9	влсж
Зимове лимонне	55086001	1969	403 /	ЛП	свж	зим	9	7		7	7	слсж
Зоря Поділля	54086001	1980	344 / 344	СЛП	свж	зим	9	9		7	7	слсж
Кримське зимове	69086006	1984	359 / 359	С	свж	зим	9	7		7	7	влсж
Каразинське	97086002	1999	403 /	Л	свж	зим	7	7		7	7	слсж

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-трації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
								посухи	поля-гання	осипання	хвороб		
Катерина	94086013	2001	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Кимерія	92086003	1997	359 / 359	С		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Кримське	75086004	1999	359 / 359	Кр		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Краснокутське солодке	86086003	2003	403 /	Л		свж	осін	7	9		7	7	
Кальвіль сніговий	47086005	1957	1010 / 424	ЛПС		свж	зим	9	7		5	7	влеж
Кальвіль донецький	71086001	1987	314 /	С		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Любава	® 02086005	2006	424 /	Л		ун	зим	9	9			9	
ММ-106	75086014	1984	1010 / 344	СЛП		підш.		9	9			9	
Мантуанер	38086009	1989	1010 / 590	С		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Мелба	40086003	1962	1010 / 344	СЛП		свж	літ	9	9		7	7	
Мліївське літнє	61086002	1962	424 /	Л		свж	літ	9	7		7	7	
Орнамент	® 92086009	2005	344 / 344	СЛ	7	свж	зим	9	9			9	9
Перлина Кисва	94086021	2001	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Паніровка	38086003	1950	1010 / 344	СЛП		свж	літ	9	9		7	7	
Пепінка золотиста	55086002	1971	424 /	СЛП		свж	осін	9	9		7	7	
Предгорне	75086026	1999	359 / 359	Кр		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Прима	76086023	1991	1010 / 344	С		свж	осін	9	7		7	7	
Радогость	92086018	2000	344 / 344	ЛП		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Ренет Смирєнка	47086006	1957	424 /	СЛП		свж	зим	9	9		9	7	влеж
Ровесник	78086006	2000	424 /	СЛ		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Рубінове Дуки	74086003	1983	344 / 344	Л		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Рум'яний альпініст	87086002	1997	365 / 365	С		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Смирєнківець	80086004	1997	424 /	Л		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Скіфське золоті	® 92086010	2006	344 /	СЛ		ун	рзим	9	9			9	
Слава переможцям	47086008	1954	424 /	СЛП		ун	осін	9	9		7	7	
Сєнтябрьське красне	69086010	1989	359 / 359	С		свж	осін	9	7		7	7	
Салгирське	73086021	1981	359 / 359	С		свж	осін	7	7		7	7	
Старсод	® 05086002	2007	324 /	ЛП		свж, тхн	осін	9	8			8	8
Станфір	82086011	2001	424 /	ЛП		свж	зим	7	7		7	7	слеж

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Спартан	70086013	1986	1010 / 344	СЛП	свж	зим	9	9		7	7	влєж	
Теремок	90086002	1999	344 / 344	ЛП	ун	осін	9	7		7	7		
Таврія	75086008	1984	359 / 359	С	свж	зим	7	7		7	7	слєж	
Уманське зимове	68086012	1988	344 / 344	СЛ	свж	зим	9	7		7	7	слєж	
Флоріна	94086011	2003	1010 / 424	СЛ	свж	зим	9	7		9	9	слєж	
Ювілейне Міс	® 04086003	2006	424 /	Л	ун	зим	9	9			9	9	
Брейберн	04086001	2007	420 /	С	свж	пс	7	7			8	8-9	
Власта	® 02086002	2006	424 /	Л	ун	осін	9	9			9	7	
Чемпіон	04086002	2007	420 /	С	свж	сс	7	7			8	8-9	
Груша	-	56											
Бере Боск	40076005	1950	1010 / 344	СЛ	свж	осін	9	9		9	7		
Бере київська	72076001	1991	344 / 344	Л	свж	зим	9	9		7	7	влєж	
Буковинка	87076007	1997	433 /	Л	ун	осін	7	7		7	7		
Васса	66076001	1979	359 / 359	С	свж	зим	9	7		7	7	слєж	
Вільямс	40076009	1950	1010 / 344	СЛ	ун	літ	9	7		7	7		
Вільямс Руж Дельбара	68076003	1988	1010 / 344	С	свж	літ	9	9		7	7		
Вітчизняна	57076002	1969	359 / 359	СЛ	свж	зим	9	7		7	7	слєж	
Вижниця	87076012	1999	344 / 344	ЛП	свж	осін	9	7		7	7		
Гранд Чемпіон	73076005	1988	1010 / 344	С	свж	осін	9	9		7	7		
Десертна	57076001	1969	359 / 359	С	свж	осін	7	7		7	7		
Етюд	87076013	1999	372 / 344	ЛП	свж	зим	9	7		7	7	влєж	
Зимова мліївська	68076001	1989	424 /	Л	свж	зим	9	7		7	7	влєж	
Золотава	® 05076004	2007	403 /	Л	свж	осін	7	7-8			8-9	7-8	
Звєняченська	92076024	1997	433 /	Л	ун	осін	7	7		7	7		
Золотоворітська	81076004	1995	372 / 344	Л	свж	зим	9	9		9	9	влєж	
Золотиста	58076001	1975	359 / 359	С	свж	зим	9	7		7	7	влєж	
Ізюминка Криму	83076003	1995	359 / 359	С	свж	зим	9	7		7	7	слєж	
Ізумрудна	82076009	1994	359 / 359	С	свж	зим	9	7		7	7	слєж	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
ІС 2-10	98076001	2000	344 / 344	ЛП		підщ.		9	9			9	
ІС 4-6	98076002	2000	344 / 344	ЛП		підщ.		9	9			9	
Корсунська	49076001	1972	424 /	Л		свж	літ	9	7		7	7	
Конференція	54076001	1975	1010 / 344	ЛП		свж	осін	9	9		7	9	
Круноплідна	87076011	1997	433 /	Л		ун	осін	9	7		7	7	
Кюре	40076013	1950	1010 / 344	СЛП		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Кучерянка	88076003	1997	433 /	Л		ун	зим	9	9		9	9	влеж
Лимонка	40076003	1950	1010 / 344	СЛ		ун	літ	9	9		7	7	
Малевчанка	88076002	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	
Мліївська рання	55076001	1962	424 /	Л		ун	літ	7	7		7	7	
Марія	92076011	2001	359 / 359	Кр		свж	зим	7	7		7	7	слсж
Ноябрьська Молдавії	95076002	2000	365 / 365	Кр		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Наджда стегу	87076003	2000	365 / 365	С		свж	осін	7	7		7	7	
Оснєв'янська	69076001	1987	403 /	СЛ		свж	осін	9	9		7	7	
Осінь Буковини	88076001	1997	433 /	Л		ун	осін	9	7		7	7	
Придністр'янка	87076005	1997	433 /	П		ун	осін	7	7		7	7	
Платонівська	® 06076001	2007	424 /	Л		свж	осін	8	9			8-9	9
Роксолана	81076005	1995	372 / 344	СЛ		свж	зим	9	9		9	9	слсж
Солодка з Млієва	52076001	1981	424 /	Л		свж	літ	77	7		7	7	
Стрійська	86076002	1999	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Смерічка	83076002	1995	372 / 344	Л		свж	осін	7	7		9	7	
Старкримсон	73076007	1985	1010 / 344	С		свж	літ	9	9		9	7	
Сторожинецька	92076005	1997	433 /	Л		ун	зим	9	9		9	9	слсж
Таврійська	74076003	1976	359 / 359	СЛ		свж	осін	9	7		9	7	
Трембіта	80076008	1995	372 / 344	Л		свж	осін	7	7		7	9	
Улюблена Клаппа	40076015	1950	1010 / 344	СЛП		свж	літ	9	7		7	7	
Улюблена осіння	82076006	1987	403 /	Л		свж	осін	7	7		7	7	
Черемшина	82076002	2000	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	9		7	7	влеж
Чернівчанка	87076006	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-тації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-викори-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
								посухи	поля-гання	осипання	хвороб		
Щедра	51076002	1978	424 /	Л		свж	осін	7	7		7	7	
Яблунівська	87076009	1997	433 /	Л		ун	зим						влєж
Яніс	® 06076002	2007	433 /	Л		ун	посін	8-9	8-9			9	8-9
Вересневе Дево	® 05076001	2006	344 /	ЛП		ун	осін	9	9			9	9
Оксамит	® 01076002	2006	424 /	Л		ун	осін	9	9			9	7
Якимівська	86076003	2000	359 / 359	С		свж	осін	9	7		9	7	
Бере Десятова	® 04076001	2006	344 /	СЛ		свж	рс	9	9			9	9
Уманська ювілейна	® 04076002	2006	344 /	СЛ		свж	рс	9	9			9	9
Райдуга	® 01076001	2006	424 /	Л		ун	пс	9	9			9	7
Айва	-	6											
Кримська ароматна	72207001	1981	365 / 365	СЛ		ун	сс	9	7		7	7	
Кримська рання	68207004	1982	365 / 365	С		ун	рс	7	7		7	5	
Мир	72207003	1981	365 / 365	СЛ		ун	сп	7	7		5	7	
Отлічниця	68207005	1976	365 / 365	С		ун	сс	7	7		5	5	
Сказочна	98207002	2001	365 / 365	С		ун	сс	9	7		5	5	
С'єдобна	98207001	2001	365 / 365	С		ун	сс	9	7		7	5	
Хеномелес	-	4											
Каліф	98362004	2001	314 /	СЛ		тхн	рс	9	7		7	5	
Ніколай	98362001	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7		7	7	
Ніка	98362003	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7		7	7	
Ніна	98362002	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7		7	7	
Абрикос	-	10											
Авіатор	83070001	1995	365 / 365	С		ун	пс	7	7		5	5	
Ананасний щорупінський	40070001	1962	365 / 365	С		ун	сс	9	7		7	7	
Буревісник	78070001	1991	365 / 365	С		стл	рс	7	7		5	5	
Красношочий	48070001	1958	1010 / 424	СЛ		ун	сс	9	9		7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-тації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Щедра	51076002	1978	424 /	Л		свж	осін	7	7		7	7	
Яблунівська	87076009	1997	433 /	Л		ун	зим						всез
Яніс	® 06076002	2007	433 /	Л		ун	посін	8-9	8-9			9	8-9
Вересневе Дево	® 05076001	2006	344 /	ЛП		ун	осін	9	9			9	9
Оксамит	® 01076002	2006	424 /	Л		ун	осін	9	9			9	7
Якимівська	86076003	2000	359 / 359	С		свж	осін	9	7		9	7	
Бере Десятова	® 04076001	2006	344 /	СЛ		свж	рс	9	9			9	9
Уманська ювілейна	® 04076002	2006	344 /	СЛ		свж	рс	9	9			9	9
Райдуга	® 01076001	2006	424 /	Л		ун	пс	9	9			9	7
Айва	-	6											
Кримська ароматна	72207001	1981	365 / 365	СЛ		ун	сс	9	7		7	7	
Кримська рання	68207004	1982	365 / 365	С		ун	рс	7	7		7	5	
Мир	72207003	1981	365 / 365	СЛ		ун	сп	7	7		5	7	
Отлічниця	68207005	1976	365 / 365	С		ун	сс	7	7		5	5	
Сказочна	98207002	2001	365 / 365	С		ун	сс	9	7		5	5	
С'єдобна	98207001	2001	365 / 365	С		ун	сс	9	7		7	5	
Хеномелес	-	4											
Каліф	98362004	2001	314 /	СЛ		тхн	рс	9	7		7	5	
Ніколай	98362001	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7		7	7	
Ніка	98362003	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7		7	7	
Ніна	98362002	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7		7	7	
Абрикос	-	10											
Авіатор	83070001	1995	365 / 365	С		ун	пс	7	7		5	5	
Ананасний цюрупінський	40070001	1962	365 / 365	С		ун	сс	9	7		7	7	
Буревісник	78070001	1991	365 / 365	С		стл	рс	7	7		5	5	
Красношохий	48070001	1958	1010 / 424	СЛ		ун	сс	9	9		7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
								посухи	полягання	осипання	хвороб		
Кримський амур	83070002	1994	365 / 365	С		ун	сп	7	7		5	7	
Колосний	77070002	1993	344 / 344	СЛ		ун	сс	7	7		7	5	
Консервний пізній	47070001	1969	365 / 365	С		ун	пс	9	7		7	7	
Олімп	69070001	1983	365 / 365	СЛ		ун	сс	7	7		7	7	
Парнас	69070002	1982	365 / 365	С		ун	сс	9	9		7	7	
Поліський крупноплідний	74070001	1985	344 / 344	С		ун	сс	7	7		5	5	
Алича	-	8											
Генерал	® 06072002	2007	314 /	ЛС		ун	сп	9	9			9	7-8
Десертна	48072001	1969	365 / 365	С		ун	сс	9	9		5	7	
Дончанка рання	92072004	1997	314 /	Л		свж	рс	9	9		7	7	
Найдюшин	86072005	1998	314 /	Л		ун	пс	9	7		7	5	
Оленька	86072001	1995	365 / 365	СЛ		ун	сс	9	9		7	7	
Обільна	57072001	1969	365 / 365	С		ун	рс	9	9		7	7	
Пламенна	86072004	1998	314 /	Л		ун	пс	9	7		5	5	
Тетяна	® 06072001	2007	344 /	ЛС		ун	сп	8	8			9	7-8
Вишня	-	3											
Альфа	79074001	2000	424 /	Л		ун	сп	9	9		5	5	
Гріот Подбельський	38074008	1948	1010 / 344	СЛП		ун	сс	9	9		7	7	
Порд Стар	84074005	1995	1010 / 344	П		ун	пс	9	9		9	9	
Черешня	-	33											
Амазонка	90085002	2001	314 /	Л		ун	пс	7	7		5	5	
Аеліта	77085004	1989	314 /	СЛ		ун	сп	9	7		5	5	
Валерія	88085004	2001	314 /	Л		ун	сс	9	7		5	7	
Виставочна	47085001	1972	365 / 365	СЛ		ун	пс	9	9		7	7	
Генеральська	48085002	1989	365 / 365	С		ун	пс	9	9		7	7	
Донецький уголок	77085007	1990	314 /	СЛ		ун	пс	7	7		7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Дончанка	71085001	1985	314 /	СЛ	ун	сп	7	7		5	7		
Дрогана жовта	40085002	1950	1010 / 344	СЛП	ун	пе	9	9		7	7		
Донецька красавиця	82085006	1987	314 /	С	ун	сс	9	7		7	5		
Заря Востока	72085002	1996	365 / 365	Л	ун	сс	9	7		5	5		
Зоряна (Возвращеніє)	99085006	2002	424 /	Л	ун	пе	9	7		7	7		
Китайська чорна	50085003	1962	344 / 344	ЛП	ун	сс	7	5		5	5		
Любава	® 06085002	2007	314 /	СЛП	ун	сп	7	7			8	8	
Легенда Мліва	® 06085001	2007	424 /	Л	ун	сс	7	7			8	9	
Нектарна	49085003	1954	424 /	СЛ	ун	пе	9	7		7	7		
Рання Дуки	49085002	1972	344 / 344	Л	свж	рс	7	7		5	5		
Рожева млівська	49085001	1962	424 /	ЛП	ун	пе	7	7		5	7		
Ярославна	77085003	1989	314 /	СЛ	ун	сп	9	7		7	5		
Янтарна	47085009	1980	365 / 365	Л	ун	пе	7	7		5	5		
Визнання	02085002	2007	325 /	ЛС	свж	ран	9	9			7	8	
Ера	89085003	2007	325 /	ЛС	ун	ран	9	9			7-8	9	
Дебют	02085004	2007	325 /	СЛ	ун	сер	7	7			8	8-9	
Аншлаг	® 04085003	2007	325 /	ЛС	ун	сс	9	7			8	9	
Ласуня	® 04085005	2007	325 /	ЛС	ун	сс	9	7			8	9	
Ніжність	® 05085001	2006	344 /	ЛП	ун	сс	9	9			9		
Простір	02085006	2007	325 /	СЛ	ун	сс	9	7			7	8-9	
Шанс	® 04085004	2007	325 /	ЛС	ун	сс	9	7			8	9	
Елос	89085002	2007	325 /	СЛ	ун	сер	9	9			7	9	
Суперниця	02085003	2007	325 /	СЛ	ун	сп	9	7			8	9	
Віха	02085005	2007	325 /	ЛС	ун	пізн	9	7			8	8	
Дивна	® 04085001	2007	325 /	ЛС	ун	пізн	9	7			8	8-9	
Любимця Туровцева	® 04085002	2007	325 /	ЛС	ун	пізн	9	7			8	8	
Темпоріон	89085001	2007	325 /	СЛ	ун	пізн	9	9			7	9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- трації			Заявник / Підтримувавч	Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
			посухи	поля- гання						осипання	хвороб	

Слива

- 14

Анна Шпет	39080001	1949	1010 / 344	СЛП		ун	пс	9	9		7	5	
Валор	89080001	1997	1010 / 344	Л		ун	сп	9	9		5	5	
Волошка	76080001	1980	424 /	СЛП		ун	пс	9	9		5	5	
Ненька	® 06080001	2007	424 /	Л		ун	ран	8	8				
Ода	79080003	1986	424 /	Л		свж	рс	9	9		5	5	9
Ренклюд Карбішева	75080001	1984	314 /	Л		ун	рс	9	9		7	7	
Ренклюд Альтана	39080009	1954	1010 / 344	СЛП		ун	сп	9	9		7	7	
Ренклюд ранній	90080002	1988	314 /	С		свж	рс	9	7		5	5	
Сенгябрьська	48080002	2003	424 /	Л		ун	сп	9	9		7	7	
Степелі	76080006	1988	1010 / 344	СЛ		ун	пс	9	9		7	7	
Угорка донецька	71080004	1985	314 /	С		ун	пс	9	7		7	5	
Угорка італійська	39080003	1949	1010 / 424	СЛП		ун	пс	9	9		7	7	
Угорка донецька рання	71080001	1984	314 /	С		ун	пс	9	7		5	5	
Чачакська найкраща	90080005	1999	363 / 363	С		ун	пс	9	7		5	5	

Персик

- 25

Волшебний	68079008	1995	365 / 365	С		ун	сс	9	7		7	7	
Восток 3	81079002	1995	365 / 365	С		ун	сс	7	7		7	7	
Золота Москва	72079004	1982	365 / 365	С		стл	сп	7	7		7	7	
Златогор	51079001	1976	365 / 365	С		ун	рс	7	7		7	7	
Знамя	74079002	1986	365 / 365	С		ун	пс	7	7		7	7	
Красна дівича	63079002	1977	365 / 365	С		стл	сп	7	7		7	7	
Кремлівський	47079002	1954	365 / 365	С		стл	рс	7	7		7	7	
Кримська осінь	83079003	1999	365 / 365	С		ун	пс	7	7		7	7	
Кримський фейсверк	84079009	1995	365 / 365	С		ун	рс	7	7		5	7	
Київський ранній	50079001	1954	344 / 344	СЛ		стл	рс	5	7		7	5	
Лебедєв	48079001	1969	365 / 365	С		ун	сс	7	7		7	7	
Молодіжний	63079004	1982	365 / 365	СЛ		стл	сс	5	5		5	5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
								посухи	полягання	осипання	хвороб		
Муза	68079003	1982	365 / 365	С		стл	пс	7	7		7	7	
Пушистий ранній	47079004	1954	365 / 365	СЛ		стл	рс	5	5		5	5	
Парацельс	03079003	2006	324 /	ЛП		ун	рс	9	9			9	9
Редхавен	68079012	1985	1010 / 344	С		стл	сс	7	7		7	7	
Сочний	47079005	1954	365 / 365	СЛ		стл	рс	7	7		7	7	
Советський	48079002	1954	365 / 365	С		стл	ср	7	7		7	7	
Стартовий	94079005	2000	365 / 365	С		ун	рс	7	7		7	7	
Сказка	79079002	1993	365 / 365	С		стл	сс	7	7		7	7	
Франт	68079007	1974	365 / 365	С		стл	рс	7	7		7	7	
Чемпіон ранній	81079003	1983	365 / 365	С		стл	рс	7	7		7	7	
Медведівський жовтий	03079002	2006	324 /	ЛП		ун	рс	9	9			9	9
Фодор	03079001	2006	324 /	ЛП		ун	сс	9	9			9	9
Ерітрокарпа 1	® 03079004	2006	324 /	ЛП		ун	пс	9	9			9	9
Нектарін	-	1											
Рубіновий 8	84396001	2001	365 / 365	С		ун	пс	7	7		5	7	
Кизил	-	1											
Билда	98212001	2001	314 /	СЛП		ун	пс	7	7		5	7	
Агрус	-	18											
Артемівський	68071001	1998	314 /	С		ун	рс	9	7		5	5	
Бахмутський	68071002	1978	314 /	С		ун	сс	9	7		5	5	
Високий замок	85071001	1995	372 / 344	П		ун	сс	9	7		5	5	
Донецький крупноплідний	68071003	1976	314 /	С		ун	сс	9	7		5	5	
Донецький первенець	68071004	1979	314 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	
Карпати	84071001	1995	372 / 344	Л		ун	сс	9	7		5	5	
Консервний	66071001	1981	424 /	Л		ун	сс	9	7		5	5	
Красень	75071001	1986	424 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-трації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Каменяр	85071002	1994	372 / 344	ЛП		ун	сс	9	7		5	-5	
Легінь	® 06071001	2007	424 /	Л		ун	сс	7-8	7-8				7
Млійський жовтий	51071001	1969	424 /	ЛП		ун	рс	9	7		5	7	
Неслухівський	84071002	1990	372 / 344	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	
Карат	® 04071002	2006	344 /	ЛП		ун	рс	9	9			9	
Елегант	® 04071003	2006	424 /	Л		ун	сс	9	9			9	9
Златогор	® 04071001	2006	344 /	ЛП		ун	рс	9	9			9	
Оксамит	® 05071001	2006	344 /	СЛП		ун	сс	9	9			9	7
Славута	® 05071002	2006	344 /	ЛП		ун	сс	9	9			9	
Княжич	® 05071003	2006	344 /	ЛП		ун	сп	9	9			9	
Жимолость	-	6											
Богдана	98341001	2000	403 /	Л		ун	сс	7	7		7	5	
Допчанка	97341004	2001	317 / 317	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	
Степова	97341002	2001	317 / 317	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	
Скіфська	97341001	2001	317 / 317	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	
Українка	97341003	2001	317 / 317	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	
Фіалка	98341002	2000	403 /	Л		ун	сс	7	7		7	5	
Калина	-	2											
Великоплідна	97211002	2001	424 /	ЛП		ун	сс	9	9		7	7	
Коралова	97211001	2001	424 /	ЛП		ун	рс	9	9		7	7	
Малина	-	13											
Зіва	90077004	1995	1010 / 344	СЛ		ун	рм	9	7		7	7	
Космічна	® 05077002	2007	350 /	ЛП		ун	рем	7	7			8	8-9
Мар'янушка	81077001	1993	403 /	СЛ		ун	сс	9	7		7	7	
Новость Миколайчука	73077001	1987	424 /	ЛП		ун	сс	9	7		7	7	
Новокітківська	51077001	1969	344 / 344	СЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Одарка	80077002	1988	403 /	СЛП		ун	рс	9	7		7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Персея	® 06077002	2007	344 /	ЛП	ун	ран	8	9					
Рось	86077001	1999	424 /	СЛ	ун	рс	9	7			7	8	8-9
Саня	® 06077001	2007	344 /	ЛП	ун	ран	8	9				7	
Сяйво	® 05077003	2007	350 /	ЛП	ун	рем	7-8	7				7-8	8-9
Осінь	® 03077002	2006	350 /	ЛП	ун	рем	9	9				7-8	8-9
Феномен	® 99077002	2007	403 /	Л	ун	сс	8	8				9	9
Промінь	® 03077001	2006	350 /	ЛП	ун	сс	9	9				7-8	8-9
Обліпіха	-	1										9	9
Солодка жінка	98078003	2000	314 /	С	ун	сс	9	7			7	7	
Порічки (червоні і білі)	-	11											
Йонкер ван Тетс	81082001	1987	1010 / 424	СЛП	ун	рс	9	7			7	7	
Львівська солодка	94082002	2000	372 /	ЛП	ун	сс	9	7			5	7	
Любава	94082003	2000	372 /	ЛП	ун	сс	9	7			5	7	
Ласуня	® 06082001	2007	344 /	ЛП	свж	рс	9	8					
Святкова	94082004	2000	372 /	ЛП	ун	рс	9	7				8-9	9
Святомихайлівська	98082001	2001	344 / 344	СЛП	ун	сп	9	7			7	7	
Троїцька	94082008	2001	344 / 344	СЛП	ун	сп	9	7			7	7	
Чародійка	94082006	2000	372 /	ЛП	ун	пс	9	7			5	7	
Ярославна	97082002	2001	372 /	ЛП	ун	сп	9	7			5	7	
Дарниця	® 94082010	2006	344 /	ЛП	ун	сс	9	9				9	9
Самбурська	® 94082011	2006	344 /	ЛП	ун	рс	9	9				9	9
Смородина чорна	-	32											
Аметист	92083005	2002	344 / 344	П	ун	сс	9	7			7	7	
Верность	87083001	1995	163 /	ЛП	ун	пс	9	7			7	7	
Вернісаж	94083007	2003	344 / 344	СЛП	ун	сс	9	9			7	7	
Вербна	97083007	2004	372 /	ЛП	ун	рс	9	7			7	7	
Г'овтва	87083008	1999	350 /	ЛП	ун	сс	9	7			7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Дочка Ворскли	90083007	1999	350 /	СЛ		ун	рс	9	9		7	7	
Зоря Галицька	94083003	2000	372 /	ЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Козацька	92083003	2001	344 / 344	ЛП		ун	ср	9	7		7	7	
Краса Львова	94083004	2000	372 /	ЛП		ун	сп	9	9		7	7	
Консул	® 06083001	2007	424 /	Л		ун	ран	9	9			8-9	9
Либідь	94083005	2001	372 /	ЛП		ун	сп	9	5		5	7	
Надбужанська	97083006	2004	372 /	ЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Оріана	® 06083003	2007	344 /	ЛП		ун	рс	9	8			8-9	7
Пам'яті Леоніда Михайлівського	® 05083002	2007	350 /	ЛП		ун	ран	9	5-6			8-9	7-8
Пам'ять Правика	90083002	1994	424 /	Л		ун	сс	9	7		7	7	
Славута	75083002	1989	424 /	Л		ун	рс	9	7		7	7	
Софія	97083005	2001	372 /	ЛП		ун	сс	9	7		7	7	
Санюта	87083007	1995	344 / 344	СЛ		ун	сп	9	9		7	7	
Сюїта київська	87083006	1995	344 / 344	СЛ		ун	ср	9	7		7	7	
Софіївська	97083010	2001	344 / 344	СЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Тітанія	90083003	1997	1010 / 424	Л		ун	сс	9	7		7	7	
Українка	94083006	2000	372 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	
Університетська	® 05083001	2007	350 /	ЛП		ун	пс	9	7-8			8-9	8
Чернеча	88083003	2000	344 / 344	ЛП		ун	сс	9	9		7	7	
Черешнева	91083007	1999	344 / 344	ЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Ювілейна Копаня	97083001	2001	344 / 344	СЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Ластівка	01083002	2006	344 /	Л		ун	рс	9	9			9	9
Мелодія	® 04083002	2006	424 /	Л		ун	рс	9	9			9	9
Казкова	® 01083003	2006	344 /	Л		ун	сс	9	9			9	9
Муза	® 04083001	2006	424 /	Л		ун	сс	9	9			9	9
Радужна	® 01083001	2006	344 /	Л		ун	ср	9	9			9	9
Володимирська	® 97083002	2006	344 /	Л		ун	сп	9	9			9	9

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- трації			Заявник / Підтримувач	Продук- тивність	Напря- м ви- корис- тання	Група стиг- лості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
			посу- хи	поля- гання						осипання	хвороб	

Суніця

- 28

Симфонія	® 05084008	2007	670 /	ЛП		ун	сп	9	9			9	8
Багряна	90084005	1999	344 / 344	СЛП		ун	рс	7	7			7	
Берегиня	03084003	2005	350 /	СЛП	9	ун	рс	9	9			9	
Веселка	® 06084001	2007	344 /	СЛП		свж	ран	9	8			9	
Дарунок вчителю	85084001	1993	344 / 344	СЛП		свж	рс	7	7			7	
Десна	78084001	1987	344 / 344	СЛП		свж	рс	9	7			7	
Ельсанта	97084004	1999	1012 /	С		ун	рс	7	7			5	
Ерос	® 05084009	2007	672 /	СЛ		ун	сп	7	9			8	8-9
Зенга Зенгана	68084001	1975	1010 / 557, 424	СЛП		ун	сп	7	7			7	
Істочник	80084005	1989	344 / 344	СЛП		ун	сс	7	7			5	
Кримчанка 87	80084008	1987	359 / 359	С		ун	сс	7	7			5	
Кримська рання	77084002	1985	359 / 359	С		свж	рс	7	7			5	
Кримська ремонтантна	81084001	1985	359 / 359	С		свж	рс	7	7			5	
Корона	® 05084010	2007	601 /	ЛП		ун	ран	9	7			7	8
Львівська рання	71084001	1979	372 / 344	СЛП		ун	рс	7	7			5	
Мачужинка	82084001	1990	372 /	П		свж	рс	7	7			5	
Ольвія	97084002	2001	344 / 344	СЛП		ун	рс	7	7			7	
Присвята	86084001	1992	344 / 344	СЛП		ун	сп	7	7			7	
Покахонтас	72084003	1980	1010 / 424	П		ун	сп	9	7			7	
Ред Гонтлет	76084002	1982	1010 / 424	СЛП		ун	сп	7	7			7	
Русанівка	78084003	1986	344 / 344	СП		ун	рс	7	7			7	
Теніра	84084004	1992	1010 / 424	П		ун	сп	7	7			7	
Фестивальна ромашка	85084002	1992	344 / 344	СЛП		ун	сс	7	7			7	
Факел	03084002	2005	350 /	СЛП	7	ун	сп	9	9			7	
Розана київська	® 03084004	2006	344 /	СЛП		ун	рс	9	9			9	9
Хонейо	05084001	2006	557 /	Л		ун	рс	9	9			9	9
Презент	® 05084004	2006	344 /	СЛП		ун	сп	9	7			9	9

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-трації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
								посухи	поля-гання	осипання	хвороб		
Полка	® 05084003	2007	601 /	Л		ун	сп	9	7			9	8-9
Горіх грецький	-	10											
Буковинський 2	87075003	1995	433 /	Л		ун	сс	5	7			7	
Буковинський 1	79075004	1997	433 /	Л		ун	сс	5	7			5	
Буковинська бомба	87075007	1995	433 /	Л		ун	сс	5	7			7	
Клішківський	91075009	1995	433 /	Л		ун	рс	5	7			7	
Прикарпатський	91075010	1995	433 /	Л		ун	рс	5	5			7	
Придністровський	84075001	1997	433 /	Л		ун	сс	5	7			5	
Рудківський	® 97075002	2007	433 /	Л		ун	ран	7				7	9
Топорівський	91075014	1995	433 /	Л		ун	сп	7	5			7	
Чернівецький 1	95075001	1997	433 /	Л		ун	сс	5	7			5	
Ярівський	91075012	1995	433 /	Л		ун	сс	5	5			7	
Гранат	-	1											
Сочний 110	65209001	1994	365 / 365	С		ун	сс	5	7			7	
Інжир	-	1											
Сабруція рожева	81210001	1994	365 / 365	С		ун	сс	>5	7			7	
Ківі	-	2											
Монті	98342002	2000	365 / 365	С		ун	сп	>5	7		5	7	
Томурі	98342001	2000	365 / 365	С		зпл	сп	<5	7		5	7	
Маслина	-	1											
Кримська превосходна	81214002	1994	365 / 365	С		ун	рс	>5	7			7	
Мигдаль	-	5											
Десертний	49215001	1976	365 / 365	С		ун	сс	7	7		7	7	
Мілас	97215004	2000	365 / 365	С		ун	рс	7	7		7	7	
Нікітський 2240	65215002	1986	365 / 365	С		ун	сс	7	7		7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
								посухи	полягання	осипання	хвороб		
Нікітський 62	49215002	1954	365 / 365	С		ун	сс	7	7		7	7	
Прибрежний	72215002	1986	365 / 365	С		ун	пс	7	7		7	7	
Хурма східна - 4													
Гора Роджерс	® 05442004	2006	1067 /	С		ун	сс	9	9			9	9
Гора Роман Кош	® 05442003	2006	1067 /	С		ун	сс	9	9			9	9
Гора Говерла	® 05442002	2006	1067 /	С		ун	сс	7	9			9	9
Новінка	® 05442001	2006	1067 /	С		ун	сс	9	9			9	9
Актинідія пурпурна х актинідія гостра - 2													
Ласунка	® 05444001	2006	348 /	Л		ун	сс	9	9			9	9
Помаранчева	® 05444003	2006	348 /	Л		ун	сс	9	9			9	9
Яблуня (підщепа) - 2													
КД 4	® 05086006	2007	403 /	ЛП		підщ		8-9	7-9			9	9
КД 5	® 05086007	2007	403 /	ЛП		підщ		8-9	7			9	9
Виноград													
Виноград - 118													
Асма	80073010	1986	1010 / 488	5-6		стл	дп	7	7			5	
Аркадія	® 90073004	1995	379 /	7,8-10		стл	др	7	7			5	
Ассоль	® 90073003	2005	364 /	1 - 6	5	стл	рс	9	9			7	
Алсатіко	54073004	1958	1010 / 488	5,6		тхн	пс	9	7			7	
Аліготе	48073001	1956	1010 / 488, 379	1-6, 8-15		тхн	рс	7	7			7	
Аптей магарацький	® 80073001	1988	364 / 364	1-4, 7		тхст	пс	9	7			7	
Альбілю кримський	57073008	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	9	9			7	
Аврора Магарача	® 82073012	1995	364 /	8-10		тхн	сс	9	7			7	
Берландієрі х Рипарія Кобера 5 ББ	76073010	1978	1010 / 226	1-15		підщ,		9	9			9	
Буковинка	® 92073004	2006	1068 /	1,6-8,9,11,12,1	5	тхн	сс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Бордо	® 01073008	2006	364 /	С	7	тхн	дп	7	6				-7
Бастардо магарацький	69073001	1969	364 / 364	2-10,14		тхн	пс	9	9				9
Берландієрі х Ринарія СО4	76073011	1978	1010 / 241	1-15		підщ.		9	9				9
Берландієрі х Ринарія Телскі 5Ц	76073003	1978	1010 / 379	1-15		підщ.		9	9				9
Вердельо	52073003	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	7	7				7
Восток	® 68073001	1978	379 /	11-14		стл	сс	7	7				7
Гурзуфський розовий	® 97073008	2006	1068 /	6-8,9,11,12,15	5	тхст	сс	7	7				7
Голубок	® 70073001	1981	379 /	7-12,15		тхн, всш	рс	7	7				7
Гарс Левелю	49073005	1958	1010 / 379	4-7		тхн	дп	9	7				7
Данко	® 81073004	2003	364 / 364	1-6		тхн	сс	7	7				7
Дністровський рожевий	® 65073001	1972	379 /	8-10		тхст	дп	9	9				7
Джеват кара	01073002	2002	917 / 517	5		тхн	пс	9	7				7
Екім кара	59073010	1969	364 / 517	5,6		тхн	дп	9	7				7
Загадка	® 00073007	2006	379 /	,6,8,9,11,13,1	5	стл	сс	6	5				7
Загрей	® 00073008	2006	379 /	,6,8,9,11,13,1	7	тхн	пс	8	6				6
Золотистий устійчивий	® 70073002	1990	379 /	10		тхст, всш	пс	7	7				7
Італія	51073002	1969	1010 / 379	2-6,8-10,13,14		стл	дп	9	7				7
Інтервітє Магарача	® 94073012	2006	364 /	С	7	стл	пс	7	5				8
Іршаї Олівер	57073009	1958	1010 / 379	7-10		стл	др	9	7				7
Кефесія	79073006	1995	917 / 517	5,6		тхн	дп	7	7				7
Королева виноградарів	49073001	1959	1010 / 379	2,4-6,8-12,15		стл	рс	7	7				7
Кокур білий	57073001	1958	364 /	2,4-6		тхн	дп	7	7				7
Кардинал	65073005	1969	1010 / 364	1-6,8,14		стл	др	7	7				7
Капсельський білий	92073012	1995	917 / 517	5,6		тхн	пс	9	9				7
Крона	92073013	1995	917 / 517	5,6		тхн	пс	7	7				7
Кобзар	® 90073011	2006	379 /	,2,6-9,11,13,1	5	стл	рс	5	6				6
Карабурну	52073005	1962	1010 / 379	2-15		стл	дп	9	7				7

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м ви- корис- тання	Група стиг- лості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
								посу- хи	поля- ган- ня	осипан- ня	хвороб		
Каберне Совіньйон	52073004	1962	1010 / 379	1-12,13-15		тхн, всш	дп	9	9			7	
Князь Кіранов	02073002	2006	917 /	С	5	тхн	дп	9	5			8	
Ланка	® 79073002	1990	379 /	8-10,15		стл	сс	9	7			7	
Леся	® 74073008	1985	379 /	8-10,13-15		стл	рс	7	7			7	
Лівадійський чорний	® 97073007	2006	1068 /	1,6-8,9,11,12,1	7	тхн	рс	7	7			7	
Любительський	® 00073002	2006	1068 /	6,7,8,9,11,12,	7	стл	сс	7	7			7	
Марсельський чорний ранній	50073003	1969	1010 / 379	8,9		тхст	рс	7	7			7	
Мускат Отгонель	50073004	1952	1010 / 379	1-4,7-9,11-14		тхст	рс	7	7			7	
Морастель	57073010	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	дп	7	7			7	
Мускат тайровський	® 68073004	1976	379 /	7-14		стл	др	7	7			7	
Мускат янтарний	69073002	1986	614 / 488	1-6,13-15		стл	др	7	7			7	
Мускат білий	49073003	1959	1010 / 364	2,4-6,13,14		тхн	рс	7	7			7	
Мускат Голодриги	® 97073006	2006	1068 /	1,6-8,9,11,12,1	7	тхн	др	7	7			7	
Мускат жемчужний	® 79073003	1988	379 /	8-10,15		стл	др	7	7			7	
Мускат гамбургський	49073009	1958	1010 / 379	1-15		стл	пс	9	9			7	
Мерло	59073011	1983	1010 / 379	1,2,4,7-14		тхн	сс	7	7			7	
Мускат рожевий	52073006	1958	1010 / 488, 517	2,4,6		тхн	рс	7	7			7	
Мускат чорний	52073007	1958	1010 / 364	2,5,6		тхн	рс	7	7			7	
Мюллер Тургау	49073010	1958	1010 / 379	7		тхн	сс	7	7			7	
Мурведр	00073011	2001	364 /	2,5,6		тхн	дп	7	7			7	
Мускат одеський	® 82073003	1993	379 /	8-14		тхн	рс	7	7			7	
Мускат Лівадія	® 04073002	2006	1068 /	5,6,8,7,9-12,1	7	стл	др	7	7			7	
Оригінал	® 87073003	2002	379 /	8		стл	пс	9	9			9	
Олімпійський	77073023	1989	413 /	12		тхн	дп	7	7			7	
Одеський чорний	® 57073002	1972	379 /	1-6,8-14		тхн, всш	дп	7	7			7	
Одеський сувенір	® 74073001	1985	379 /	7-12		стл	пс	9	9			7	
Овідіопольський	® 72073001	1986	379 /	8-15		тхн, всш	сс	7	7			7	
Олег	® 00073001	2006	1068 /	1,6-8,9,11,12,1	5	тхн	рс	9	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Одеський ранній	® 61073004	1978	379 /	10		стл	др	7	7			-7	
Піно сірий	49073012	1959	1010 / 379	6,8-14		тхн	рс	7	7			7	
Первенець Магарача	® 76073014	1994	364 / 364	1-14		тхн	пс	7	9			7	
Піно чорний	57073011	1959	1010 / 379	2,4,8-14		тхн	рс	7	7			7	
Подарок Магарача	® 77073014	1987	364 / 364	1-3,12-14		тхст	рс	7	7			7	
Ринарія х Рунестрис 101-14	76073007	1978	1010 / 241	1-15		підш.		9	9			9	
Ринарія х Рунестрис 3309	76073008	1978	1010 / 379	1-15		підш.		9	9			9	
Ранній Магарача	52073002	1969	364 / 364	1-6,8-15		стл	др	7	7			7	
Ркацгелі	49073004	1958	1010 / 379	1-5,7-15		тхн	дп	9	9			9	
Рубіновий Магарача	59073007	1969	364 / 364	4-6,11,12,15		тхн, всш	пс	9	9			7	
Рубін Голодриги	® 92073005	2006	1068 /	1,6-8,9,11,12,1	5	тхн	пс	9	9			9	
Роднічок	90073018	2006	379 /	2,6-9,11,13,1	7	тхн	дп	8	6			7	
Рислінг рейнський	39073001	1949	1010 / 379	1-5,7-15		тхн, всш	пс	9	7			7	
Рубін гаїровський	® 79073005	1990	379 /	8-10,14		тхн	дп	9	9			9	
Рісус	® 92073016	2006	1068 /	1,6-8,9,11,12,1	7	тхн	сс	7	7			9	
Совін'йон зелений	49073017	1969	1010 / 379	1,2,4-6,8-14		тхн	сс	9	7			7	
Сорок лет Победи	90073021	1998	413 /	12		тхн	дп	7	7			7	
Смена	® 90073020	2006	379 /	2,6-9,11,13,1	5	стл	сс	6	6			7	
Серсіаль	49073015	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	9	9			7	
Сільванер	49073016	1958	1010 / 379	1-5,8-10,12		тхн	рс	7	7			7	
Сапераві	50073001	1958	1010 / 379	1-15		тхн	пс	9	9			7	
Сухолиманський білий	® 58073001	1969	379 /	2,8-14		тхн	сс	7	7			7	
Семільон	00073010	2001	364 /	2,5,6,9		тхн	пс	7	7			7	
Солдайя	01073003	2002	917 / 517	5,6		тхн	пс	7	7			7	
Сари пандас	79073007	1995	917 / 517	5,6		тхн	пс	9	9			7	
Сопячнодолинський	92073007	1995	364 / 517	5,6		тхн	пс	7	7			7	
Сорок лет Октября	® 57073012	1969	379 /	7,8,9		тхн	дп	9	9			7	
Тельті курук	50073002	1969	1010 / 379	9,10		тхн	пс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Тавквері Магарача	® 85073004	2006	364 /	2	7	тхн	дп	9	9				9	
Трамінер рожевий	49073018	1958	1010 / 379	1-5,7-11,13-15		тхн	рс	7	7				7	
Український 85	® 68073002	1985	379 /	10		стл	др	7	7				7	
Фетяска біла	52073008	1958	1010 / 379	1-4,7-15		тхн, всш	рс	7	7				7	
Фурмінг	49073019	1958	1010 / 379	6,7		тхн	дп	9	7				7	
Цитронний Магарача	® 94073006	2002	364 / 364	1-6		тхн	рс	7	7				7	
Цимлянський чорний	60073003	2002	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	7	7				7	
Шардоне	49073020	1958	1010 / 379	1-5,8-14		тхн	сс	7	7				7	
Шабаш	57073007	1958	1010 / 488	2-6		стл	дп	9	9				7	
Шасла біла	48073002	1958	1010 / 379	1-15		стл	рс	7	7				7	
Шоколадний	® 05073001	2006	1068 /	6,7,8,9,11,12,	7	стл	сс	7	7				7	
Кок пандас	01073001	2002	917 / 517	5,6		тхн	рс	7	7				7	
Біанка	94073015	2007	379 /	2,10,11,12,13,	5	тхн	сс	7					7	
Альмінський	® 97073003	2007	364 /	2	5	тхн	пс	8	8				7	
Рислінг Магарача	® 83073001	2007	364 /	4	7	тхн	пс	8	8				7	
Спартанець Магарача	® 82073001	2007	364 /	2	5	тхн	пс	5	7				7	
Анателікон	® 00073006	2007	364 /	6	5	тхн	дп	7	7				7	
Чорна опіана	® 00073005	2007	364 /	6	7	тхн	дп	7	7				7	
Огоньок таїровський	® 90073015	2007	379 /	2,6-9,11,13,1	5	стл	др		6				7	
Ялтинський безнасінний	® 97073010	2007	364 /	6	5	стл	сс	5	6				7	
Етюд	® 05073002	2007	379 /	1,6,8,9,11,13,14	5	стл	сс	7	7				8	
Кишинь таїровський	® 05073007	2007	379 /	2,6-9,11,13,14	5	стл	пс		5				6	
Таїр	® 84073003	2007	379 /	6,8,9,11,13,14	5	стл	рс		7				7,6	
Геркулес	® 97073001	2007	364 /	6	5	стл	дп	5	6				7	
Добриня	® 05073004	2007	379 /	8-12		підщ		8	9				6-7	

Декоративні та лікарські

Алтея лікарська - 1

Мальвіна	97081001	2001	385 /	ЛП		лік	сс	7	7	7		7	
----------	----------	------	-------	----	--	-----	----	---	---	---	--	---	--

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Белладонна - 1													
Красавка	79181001	1981	385 /	С		лік	сс			7	7	7	
Бүзюк - 6													
Вогні Донецька	97223005	2002	317 / 317	СЛП		озл., зріз		9	9				7
Донецькі зорі	97223002	2002	317 / 317	СЛП		озл., зріз		9	9				7
Донецький сувенір	97223003	2002	317 / 317	СЛП		озл., зріз		9	9				7
Професор М.І.Рева	97223004	2002	317 / 317	СЛП		озл., зріз		9	9				7
Професор О.Л.Липа	97223001	2002	317 / 317	СЛП		озл., зріз		9	9				7
Професор В.І.Чопик	04223001	2005	317 /	С		озл	рс	7	9	9	9	9	
Валеріана лікарська - 2													
Левада	99182001	2002	909 /	СЛП		лік	сс		7				7
Україна	92182001	1997	385 /	Л		лік	сс		7				7
Вовчуг польовий - 1													
Рожевий	92354001	1999	385 /	ЛП		лік	сс	9	9				7
Декоративна яблуня - 3													
Біла чарівниця	01399001	2005	317 /	СЛ		озл	рс	7	7		9	9	
Травнева красуня	01399002	2005	317 /	СЛ		озл	сп	9	9		9	7	
Чорна перлина	01399003	2005	317 /	СЛ		озл	рс	9	9	9	9	9	
Еремур - 2													
Кримські зорі	92351001	1999	365 / 365	С		озл, зріз					7	7	
Руслан	91351001	1999	365 / 365	С		озл, зріз					7	7	
Ехінацея пурпурова - 6													
Вітаверна	99322001	2002	909 /	СЛП		лік	сс	9	9	7			7
Зірка Миколи Вавилова	04303001	2007	477 /	СЛП	5	к, фарм, мс	сс	5	5				8
Принцеса	94303001	1999	385 /	Л		лік	сс	9	9	7			7

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Поліська красуня	® 05303002	2007	596 /	СЛП	5	фарм, мед	сс	5	5				5	сбіл,скліт
Чарівниця	® 05303001	2007	385 /	СЛП	7	лік	сс	5	5	5	5	4		
Юзівська	® 04303002	2007	317 /	С	7	корм	сс	7-9	7-9	7-9	-	7		
Женьшень	-	1												
Український 2	95171001	1998	986 /	Л		лік, х	сс	7	7				7	
Жовтушник лакфіолевидний		1												
Сонячний	99379001	2001	385 /	Л		лік	сс	7	7				7	
Звіробій	-	1												
Антос	97373001	2002	1073 /	ЛП		фарм			5	7	7	7		
Калістефус китайський	-	27												
Аметист	79285002	1997	344 / 344	ЛП		озл			5	7	7	7		
Варя	97285002	2001	348 /	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7		
Веснянка	79285004	1999	344 / 344	ЛП		зріз,озл			7	7	7	7		
Звезда Полесья	90285006	1995	344 / 344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7		
Лебедине озеро	76285001	2001	344 / 344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7		
Либідь	00285001	2004	344 / 344						5	7	7	7		
Надія	94285001	1998	425 /	ЛП		озл			7	7	7	7		
Нсжность	79285005	1999	344 / 344	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7		
Одарка	97285001	1999	344 / 344	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7		
Осіній вечір	90285007	1996	344 / 344	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7		
Оксана	90285005	1996	344 / 344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7		
Павліна	91285003	1996	344 / 344	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7		
Поліна	76285009	1996	344 / 344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7		
Рубінові зв'язки	79285003	1985	344 / 344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7		
Чарм	74285014	1997	344 / 344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7		
Юлія	79285001	1997	344 / 344	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7		

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м ви- корис- тання	Група стиг- лості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посу- хи	поля- гання	осипання	хвороб	
Яблунева	92285004	1994	344 / 344	ЛП	озл,зріз			5	7	7	7		
Канна індійська													- 13
Комсомо́лія	80234005	1985	365 / 365	СЛП	озл				5			7	
Красне ро́зенни	79234003	1995	365 / 365	С	озл				5			7	
Кримська Рів'єра	69234002	1970	365 / 365	СЛП	озл				5			7	
Кримські зорі	80234003	1984	365 / 365	С	озл				5			7	
Луї Кайо	73234002	1974	365 / 365	ЛП	озл				5			7	
Лівадія	69234004	1970	365 / 365	С	озл				5			7	
Отбіск заката	84234003	1990	365 / 365	С	озл				5			7	
Пламя Криму	65234003	1970	365 / 365	С	озл				5			7	
Парфенон	91234001	1997	365 / 365	С	озл				5			7	
Ред Кінг Гумберт	93234001	1975	365 / 365	СЛП	озл				5			7	
Сонячна красавиця	69234003	1970	365 / 365	С	озл				5			7	
Саянот Победи	80234004	1984	365 / 365	С	озл				5			7	
Ломніс													- 14
Анастасія Анісімова	83237001	2000	365 / 365	С	озл		7	7		7		7	
Альмініст	79237004	1998	365 / 365	СЛ	озл		7	7		7		7	
Альонушка	82237001	1998	365 / 365	СЛ	озл		7	5		7		7	
Бірюзінка	74237003	1985	365 /	ЛП	озл		7	7		7		7	
Золотий ювілей	76237002	1998	365 / 365	СЛ	озл		5	7		7		7	
Звездоград	92237001	1998	365 / 365	СЛ	озл		5	7		7		7	
Синє пламя	65237003	1998	365 / 365	СЛ	озл		5	7		7		7	
Сиза пугиця	88237002	1998	365 / 365	СЛ	озл		5	7		7		5	
Серенада Криму	86237006	1998	365 / 365	Л	озл		7	5		7		7	
Фаргезіодес	73237001	1987	365 /	С	озл		7	7		7		7	
Чехонте	91237002	2000	365 / 365	С	озл		5	7		7		7	
Чайка	81237001	1998	365 / 365	СЛ	озл		5	5		7		7	
Юність	72237003	1998	365 / 365	СЛ	озл		7	5		7		5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Ялтинський етюд	78237002	1985	365 / 365	ЛП	озл		7	5		7	5		
<u>Льон великоквітковий - 3</u> <u>(декоративний)</u>													
Аврора	01308001	2003	329 / 329	СЛП	зріз			7	5	5	5		
Марс	00308001	2001	329 / 329	С	озл, зріз			7	5	5	5		
Рум'янець	01308002	2003	329 / 329	СЛП	зріз			7	5	5	5		
<u>Наперстянка пурпурова - 1</u>													
Зірочка	90192001	1999	385 /	П	лік	сс	5	5	5	7	7		
<u>Наперстянка шерстиста - 2</u>													
Карікола	79193001	1981	385 /	Л	лік	сс	5	5	5	7	7		
Сульчанка	90193002	1996	385 /	ЛП	лік	сс	5	5	5	7	7		
<u>Оман високий - 1</u>													
Гулівер	98332001	2001	385 /	Л	лік	сс	9	9	7	7	7		
<u>Півники - 1</u>													
Скіф	90231008	2001	365 / 365	С	озл, зріз		9	9			7		
<u>Персик декоративний - 5</u>													
Жизель	97359002	1999	365 / 365	С	озл, зріз		9	7		7	5		
Лель	® 00359001	2007	365 /										
Маленький принц	® 04359001	2007	365 /										
Сольвейг	97359001	1999	365 / 365	С	озл, зріз		9	7		7	5		
Фрезі Грант	® 04359002	2007	365 /										
<u>Подорожник блошиний - 1</u>													
Березотіцький	97377001	2001	385 /	Л	лік	сс	9	9			7		

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямовикористання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Подорожник великий - 1													
Полтавський	84195001	1989	385 /	ЛП		лік	сп	9	9			7	
Ехінацея біла - 1													
Красуня прерій	03412001	2005	386 /	С		лік	сс		9	9	9	7	
Різоторопша плямиста - 1													
Бойківчанка	® 05194001	2007	332 /	СЛ	5	лік, х	сс		7	8	5	7	
Ромашка аптечна - 1													
Перлина Лісостепу	92197001	1999	385 /	Л		лік	сс						
Ротики садові - 1													
Фламме	74221007	1978	344 /	ЛП		озл		7	7	7	7	5	
Солодка гола - 1													
Соло 1	98335001	2001	909 /	С		лік	сс	7	5	5	7	5	
Соняшник декоративний-однорічний - 14													
Ела	® 04316002	2007	1059 /										
Жемчужний	03316001	2004	1059 /						7	7	9	7	
Забава	03316002	2004	1059 /						7	7	9	7	
Золоте руно	® 03316004	2007	328 /										
Кармен F1	00316004	2001	329 / 329	СЛП		озл, зріз			7	7	9	7	
Маленький Принц	® 04316001	2007	1059 /										
Маліш	02316001	2003	329 / 329	СЛП		зріз			7	7	9	7	
Наджда	00316003	2001	329 / 329	СЛП		озл, зріз			7	7	9	7	
Ніжність	02316002	2003	329 / 329	СЛП		зріз			7	7	9	7	
Сиреневий туман	® 03316003	2007	328 /										
Сонячний промінь	02316004	2004	329 / 329						7	7	9	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики									
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість	
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Чарівник	02316003	2004	329 / 329											
Юліана F1	00316005	2001	329 / 329	СЛП		озл, зріз			7	7	9	7		
Стевія	-	2							7	7	9	7		
Берегиня	92278001	1999	334 /	С		лік	сс	5	5	7	7	7		
Славутич	92278002	1999	334 /	П		лік	сс	5	5	7	7	7		
Троянда	-	44												
Аджимушкай	91246004	1999	365 / 365	С		озл		5	5	9	7	5		
Аю-даг	67246001	1976	365 / 365			акр,озл,зріз		7	5	9	7	5		
Білянка	81246004	1987	365 / 365	СЛП		акр,озл,зріз		7	7		5	5		
Весенняя Заря	91246001	1999	365 / 365	С		озл		5	7		7	5		
Діна	94246001	1999	365 / 365	С		озл		5	7		5	7		
Дівчачі гръози	83246001	1999	365 / 365	С		озл		7	7		5	5		
Золотий юбілсй	77246005	1981	365 / 365	С		акр,озл,зріз		5	7		7	7		
Золотая осень	61246003	1970	365 / 365	С		акр,озл,зріз		7	7		7	7		
Кримське сонечко	® 01246001	2006	365 /	С	9	оз	сс	9	7			9	7	
Кримські огонькі	94246002	1999	365 / 365	С		озл		5	7		5	7		7
Красний маяк	97246006	2000	365 / 365	С		озл, зріз		5	7		5	7		
Красний мак	65246001	1976	365 / 365	СЛП		акр,озл,зріз		5	7		5	7		
Кораловий сюрприз	77246003	1981	365 / 365	СЛП		акр,озл,зріз		5	7		7	7		
Комсомольський огоньок	70246005	1980	365 / 365	СЛП		акр,озл,зріз		7	7		7	7		
Мейдебенне	00246001	2002	1 /	ЛП Згр	9	зріз., прм		7	7		7	5		
Мейяспер	00246002	2002	1 /	ЛП Згр	9	зріз., прм		7	7		5	7		
Мейовські	99246001	2002	1103 /	ЛП	9	озл		5	7		5	7		
Октябрина	70246002	1980	365 / 365	С		акр,озл,зріз		5	7		7	7		
Пламя Востока	61246015	1970	365 / 365	С		акр,озл,зріз		5	7		7	7		
Прекрасна Таврида	66246007	1980	365 / 365	С		акр,озл,зріз		5	7		7	7		
Пьюстрая фантазія	88246005	2000	365 / 365	С		озл, зріз		5	7		7	7		
Ссда дама	98246002	2001	365 / 365	С		озл		5	7		7	5		

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
				посухи					полягання	осипання	хвороб		
Таналенін	® 05246002	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Тан00163	® 05246004	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Тан99303	® 05246006	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Танобмил	® 05246007	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Танотіка	® 05246008	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Тан01693	® 05246010	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Таналедев	® 05246005	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Танкальсіг	® 05246001	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Танавл	® 05246003	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Феодосіївська красуня	® 01246003	2006	365 /	С	9	оз	сс	7	7			9	9
Херсонес	90246006	1999	365 / 365	С		озл		5	5		7	5	
Чатир-Даг	® 01246002	2006	365 /	С	9	оз	сс	9	9			9	7

Тюльпан

- 16

Академік Барабанов	96247011	2001	1029 /	ЛП		зріз, озл		7	7	7	5	7	
Арлекин	96247006	2001	1029 /	ЛП		зріз, озл		7	7	7	7	7	
Галіна Уланова	84247001	1997	365 / 365	С		озл, зріз		7	7	7	5	7	
Жемчужний	96247013	2001	365 / 365	ЛП		зріз, озл		7	7	7	5	7	
Кримський	90247001	1985	365 / 365	ЛП		озл, зріз		7	7	7	7	7	
Каменний цвсток	96247009	2001	1029 /	ЛП		озл, зріз		7	7	7	5	7	
Микола Вавілов	96247008	2005	1029 /	С		озл	рс	9	9	9	9	7	
Майське утро	96247010	2001	1029 /	ЛП		зріз, озл		7	7	7	7	7	
Міраж	96247002	2001	365 / 365	ЛП		зріз, озл		7	7	7	7	7	
Роман-Кош	96247001	2000	365 / 365	С		озл, зріз		7	7	7	7	7	
Славутич	96247005	2001	1029 /	ЛП		зріз, озл		7	7	7	7	7	
Сказочне видіння	96247014	2001	365 / 365	ЛП		зріз, озл		7	7	7	7	7	
Скіф	96247012	2000	365 / 365	СЛП		озл, зріз		5	7	7	5	7	
Тарас Шевченко	96247004	2000	1029 /	СЛП		озл, зріз		7	7	7	5	7	
Таранцелла	96247007	2000	1029 /	ЛП		озл, зріз		7	7	7	5	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Тоня	85247002	1997	365 / 365	С	озл, зріз		5	7	7	7	7		
Тютюн крилатий	-	1											
Многоцвітковий	88245002	1991	92 /	ЛП	озл		7	7	7	7	7		
Хризантема	-	28											
Вероніка	78250007	1985	365 / 365	С	озл, зріз		7	7	7	9	7		
Ветрениця	® 05250007	2006	317 /	СЛ	оз		9	9		7	9	9	
Дончанка	® 04250001	2006	317 /	СЛ	ун		9	9			7	7	
Донецький епод	® 04250005	2006	317 /	СЛ	ун		9	9			7	7	
Єсеніана	97250001	2001	365 / 365	С	озл, зріз		5	7	7	9	7		
Жадана	® 04250010	2006	317 /	СЛ	ун		9	9			9	9	
Золоте поле	78250002	1985	365 / 365	С	озл, зріз		7	7	7	7	7		
Краски осені	73250002	1985	365 / 365	С	озл, зріз		7	7	7	7	7		
Каріатіда	® 04250004	2006	317 /	СЛ	ун		9	9			9	7	
Кокетка	® 04250007	2006	317 /	СЛ	ун		7	7			9	7	
Колдунья	® 04250011	2006	317 /	СЛ	оз		7	9		7	9	7	
Кіра	® 05250004	2006	365 /	СЛ	оз		9	7		9	9	9	
Медея	97250002	1999	365 / 365	С	озл		7	5	7	7	7		
Меотида	® 04250009	2006	317 /	СЛ	ун		9	9		7	7	7	
Ніколіна	® 05250005	2006	365 /	СЛ	оз		9	9			9	9	
Нікітська Ювілейна	® 05250001	2006	365 /	СЛ	оз		7	7			9	9	
Ноктори	® 04250006	2006	317 /	СЛ	ун		9	9			7	7	
Опал	90250008	1995	365 / 365	С	озл, зріз		7	5	7	7	7		
Оранжевий закат	80250008	1985	365 / 365	С	озл, зріз		7	5	7	7	7		
Поле Чудес	74250003	1997	365 / 365	С	озл, зріз		7	7	7	9	7		
Пастель	® 05250002	2006	365 /	СЛ	оз		9	9		7	9	7	
Роксолана	® 04250003	2006	317 /	СЛ	ун		9	7			7	7	
Сонцесвіт	® 04250002	2006	317 /	СЛ	ун		7	9			9	9	
Струя Лазурі	94250010	1999	365 / 365	ЛП	озл		7	7	7	9	7		

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресст-рації	Заявник / Підтримувач		Продук-тивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Сухоцвітник	® 05250006	2006	365 /	СЛ		оз		9	9		9	9	9
Харига	® 04250008	2006	317 /	СЛ		ун		9	9			7	7
Цвітник Семицвітник	® 05250003	2006	365 /	СЛ		оз		7	9			9	7
Цірконій	94250011	2001	365 / 365	С		озл, зріз		5	7	7	9	7	
Целозія гребінчаста	-	1											
Гребінець	00347001	2002	405 /	ЛП		озл., зріз					7	7	
Цмин пісковий	-	1											
Золотистий	92315001	1999	385 /	Л		лік	сс	7	7	7	7	7	
Чебрець повзучий	-	1											
Духм'яний	94147001	1999	385 /	С		лік	сс	7	9	7	7	7	
Шавлія лікарська	-	1											
Бужеле	® 05203001	2007	409 /	СЛ	5	лік, тхн	сс	5	5	5	4	5	
Щириця Мантегацца	-	1											
Вогняна кулька	00393001	2002	405 /	ЛП		озл			7	7	7	7	
Рицина декоративна	-	2											
Осішня рансодія	00098004	2002	329 / 329	СЛП		озл			5	7	7	7	
Серенада	00098003	2001	329 / 329	СЛП		озл			5	5	7	7	
Полин кримський	-	1											
Алупка	® 04432001	2007	365 /	С	5	тхн, х	пс	5	5			5	
Полин лікарський	-	1											
Евксин	® 04433001	2007	365 /	С	5	тхн, лік	рс	5	5			5	
Череда трироздільна	-	1											
Монастирська	03414001	2005	385 /	С		лік	пс		9	9	9	9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєс- трації			Заявник / Підтримувач	Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
			посу- хи	поля- гання						осипання	хвороб	

Лісові

Дуб

- 1

Боржавський	98262001	2001	1074 /	Л	ун		9	9				5
-------------	----------	------	--------	---	----	--	---	---	--	--	--	---

Кедр атласський

- 1

Мукачівський	97385001	2001	1074 /	Л	ун		9	9				7
--------------	----------	------	--------	---	----	--	---	---	--	--	--	---

Модрина

- 2

Білославська	94369001	1996	987 /	К	ун		9	9				7
Мукачівська	99266001	2001	1074 /	Л	ун		9	9				7

Сосна звичайна

- 1

Боярська-І	01277001	2003	350 /	ЛП	ун		9	9				7
------------	----------	------	-------	----	----	--	---	---	--	--	--	---

Сосна кедрова

- 1

Богородчанська	96360001	1998	987 /	К	ун		9	9				7
----------------	----------	------	-------	---	----	--	---	---	--	--	--	---

Ялиця біла

- 1

Коломийська	96275001	2003	987 /	П	ун		9	9				7
-------------	----------	------	-------	---	----	--	---	---	--	--	--	---

Ялиця бальзамічна

- 1

Надвірнянська	94269001	1996	987 /	К	ун		9	9				7
---------------	----------	------	-------	---	----	--	---	---	--	--	--	---

Ясен вузьколистий

- 1

Закарпатський	98274001	2001	1074 /	Л	ун		9	9				7
---------------	----------	------	--------	---	----	--	---	---	--	--	--	---

Інші

Глива звичайна

- 11

Атолл	03408007	2004	378 /
Аркадія	03408001	2004	378 /
Бригантіна	03408006	2004	378 /

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Дністр	03408003	2004	378 /										
Коралл	03408004	2004	378 /										
Кардинал	03408005	2004	378 /										
Марина	03408008	2004	378 /										
Отрала	03408010	2004	378 /										
Сільван НК-35	® 04408001	2005	286 / 286										
Утес	03408009	2004	378 /										
Чорномор	03408002	2004	378 /										
Печериця	-	2											
Сільван А-15	® 04375001	2005	286 / 286										
Сільван 512	® 04375002	2005	286 / 286										
Шії-таке	-	4											
Адмірал	03409001	2004	378 /										
Риф	03409002	2004	378 /										
Шовковиця	-	10											
Білосніжка	99206001	2001	317 / 317	СЛ	7-9	ун		>5	>5		6	7	
Весна	05206001	2006	401 /										
Діна	99206002	2001	317 / 317	СЛ	7-9	ун		>5	>6		6	7	
Машенька	99206003	2001	317 / 317	СЛ	7-9	ун		>5	>5		6	7	
Мерефянська	01206002	2004	401 /	СЛП	9	корм.		8	8			8	
Надія	02206001	2004	401 /										
Слобожанська 1	01206001	2004	401 /	СЛП	9	корм.		7	8			8	
Українська 7	96206001	2003	401 /	СЛП	7-9	корм		>5	>5			7	
Українська 6	94206002	2003	401 /	СЛП	7-9	корм		>5	>5			7	
Українська 5	94206001	2003	401 /	СЛП	7-9	корм		>5	>5			7	

**Характеристики сортів рослин,
занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення
в Україні у 2007 році**

Сільськогосподарські: злаки**Пшениця м'яка озима****03007026 Віга**

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(і): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Різновидність *Lutescens*. Тип розвитку — озимий. Кущ — напіврозлогий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності, довгий із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої ширини, зубець ледь зігнутий і короткий, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, широка, крупна. Язичок — короткий, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Рослини заввишки 80-86 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,7-8,9 бала. Сорт більш посухостійкий, стійкість до посухи 8,2-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 281-294 доби. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 62,6 ц/га, в зоні Лісостепу — 73,6 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 7,9 ц/га, в зоні Лісостепу — 2,4 ц/га. Маса 1000 зерен 40,4-42,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,4-13,5% білка, клейковини 27,6-28,4%, ІДК — 75-80 о.п., сила борошна — 277-303 о.а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1050-1080 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0-8,2 бала. Цінна пшениця. Сорт інтенсивного типу.

04007006 Господиня

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Різновидність *Eritrospermum*. Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече пряме та вузьке, зубець ледь зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — середній, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 79-86 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,1-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,0-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 276-287 діб. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 60,5 ц/га, в зоні Лісостепу — 66,4 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 5,8 ц/га, в зоні Лісостепу — 0,9 ц/га. Маса 1000 зерен 37,6-40,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно

містить 14,0-14,2% білка, клейковини 28,8-29,6%, ІДК — 70-75 о.п., сила борошна — 399-402 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1160-1200 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,2-8,3 бала. Сильна пшениця.

Сорт універсального типу використання, придатний для вирощування на різних агрофонах. При загущених посівах може вилягати.

® 04007010 Зимоярка

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и): Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Різновидність *Lutescens*. Тип розвитку — альтернативний (дворучка). Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорецький листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий із помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої ширини, зубець дуже зігнутий та дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, овально-ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 92-98 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — середня - нижчесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 7,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,4 бала. Стійкість до посухи 8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий. Веgetаційний період 289 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила — 68,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту — 2,9 ц/га. Маса 1000 зерен 40,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14% білка, клейковини 28,5%, ІДК — 75 о.п., сила борошна — 357 о.а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1050-1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0 бала. Сильна пшениця.

У весняному посіві сорт Зимоярка мав урожайність 50,3 ц/га, прибавка від 3,5 ц/га на Маньківській сортодослідній станції до 12,0 ц/га на Хмельницькому ОЦЕСР.

Рекомендується висівати сорт в кінці оптимальних строків посіву озимих культур, під час зимових відлиг та ранньою весною.

© 03007005 Зразкова

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Різновидність *Lutescens*. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорецький листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої довжини та нещільний із помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої ширини, зубець прямий та короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, коротка, середньої ширини та крупності. Язичок — короткий, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 88 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — середня-вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 8,3 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 280 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 59,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 5,1 ц/га. Маса 1000

зерен 38 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,4% білка, клейковини 31,9%, ІДК — 55 о.п., сила борошна — 1180 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,5 бала. Сильна пшениця.

® 03007006 Зміна

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Селена"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності та довжини із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече скошене та вузьке, зубець ледь зігнутий і середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке, овально-ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 88 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — середня-вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 8,3 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 280 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 59,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 5,1 ц/га. Маса 1000 зерен 38 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,4% білка, клейковини 31,9%, ІДК — 55 о.п., сила борошна — 516 о.а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1180 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,5 бала. Сильна пшениця.

® 03007011 Кольчуга

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець"

Підтримувач(и):

Різновидність Lutescens. Тип розвитку - озимий. Кущ - напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече округле та широке, зубець ледь зігнутий і дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні - слабке, зовнішньої - слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок - середній, кіль на нижній квітковій лусці - наявний, вушка - гострі.

Рослини заввишки 96 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 281 добу.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 57,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту — 2,3 ц/га. Маса 1000 зерен 42,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,4% білка, клейковини 27,6%, ІДК — 60 о.п., сила борошна 313 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1000 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0 бала. Цінна пшениця.

02007030 Красота

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Різновидність *Lutescens*. Тип розвитку — озимий. Кущ — напіврозлогий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, щільний, середньої довжини із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече пряме та середньої ширини, зубець ледь зігнутий і дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, овальної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Рослини заввишки 88 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,6 бала. Стійкість до посухи 7,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 290 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 65,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту — 0,9 ц/га. Маса 1000 зерен 39,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9% білка, клейковини 27,9%, ІДК — 75 о.п., сила борошна — 295 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,2 бала. Сильна пшениця.

® 03007022 Комплімент

Заявник: Дойче Заатфеределунг Ліппштадт-Бремен ГмбХ

Власник(и): Дойче Заатфеределунг Ліппштадт-Бремен ГмбХ

Підтримувач(и):

Різновидність *Lutescens*. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і помірне антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності та довжини із помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої ширини, зубець ледь зігнутий і короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, коротка, середньої ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Висота рослин 91 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 281 добу.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся — 57,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту — 1,9 ц/га. Маса 1000 зерен 40,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,0% білка, клейковини 26,5%, ІДК — 80 о.п., сила борошна — 267 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 980 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0 бала. Цінна пшениця.

02007009 Ласуня

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(и):

Різновидність *Eritrospermum*. Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має дуже слабкий або відсутній восковий наліт на піхві і дуже слабе або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з дуже слабким або відсутнім восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої ширини, зубець ледь зігнутий і середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — помірне,

зовнішньої — слабке, овально-ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — тупі.

Висота рослин 74-82 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,3-8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 7,6-8,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 283-287 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 50,8 ц/га, в зоні Лісостепу — 63,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту — 0,2 ц/га. Маса 1000 зерен 39,5-43,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту відмінні. Зерно містить 15,1-15,4% білка, клейковини 32,4-33,2%, ІДК — 60 о.п., сила борошна — 403-418 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100-1180 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,2-8,3 бала. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 03007023 Лист 25

Заявник: Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Власник(и): Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Підтримувач(і):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене та середньої ширини, зубець ледь зігнутий і середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке, овально-ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Висота рослин 77-79 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,0-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,3-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 283-288 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 64,0 ц/га, в зоні Лісостепу — 65,9 ц/га. Прибавка до національного стандарту в Степу — 5,4 ц/га, Лісостепу — 3,1 ц/га. Маса 1000 зерен 40,5-40,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,4-13,7% білка, клейковини 29,1-29,2%, ІДК — 75-80 о.п., сила борошна — 296-367 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1030-1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0-8,1 бала. Цінна пшениця.

01007013 Оксана

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене з наявною другою вершиною та широке, зубець ледь зігнутий і довгий, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 73 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — середня - вищесередня, у польових умовах за роки випробування

зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 7,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 283 доби. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 58,9 ц/га. Прибавка до національного стандарту — 0,3 ц/га. Маса 1000 зерен 36,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,9% білка, клейковини 29,4%, ІДК — 50 о.п., сила борошна — 356 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,2 бала. Цінна пшениця.

03007038 Почесна (Престиж)

Заявник: Північно-Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Донського зонального науково-дослідного інституту сільського господарства

Власник(и):

Підтримувач(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і дуже слабе або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з дуже сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності та довжини із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої ширини, зубець прямий і короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — короткий, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Висота рослин 99-103 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,4-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,5-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 281-292 доби. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 59,5 ц/га, Лісостепу — 64,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 4,8 ц/га. Маса 1000 зерен 40,7-42,2 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,3% білка, клейковини 30,6-31,3%, ІДК — 65-75 о.п., сила борошна — 329-464 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100 - 1170 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,2-8,5 бала. Сильна пшениця.

® 03007004 Попелюшка

Заявник: Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має дуже слабкий або відсутній восковий наліт на піхві і дуже слабе або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності та довжини із дуже слабким або відсутнім восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене та середньої ширини, зубець середньо зігнутий і дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 80-86 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,1-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,3 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 280-288 діб. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 64,5 ц/га, Лісостепу — 70,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу —

5,9 ц/га, в зоні Лісостепу — 7,2 ц/га. Маса 1000 зерен 39,5-41,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,8 - 14,0% білка, клейковини 29,3 - 28,7%, ІДК — 75 о.п., сила борошна — 301- 405 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100 - 1130 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0 бала. Сильна пшениця.

® 02007040 Росинка

Заявник: Інститут рису Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рису Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Різновидність *Lutescens*. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий із помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече пряме та середньої ширини, зубець прямий і дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Висота рослин 96 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 280 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 56,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 2,1 ц/га. Маса 1000 зерен 41,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,1% білка, клейковини 29,4%, ІДК — 70 о.п., сила борошна — 428 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1300 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,5 бала. Сильна пшениця.

03007036 Росинка тарасівська

Заявник: Північно-Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Донського зонального науково-дослідного інституту сільського господарства

Власник(и):

Підтримувач(і): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Різновидність *Eritrospermum*. Тип розвитку — озимий. Кущ — напіврозлогий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої довжини та щільності із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече округле та широке, зубець ледь зігнутий і короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, довга, середньої ширини, крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 89 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — середня-вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 280 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 60,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 5,6 ц/га. Маса 1000 зерен 44,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,5% білка, клейковини 31,0%, ІДК — 65 о.п., сила борошна — 405 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1300 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,3 бала. Сильна пшениця.

04007003 Скарбниця

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортівивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Різновидність *Eritrospermum*. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і дуже слабе або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої довжини та нещільний, із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене та вузьке, зубець ледь зігнутий і середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 78-87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,1-8,9 бала. Стійкість до посухи 7,7-8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 280 - 285 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 59,9 ц/га, в зоні Лісостепу — 65,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 5,2 ц/га. Маса 1000 зерен 36,3-41,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту відмінні. Зерно містить 14,0% білка, клейковини 28,3-28,4%, ІДК — 60-65 о.п., сила борошна — 560-566 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100-1200 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,4-8,5 бала. Сильна пшениця, добрий поліпшувач. Сорт інтенсивного типу.

® 04007012 Снігурка

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и): Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Різновидність *Eritrospermum*. Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, довгий, середньої щільності, із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої ширини, зубець прямий і дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 91-95 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 281-287 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 61,6 ц/га, в зоні Лісостепу — 66,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 6,9 ц/га, в зоні Лісостепу — 0,9 ц/га. Маса 1000 зерен 41,1- 43,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-14,5% білка, клейковини 28,4-30,1%, ІДК — 75 о.п., сила борошна — 285-330 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1050-1080 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,4-8,5 бала. Сильна пшениця.

02007028 Фішт

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Різновидність *Lutescens*. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої довжини, нещільний, із помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече округле та середньої ширини, зубець прямий і дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, коротка, вузька, дрібна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — тупі.

Висота рослин 86-87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,6-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,0-8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 278-288 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 62,4 ц/га, в зоні Лісостепу — 66,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 3,8 ц/га, в зоні Лісостепу — 3,5 ц/га. Маса 1000 зерен 38,0-38,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,7-14,1% білка, клейковини 28,1-31,1%, ІДК — 65-70 о.п., сила борошна — 379-402 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1080-1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0-8,2 бала. Сильна пшениця.

® 04007011 Хуртовина

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и): Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук
Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Підтримувач(і):

Різновидність *Eritrospermum*. Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, довгий, середньої щільності із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої ширини, зубець прямий і середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 90-96 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,6-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,4-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 281-287 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 59,7 ц/га, в зоні Лісостепу — 64,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 5,0 ц/га. Маса 1000 зерен 38,3-40,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9-14,1% білка, клейковини 29,7-30,2 %, ІДК — 65-70 о.п., сила борошна — 348-358 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0-8,2 бала. Сильна пшениця.

® 03007001 Шестопалівка

Заявник: Приватне сільськогосподарське селекційно-дослідне підприємство "БОР"

Власник(и): Приватне сільськогосподарське селекційно-дослідне підприємство "БОР"

Підтримувач(і): Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"

Різновидність *Eritrospermum*. Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої

щільності та довжини, із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече скошене та вузьке, зубець ледь зігнутий і середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, овальної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — короткий, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 86-87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,5-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,1-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 278-288 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 59,5 ц/га, в зоні Лісостепу — 65,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 4,8 ц/га. Маса 1000 зерен 42,6-44,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,2-14,3% білка, клейковини 29,4-30,5%, ІДК — 75 о.п., сила борошна — 337-382 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100-1180 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,2-8,4 бала. Сильна пшениця.

Пшениця м'яка яра

® 04007027 Аранка

Заявник: Приватне мале підприємство "Тирас"

Власник(и): Осева Ексімпо Прага с.р.о.

Приватне мале підприємство "Тирас"

Підтримувач(і):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — ярий. Кущ — прямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і помірне антоціанове забарвлення вушок. Соломина помірно виповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене з наявною другою вершиною та середньої ширини, зубець ледь зігнутий і довгий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, середня за крупністю. Язичок — короткий, киль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 67-77 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,5-8,7 бала. Стійкість до посухи 7,8-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 99-104 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 39,7 ц/га, в зоні Лісостепу — 46,3 ц/га, в зоні Полісся — 43,9 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Степу — 12,3 ц/га, в зоні Лісостепу — 8,2 ц/га, в зоні Полісся — 6,2 ц/га. Маса 1000 зерен 37,9-39,2 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,6-14,1% білка, клейковини 29,2-31,7%, ІДК — 65-75 о.п., сила борошна — 284-356 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1050-1080 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0 бала. Сильна пшениця.

® 03007034 Недра

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — ярий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, дуже нещільний, довгий із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене та вузьке, зубець прямий і дуже довгий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини

та ширини, крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 98 см. Стійкість сорту до вилягання 8,0 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,6 бала. Стійкість до посухи 8,5-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 102-104 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 40,5 ц/га, в зоні Полісся — 40,9 ц/га, стабільна по роках та місцях випробування. Гарантована прибавка в зоні Лісостепу — 2,9 ц/га, в зоні Полісся — 3,6 ц/га. Маса 1000 зерен 41,4-42,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,0-14,4% білка, клейковини 27,1-31,1%, ІДК — 70-75 о.п., сила борошна — 260-350 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1000-1050 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0-8,2 бала. Цінна пшениця.

® 04007042 Стависька

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Підтримувач(і):

Різновидність *Lutescens*. Тип розвитку — ярий. Куц — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і помірно антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої довжини, зубець ледь зігнутий і короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, овальної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — довгий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — тупі.

Висота рослин 102-105 см. Стійкість сорту до вилягання 7,6-8,0 бала. Стійкість до осипання 8,5-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,3-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 104-105 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 40,6 ц/га, в зоні Полісся — 39,6 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Лісостепу — 9,2 ц/га, в зоні Полісся — 7,1 ц/га. Маса 1000 зерен 39,6-40,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,0-13,1% білка, клейковини 27,0-27,2 %, ІДК — 70-75 о.п., сила борошна — 264-270 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 990-1000 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0 бала. Цінна пшениця.

® 04007047 Сюїта

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и): Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Різновидність *Eritrospermum*. Тип розвитку — ярий. Куц — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена, виповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене з наявною другою вершиною та вузьке, зубець середньо зігнутий і короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — відсутній, вушка — гострі.

Висота рослин 98-99 см. Стійкість сорту до вилягання 7,0 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 101-105 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 47,1 ц/га, в зоні Полісся — 42,6 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Лісостепу — 9,0

ц/га, в зоні Полісся — 5,0 ц/га. Маса 1000 зерен 37,2-38,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,3-14,0% білка, клейковини 28,7-29,0%, ІДК — 70-75 о.п., сила борошна — 342-424 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100-1150 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,3-8,5 бала. Сильна пшениця.

Пшениця тверда озима

® 03008001 Бурштин

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на нижньому боці листової пластинки і слабке антоціанове забарвлення. Соломина помірно виповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням верхнього вузла. Колос червоного кольору, пірамідальної форми, щільний із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, світло-коричневі. Нижня колоскова луска видовжена, плече піднесене та середньої ширини, зубець дуже зігнутий та короткий, опушення зовнішньої поверхні — відсутнє. Зернівка напіввидовжена, має короткий чубок. Язичок — середній, кільцевої форми. Вушка: охоплення соломини — повне.

Висота рослин 82-83 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — середня-нижчесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,3-8,4 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 276-290 діб. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 60,8 ц/га, в зоні Лісостепу — 56,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 1,2 ц/га, в зоні Лісостепу — 3,4 ц/га. Маса 1000 зерен 44,5-45,8 г. Зерно містить 14,2-14,3% білка, загальна оцінка макарон — 8,5 бала.

Пшениця тверда яра

® 04008001 Кучумовка

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Різновидність Valenciae. Тип розвитку — ярий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на нижньому боці листової пластинки і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина слабко виповнена з дуже сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким, або відсутнім опушенням верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, чорного кольору. Нижня колоскова луска яйцеподібна, плече скошене та вузьке, зубець прямий, опушення зовнішньої поверхні — наявне. Зернівка напіввидовжена, має короткий чубок. Язичок — середній, кільцевої форми, вушка: охоплення соломини — неповне.

Висота рослин 82-99 см. Стійкість сорту до вилягання 7,9-8,4 бала. Стійкість до осипання 8,5-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 98-101 доби. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 31,6 ц/га, в зоні Лісостепу — 40,9 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Степу — 6,5 ц/га, в зоні Лісостепу — 8,5 ц/га. Маса 1000 зерен 43,4-45,2 г. Вміст білка у зерні 13,7-14,3%. Загальна оцінка макарон — 7,8 бала.

Жито озиме**® 03003001 Сіверське**

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Рослина диплоїд, середньої висоти, форма куща напівпрямостоячий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із помірним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та короткою листковою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та ширини листкову пластинку. Соломина має дуже коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та сильне опушення під колосом. Колос середньої довжини, щільності, має горизонтальне положенням в просторі, та слабкий сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із світлим забарвленням алеїронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила: в зоні Степу 50,2 ц/га, Лісостепу 55,2 ц/га, Полісся 54,4 ц/га. Гарантована добавка 5,6 - 7,6 ц/га. Вміст білку 10,3 - 11,8%, число падіння 232 - 265 с, загальна оцінка 6,5 - 8,4 балів. Зимостійкість на рівні 8,5 - 8,9 балів. Сорт відносно стійкий до ураження хворобами, вилягання, осипання та посухи.

04003001 Хамарка

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Рослина диплоїд, низька за висотою, форма куща напівпрямостоячий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із сильним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та короткою листковою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та ширини листкову пластинку. Соломина має коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та сильне опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має похиле положенням в просторі, та слабкий сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із світлим забарвленням алеїронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 56,5 ц/га. Гарантована прибавка 13,9 ц/га. Вміст білку 11,4%, число падіння 235 с, загальна оцінка 6,5 балів. Зимостійкість на рівні 8,4 балів. Сорт відносно стійкий до посухи, осипання, вилягання; ураження хворобами незначне.

® 03003002 Хлібне

Заявник: Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослина диплоїд, низька за висотою, форма куща прямостоячий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із помірним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та середньої довжини листковою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та ширини листкову пластинку. Соломина має дуже коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та дуже сильне опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має похиле положенням в просторі, та помірний сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із світлим забарвленням алеїронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 49,3 ц/га, Лісостепу 56,4 ц/га, Полісся 51,5 ц/га. Гарантована прибавка 2,6 - 7,6 ц/га. Зимостійкість на рівні 8,4 - 8,9 балів. Вміст білку 10,2 - 11,9%, число падіння 212 - 235 с, загальна оцінка 6,5 балів. Сорт відносно стійкий до

вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04003002 Юр'ївець

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослина диплоїд, низька за висотою, форма куща напіврозлогий. Тип розвитку – озимий. Колеоптиле короткий за довжиною із сильним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має слабкий восковий наліт та короткою листовою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та ширини листову пластинку. Соломина має дуже коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та помірно опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має горизонтальне положенням в просторі, та помірний сизий наліт. Зернівка середньої довжини, із темним забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 58,8 ц/га, Полісся 50,9 ц/га. Гарантована добавка 2,0-16,2 ц/га. Вміст білку 11,7%, число падіння 179 - 238 с, загальна оцінка 6,6 балів. Зимостійкість на рівні 7,8 - 8,2 балів. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

Тритикале озиме

02011006 Мудрець

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(і): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: багато рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві - сильний, листкова пластинка довга та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке, довжина відносно колосу — середні. Соломина середньо-виповнена, зі слабко опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, нещільний, вузький та середньої довжини, пірамідальної форми, пониклий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець середній. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабо зморшувата.

Висота рослин 93 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня - підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 292 доби. Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 65,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу — 4,1 ц/га. Маса 1000 зерен 53,1 г. Вміст білка в зерні 13,1%.

® 03011002 Ратне

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Волинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком,

антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабе, сизий восковий наліт на піхві — дуже сильний, листкова пластинка дуже довга та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення слабе, довжина відносно колосу — короткі. Соломина порожниста з відсутнім або дуже слабким опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, нещільний, широкий та середньої довжини, циліндричної форми з горизонтальним положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, видовжена, зморшувата.

Висота рослин 112-125 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,4-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,0-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,7-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 285-303 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 61,0 ц/га, в зоні Лісостепу — 62,4 ц/га, в зоні Полісся — 53,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 5,0 ц/га, в зоні Лісостепу — 2,0 ц/га. Маса 1000 зерен 48,2-51,5 г. Вміст білка у зерні 11,9%.

Тритикале яре

® 03011009 Згурівський

Заявник: Вітвіцький Михайло Антонович

Власник(и): Вітвіцький Михайло Антонович
Приватне підприємство "Віткос"

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини низькі, форма куща — напіврозлогий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабе, сизий восковий наліт на піхві — слабкий, листкова пластинка дуже коротка та широка. Остюки: антоціанове забарвлення слабе, довжина відносно колосу — короткі. Соломина порожниста зі слабо опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої довжини, ширини та щільності, пірамідальної форми, пониклий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабо зморшувата.

Висота рослин 94 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 103 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся — 45,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Полісся — 4,3 ц/га. Маса 1000 зерен 45,4 г. Вміст білка 12,7%,

® 03011005 Кобзар

Заявник: Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"

Власник(и): Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабе, сизий восковий наліт на піхві — помірний, листкова пластинка коротка та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення помірне, довжина відносно колосу — короткі. Соломина середньо виповнена із сильно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої довжини та щільності, вузький, циліндричної форми, напівпрямий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, середня за крупністю, видовжена, зморшувата.

Висота рослин 91-93 см. Стійкість сорту до вилягання — 8,9-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 104-105 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 46,6 ц/га, в зоні Полісся — 45,7 ц/га. Маса 1000 зерен 39,4-40,6. Вміст білка 12,1-13,2%.

® 04011006 Коровай харківський

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини середньої висоти, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабе, сизий восковий наліт на піхві — відсутній або дуже слабкий, листкова пластинка середньої довжини та ширини. Остюки: антоціанове забарвлення помірне, довжина відносно колосу — середні. Соломина середньо виповнена із сильно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: білий, середньої довжини, ширини та щільності, пірамідальної форми, напівпрямий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець короткий, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, видовжена, слабо зморшувата.

Рослини висотою 101-103 см. Стійкість сорту до вилягання — 7,85-8,1 бала. Стійкість до осипання — 8,7-9,0 бала. Стійкість до посухи — 7,8-8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 103-108 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 43,4 ц/га, в зоні Лісостепу — 44,9 ц/га, в зоні Полісся — 47,0 ц/га. Маса 1000 зерен 44,3-47,1 г. Вміст білка 12,5-13,6%,

® 04011005 Лосинівське

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Національний аграрний університет

Підтримувач(и):

Тип розвитку — ярий. Рослини середньої висоти, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: багато рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок помірне, сизий восковий наліт на піхві — помірний, листкова пластинка середня за довжиною та шириною. Остюки: антоціанове забарвлення слабе, довжина відносно колосу — короткі. Соломина середньо виповнена, з дуже сильно опушеним верхнім міжвузлям. Колос: сіро-димчастий, середньої ширини та щільності, довгий, пірамідальної форми, напівпоникий. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середньої довжини, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, дуже видовжена, зморшувата.

Висота рослин 95 см. Стійкість сорту до вилягання 8,9 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 103 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 41,9 ц/га, в зоні Полісся — 45,7 ц/га. Маса 1000 зерен 43,6-44,9 г. Вміст білка 12,6-12,8%,

Овес ярий**03005001 Аркан**

Заявник: Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина за габітусом пряма, середньої довжини, відсутні або дуже рідко зустрічаються рослини із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті - середній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочок розкидиста, положення гілочок горизонтальне, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із відсутньою або дуже слабкою сіруватістю. Первинне зерно: наявна помірна сіруватість нижньої квіткової луски, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - коричневий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -34,4 г. Середньоранній, вегетаційний період - 97 днів. Стійкість до полягання, осипання та посухи оцінена балами - 7 -9. Вирівняність зерна 95 %, плівчастість середня -28,6 %.

За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай - 42,4 ц / га, що на 10,4 % більше стандартів.

Бактеріальним опіком, корончастою іржею уражується від слабого до середнього.

03005002 Декамерон

Заявник: Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина за габітусом пряма, середньої довжини, відсутні або дуже рідко зустрічаються рослини із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті - дуже ранній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла дуже слабка. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочок розкидиста, положення гілочок горизонтальне, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із відсутньою або дуже слабкою сіруватістю. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски - відсутня, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - коричневий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -35,2 г. Зернівка московського / пробштейського / типу.

Середньостиглий, вегетаційний період 95 днів. Стійкий до осипання та полягання. Посухостійкість середня.

Високоврожайний. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай за роки випробування 52,8 ц / га, що на 6,8 ц / га більше стандартів. Потенційна урожайність сорту 75 ц / га.

Плівчастість 31,9 %. Білка має -13,8 %.

Бактеріальним опіком, корончастою іржею уражується слабо. Стійкий проти летючої сажки.

® 04005001 Самуель

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"

Власник(и): Гроетзнер Пфланцензucht ГмбХ

Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"

Підтримувач(и):

Рослина за габітусом пряма, довга, рослини із закрученими прапорцевими листками відсутні або дуже рідко зустрічаються, час викидання волоті – ранній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: довга, орієнтація гілочок одногрива, положення гілочок горизонтальне, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски довгі, сіруватість відсутня або дуже слабка. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски – відсутня або дуже слабка, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски – білий. Первинне зерно: має середні базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -29,7 г. Сорт ранньостиглий, дозріває в зоні Лісостепу за 91 день, або на 3 - 6 днів раніше стандартів. Стійкий до полягання, осипання та посухи.

За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,1 ц / га. Вирівняність зерна висока, вихід крупи -100 %, білка -14,1 %.

Слабко уражується корончастою іржею. Стійкий проти летючої сажки.

® 04005003 Саргон

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Рослина за габітусом напівпряма, дуже довга, помірна кількість рослин із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті – середній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла помірна. Волоть: коротка за довжиною, орієнтація гілочок одногрива, положення гілочок пряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із помірною сіруватістю. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски – відсутня, тенденція до остистості слабка. Колір нижньої квіткової луски – коричневий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та середньої довжини стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен - 35,5 г. Зернівка московського / пробштейського / типу.

Сорт середньоранній, вегетаційний період 85 - 90 днів. Стійкість проти осипання та полягання висока.

За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 43 ц / га, що на 11,9 % більше стандартів, максимальний - 64 ц / га.

Слабко уражується корончастою іржею. Стійкий проти летючої сажки.

® 04005002 Саломон

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"

Власник(и): Гроетзнер Пфланцензукт ГмбХ

Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"

Підтримувач(и):

Рослина за габітусом пряма, довга, рослини із закрученими прапорцевими листками відсутні або дуже рідко зустрічаються, час викидання волоті – ранній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: довга, орієнтація гілочок одногрива, положення гілочок пряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски довгі, сіруватість відсутня або дуже слабка. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски – відсутня або дуже слабка, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски – білий. Первинне зерно: має середні базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Маса 1000 зерен -28,5 г. Сорт ранньостиглий, досягає в зоні Лісостепу за 90 днів, або на 3 -5 днів раніше стандартів. Стійкий до полягання, осипання та посухи.

За роки випробування на обласних державних центрах отримали середній урожай 34,7 ц / га , що на рівні стандартів .Потенційна можливість сорту - 65 ц / га .

Має відмінні круп'яні якості зерна . Вирівняність зерна - 95 % , вихід круп - 100 % , смакові якості добрі . Білка має 12,3 % .

Корончастою іржею уражується слабо , борошнистою россою і летючою сажкою не уражується .

Ячмінь озимий

® 02012011 Абориген

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Різновидність Pallidum. Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, з похилим прапорцевим листком відсутні, або дуже мало, середньої висоти. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок наявне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабковиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос з відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої довжини та нещільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка не має плівки, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє, або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки має білясте забарвлення, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 59,8 ц/га. Гарантована добавка 9,0 ц/га. Зимостійкість 8,6 балів. Вміст білку 13%. Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

® 03012001 Ковчег

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и): Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Різновидність Pallidum. Тип розвитку - озимий. Кущ напівпрямостоячий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок відсутнє, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабковиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос з відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має більше двох рядів, циліндричної форми, короткий та середньої щільності. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки має білясте забарвлення, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 63,5 ц/га. Гарантована добавка 12,7 ц/га. Зимостійкість на рівні 8,6 балів. Вміст білку 13,3%. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04012023 Морозко

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Різновидність Pallidum. Тип розвитку - озимий. Кущ напівпрямостоячий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком відсутні або дуже мало. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок відсутнє, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, напівпрямий, має більше двох рядів, циліндричної форми, короткий та нещільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та відсутній або дуже слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки має білясте забарвлення, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – довгий

Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 57,2 ц/га. Гарантована добавка 6,4 ц/га. Зимостійкість на рівні 9,0 балів. Вміст білку 12,9 ц/га. Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04012024 Фантаст

Заявник: Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Різновидність Parallelum. Тип розвитку - озимий. Кущ напіврозлогий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок наявне, восковий наліт на піхві слабкий. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, прямий, має більше двох рядів, пірамідальної форми, короткий та щільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та відсутній або дуже слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки має білясте забарвлення, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 58,9 ц/га. Гарантована добавка 8,6 ц/га. Зимостійкість на рівні 8,0 балів. Вміст білку 12,7 %. Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

Ячмінь ярий**® 03012011 Аспект**

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий. Рослини низькі, з похилим прапорцевим листком багато. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок поміrne, восковий наліт на піхві слабкий. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястого забарвлення, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Рослини висотою 82 см. Зернівка велика, жовта. Маса 1000 зерен - 47,7 г. Сорт напівінтенсивного типу. Середньопізній, в умовах Полісся дозріває за 97 днів. В закладах експертизи за роки випробування отримали середній урожай - 52,4 ц/га, що на 10,5 відсотка більше стандартів. Стійкий до полягання та осипання. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,7%, екстрактивність речовин - 79,5%. Борошнистою россою, гельмінтоспоріозом уражується менше стандартів.

® 04012006 Віват

Заявник: Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Власник(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Підтримувач(і): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Кущ напіврозлогий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком багато. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільний. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Маса 1000 зерен - 49,5 г. Середньопізній, вегетаційний період 96 днів.

В закладах експертизи за роки випробування отримали середній урожай 51,7 ц/га, що на 9,3 % більше стандартів. Потенційна урожайність сорту 85 ц/га. Сорт напівінтенсивного типу. Стійкий до полягання, осипання.

Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Пивоварний. Білка має 10,9 %, екстрактивність - 80 %.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-процентної господарської придатності 4,0-4,5 млн / га насінин.

Стійкий до ураження борошнистою россою, бурною іржею.

® 03012015 Здобуток

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Різновидність *Parallelum*. Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, довгий та нещільний. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зерно велике, жовте. Маса 1000 зерен -54,5 г. Середньопізній, вегетаційний період -92 -98 днів. В закладах експертизи за роки випробування отримали середній урожай 49,5 -54,5 ц/га, що на 10,1- 14,8 % більше стандартів, стійкий до полягання та осипання. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Слабко уражується гельмінтоспоріозом і твердою сажкою. Протруєння насіння перед сівбою Вітаваксом 200ФФ забезпечує повний захист від хвороб. Добре адаптований до всіх природньо - кліматичних умов України.

® 04012012 Командор

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
Закрите акціонерне товариство "Селена"

Підтримувач(і):

Різновидність *Nutans*. Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий. Рослини низькі, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають дуже сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу має довгий перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка еліптична, солом'яно -жовта. Маса 1000 зерен 48 г. Пізній, вегетаційний період 90 -97 днів. В закладах експертизи отримали середній урожай 52,1-54,8 ц/га, що на 15,6 -15,9 % більше стандартів. Потенційна урожайність сорту 90 ц/га. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5 -5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5 -10 днів призводить до недобору врожаю до 7 -9 ц/га. Сорт стійкий до осипання та полягання. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11 %, плівчастість 7-8 %, екстрактивних речовин 80,1 % та крохмалю 45,8 %. Добра озерненість колоса /23 -28 зерен у колосі /, має високу кустистість та вирівняність стеблостою. Стійкий до борошнистої роси, карликової іржі, летючої та кам'яної сажки, гельмінтоспоріозу. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб та підвищення врожайів.

® 03012016 Мономах

Заявник: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Власник(и): Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Підтримувач(і):

Різновидність *Parallelum*. Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком багато. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок дуже сильне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабковиповнена. Остюки мають слабе антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабе або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка жовта. Маса 1000 зерен -44,7 г. Середньостиглий, вегетаційний період -89 днів. В закладах експертизи отримали середній урожай - 51,3 ц/га, що на 14,2 % більше стандартів. За даними заявника рекомендується висівати за 100 -відсоткової господарської придатності 4,5 -5 млн/га насінин. Потенційна врожайність сорту -87 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має -11,4 %, Плівчастість -7-8 %, екстрактивних речовин -78-80 %. Стійкий до полягання та осипання. Боршністою росю, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів. Протруєння насіння перед сівбою препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб.

® 04012007 Мальз

Заявник: Осева Ексімпі Прага с.р.о.

Власник(и): Плант Селект - товариство з обмеженою відповідальністю
Осева Ексімпі Прага с.р.о.

Підтримувач(і):

Різновидність *Nutans*. Тип розвитку - ярий. Кущ напіврозлогий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок дуже сильне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабковиповнена. Остюки мають дуже сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу має довгий перший сегмент та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабе або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Рослини висотою 74 -75 см. Пізньостиглий, вегетаційний період 90 -96 днів. Насіння еліптично - видовжене, жовте. Маса 1000 зерен 45,4 -46,8 г. Сорт для інтенсивних технологій вирощування. В закладах експертизи отримали середній урожай 52,1 -54,2 ц/га, що на 14,3 -15,9 % більше стандартів. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4 -4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5 -10 днів призводить до недобору врожаю до 10 ц/га. Потенційна врожайність сорту 95 ц/га. Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кущистістю та ранніми строками сіву. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,9 -11,3 %, плівчастість 7 -8 %, екстрактивних речовин 80 -82 %. Боршністою росю, бурою іржею, гельмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується нижче стандартів. Протруєння насіння перед сівбою препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист від хвороб.

® 03012010 Незабудка

Заявник: Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Власник(и): Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Різновидність *Parallelum*. Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий. Рослини низькі, з похилим прапорцевим листком багато. Прапорцевий листок

- антоціанове забарвлення вушок дуже сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка еліптична, солом'яно-жовта, маса 1000 зерен -50,6 г. Пізньостиглий, вегетаційний період 100 днів. Солома середньої довжини, міцна, стійка проти полягання. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5 - 5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до недобору врожаю до 7,5 ц/га. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай -53,3 ц/га, що на 12,3 % більше стандартів. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має - 11,8 %, екстрактивних речовин -79,8 %. Стійкий до борошнистої роси, карликової іржі. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб.

® 03012007 Сонцедар

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и): Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий. Рослини низькі, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка ромбічної форми, світло-жовта. Маса 1000 зерен 45,0-46,7 г. Середньопізній, досягає за 92 -100 днів. Стійкий до полягання, осипання. Особливістю сорту є те, що він відрізняється стійкістю до весняних заморозків, високим температурам і засусі в літній період. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4 -4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5 -10 днів призводить до значного недобору врожаю. Сорт напівінтенсивного типу, пластичний. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 49,4- 52,9 ц/га, що на 9,8 -11,6 % більше стандартів. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,5 %, екстрактивних речовин -79 -80 %, крохмалю 58 -60 %. Стійкий до ураження борошнистою росю.

® 03012017 Токада

Заявник: Лохов-Петкус ГмбХ

Власник(и): Лохов-Петкус ГмбХ

Підтримувач(і):

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Кущ напіврозлогий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із помірним восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має короткий перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі

волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки має білясте забарвлення, форма еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та повне охоплення соломини. Язичок – середній.

Зерно велике, жовте, подовжено-овальної форми. Маса 1000 зерен -52,6 г. Сорт інтенсивного типу, пластичний. Добре реагує на внесення мінеральних добрив. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності -4 -4,5 млн/га насінин. Пізній, вегетаційний період 93 - 101 день. Агротехнік звичайна для зони вирощування. За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 53,6 -56,3 ц/га, що на 18,8 -19,2 відсотки більше стандартів. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до значного недобору врожаю та погіршення якості зерна. Стійкий до полягання, осипання та посухи. Має високі пивоварні властивості. Білка має -10,5 %, плівчастість 7 -9 %, екстрактивність речовин 80 -82 %. Стійкий до всіх листостеблових хвороб, летючої сажки.

® 04012011 Тройчан

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(і):

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Куш напівпрямостоячий. Рослини середньої висоти, з похилим прапорцевим листком середня кількість. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок дуже сильне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, довгий та дуже нещільний. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка ромбічна, світло - жовта. Маса 1000 зерен -48,9 г. Середньостиглий, досягає за 88 днів, що на 3 -4 дні раніше стандартів. Стійкий проти полягання та осипання. Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4 -4,5 млн/га насінин. Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Урожайний. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 55,6 ц/га, що на 23,8 % більше стандартів. Відрізняється стійкістю до весняних заморозків. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має -11,3 %, екстрактивних речовин -79-81 %. Стійкий до борошністої роси, гельмінтоспоруозу. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння перед сівбою препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист від хвороб.

® 04012021 Юкатан

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и): Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Різновидність Nutans. Тип розвитку - ярий. Куш напівпрямостоячий. Рослини низькі, з похилим прапорцевим листком дуже багато. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок дуже сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім, або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну

форму верхівки та перекидаюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Зернівка видовжена, світло жовта. Маса 1000 зерен 46,1 г. Середньостиглий, вегетаційний період 85 -89 днів. Стійкий до полягання та осипання. За даними заявника рекомендується висівати за 100 -відсотковою господарської придатності 4,5 -5 млн / га насіння. Запізнення із сівбою на 5 -10 днів призводить до недобору врожаю 4,5 -7 ц/га. Сорт напівінтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 52,9 ц/га, що на 17,8 % більше стандартів. Потенційна можливість сорту 90 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,2%, екстрактивність 80,2 %, вміст крохмалю 62,1 %. Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспориозом. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння перед сівбою препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб та значне підвищення врожаю.

Кукурудза

® 04004063 Авіас 277 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіас 2000"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Зигзагоподібність стебла - відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - дуже сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення шовку - помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне. Урожайність по зоні Степу 70,7ц/га, Лісостепу - 97,4ц/га, Полісся - 88,5ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,3 - 11,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,5-8,7 балів, вилягання 8,6- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78-79 %. Вміст крохмалю 73,9 - 74,8%, білку 8,6 - 10,0 %.

04004090 Аванс МС 350

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - малий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - великий. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - жовто-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 71,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 2,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 балів, вилягання 9,0 балів, пузирчастої

сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 %. Вміст крохмалю 73,7 %, білку 9,5 %.

03004053 Аманда

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня слабе.

Урожайність по зоні Степу - 72,2 ц/га, Лісостепу 94,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,7 -7,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,4- 8,5 балів, вилягання 8,7- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 -81 %. Вміст крохмалю 73,5 - 74,6%, білку 8,8 - 9,3 %.

04004043 Буг СВ

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - дуже сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки і низу зернини -оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже слабе.

Урожайність, ц/га по зоні Лісостепу 85,8ц/га, гарантована прибавка складає 5,0ц/га. Вихід зерна при обмолоті 78%. Стійкість до засухи 8,6балів, вилягання 8,9 балів, пораження пузирчастою сажкою 9,0 балів. Вміст крохмалю 74,6%, білку 8,4% .

05004024 Бц 178

Заявник: БЦ Інститут селекції і рослинництва

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною -

довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - червоно-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зонах Лісостепу - 89,9ц/га, Полісся 88,8ц/га, гарантована прибавка відповідно складає 9,1-10,0 ц/га. Стійкість до засухи по зонах становить 9,0 балів, вилягання 8,9-9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті складає 79-80%. Вміст крохмалю 73,5- 74,8%, білку 8,6-9,7%.

04004096 Базальт 270 ВС

Заявник: Приватна виробнича фірма "Агроцентр"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, антоціанове забарвлення шовку відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 97,2ц/га, Полісся - 88,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,6 - 11,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,9 балів, вилягання 8,4- 8,6 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 -80 %. Вміст крохмалю 72,7 - 74,4%, білку 10,2 - 10,6 %.

05004023 Бц 282

Заявник: БЦ Інститут селекції і рослинництва

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, відсутнє антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - червоний. Антоціанове забарвлення лусок стрижня слабе.

Урожайність по зоні Степу - 64,8ц/га, Лісостепу -89,9 ц/га, Полісся - 90,5 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,4 - 7,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,8- 8,9 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 -80 %. Вміст крохмалю 73,6 - 76,7%, білку 7,7 - 9,3 %.

05004025 Бц 288 Б

Заявник: БЦ Інститут селекції і рослинництва

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній, відсутнє антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 68,5ц/га, Лісостепу - 93,9 ц/га, Полісся - 87,4 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,4 - 8,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,8- 8,9 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 - 81 %. Вміст крохмалю 73,6 - 75,7%, білку 8,7 - 9,3 %.

® 04004059 Бестселер 287 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня слабе.

Урожайність по зоні Степу - 72,8 ц/га, Лісостепу - 89,6ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,6 - 6,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 - 9,0 балів, вилягання 8,8 - 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 - 80 %. Вміст крохмалю 76,0 - 76,2 %, білку 9,8 - 10,2 %.

® 03004028 ВЦ 380 МВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) -

від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 74,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 %. Вміст крохмалю 76,6 білку 9,2 %.

04004011 Гейзер

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - малий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 75,9 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,6 ц/га. Стійкість до засухи 9,0 балів, вилягання 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 %. Вміст крохмалю 75,2 %, білку 8,6 %.

03004031 Господар 360 СВ

Заявник: Науково-виробниче підприємство "Агродніпро-насіння"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть - щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Степу на зрошенні - 108,3 ц/га, на богарі - 68,5 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 %. Вміст крохмалю 74,6 білку 9,2 %.

® 04004056 Дерезуватський 291 СВ**Заявник:** Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук**Власник(и):** Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу -73,4 ц/га, Лісостепу - 89,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,2 - 9,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,7 балів, вилягання 8,6- 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 79 %. Вміст крохмалю 74,9 - 75,7%, білку 8,2 - 8,4 %.

03004003 ДК 243**Заявник:** Монсанта Інтернешнл Сьорл**Власник(и):****Підтримувач(и):**

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього, відсутнє антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Степу -76,0 ц/га, Лісостепу - 91,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,2 - 8,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7- 8,9 балів, вилягання 8,8- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 79 %. Вміст крохмалю 75,7 - 76,6 білку 7,8 - 9,2 %.

03004051 Еміліо**Заявник:** КВС ЗААТ АГ**Власник(и):****Підтримувач(и):**

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на

нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже слабе.

Урожайність по зоні Степу - 66,0 ц/га, Лісостепу - 98,5 ц/га, Полісся - 85,0 ц/га, гарантована прибавка відповідно 2,4 - 12,2, ц/га. Стійкість до засухи 8,7- 8,8 балів, вилягання 8,8- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 76 - 78 %. Вміст крохмалю 74,8 - 76,0%, білку 7,5 - 9,4 %.

® 04004060 Заліщицький 191 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,3 ц/га, Полісся - 86,2 ц/га гарантована прибавка відповідно 7,3 - 8,4 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 - 8,6 балів, вилягання 8,9 - 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 - 80 %. Вміст крохмалю 74,6 - 75,9%, білку 8,2 - 9,8 %.

® 04004098 Колізей 180 ВС

Заявник: Приватна виробнича фірма "Агроцентр"

Власник(и): Приватна виробнича фірма "Агроцентр"
Костюченко Віктор Іванович

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу становить 86,2 ц/га, Полісся 84,6 ц/га, гарантована прибавка відповідно складає 5,4-5,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,6-9,0 балів, вилягання 8,8-9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті становить 78-79%. Вміст крохмалю 74,8-76,3%, білку 7,0-9,2 %.

04004009 КАМПАЛА

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(и):

Положення листкової пластинки листка у просторі - ледь похиле. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Положення бічних гілочок на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів - мала, колір верхівки та низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу 68,8 ц/га, Лісостепу - 91,8ц/га, Полісся - 88,2ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,4 - 6,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,5-8,6 балів, вилягання 8,6- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 77-78 %. Вміст крохмалю 74,8 - 76,0%, білку 8,3 - 10,0 %.

® 04004097 Контур 250 ВС

Заявник: Приватна виробнича фірма "Агроцентр"

Власник(и): Приватна виробнича фірма "Агроцентр"

Костюченко Віктор Іванович

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною -- середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів - середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу 67,1 ц/га, Лісостепу - 90,9 ц/га, гарантована прибавка відповідно 2,7 - 5,2 ц/га. Стійкість до засухи 885- 8,9 балів, вилягання 8,5- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80, - 81 %. Вміст крохмалю 77,0 - 77,3%, білку 8,7 - 9,0 %.

04004106 KB 2704

Заявник: Ходовля Рослин Рольничих "Насьона Кобежиц"спулка з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) -

довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - червоно-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,6 ц/га, Полісся - 87,9 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,7 - 4,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,6 балів, вилягання 8,0- 8,5 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 76,0 - 77,0 %. Вміст крохмалю 74,8 - 75,2%, білку 8,6 - 9,0 %.

04004114 Коксімо

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - дуже мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 104,9 ц/га, Лісостепу 92,6 ц/га, Полісся - 88,0 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,6 -14,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,7 балів, вилягання 8,5- 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 - 83 %. Вміст крохмалю 72,5 - 73,6%, білку 8,2 - 10,2 %.

05004010 Корнелі

Заявник: Кассад Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже слабе.

Урожайність по зоні Степу - 67,5 ц/га, Лісостепу 95,3 ц/га, Полісся - 91,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,1 -9,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,6- 8,7 балів, вилягання 8,6- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 - 82 %. Вміст крохмалю 73,6 - 74,2%, білку 8,3 - 10,1 %.

05004014 Корсунський 297 МВ

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, антоціанове забарвлення шовку - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий, тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня слабе.

Урожайність по зоні Степу - 66,1 ц/га, Лісостепу - 95,4 ц/га, Полісся - 89,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,9 - 9,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,4- 8,5 балів, вилягання 8,7- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 80 %. Вміст крохмалю 73,1 - 76,2%, білку 8,7 - 9,2 %.

04004113 Лаксот

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 99,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 8,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 %. Вміст крохмалю 74,6 %, білку 8,9 %.

04004006 Латізана

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній, антоціанове забарвлення шовку - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки та низу зернини -

оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 93,4ц/га, Полісся - 86,2ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,0 - 7,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,6 балів, вилягання 8,6- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79-80 %. Вміст крохмалю 73,4 - 74,1%, білку 8,0 - 8,7 %.

04004008 ЛГ 3409

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Положення листкової пластинки листка у просторі - ледь похиле. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Розміщення колосків на волоті - щільне. Положення бічних гілочок на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - наявне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів - мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня - наявне.

Урожайність по зоні Степу 67,7 ц/га, Лісостепу - 92,1ц/га, Полісся - 87,6ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,3 - 6,4 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,6 балів, вилягання 8,6- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79-80 %. Вміст крохмалю 73,8 - 74,8%, білку 7,7 - 9,3 %.

04004085 Лелека МВ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,5ц/га, Полісся - 91,5ц/га, гарантована прибавка відповідно 442 - 10,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,7 балів, вилягання 8,2- 8,4 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 77-79 %. Вміст крохмалю 73,9 - 76,0%, білку 9,0 - 9,6 %.

04004112 ЛГ 2447

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки

довгі, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, антоціанове забарвлення шовку - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Степу - 107,9 ц/га, Лісостепу 97,3 ц/га, Полісся - 93,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 11,6 - 19,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,6- 8,9 балів, вилягання 8,6- 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78,0 - 79,0 %. Вміст крохмалю 72,8 - 76,8%, білку 7,5 - 10,0 %.

® 03004030 MTI

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
MTI Маїс Технолоджіс Інтернейшнл ГмбХ

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - дуже великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - жовто-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Степу - 73,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно 1,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 %. Вміст крохмалю 76,0 %, білку 8,8 %.

05004022 HC 205

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - дуже сильне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - червоно-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Степу - 66,1 ц/га, Лісостепу - 91,0 ц/га, гарантована прибавка відповідно 2,4 - 6,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,4- 8,8 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 - 81 %. Вміст крохмалю 74,6 - 77,0%, білку 7,5 - 8,4 %.

05004007 НС 2012

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - червоно-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу -84,0 ц/га, Полісся - 89,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 3,3 - 6,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,6- 8,8 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 - 80 %. Вміст крохмалю 75,2 - 76,6%, білку 9,2 - 9,4 %.

04004018 ПР39Ф58

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и): Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Підтримувач(і): Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Положення листової пластинки листка у просторі - ледь похиле. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Положення бічних гілочок на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - середня, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - великий. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів - велика, колір верхівки зернини - жовтий.

Урожайність по зоні Степу становить 72,8ц/га, Лісостепу -91,6ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,9 - 8,4 ц/га. Стійкість до засухи 8,7- 8,9 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 81-83 %. Вміст крохмалю 75,9- 76,6%, білку 9,0- 9,4 %.

04004020 ПР39Т45

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и): Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Підтримувач(і): Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Положення листової пластинки листка у просторі - пряме. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Положення бічних гілочок на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок на волоті - відсутня або дуже мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - наявне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів - мала, колір верхівки та низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу становить 78,5ц/га, Лісостепу - 96,7ц/га, Полісся - 97,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно 11,0 - 14,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,8- 8,9 балів, вилягання 8,8- 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 81-82 %. Вміст крохмалю 74,7- 76,1%, білку 8,6 - 9,3 %.

® 04004055 Подільський 274 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення шовку - слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу 72,4ц/га, Лісостепу - 99,5ц/га, Полісся - 93,6ц/га, гарантована прибавка відповідно 7,9- 13,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,9 балів, вилягання 8,6- 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 77-79 %. Вміст крохмалю 73,5 - 76,3%, білку 8,1 - 9,4 %.

® 04004021 ПР38В91

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и): Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - відсутня або дуже мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини -оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 70,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,8 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 %. Вміст крохмалю 75,6 білку 9,4 %.

04004091 Пульс МС 402

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - дуже великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини -оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 75,0 ц/га, гарантована прибавка відповідно 2,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 балів, вилягання 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 %. Вміст крохмалю 74,9 %, білку 8,5 %.

03004035 Садгір

Заявник: Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - червоно-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу 87,5 ц/га, по зоні Полісся 84,0ц/га, гарантована прибавка відповідно складає 6,6- 5,1ц/га. Стійкість до пузирчастої сажки 9 балів, засухи 8,5-8,3 бала. Вміст білку 7,5-8,5%, крохмалю 72,3-74,0%. Вихід зерна 79%.

04004089 Сплав МС 290

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - дуже короткий, тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 70,6ц/га, Лісостепу - 97,7ц/га, гарантована прибавка відповідно 6,1 - 12,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,0- 8,7 балів, вилягання 8,3- 8,6 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80,- 81 %. Вміст крохмалю 71,4 - 76,4%, білку 8,7 - 11,1 %.

® 04004058 Сов 329 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
 Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини -оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 70,6 ц/га, Лісостепу - 96,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно 2,2 - 5,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 - 9,0 балів, вилягання 8,7 - 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 79 %. Вміст крохмалю 75,7 - 76,5 %, білку 7,7 - 8,5 %.

03004054 Сенат

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):**Підтримувач(и):**

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатеподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу - 78,7 ц/га, гарантована прибавка відповідно 6,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 балів, вилягання 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80 %. Вміст крохмалю 73,5 %, білку 8,5 %.

® 04004054 Товтрянський 188 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) -

від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - ледь відхилене, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення шовку - помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, діаметр качана - великий. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зонах Лісостепу - 86,0 ц/га, Полісся - 87,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно складає 5,1-8,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,6-9,0 балів, вилягання - 8,8 - 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вміст крохмалю 74,0-76,4%, білку 8,4-9,0%.

® 03004022 ТАР 349 MB

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробнича комерційна фірма "Селекта"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробнича комерційна фірма "Селекта"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - малий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусний, за довжиною - середній, діаметр качана - великий. Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини -оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Урожайність по зоні Степу -74,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 %. Вміст крохмалю 76,6 білку 9,2 %.

04004062 Ушицький 167 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу -66,0 ц/га, Лісостепу - 81,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,2 - 8,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,5- 8,7 балів, вилягання 8,6- 8,7 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 - 79 %. Вміст крохмалю 74,7 - 75,2%, білку 8,6 - 9,1 %.

® 04004064 Хмельницький

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіас 2000"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті довга. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, антоціанове забарвлення шовку відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - жовто-оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу 105,5 ц/га, Лісостепу - 95,3ц/га, Полісся - 87,4ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,2 - 13,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,4- 8,8 балів, вилягання 7,8- 8,4 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79-82 %. Вміст крохмалю 71,0 - 76,6%, білку 8,7 - 10,1 %.

05004015 Чигиринський 267 СВ

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення шовку. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу -93,0 ц/га, Полісся - 90,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно 7,0 - 7,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,6- 8,9 балів, вилягання 8,7- 8,9 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 -80 %. Вміст крохмалю 74,3 - 76,2%, білку 8,5 - 9,4 %.

® 04004071 Яринин 176 СВ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне, кут між листовою пластинкою і стеблом - середній. Положення листка листової пластинки у просторі - похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного

цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - короткі, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала, головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною -- середній, діаметр качана - великий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів - середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне. Урожайність по зоні Лісостепу становить 86,8ц/га, Полісся - 90,3ц/га, гарантована прибавка відповідно 6,0-9,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,9-9,0 балів, вилягання 9,0 балів, пузирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78-79 %. Вміст крохмалю 75,2%, білку 7,8-8,3 %.

Сільськогосподарські: бобові

Горох

® 03001009 Аскет

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Рослина без антоціанового забарвлення, низька, з вторинними листочками (листова форма), з кількістю квіток на вузлі від одної до двох, має середні час цвітіння та достигання. Стебло нефасційоване, середньої довжини та з середньою кількістю вузлів. Прилистки середніх розмірів, добре розвинуті, з відсутніми "кролячими вухами" та середньою щільністю плямистості на них. Вторинні листочки без воскового нальоту, середнього розміру, з малою їх кількістю, мають коротку відстань від найширшої частини до основи та дуже слабку зубчатість. Прилистки добре розвинуті, без "кролячих вушок", мають восковий наліт, середнього розміру. Квітки на середніх квітконіжках. Парус білого кольору, середнього розміру з прямою основою та помірною інтенсивністю. Чашолистик середньої ширини, з загостреною формою верхівки. Біб довгий, вузький, зі слабким або відсутнім ступенем вигину, жовтого кольору, з наявною пергаментністю. Насінина сферичної форми, без чорного забарвлення рубчика, з жовтим забарвленням та помірною зморшкуватістю сім'ядолей. Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 270 -290 г. Середньопізній, вегетаційний період 95 днів. Напівінтенсивного типу.

Урожайний. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,2 ц / га, що на 4,1 відсотки більше стандартів.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Білка має 22,2 %.

Сорт стійкий до аскохітозу та антракнозу. Кореневими гнилями пошкоджується на рівні стандартів.

® 03001007 Девіз

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослина без антоціанового забарвлення, середньої висоти, без вторинних листочків (вусата форма), з середньою кількістю квіток на вузлі, має середні час цвітіння та достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та з середньою кількістю вузлів.

Прилистки середніх розмірів, добре розвинуті, з відсутніми "кролячими вухами" та середньою щільністю плямистості на них.

Квітки на середніх квітконіжках по дві на вузлі, білого кольору, середнього розміру та дуже вигнутим парусом, основа якого сильно піднесена.

Біб довгий, вузький, зі слабким або відсутнім ступенем вигину, жовтого кольору, з наявною пергаментністю.

Насінина сферичної форми, з наявним чорним забарвленням рубчика, жовтого забарвлення та відсутньою зморшкуватістю сім'ядолей.

Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 260 -270 г. Середньостиглий , вегетаційний період 85 -97 днів .Напівінтенсивного типу ,придатний до механізованого збирання .
За даними заявника норма висіву 1,0 - 1 ,2 млн/ га схожих насінин .

Урожайний .За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 36,1 -37,6 ц/га ,що на 15,9-20,9 відсотків більше стандартів . Білка має 21,9-23,4% .Агротехніка звичайна для зони вирощування .

Аскохітозом та кореними гнилями уражується нижче стандартів .

® 03001006 Ескіз

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Рослини сорту мають середню висоту, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками (вусаті) , з кількістю квіток на вузлі від одної до двох, середнього часу цвітіння та досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини, має середню кількість вузлів.

Листок помірно зелений з довгим черешком. Прилисток середньої величини, добре розвинений, без наявної формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, з середньою щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка, з загостреною формою верхівки верхнього чашолистика. Парус білого кольору, з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб довгий, вузький, жовтого кольору, має середню кількість насінних зачатків, з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та дуже слабким ступенем його прояву. Форма зовнішньої частини верхівки бобу - загострена. Інтенсивність зеленого забарвлення нестиглих насінин - помірна.

Насінина сферичної форми, з сім'ядолями жовтого кольору без зморшкуватості та відсутнім чорним забарвленням рубчика.

Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 250 -270 г .Середньопізній ,вегетаційний період 96 днів .Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання .

За даними заявника норма висіву 1,1 -1,2 млн/ га схожих насінин .Агротехніка звичайна для зони вирощування .

Урожайний .За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,9 ц / га ,що на 15,4 відсотки більше стандартів .Білка має 23,1 % .

Сорт стійкий до аскохітозу та антракнозу . Кореневими гнилями пошкоджується на рівні стандартів .

® 04001007 Фаргус

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками (вусаті) , з кількістю квіток на вузлі від двох до трьох, мають пізній час цвітіння та ранній час досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини, має багато вузлів.

Черешок листка середньої довжини . Прилисток добре розвинений, з наявною формою "кролячих вух" та восковим нальотом, має середню довжину

та ширину, з щільною плямистістю.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має малу ширину чашолистка з округлою формою верхівки верхнього чашолистика. Колір паруса від білого до кремового, з малою максимальною його шириною, прямою формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, довгий і широкий, жовтого кольору, з відсутньою пергаментністю та наявним потовщенням стулок, з увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву. Шов бобу з відсутніми або рудиментальними волокнами.

Насінина циліндричної форми, з сім'ядолями жовтого кольору зі слабкою їх зморшкуватістю та відсутнім чорним забарвленням рубчика.

Маса 1000 насінин - середня.

Маса 1000 зерен 235 - 245 г. Середньостиглий, вегетаційний період 82 -95 см. Сорт інтенсивного типу, придатний до механізованого збирання.

За даними заявника норма висіву 1,0 -1,2 млн / га схожих насінин.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Білка має 21,6 -25,8 %.

Високоврожайний. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 39,1 -41,3 ц / га, що на 15,1 -25,9 відсотків більше стандартів, максимальний 59 ц / га.

Аскохітозом та кореневими гнилями уражується нижче стандартів.

Сільськогосподарські: круп'яніГречка® 05002002 **Оранта**

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче мале підприємство "Антарія"

Підтримувач(і):

Сорт диплоїдний. Рослина за габітусом еректоїдна, індетермінального типу, висока, з середньою кількістю гілок (4-6), має середні час настання масового цвітіння (26-32 доби) та досягання (71-80 діб).

Головний пагін рослини середньої висоти, слабо ребристий, товстий, висота якого стосовно висоти гілок - вища, з середньою зоною галуження та довгою зоною плодоутворення, має середні: кількість вузлів у зоні галуження, висоти прикріплень першої гілки та першого суцвіття.

Пагони з майже суцільним антоціановим забарвленням середньої інтенсивності. Вузли пагонів середньовиражені, зеленого кольору. Опушення перших двох вузлів середньої інтенсивності.

Третій листок має середні довжину, ширину та розмір. Листкова пластинка слабо хвиляста, серцевиднотрикутна, світло-зеленого кольору, з відсутньою антоціановою плямою біля основи та слабо червоним забарвленням жилок біля неї, слабким опушенням жилок з нижнього боку та нещільними волокнами на жилках.

Квітка середнього розміру, гомостильного типу з блідо-рожевим кольором оцвітини та видовженою формою її листочків, роташування яких відокремлене. Квітка має блідо-червоний колір пиляків, овальну форму нектарників та слабкий аромат.

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагвні) характеризується такими показниками: має середньої довжини квітконос, вузькоциліндричну форму середньої щільності та середню його довжину.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні - щиток, який складається з трьох китиць, середньої довжини.

Плід середніх розмірів (довжина та ширина), краплеподібної форми з малими крилами, має середні довжину та товщину плодоніжки, оплодень якого блідо-зеленого кольору на час наливу, а за повного досягання стає темно-сірим з наявними дрібними крапками та помірним восковим нальотом на ньому. Форми граней плоду - плеската, верхівки - коротка з помірним ступенем вираженням основи.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середніми показниками вирівняності та плівчатості.

Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 20,2 ц/га, Лісостепу 24,5 ц/га, Полісся 20,6 ц/га. Гарантована добавка 2,1 - 6,5 ц/га. Крупність ядра 22,8 - 23,4%, вміст білка 13,6 - 14,1%, плівчастість 22,5 - 23,9%, вихід крупи 71,9 - 72,1%. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами нижче середнього.

Сорго зернове

® 04064003 Ковчег

Заявник: Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук
Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослини сорту характеризуються раннім часом викидання волоті та низькою висотою на час викидання волоті, а на час досягання - середньою довжиною та стеблом середньої товщини.

Паросток з сильним антоціановим забарвленням колеоптиля, відсутнім або дуже слабким забарвленням дорсального боку та сильним антоціановим забарвленням пазухи першого листка.

Листок з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її за викидання волоті.

Прапорцевий листок має помірне обезбарвлення середньої жилки, світліше порівняно з пластинкою листка та слабке жовте забарвленням.

Суцвіття - довга волоть, щільна як в кінці цвітіння, так і на час досягання, симетричної форми, з довгою видимою шийкою над пазухою на час досягання та короткими гілочками в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою - довга. Остюк на нижній квітковій лусці помірно розвинений. На час цвітіння колоскова луска жовто-зелена зі слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час досягання вона стає темно-червоною, середньої довжини.

Приймочка коротка, з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та сильним жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння - оранжево-червоне.

Зернівка після досягання світло-коричневого кольору, має еліптичну форму як зі спинки, так і в профіль, з середніми розміром зародка та малою поверхнею, вкритою насінною шкіркою. Структура ендосперму в зерні - на 3/4 крохмаліста. Забарвлення склоподібного ендосперму - біле.

Маса 1000 зерен - середня.

Рослини заввишки до 119 см. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 46,8 ц/га, Лісостепу 55,7 ц/га. Гарантована добавка 4,7 - 11,8 ц/га. Вміст білка 8,0 - 11,7 %, крохмалю 66,2 - 70,4 %. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

02064004 Лан 59

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту характеризуються пізнім часом викидання волоті і середньою висотою і на час викидання волоті, і на час досягання та стеблом середньої товщини.

Паросток зі слабким антоціановим забарвленням колеоптиля, відсутнім або дуже слабким забарвленням як дорсального боку, так і пазухи першого листка.

Листок з сильним антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та темним зеленим забарвленням її за викидання волоті.

Прапорцевий листок має дуже сильне обезбарвлення середньої жилки, світліше порівняно з пластинкою листка та помірне жовте забарвленням.

Суцвіття - довга волоть з помірною щільністю в кінці цвітіння, симетричною формою, середньою видимою шийкою над пазухою на час досягання та

короткими гілочками в середній третині.

Квітка з квітніжкою - довга. Остюк на нижній квітковій лусці відсутній або дуже слабо розвинутий. На час цвітіння колоскова луска світло-зелена з помірним антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час досягання вона стає коричневою, середньої довжини. Приймочка середньої довжини, з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та слабким жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння - оранжево-червоне.

Зернівка після досягання оранжевого кольору, має округлу форму зі спинкита та еліпса в профіль, з середніми розміром зародка та середньою поверхнею, вкритою насінною шкіркою. Структура ендосперму в зерні - на 1/2 склоподібна, білого кольору. Маса 1000 зерен - середня.

Степ

Лісостеп

Ранньостиглий сорт. Рослини заввишки до 134 см. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 35,6 ц/га, Лісостепу 54,2 ц/га. Гарантована добавка 0,7 - 3,2 ц/га. Вміст білка 11,2 - 13,4%, крохмалю 71,3 - 72,5%. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне. Напрямок використання: фуражне зерно.

Рис

® 04009001 Агат

Заявник: Інститут рису Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рису Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Рослини сорту з безбарвним колеоптилем, відсутньою чоловічою стерильністю, мають пряме положення стебел з ранніми часом викидання волоті та її досягання.

Стебло середньої довжини та ширини без антоціанового забарвлення вузлів і міжвузлів.

Листки середньої довжини та ширини зі світлою інтенсивністю зеленого забарвлення, без антоціанового забарвлення та слабкою опушеністю поверхні пластинки. Шийка, вушка та піхва листків також без антоціанового забарвлення. Язичок подвійний і безбарвний. Старіння листків - середнє: на час збирання врожаю один листок зберігає свій колір.

За раннього обстеження прапорцевий листок має напівпряме положення пластинки, а за пізнього - горизонтальне.

Рослини сорту мають середню кількість волотей з явним проявом основи верхнього міжвузлязі та слабким наявним вроринним гілкування. Положення гілок - напівряме. Головна вісь волоті - напівпряма, середньої довжини. Остюки дуже короткі, розташовані по всій довжині волоті, мають жовтувато-білий колір як на час раннього, так і пізнього обстежень.

Колосок з білим забарвленням приймочки, має коротку нижню стерильну колоскову луску солом'яного кольору.

Нижня квіткова луска з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням як кіля, зони під верхівкою, так і самої верхівки.

Зернівка має середні довжину та ширину. Маса 1000 розвинених зерен - велика. Обрушена зернівка напівверетеноподібного вигляду збоку, з середніми довжиною та шириною, білого кольору, без запаху.

Ранньостиглий цінний сорт. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 61,9 ц/га. Гарантована добавка 8,3 ц/га. Вміст білка 9,4%, скловидність 96%, плівчастість 16,4%. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами нижче середнього.

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Соняшник

04017039 Абсолют

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - антоціанове забарвлення відсутнє. Листок за розміром великий, зубці грубі, вушка помірні, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - темний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плеската. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 30,5 ц/га, гарантована добавка 5,2 ц/га. Вміст жиру 49,6 %, білку 17,8%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

® 04017049 Всесвіт

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення - помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором помірно-жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - дуже обернене, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузько яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 28,7 ц/га, Лісостепу 30,1 ц/га. Гарантована добавка 3,7 - 5,6 ц/га. Вміст жиру 48,4 - 49,9 %, білку 17,6 - 18,2 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

05017009 Віста

Заявник: Кассад Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці грубі, вушка помірні, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення

приймочки відсутні. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузько яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,7 ц/га, Лісостепу 32,4 ц/га. Гарантована добавка 5,7 - 7,9 ц/га. Вміст жиру 50,6 - 51,6 %, білку 16,6 - 17,2 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017010 Заграва

Заявник: ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Лісостепу 25,3 ц/га, гарантована добавка 3,5 ц/га. Вміст жиру 48,2%, білку 17,5%. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

04017006 Зевс

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення - помірна. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність в зоні Лісостепу становила 27,2 ц/га, гарантована добавка 2,7 ц/га. Вміст жиру 51,5 %, білку 17,1 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017028 Іберіко

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром сердній, зубці грубі, вушка великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка увігнута. Розмір сім'янки - великий, форма - вузькояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 25,6 ц/га, гарантована добавка 1,1 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 16,9%. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

® 04017056 Карат

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - округла, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 27,3 ц/га. Гарантована добавка 5,5 ц/га. Вміст жиру 51,2 %, білку 16,0 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

03017051 КВС Гелія 04 РО

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення - помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - середня, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,6 ц/га, Лісостепу 29,4 ц/га. Гарантована добавка 2,6 - 4,9 ц/га. Вміст 49,5 - 50,0 %, білку 16,0 - 17,5 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

® 05017003 Косово

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и): Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - антоціанове забарвлення відсутнє. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені і чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,5 ц/га, Лісостепу 29,5 ц/га. Гарантована добавка 5,0 - 5,6 ц/га. Вміст жиру 49,5 - 51,6 %, білку 17,0 - 18,0 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами незначне.

05017042 Конгрес

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці дрібні, вушка великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плеската. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,7 ц/га, Лісостепу 27,9 ц/га. Гарантована добавка 5,4 ц/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017065 Логос

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково - виробнича фірма "Агротехнологія"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузькояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 26,5 ц/га. Гарантована добавка 4,7 ц/га. Вміст жиру 48,4 %, білку 17,0%. Гібрид стійкий до вилягання, відносно стійкий до осипання та посухи. За період вивчення ураження хворобами незначне.

® 05017007 Лейіла

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и): Євраліс Семанс

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення сильна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - великий, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 34,4 ц/га, Лісостепу 30,5 ц/га. Гарантована добавка 6,0 - 9,5 ц/га. Вміст жиру 49,5 - 51,2 %, білку 16,1 - 17,5 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

05017010 Лайка

Заявник: Кассад Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці дрібні, вушка помірні, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузько яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,8 ц/га, Лісостепу 32,5 ц/га. Гарантована добавка 8,9 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 49,9 %, білку 16,5 - 17,1 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами незначне.

04017068 ЛХА 252/11

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці дрібні, вушка помірні, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені чітко округлі, довжина верхівки - коротка, зелений колір зовнішнього боку

листіків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,4 ц/га, Лісостепу 29,4 ц/га. Гарантована добавка 3,2 - 4,0 ц/га. Вміст жиру 49,4 - 50,1 %, білку 17,0 - 17,9%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017029 Латіно

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плеската. Розмір сім'янки - великий, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Лісостепу 25,4 ц/га, гарантована добавка 1,0 ц/га. Вміст жиру 48,2 %, білку 16,0%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи; ураження хворобами незначне.

® 03017009 Міраж

Заявник: ДНУ "Донська дослідна станція ім. А.О. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур"

Власник(и): ДНУ "Донська дослідна станція ім. А.О. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур"
Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець"

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 21,6 ц/га, Лісостепу 22,1 ц/га. Вміст жиру 48,4%, білку 17,0%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Відносно стійкий до ураження хворобами.

® 04017034 Мірослав

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"
Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки помірна. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - світлий. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середній урожай за роки випробування становив в зоні Степу 23,6 ц/га, Лісостепу 23,8 ц/га. Гарантована добавка 1,9 - 2,1 ц/га. Вміст жиру 48,2%, білку 17,3%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

® 05017002 Морава

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и): Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені і чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма з боку сім'янок сильно випукла, Гіпокотиль - антоціанове забарвлення відсутнє. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені і чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма (з боку сім'янок) - сильно випукла, сім'янка за розміром середня, форма широко яйцеподібна, за основним кольором чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 29,8 ц/га, Лісостепу 29,0 ц/га. Гарантована добавка 4,5 - 4,9 ц/га. Вміст жиру 50,4 - 51,2 %, білку 16,0 - 16,4 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами незначне.

® 05017004 Монарх

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и): Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення сильна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною короткі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - світлий. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній,

форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,2 ц/га, Лісостепу 31,8 ц/га. Гарантована добавка 5,7 - 10,0 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 51,6 %, білку 16,7 - 17,2 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017059 НК Долбі

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість відсутня або дуже слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - дуже обернене, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,9 ц/га, Лісостепу 29,9 ц/га. Гарантована добавка 2,6 - 5,6 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 50,7 %, білку 16,4 - 18,0 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017061 НК Ферті

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість відсутня або дуже слабка, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - дуже обернене, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 31,9 ц/га, гарантована добавка 6,6 ц/га. Вміст жиру 50,6 %, білку 16,9%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017058 НК Мелдімі

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за

формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження наявне лише біля основи. Положення кошика - напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями дуже сильна, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 34,6 ц/га, Лісостепу 30,8 ц/га. Гарантована добавка 4,6 - 8,1 ц/га. Вміст жиру 48,2 %, білку 18,4 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період вивчення гібрид уражувався хворобами в незначній мірі. Особливістю гібриду є стійкість до гербіцидів групи IMI.

04017054 Оберіг

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - світлий. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузькояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 25,7 ц/га, Лісостепу 28,7 ц/га. Гарантована добавка 4,1-6,8 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 51,6%, білку 16,9 - 18,0%. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

® 04017067 Онікс

Заявник: Сумський національний аграрний університет

Власник(и): Сумський національний аграрний університет

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці дрібні, вушка помірні, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий сорт кондитерського напрямку. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 23,9 ц/га, Лісостепу 23,1 ц/га. Гарантована добавка 3,9 - 5,0 ц/га. Вміст жиру 44,8 - 46,4 %, білку 18,4 - 19,2 %. Сорт середньостійкий до вилягання, відносно стійкий до осипання та посухи. За період вивчення ураження хворобами незначне.

® 04017050 Оскіл

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
 Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - антоціанове забарвлення - відсутнє. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - світлий. Рослина за висотою - висока, галушення відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 25,0 ц/га, Лісостепу 30,7 ц/га. Гарантована добавка 6,2 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,0 %, білку 17,4 - 18,1 %. Гібрид стійкий до осипання, вилягання, посухи; ураження хворобами незначне.

® 04017024 ПР63А40

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ
Власник(и): Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці грубі, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галушення відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузькояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,6 ц/га, Лісостепу 27,0 ц/га. Гарантована добавка 2,5 - 2,7 ц/га. Вміст жиру 53,6%, білку 16,0 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами незначне.

® 05017018 Песма

Заявник: Агропромислова фірма "Флора" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Власник(и): Агропромислова фірма "Флора" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
 Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки -

помірний. Рослина за висотою - середня, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузько яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,0 ц/га, Лісостепу 29,2 ц/га. Гарантована добавка 4,7 - 5,1 ц/га. Вміст жиру 52,0 - 52,5 %, білку 16,0 - 16,8 %. Гібрид стійкий до вилягання, посухи, осипання, ураження хворобами незначне.

® 04017025 ПР64А78

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и): Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - веретеновидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовженої чітко округлі, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 29,1 ц/га, Лісостепу 31,2 ц/га. Гарантована добавка 2,6 - 5,1 ц/га. Вміст жиру 51,2 - 52,4 %, білку 15,6 - 16,0 %. Гібрид стійкий до осипання, посухи, вилягання; ураження хворобами незначне.

® 04017023 ПР64Г91

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и): Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром середній, зубці дрібні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовженої чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - великий, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 26,6 ц/га, Лісостепу 27,0 ц/га. Гарантована добавка 1,2 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,6 %, білку 15,4 - 15,9 %. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017048 Псьол

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення сильна. Листок за розміром великий, зубці грубі, вушка помірні, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки слабе. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузькоюяцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,1 ц/га, Лісостепу 28,7 ц/га. Гарантована добавка 1,4 - 1,8 ц/га. Вміст жиру 50,6 %, білку 16,9%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017052 Русіч

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення сильна. Листок за розміром великий, зубці дрібні, вушка помірні, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - світлий. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плеската. Розмір сім'янки - середній, форма - вузькоюяцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 26,7 ц/га, Лісостепу 24,4 ц/га. Гарантована добавка 4,2 - 5,2 ц/га. Вміст жиру 48,3 - 50,0%, білку 16,3 - 17,4%. Гібрид стійкий до ураження хворобами, вилягання, осипання, посухи.

04017011 Сонячний настрій

Заявник: ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабка. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Лісостепу 25,8 ц/га, гарантована добавка 3,8 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 17,3%. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

® 05017019 Саша

Заявник: Агропромислова фірма "Флора" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Власник(и): Агропромислова фірма "Флора" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - антоціанове забарвлення відсутнє. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість відсутня або дуже слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - середня, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузько яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 29,0 ц/га, Лісостепу 31,2 ц/га. Гарантована добавка 4,1 - 6,6 ц/га. Вміст жиру 50,7 - 52,8 %, білку 16,0 - 16,4 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

03017025 Тріумф

Заявник: Державна научна установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)

Власник(и):

Підтримувач(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - видовжена, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 24,8 ц/га, гарантована добавка 3,0 ц/га. Вміст жиру 49,5%, білку 17,0%. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

® 05017005 Терра

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и): Євраліс Семанс

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика -

середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях відсутня або дуже слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 32,4 ц/га, Лісостепу 32,8 ц/га. Гарантована добавка 7,5 - 8,3 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 51,5 %, білку 16,2 - 17,8 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами незначне.

05017041 Термінатор

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення сильна. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - дуже довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузькояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 31,4 ц/га, Лісостепу 32,4 ц/га. Гарантована добавка 5,1 - 6,0 ц/га. Вміст жиру 50,5 - 51,0 %, білку 16,0 - 16,5 %. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017055 Форум

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 24,5 ц/га, Лісостепу 27,2 ц/га. Гарантована добавка 2,9 - 5,4 ц/га. Вміст жиру 48,6 - 52,3 %, білку 16,0 - 18,0 %. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

® 03017047 ЧаС

Заявник: Сумський національний аграрний університет

Власник(и): Сумський національний аграрний університет

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - світлий. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий сорт. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 21,6 ц/га, гарантована добавка 2,4 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 17,2%. Сорт відносно стійкий до вилягання, посухи, осипання. За період випробування ураження хворобами незначне.

® 04017042 Ясон

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці грубі, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - світлий. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,2 ц/га, в зоні Лісостепу 31,6 ц/га. Гарантована добавка 5,6-9,8 ц/га. Вміст жиру 48,0-49,4%, білку 17,0 - 17,6%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.

® 04018007 Аннушка

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"

Власник(и): Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від низької до середньої (51-70 см), з сірим опушенням. Листок світло-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок ланцетний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб сірий, за довжиною середній (40,0-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), овально-видовжена, жовта, рубчик сірий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) від дуже раннього до раннього.

Маса 1000 насінин 110-125 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Степу - 18,6, Лісостепу - 23,1 Полісся - 22,5 ц/га. Вміст жиру – 23,0 %, білку – 37,2 %.

Висота прикріплення нижнього бобу – 11,8 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи скоростиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу та Полісся.

® 04018013 Алмаз

Заявник: Білявська Людмила Григорівна

Власник(и): Білявська Людмила Григорівна

Полтавська державна аграрна академія

Підтримувач(і):

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту – індетермінантний. Форма куща проміжна. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від низької до середньої (51-70 см), з сірим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки заокруглений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб світлий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овально-видовжена, жовта, рубчик світло-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранній.

Маса 1000 насінин - 180-200 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 23,7. Вміст жиру – 23,6 %, білку – 36,8 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 12,5 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи ранньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

® 04018010 Анжеліка

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – проміжний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) середня (71-90 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок

широкоюйцевидний, за формою верхівки заокруглений, за розміром великий. Квітка біла. Біб коричневий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик темно-коричневий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранній.

Маса 1000 насінин - 203 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 22,5, Полісся - 20,8 ц/га. Вміст жиру - 23,4 %, білку - 37,6 %. Висота прикріплення нижнього бобу - 13,0 см. Напрямок використання - зерновий. Сорт відноситься до групи ранньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

04018005 Вілана

Заявник: Державна научна установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)

Власник(и):

Підтримувач(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту - індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з сірим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною середнє (7,0-12,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина куляста, жовта, рубчик світло-коричневий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) ранній.

Маса 1000 насінин - 162 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Степу - 19,8, Лісостепу - 26,3 ц/га. Вміст жиру - 23,3 %, білку - 38,0 %. Висота прикріплення нижнього бобу - 16,0 см. Напрямок використання - зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

® 04018014 Величава

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту - індетермінантний. Форма куща проміжна. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з сірим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок клиновидний, за формою верхівки загострений, великий за розміром. Квітка біла. Біб світлий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), за шириною вузький (<9,0), прямий. Насінина округло-випукла, жовта, рубчик світло-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середній.

Маса 1000 насінин - 165-175 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 23,8, Полісся - 20,3 ц/га. Вміст жиру - 23,4 %, білку - 36,6 %. Висота прикріплення нижнього бобу - 13,2 см. Напрямок використання - зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

® 04018015 Версія

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту – індетермінантний. Форма куща проміжна. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, за довжиною короткий (<40,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овальна, жовто-зелена, рубчик темно-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранніх.

Маса 1000 насінин - 165-170 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 25,9, Полісся - 21,6 ц/га. Вміст жиру – 22,6 %, білку – 37,0 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 14,0 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

® 03018016 Діона

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща проміжна. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від низької до середньої (51-70 см), з сірим опушенням. Листок світло-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок ланцетний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка біла. Біб світлий, за довжиною середній (40,0-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина округло-випукла, жовта, рубчик жовтий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) від дуже раннього до раннього.

Маса 1000 насінин - 166,6 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 22,0, Полісся - 22,6 ц/га. Вміст жиру – 22,3 %, білку – 36,1 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 12,0 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи ранньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

04018004 Дельта

Заявник: Державна научна установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)

Власник(и):

Підтримувач(і): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від низької до середньої (51-70 см), з сірим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною середнє (7,0-12,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, великий за розміром. Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), за шириною середній (9,1-12,0), серповидний. Насінина куляста, жовта, рубчик сірий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) від дуже раннього до раннього.

Маса 1000 насінин - 132 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 25,6 ц/га. Вміст жиру – 22,3 %, білку – 37,3 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 14,7 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

® 04018009 КиВін

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук
Власник(и): Інститут кормів Української академії аграрних наук
Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) середня (71-90 см), з сірим опушенням. Листок світло-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка біла. Біб сірий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), прямий. Насінина округло-випукла, жовта, рубчик темно-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранній.

Маса 1000 насінин - 146,3 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 21,1 ц/га. Вміст жиру – 23,2 %, білку – 36,2 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 13,3 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи ранньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

® 04018012 Мельпомена

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту – проміжний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, за довжиною короткий (<40,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик темно-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) пізній.

Маса 1000 насінин - 164,4 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 26,0 ц/га. Вміст жиру – 22,7 %, білку – 36,9 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 16,0 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

® 04018008 Омега вінницька

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук
Власник(и): Інститут кормів Української академії аграрних наук
Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, великий за розміром. Квітка біла. Біб світло-коричневий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик світло-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранній.

Маса 1000 насінин - 147 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 21,8 ц/га. Вміст жиру – 22,9 %, білку – 36,8 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 15,1 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання. Рекомендований для зони Лісостепу.

® 03018017 Прип'ять

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Соя - Сєвер Ко"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Соя - Сєвер Ко"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту – проміжний. Форма куща проміжна. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від низької до середньої (51-70 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок світло-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб коричневий, за довжиною середній (40,0-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик жовтий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) ранній.

Маса 1000 насінин - 156 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 23,8, Полісся - 20,4 ц/га. Вміст жиру – 23,1 %, білку – 37,0 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 11,6 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи ранньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання. Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

® 03018014 Скеля

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з сірим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, великий за розміром. Квітка біла. Біб світлий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), за шириною середній (9,1-12,0), прямий. Насінина округло-випукла, жовто-зелена, рубчик жовтий, лінійний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньопізній.

Маса 1000 насінин - 160-170 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 23,2 ц/га. Вміст жиру – 22,9 %, білку – 37,5 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 14,1 см. Напрямок використання – зерно-кормовий. Сорт відноситься до групи середньоранніх. Стійкий до посухи, вилягання, осипання. Рекомендований для зони Лісостепу.

Ріпак озимий

® 04016003 Аліот

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Колодій Юрій Антонович

Ситнік Ігор Данилович

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - вузька, довжиною - коротка. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - коротка. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - слабка.

Урожайність по зонах Степу - 38,0ц/га, Лісостепу - 34,0ц/га, Полісся - 40,0ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,5 - 8,5 ц/га. Стійкість до вилягання 8,3 - 9,0, засухи 7,9 - 8,7, осипання 8,0 - 8,5 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 8,6 - 8,9, бактеріозом 8,7-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом 8,7-9,0 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюкозинолатів 0,6-0,7%. Вміст жиру 45,5-49,8%, білку 21,6-23,9балів.

02016011 Анна

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середнього розміру. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Черешок листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середнього розміру. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність по зонах Лісостепу - 33,8ц/га, Полісся - 36,9ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,0 - 5,1 ц/га. Стійкість до вилягання 8,7 - 8,9 засухи 7,9 - 8,4, осипання 8,1 - 8,3 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 8,7 - 8,9, бактеріозом 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом 8,5-8,7 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюкозинолатів 0,7-0,8%. Вміст жиру 47,5-49,7%, білку 21,9-22,9балів.

® 04016004 Вектра

Заявник: "Рапс Г6Р" насіннєве господарство

Власник(и): "Рапс Г6Р" насіннєве господарство

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середнього розміру. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий, широкий з середньою кількістю часток. Черешок листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок короткий. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність по зонах Лісостепу - 35,8ц/га, Полісся - 38,5ц/га, гарантована прибавка відповідно 6,7 - 6,8 ц/га. Стійкість до вилягання 8,8 - 8,9 засухи 7,9 - 8,4, осипання 8,2 - 8,3 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 8,6 - 8,9, бактеріозом 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом 8,7-8,8 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюкозинолатів 0,7-0,8%. Вміст жиру 46,5-49,3%, білку 22,9-23,9балів.

® 04016007 Таурус**Заявник:** Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ**Власник(и):** Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ**Підтримувач(і):** Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною довгі, за шириною широкі. Листок темно-зелений, за довжиною довгий, за шириною широкий, зубчастість краю слабка. Час цвітіння середній. Рослина за висотою середня. Пелюстки квітки жовті, за довжиною довгі, за шириною середні. Стручок та його зубець довгий, довжина ніжки стручка середня. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби сильна.

Урожайність по зонах Лісостепу - 34,8ц/га, Полісся - 38,9ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,8-7,1 ц/га. Стійкість до вилягання 8,8 -9,0 засухи 7,9 - 8,2, осипання 8,2 -8,3 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 9,0, бактеріозом 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом 8,7-8,8 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюкозинолатів 0,3-0,4%. Вміст жиру 46,3-49,1%, білку 22,5 - 23,9балів.

Ріпак ярий**05016002 Кріс****Заявник:** Державна научна установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)**Власник(и):****Підтримувач(і):** Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною та довжиною середні. Зубчастість краю листка слабка. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - коротка. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітнього висіву помірна.

Урожайність по зонах Лісостепу - 25,8ц/га, Полісся - 28,4ц/га, гарантована прибавка відповідно 5,0-5,1 ц/га. Стійкість до вилягання 8,5 -8,9 засухи 7,5 - 8,0, осипання 8,1 -8,3 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 9,0, бактеріозом 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом 8,5-8,8 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюкозинолатів 0,3-0,4%. Вміст жиру 44,5-45,7%, білку 23,5 - 23,9балів.

® 03016011 Сріблястий 1**Заявник:** Національний аграрний університет**Власник(и):** Національний аграрний університет**Підтримувач(і):**

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною та довжиною середні. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з малою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки білий. Стручок середнього розміру. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітнього висіву відсутня або дуже слабка.

Урожайність по зонах Степу - 20,1Лісостепу - 24,7ц/га, Полісся - 27,6ц/га, гарантована прибавка відповідно 4,0-5,1 ц/га. Стійкість до вилягання 8,5 - 8,7 засухи 7,5 - 8,0, осипання 8,1 -8,3 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 9,0, бактеріозом 8,6-8,8 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом 8,5-8,8 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2-0,3%, глюкозинолатів 0,7-0,8%. Вміст жиру 43,7 - 45,5%, білку 21,5 - 22,9 балів.

Льон кудряш

® 06094002 Блакитно помаранчевий

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(и):

Рослина за висотою дуже низька (включаючи гілки), розмір віночка квітки середній, колір пелюсток за повного цвітіння фіолетовий, поздовжній згин пелюстки відсутній, забарвлення пиляка голубувате, розмір коробочки великий, маса 1000 насінин - велика, забарвлення насіння жовте. Початок цвітіння середній.

За даними заявника: Урожайність насіння 20 ц/га, маса 1000 насінин 9,2 г., вегетаційний період 90 днів. Вміст жиру 41,3%. Сорт відносно стійкий до посухи, стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами на рівні 8-9 балів.

05094002 ВНІІМК 620

Заявник: Державна научна установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)

Власник(и):

Підтримувач(и): Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Рослина за висотою середня (включаючи гілки), розмір віночка квітки середній, колір пелюсток за повного цвітіння світло-синій, поздовжній згин пелюстки відсутній, забарвлення пиляка сірувате, розмір коробочки середній, маса 1000 насінин - середня, забарвлення насіння коричневе. Початок цвітіння середній.

За даними заявника: Урожайність насіння 20,0 ц/га, маса 1000 насінин 8 г., вегетаційний період 80 днів. Вміст жиру 51%. Сорт стійкий до осипання та вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами на рівні 7-8 балів.

® 05094003 Ківіка

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Рослина за висотою низька (включаючи гілки), розмір віночка квітки малий, колір пелюсток за повного цвітіння фіолетовий, поздовжній згин пелюстки відсутній, забарвлення пиляка голубувате, розмір коробочки малий, маса 1000 насінин - мала, забарвлення насіння помірно-коричневе. Початок цвітіння ранній.

За даними заявника: Урожайність насіння 16,2 ц/га, маса 1000 насінин 6,5 г., вегетаційний період 82 дні. Вміст жиру 43%. Сорт відносно стійкий до вилягання та посухи, стійкий до осипання. Ураження хворобами на рівні 7-9 балів.

® 06094001 Надійний

Заявник: ДНУ "Донська дослідна станція ім. А.О. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур"

Власник(и): ДНУ "Донська дослідна станція ім. А.О. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур"
Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець"

Підтримувач(и):

Рослина за висотою висока (включаючи гілки), розмір віночка квітки великий, колір пелюсток за повного цвітіння блакитний, поздовжній згин пелюстки відсутній, забарвлення пиляка голубувате, розмір коробочки великий, маса 1000 насінин - велика, забарвлення насіння світло-коричнєве. Початок цвітіння середній.

За даними заявника: Урожайність насіння 28,2 ц/га, маса 1000 насінин 7,0 г., вегетаційний період 85 днів. Вміст жиру 50,0%. Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами на рівні 9 балів.

® 06094003 Симпатик

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Рослина за висотою середня (включаючи гілки), розмір віночка квітки середній, колір пелюсток за повного цвітіння рожевий, поздовжній згин пелюстки відсутній, забарвлення пиляка оранжево-рожеве, розмір коробочки великий, маса 1000 насінин - середня, забарвлення насіння темно-коричнєве. Початок цвітіння середній.

За даними заявника: Урожайність насіння 23 ц/га, маса 1000 насінин 6,4 г., вегетаційний період 82 дні. Вміст жиру 42%. Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами на рівні 8-9 балів.

Мак

® 05095002 Європейський

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"

Підтримувач(і):

Діаметр розетки середній, розгалуження стебла подвоєне, опушеність між коробочкою та верхівкою стебла середня, восковий наліт на стеблових листках слабкий, характер надрізів країв листків пилчастий, забарвлення пелюсток біле з плямими помірно- фіолетового кольору, розсічення пелюсток відсутнє, восковий наліт коробочки помірний, за формою поздовжнього розрізу коробочка широко-еліптична, форма основи плеската, діаметр середній, диск приймочки за формою блюдцеподібний, часточок багато, поверхня часточок ребриста, колір насіння голубуватий, час цвітіння середній, вміст морфіну низький.

За даними заявника: Урожайність насіння 1,4 ц/га, маса 1000 насінин 0,60 г, вегетаційний період 120 днів. Вміст жиру 60%, морфіну 0,04%. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 05095007 Каменя

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"

Підтримувач(і):

Діаметр розетки середній, розгалуження стебла подвоєне, опушеність між коробочкою та верхівкою стебла середня, восковий наліт на стеблових листках помірний, характер надрізів країв листків пилчастий, забарвлення пелюсток біле з плямими помірно- фіолетового кольору, характер розсічення пелюсток хвилястий, восковий наліт коробочки помірний, за формою поздовжнього розрізу коробочка кругла, форма основи плеската, діаметр середній, диск приймочки за формою блюдцеподібний, часточок багато, поверхня часточок ребриста, колір насіння сірий, час цвітіння середній, вміст морфіну низький.

За даними заявника: Урожайність насіння 1,5 ц/га, маса 1000 насінин 0,45 г, вегетаційний період 100 днів. Вміст жиру 54%, морфіну 0,04%. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

® 05095010 Шарго

Заявник: Агрофірма ім.Івана Франка

Власник(и): Агрофірма ім.Івана Франка

Підтримувач(і):

Діаметр розетки середній, розгалуження стебла потроєне, опушеність між коробочкою та верхівкою стебла відсутня або дуже слабка, восковий наліт на стеблових листках помірний, характер надрізів країв листків двічізубчастий, забарвлення пелюсток біле з плямими помірно- фіолетового кольору, розсічення пелюсток відсутнє, восковий наліт коробочки помірний, за формою поздовжнього розрізу коробочка кругла, форма основи плеската, діаметр середній, диск приймочки за формою блюдцеподібний, часточок середня кількість, поверхня часточок ребриста, колір насіння з блакитним відтінком, час цвітіння середній, вміст морфіну дуже низький..

За даними заявника: Урожайність 1,3 ц/га, маса 1000 насінин 0,55 г, вегетаційний період 110 днів. Вміст жиру 53%, морфіну 0,05%. Сорт відносно стійкий до вилягання, обсіпання, посухи. Ураження хворобами незначне.

Арахіс

® 06091001 Валар

Заявник: Дочірнє підприємство "Рейлін"

Власник(и): Дочірнє підприємство "Рейлін"
Кейджо, Інк.

Підтримувач(і):

Рослина сланка, головне стебло поникле, верхівки бічних гілок злегка повернуті догори, гілкування сильне, час досягання пізній, листкова пластинка за розміром середня, за кольором помірно-зелена, основна форма цвітіння з чергуванням, цвітіння на головному стеблі відсутнє, перетяжки на бобах середні, текстура поверхні бобів середня, гачок слабко виражений, кількість насінин у бобах середня, насіння за кольором насінної оболонки до переробки однокольорове, форма насіння циліндрична, розмір середній, маса 1000 шт. насінин середня.

За даними заявника: Урожайність зерна 42 ц/га, бобів 55 ц/га. Вага 100 насінин 59г., сорт середньостиглий. Вміст олії 47,7%, цукрів 4,3% Якість олії 7,7 балів. Ураження хворобами незначне.

® 06091002 Лінар 90

Заявник: Дочірнє підприємство "Рейлін"

Власник(и): Дочірнє підприємство "Рейлін"
Кейджо, Інк.

Підтримувач(і):

Рослина прямостояча, гілкування помірне, час досягання пізній, листкова пластинка за розміром середня, за кольором помірно-зелена, основна форма цвітіння з чергуванням, форма цвітіння на основному стеблі з чергуванням, перетяжки на бобах середні, текстура поверхні бобів тонка, гачок помірно виражений, насінин у бобах декілька, насіння за кольором насінної оболонки до переробки однокольорове, форма насіння циліндрична, розмір малий, маса 1000 шт. насінин мала.

За даними заявника: Урожайність зерна 25,5 ц/га, бобів 34 ц/га. Вага 100 насінин 46 г., сорт середньостиглий. Вміст олії 45,8%, цукрів 4,1%. Якість олії 7 балів. Ураження хворобами незначне.

Льон-довгунець

® 04015004 Борец

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "АНК"
Власник(и): Республіканське унітарне підприємство "Могильовська обласна сільськогосподарська дослідна станція"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "АНК"

Підтримувач(і):

Рослина за висотою низька. Стебло за довжиною дуже коротке. Квітка з блідо-блакитним віночком, пелюстки блакитно-фіолетові, пиляки голубуваті. Коробочка мала. Насінина помірно-коричнева. Час початку цвітіння-ранній.

Урожай соломки 51,2 ц/га, насіння 7,4 ц/га. Вміст всього волокна 27,3 %, довгого 19,3%. Середній номер волокна 14,8, відносно розривне навантаження 15,1 гс/текс. Сорт відносно стійкий до вилягання, оспання, посухи. Ураження хворобами на рівні 8 - 8,5 балів.

® 05015001 Батист

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
Власник(и): Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Рослина висока. Стебло довге. Квітка з білим віночком та пелюстками, пиляки сіруваті. Коробочка мала. Насінина помірно-коричнева. Час початку цвітіння-середній.

Урожайність соломки 50,9 ц/га, насіння 8,1 ц/га. Вміст всього волокна 15%, довгого 12%. Середній номер довгого волокна 12,3, відносно розривне навантаження 15,6 гс/текс. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами на рівні 7,9 - 8,3 балів.

03015001 Вручий

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою низька. Стебло за довжиною коротке. Квітка з блакитним віночком, фіолетовими пелюстками, пиляки сіруваті. Коробочка мала. Насінина помірно-коричнева. Час початку цвітіння-середній.

Урожай соломки 50,1 ц/га, насіння 7,2 ц/га. Вміст всього волокна 33,0%, довгого 19,8 %. Середній номер волокна 14,0; відносно розривне навантаження 22,4 гс/текс. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами на рівні 8 - 8,4 балів.

® 04015003 Довіра

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "АНК"
Власник(и): Республіканське унітарне підприємство "Могильовська обласна сільськогосподарська дослідна станція"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "АНК"

Підтримувач(и):

Рослина за висотою низька. Стебло за довжиною коротке. Квітка з блакитно-фіолетовими пелюстками, блідо-блакитним віночком, сіруватими пиляками. Коробочка мала. Насінина помірно-коричнева. Час початку цвітіння-середній.

Урожай соломки 50,9 ц/га, насіння 7,5 ц/га. Вміст всього волокна 26,4% , довгого волокна 18,1%. Середній номер волокна 13,6; відносне розривне навантаження 13,8 гс/текс. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами на рівні 7,8 - 8,2 балів.

® 04015002 Прамень

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "АНК"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "АНК"
Республіканське унітарне підприємство "Білоруський науково-дослідний інститут льону"

Підтримувач(и):

Рослина за висотою низька. Стебло коротке. Квітка з блакитно-фіолетовими пелюстками, блідо-блакитним віночком, сіруватими пиляками. Насінина помірно-коричнева. Час початку цвітіння-середній

Урожай соломки 50,2 ц/га, насіння 7,3 ц/га. Вміст всього волокна 27,5%, довгого 16,4%. Середній номер волокна 11,7, відносне розривне навантаження 14,0 гс/текс. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами на рівні 7,5 - 8,0 балів.

Коноплі

05014001 Гляна

Заявник: Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток з ланцетоподібною формою сім'ядолю, а антоціановим забарвленням гіпокотилля. Рослина однодомна, за висотою низька (181-229 см), верхівка зелена. Центральна частка листка за довжиною довга (<16,2 см), за шириною середня (2,2-2,7 см). Суцвіття за формою ромбічне, середньо компактне, за довжиною середнє (51-70,0 см), за шириною середнє (5,8-8,6), розміщення чоловічих квіток на квітконосному пагоні щільне (однодомні). Насінина сіра.

За даними заявника: Урожайність соломки 64,2 ц/га, насіння - 16 ц/га; вміст всього волокна 32,7%, довгого волокна 24,7 %. Середній номер волокна 1; розривне навантаження 34,2 кгс. Вміст ТГК 0,001 %. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками на рівні 8-9 балів.

05014002 Зоряна

Заявник: Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток з видовженою формою сім'ядолі, а антоціановим забарвленням гіпокотилля. Рослина однодомна, за висотою середня (230-278 см), верхівка зелена. Центральна частка листка за довжиною середня (14,3-16,2 см), за шириною середня (2,2-2,7 см). Суцвіття за формою ромбічне, високо компактне, за довжиною коротке (<51,0), вузьке (<5,8), розміщення чоловічих квіток на квітконосному пагоні щільне (однодомні). Насінина темно-сіра.

За даними заявника: Урожай соломки 89,8 ц/га, насіння 5,3 ц/га. Вміст всього волокна 29,3%, довгого 22,4 %. Розривне навантаження 26,7 кгс, вміст

ТГК 0,02 %. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками на рівні 8-9 балів.

Бавовник

® 06366002 Валент

Заявник: Дочірнє підприємство "Рейлін"

Власник(и): Кейджо, Інк.
Дочірнє підприємство "Рейлін"

Підтримувач(і):

Рослина за висотою низька, за формою циліндрична. Стебло темно-зелене, сильно опушене у верхній частині. Листок за розміром середній, дуже сильно опушений. Квітка з кремовим забарвленням пелюсток і пилку. Плодова гілка за довжиною середня. Коробочка яйцевидна, ступінь відкриття помірний. Волокно біле, за довжиною середнє.

За даними заявника: Урожайність сирцю 22,0 ц/га, насіння 9,5 ц/га, волокна 12,5 ц/га. Вегетаційний період 155 днів. Штапельна довжина 18,6 мм., розривне навантаження 3,7 кгс. Сорт стійкий до вилягання і посухи; ураження хворобами та пошкодження шкідниками на рівні 7 балів.

® 03366001 Підозерський 4

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослина за висотою середня, за формою конічна. Стебло рожево-зелене. Листок помірно-зелений, за формою лопатевий, за розміром малий. Квітка з кремовим забарвленням пелюсток, темно-жовтими пилками. Плодова гілка за довжиною середня. Коробочка кругла, ступінь відкриття сильний. Волокно біле, за довжиною середнє.

За даними заявника: Урожайність сирцю 19,2 ц/га, насіння 9,6 ц/га, волокна 7,3 ц/га. Вегетаційний період 117 днів. Штапельна довжина 28,8 мм., розривне навантаження 4,8 кгс. Сорт стійкий до посухи, вилягання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками на рівні 8 - 9 балів.

® 06366001 Рейкот 22

Заявник: Дочірнє підприємство "Рейлін"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою низька, за формою циліндрична. Стебло темно-зелене, помірно опушене у верхній частині. Листок темно-зелений, за формою пальчастий, за розміром середній, помірно опушений. Квітка з кремовим забарвленням пелюсток і пилку. Плодова гілка за довжиною середня. Коробочка яйцевидна, ступінь відкриття помірний. Волокно біле, за довжиною середнє.

За даними заявника: Урожай сирцю 23,3 ц/га, насіння 17,0 ц/га, волокна 14,0 ц/га. Вегетаційний період 155 днів. Штапельна довжина 28,7 мм, розривне навантаження 4,1 кгс. Сорт стійкий до вилягання та посухи; ураження хворобами та пошкодження шкідниками на рівні 7 балів.

Сільськогосподарські: буряк

Буряк цукровий

03013022 Боруґа

Заявник: Сингента Сідс АБ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток із слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки вертикальний. Листок середньої довжини. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною, з слабкою хвилястістю країв та слабо гофрованою поверхнею. Форма верхівки тупа. Черешок дуже вузький за шириною, зеленого кольору, з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру, середній за довжиною, вузькоконічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайного типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 597 ц/га, Лісостепу 549 ц/га, Полісся 568 ц/га, цукристість відповідно 17,0; 16,8; 17,6%, збір цукру з гектара відповідно 102,3; 92,4; 101,1 ц. Втрати цукру в мелясі 1,4-1,6%.

Гібрид стійкий до цвітущості та ураження коренеїдом. Характеризується інтенсивним стартовим ростом і розвитком. Рекомендований для середніх та пізніх строків збирання. Придатність до механізованого збирання 6,9-8,3 бала.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

04013012 Бакара

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток із сильним антоціановим забарвленням. Розетка напівпохилого типу. Листок середньої довжини. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною із помірною хвилястістю країв та помірно гофрованою поверхнею, верхівка гостра. Черешок середньої ширини, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 605 ц/га, Лісостепу 578 ц/га, Полісся 573 ц/га, цукристість відповідно 17,0; 17,1; 16,7%, збір цукру з гектара відповідно 103,5; 99,0; 96,1 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5-1,6%.

Гібрид стійкий до різоманії, цвітущості, ризоктоніозу, борошнистої роси та ураження коренеїдом. Толерантність до церкоспорозу середньовисока. Характеризується інтенсивним стартовим ростом і розвитком. Придатність до механізованого збирання 7,4-8,1 бала.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

03013012 Вінцент

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки напівпохилий. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка за довжиною коротка, за шириною вузька з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру середньої довжини, ширококонічної форми, повністю

заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 629 ц/га, Лісостепу 567 ц/га, Полісся 590 ц/га, цукристість відповідно 16,8; 17,0; 17,2%, збір цукру з гектара відповідно 106,6; 96,8; 101,4 ц. Втрати цукру в мелясі 1,4-1,6%.

Гібрид стійкий до ризоманії та цвітушності, толерантний до церкоспорозу та ураження коренеїдом. Має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

03013012 Вінцент

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплідний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки напівпохилий. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка за довжиною коротка, за шириною вузька з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру середньої довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	106,6	96,8	101,4
Гарантована прибавка: ц/га	9,1	15,5	16,1
%	9,3	19,1	18,9
Урожайність коренеплодів, ц/га	629	567	590
Цукристість, %	16,8	17,0	17,2
Вихід цукру: %	14,4	14,6	14,9
ц/га	94,5	84,4	92,4
Вміст розчинної золи, %	0,4	0,4	0,4
Втрати цукру в мелясі, %	1,5	1,6	1,4
Придатність до механізованого збирання, бал.	7,9	8,1	6,9
Стійкість до цвітушності, б	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеїдом, б	1,0	3,0	3,7
Стійкість до церкоспорозу, б	5,8	6,7	6,3

03013016 Газета

Заявник: Сингента Сідс АБ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплідний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток із слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки вертикальний. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка за довжиною коротка, за шириною вузька з слабкою хвилястістю країв та з гладенькою поверхнею. Листкова пластинка характеризується сильною інтенсивністю зеленого забарвлення. Верхівка гостра. Черешок середній за шириною, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, короткий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайного типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 560 ц/га, Лісостепу 494 ц/га, Полісся 509 ц/га, цукристість відповідно 17,7; 17,3; 17,6%, збір цукру з гектара відповідно 101,4; 85,6; 90,4 ц. Втрати цукру в мелясі 1,4-1,6%.

Гібрид стійкий до цвітущості та ураження коренеїдом. Рекомендований для пізніх строків збирання. Придатність до механізованого збирання 7,4-8,6 бала. Характеризується доброю лежкістю.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

03013016 Газета

Заявник: Сингента Сідс АБ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток із слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки вертикальний. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка за довжиною коротка, за шириною вузька з слабкою хвилястістю країв та з гладенькою поверхнею. Листкова пластинка характеризується сильною інтенсивністю зеленого забарвлення. Верхівка гостра. Черешок середній за шириною, зеленого кольору з білуватозеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, короткий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	101,1	85,6	90,4
Гарантована прибавка: ц/га	3,6	4,3	5,1
%	3,7	5,3	6,0
Урожайність коренеплодів, ц/га	560	494	509
Цукристість, %	17,7	17,3	17,6
Вихід цукру: %	14,8	14,8	15,5
ц/га	81,5	71,4	78,1
Вміст розчинної золи, %	0,4	0,4	0,4
Втрати цукру в мелясі, %	1,5	1,6	1,4
Придатність до механізованого збирання, бал.	8,7	8,4	7,3
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеїдом, б	1,0	4,3	3,7
Стійкість до церкоспорозу, б	5,5	7,2	5,4
Гібрид урожайного типу.			

03013023 Делеїта

Заявник: Сингента Сідс АБ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка вертикального типу. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною з помірною хвилястістю країв та помірно гофрованою поверхнею. Форма верхівки тупа. Черешок вузький за шириною, зеленого кольору з білуватозеленим забарвленням в основі. Коренеплід короткий за довжиною, веретеноподібної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 547 ц/га, Лісостепу 533 ц/га, Полісся 496 ц/га, цукристість відповідно 17,8; 17,4; 17,8%, збір цукру з гектара відповідно 98,3; 92,8; 88,6 ц. Втрати цукру в мелясі 1,3-1,6%.

Гібрид стійкий до цвітущості та ураження коренеїдом. Придатність до механізованого збирання 6,4-8,6 бала.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

03013025 Зоряний

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська насіннева компанія"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з сильно вираженим антоціановим забарвленням. Розетка напіврозлогого типу. Листок середній за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною із слабкою хвилястістю країв та помірно гофрованою поверхнею. Черешок вузький, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплідів у зоні Степу становила 579 ц/га, Лісостепу 530 ц/га, Полісся 537 ц/га, цукристість відповідно 17,4; 17,3; 18,0%, збір цукру з гектара відповідно 101,7; 92,4; 97,6 ц. Втрати цукру в мелясі 1,6-1,9%.

Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренеїдом. Придатність до механізованого збирання 7,0-8,1 бала.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

03013025 Зоряний

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська насіннева компанія"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з сильно вираженим антоціановим забарвленням. Розетка напіврозлогого типу. Листок середній за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною із слабкою хвилястістю країв та помірно гофрованою поверхнею. Черешок вузький, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	101,7	92,1	97,6
Гарантована прибавка: ц/га	4,2	10,9	12,3
%	4,3	13,4	14,4
Урожайність коренеплідів, ц/га	579	530	537
Цукристість, %	17,4	17,3	18,0
Вихід цукру: %	14,6	14,8	15,3
ц/га	87,2	80,5	82,1
Вміст розчинної золи, %	0,5	0,5	0,4
Втрати цукру в мелясі, %	1,7	1,9	1,6
Придатність до механізованого збирання, бал.	7,9	8,1	7,0
Стійкість до цвітушності, б	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеїдом, б	1,0	2,5	3,0
Стійкість до церкоспорозу, б	6,1	7,7	5,8

01013030 Казино

Заявник: Даніско Сід ГмбХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з слабо вираженим антоціановим забарвленням. Тип розетки напіврозлогий. Листок за довжиною середній. Листкова пластинка за довжиною середня, за шириною вузька з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок білий, вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, середній за довжиною, вузькоконічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайного типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 562 ц/га, Лісостепу 528 ц/га, Полісся 570 ц/га, цукристість відповідно 16,8; 16,5; 18,4%, збір цукру з гектара відповідно 94,1; 87,8; 105,2 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5-2,1%.

Гібрид стійкий до ризоманії та цвітущості, толерантний до церкоспорозу та ураження коренеїдом. Має хорошу придатність до механізованого збирання та висока технологічна якість.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

03013010 Класика

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Тип розетки напіврозлогий. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка за довжиною коротка, за шириною вузька, з помірно гофрованою поверхнею, хвилястість країв помірна. Черешок зелений, вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру, довгий за довжиною, циліндрично-конічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 573 ц/га, Лісостепу 567 ц/га, Полісся 513 ц/га, цукристість відповідно 16,4; 17,1; 16,9%, збір цукру з гектара відповідно 94,6; 97,0; 87,8 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5-1,6%.

Гібрид стійкий до цвітущості, толерантний до ураження коренеїдом. Має хорошу придатність до механізованого збирання та високу технологічну якість.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостеп та Полісся.

03013010 Класика

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Тип розетки напіврозлогий. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка за довжиною коротка, за шириною вузька, з помірно гофрованою поверхнею, хвилястість країв помірна. Черешок зелений, вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру, довгий за довжиною, циліндрично-конічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	94,6	97,0	87,8
Гарантована прибавка: ц/га	-2,6	15,7	2,5
%	-3,0	19,4	3,0
Урожайність коренеплодів, ц/га	573	567	513
Цукристість, %	16,4	17,1	16,9
Вихід цукру: %	14,1	14,8	14,6

ц/га	83,1	85,0	77,2
Вміст розчинної золи, %	0,4	0,4	0,4
Втрати цукру в мелясі, %	1,5	1,6	1,5
Придатність до механізованого збирання, бал.	7,9	7,9	6,5
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураження коренейдом, б	1,0	3,0	2,5
Стійкість до церкоспорозу, б	4,9	6,7	6,1

04013020 Кармеліта

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка напіврозлогого типу. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною з помірною хвилястістю країв, поверхня помірно гофрована, форма верхівки тупа. Черешок середньої ширини, зеленого кольору з білуватим-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середньої довжини, вузькоконічної форми, повністю заглиблений у ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2005-2006) середня врожайність коренеплідів у зоні Степу становила 588 ц/га, Лісостепу 575 ц/га, Полісся 582 ц/га, цукристість відповідно 18,1; 18,0; 17,7%, збір цукру з гектара відповідно 107,3; 103,8; 103,6 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5-1,7%.

Гібрид стійкий до різоманії, цвітущості та ураження коренейдом. Придатність до механізованого збирання 6,8-7,8 бала.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

04013020 Кармеліта

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка напіврозлогого типу. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною з помірною хвилястістю країв, поверхня помірно гофрована, форма верхівки тупа. Черешок середньої ширини, зеленого кольору з білуватим-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середньої довжини, вузькоконічної форми, повністю заглиблений у ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	107,3	103,8	103,6
Гарантована прибавка: ц/га	9,8	22,5	18,2
%	10,1	27,7	21,4
Урожайність коренеплідів, ц/га	588	575	582
Цукристість, %	18,1	18,0	17,7
Вихід цукру: %	15,3	16,3	15,0
ц/га	92,0	91,7	94,4
Вміст розчинної золи, %	0,4	0,4	0,4
Втрати цукру в мелясі, %	1,7	1,6	1,5
Придатність до механізованого збирання, бал.	7,2	7,8	6,8

Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеюдом, б	1,0	4,1	2,0
Стійкість до церкоспорозу, б	5,3	7,6	5,7

05013002 Каньйон

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка напіврозлогого типу. Листок середньої довжини. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною з слабкою хвилястістю країв, поверхня сильно гофрована, форма верхівки тупа. Черешок вузький за шириною, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середній за розміром, довгий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений у ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2005-2006) середня врожайність коренеплідів у зоні Степу становила 607 ц/га, Лісостепу 624 ц/га, Полісся 562 ц/га, цукристість відповідно 17,4; 18,0; 17,8%, збір цукру з гектара відповідно 106,2; 112,1; 101,1 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5-1,8%.

Гібрид стійкий до різоманії, цвітущості та ураження коренеюдом. Толерантність до церкоспорозу середня. Характеризується високою початковою швидкістю росту. Придатність до механізованого збирання 6,0-8,5 бала.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

05013002 Каньйон

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка напіврозлогого типу. Листок середньої довжини. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною з слабкою хвилястістю країв, поверхня сильно гофрована, форма верхівки тупа. Черешок вузький за шириною, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середній за розміром, довгий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений у ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	106,2	112,1	101,1
Гарантована прибавка: ц/га	8,8	30,9	15,8
%	9,0	38,0	18,5
Урожайність коренеплідів, ц/га	607	624	562
Цукристість, %	17,4	18,0	17,8
Вихід цукру: %	14,9	15,6	15,0
ц/га	90,5	100,4	90,1
Вміст розчинної золи, %	0,4	0,5	0,4
Втрати цукру в мелясі, %	1,6	1,8	1,5
Придатність до механізованого збирання, бал.	8,5	8,3	6,0
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеюдом, б	1,0	1,9	3,4
Стійкість до церкоспорозу, б	6,3	7,8	5,8

Гібрид урожайного типу, стійкий до ризоманії. Толерантність до церкоспорозу середня.

03013015 Ліbero

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка напівпохила. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною з помірною хвилястістю країв та помірно гофрованою поверхнею. Форма верхівки тупа. Черешок за шириною вузький, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, середньої довжини, вузькоконічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 670 ц/га, Лісостепу 581 ц/га, Полісся 548 ц/га, цукристість відповідно 16,6; 16,7; 17,0%, збір цукру з гектара відповідно 111,7; 97,4; 93,6 ц. Втрати цукру в мелясі 1,4-1,5%. Гібрид стійкий до церкоспорозу, ризоманії, цвітушності та ураження коренеїдом. Придатність до механізованого збирання 7,0-8,3 бала. Рекомендований для вирощування на всій території України.

03013014 Мозаїк

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток із слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки напіврозлогий. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка великого розміру, коротка за довжиною і вузька за шириною із слабкою хвилястістю країв, поверхня слабо гофрована, форма верхівки тупа. Черешок зеленого кольору, вузький за шириною, з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середній за розміром, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 585 ц/га, Лісостепу 537 ц/га, Полісся 511 ц/га, цукристість відповідно 17,2; 17,3; 17,8%, збір цукру з гектара відповідно 101,4; 93,5; 91,0 ц. Втрати цукру в мелясі 1,4-1,5%. Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренеїдом. Придатність до механізованого збирання 7,4-8,6 бала. Рекомендований для вирощування на всій території України.

03013014 Мозаїк

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток із слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки напіврозлогий. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка великого розміру, коротка за довжиною і вузька за шириною із слабкою хвилястістю країв, поверхня слабо гофрована, форма верхівки тупа. Черешок зеленого кольору, вузький за шириною, з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середній за розміром, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	101,4	93,5	91,0
Гарантована прибавка: ц/га	3,9	12,2	5,7

	%	4,0	15,0	6,7
Урожайність коренеплодів, ц/га		585	537	511
Цукристість, %		17,2	17,3	17,8
Вихід цукру: %		14,7	15,1	15,3
	ц/га	89,1	82,6	80,3
Вміст розчинної золи, %		0,4	0,4	0,4
Втрати цукру в мелясі, %		1,4	1,5	1,4
Придатність до механізованого збирання, бал.		8,6	8,1	7,4
Стійкість до цвітущості, б		9,0	9,0	9,0
Ураження коренеїдом, б		1,0	3,7	3,0
Стійкість до церкоспорозу, б		5,6	7,1	5,4

03013009 Настя

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетки напіврозлога. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка коротка за довжиною вузька за шириною з сильною хвилястістю країв та сильно гофрованою поверхнею. Форма верхівки тупа. Листкова пластинка характеризується слабкою інтенсивністю зеленого забарвлення. Черешок вузький за шириною, білого кольору з білуватим-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, середньої довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 564 ц/га, Лісостепу 561 ц/га, Полісся 597 ц/га, цукристість відповідно 16,9; 17,0; 17,6%, збір цукру з гектара відповідно 96,7; 95,9; 106,2 ц. Втрати цукру в мелясі 1,4-1,7%.

Гібрид стійкий до цвітущості, толерантний до ураження коренеїдом. Придатність до механізованого збирання 6,6-8,4 бала.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостеп та Полісся.

05013007 Портланд

Заявник: Насіннєва компанія Ласн Сідс Лімітед

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка розлогого типу. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середньої ширини з слабкою хвилястістю країв, поверхня слабко гофрована, форма верхівки тупа. Черешок середньої ширини, зеленого кольору з білуватим-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід довгий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений у ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2005-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 582 ц/га, Лісостепу 591 ц/га, Полісся 597 ц/га, цукристість відповідно 17,8; 17,9; 17,8%, збір цукру з гектара відповідно 104; 105,7; 109,4 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5-1,7%.

Гібрид стійкий до цвітущості та ураження коренеїдом. Придатність до механізованого збирання 5,8-7,7 бала. Рекомендований для вирощування на всій території України.

05013007 Портланд

Заявник: Насіннєва компанія Ласн Сідс Лімітед

Власник(и):

250

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка розлогого типу. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середньої ширини з слабкою хвилястістю країв, поверхня слабо гофрована, форма верхівки тупа. Черешок середньої ширини, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід довгий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений у ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	104	105,7	109,4
Гарантована прибавка: ц/га	6,5	24,4	24,0
%	6,7	30,1	28,2
Урожайність коренеплодів, ц/га	582	591	597
Цукристість, %	17,8	17,9	17,8
Вихід цукру: %	15,4	15,8	15,1
ц/га	90,9	103,1	92,0
Вміст розчинної золи, %	0,5	0,4	0,4
Втрати цукру в мелясі, %	1,7	1,6	1,5
Придатність до механізованого збирання, бал.	7,7	7,6	5,8
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеїдом, б	1,0	2,5	2,6
Стійкість до церкоспорозу, б	6,7	7,6	5,8

® 04013010 Ризольт

Заявник: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки напіврозлогий. Листок середній за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована, форма верхівки гостра. Черешок зелений, середній за шириною з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, вузькоконічної форми, на 3/4 заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 569 ц/га, Лісостепу 467 ц/га, Полісся 459 ц/га, цукристість відповідно 17,1; 16,7; 17,3%, збір цукру з гектара відповідно 98,2; 78,2; 80,3 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5-1,7%. Гібрид стійкий до ризоманії та цвітущості, толерантний до ураження коренеїдом. Має хорошу придатність до механізованого збирання. Рекомендований для вирощування в Степовій зоні.

03013011 Сніжана

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з слабким антоціановим забарвленням. Розетка розлога. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка вузька за шириною та коротка за довжиною з помірною хвилястістю країв, слабо гофрована. Черешок зелений, за шириною

вузький з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру, довгий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплідів у зоні Степу становила 549 ц/га, Лісостепу 550 ц/га, Полісся 621 ц/га, цукристість відповідно 16,8; 16,9; 17,9%, збір цукру з гектара відповідно 93,3; 93,3; 111,6 ц. Втрати цукру в мелясі 1,2-1,8%.

Гібрид стійкий до ризоманії, цвітущості та ураження коренеїдом толерантний до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання 6,6-8,3 бала.

Рекомендований для вирощування у Лісостеповій та Поліській зонах.

03013011 Сніжана

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з слабким антоціановим забарвленням. Розетка розлога. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка вузька за шириною та коротка за довжиною з помірно хвилястістю країв, слабо гофрована. Черешок зелений, за шириною вузький з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру, довгий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	93,3	93,3	111,6
Гарантована прибавка: ц/га	-4,2	12,0	26,3
%	-4,3	14,7	30,8
Урожайність коренеплідів, ц/га	549	550	621
Цукристість, %	16,8	16,9	17,9
Вихід цукру: %	14,8	14,6	15,7
ц/га	84,1	81,3	101,7
Вміст розчинної золи, %	0,3	0,5	0,4
Втрати цукру в мелясі, %	1,2	1,8	1,4
Придатність до механізованого збирання, бал.	8,3	8,3	6,6
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеїдом, б	1,0	3,0	1,8
Стійкість до церкоспорозу, б	4,7	7,0	5,9

03013021 Травіата

Заявник: Сингента Сідс АБ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток із слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки напіврозлогий. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка велика, довга за довжиною та вузька за шириною, з слабкою хвилястістю країв, слабо гофрована, з сильною інтенсивністю зеленого забарвлення, верхівка тупа. Черешок зелений, з білувато-зеленим забарвленням в основі, за шириною вузький. Коренеплід великого розміру, довгий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплідів у зоні Степу становила 591 ц/га, Лісостепу 529 ц/га, Полісся 512 ц/га, цукристість відповідно 17,2; 17,4; 18,0%, збір цукру з гектара відповідно 102,8; 91,9; 93,4 ц. Втрати цукру в мелясі 1,4-1,6%.

Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренеїдом. Придатність до механізованого збирання 7,1-8,2 бала. Рекомендується для ранніх та середніх строків збирання.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

03013021 Травіата

Заявник: Сингента Сідс АБ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток із слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки напіврозлогий. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка велика, довга за довжиною та вузька за шириною, з слабкою хвилястістю країв, слабо гофрована, з сильною інтенсивністю зеленого забарвлення, верхівка тупа. Черешок зелений, з білувато-зеленим забарвленням в основі, за шириною вузький. Коренеплід великого розміру, довгий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	102,8	91,9	93,4
Гарантована прибавка: ц/га	5,3	10,6	8,1
%	5,4	13,1	9,5
Урожайність коренеплодів, ц/г	591	529	512
Цукристість, %	17,2	17,4	18,0
Вихід цукру: %	14,6	15,0	15,8
ц/га	86,7	77,9	77,9
Вміст розчинної золи, %	0,4	0,4	0,4
Втрати цукру в мелясі, %	1,5	1,6	1,4
Придатність до механізованого збирання, бал.	8,0	8,2	7,1
Стійкість до цвітушності, б	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеїдом, б	1,0	4,3	3,0
Стійкість до церкоспорозу, б	6,3	6,6	6,3

Гібрид цукристого типу.

05013005 Хамбер

Заявник: Насіннєва компанія Лаєн Сідс Лімітед

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з слабким антоціановим забарвленням. Розетка розлогого типу. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною з помірною хвилястістю країв, поверхня помірно гофрована, форма верхівки тупа. Черешок середньої ширини, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, короткий за довжиною, циліндрично-конічної форми, повністю заглиблений у ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2005-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 617 ц/га, Лісостепу 568 ц/га, Полісся 599 ц/га, цукристість відповідно 18,4; 17,8; 18,7%, збір цукру з гектара відповідно 114; 101,3; 114,1 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5-1,8%. Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренеїдом. Придатність до механізованого збирання 7,0-7,7 бала.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

04013027 Яриса

Заявник: Кутновска Годовла Бурака Цукрового Сп. з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка вертикального типу. Листок середньої довжини. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною з помірною хвилястістю країв, поверхня помірно гофрована, форма верхівки тупа. Черешок середньої ширини, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середньої довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений у ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2005-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 571 ц/га, Лісостепу 532 ц/га, Полісся 457 ц/га, цукристість відповідно 17,4; 17,4; 17,0%, збір цукру з гектара відповідно 99,6; 92,6; 78,6 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5-1,8%.

Гібрид стійкий до цвітущості та ураження коренеїдом. Толерантність до церкоспорозу середня. Придатність до механізованого збирання 6,7-8,5 бала.

Рекомендований для вирощування у Степовій та Лісостеповій зонах.

04013028 Япола

Заявник: Кутновска Годовла Бурака Цукрового Сп. з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка розлогого типу. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною з помірною хвилястістю країв, поверхня сильно гофрована, форма верхівки тупа. Черешок середньої ширини, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру, довгий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений у ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2005-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 575 ц/га, Лісостепу 527 ц/га, Полісся 424 ц/га, цукристість відповідно 17,3; 17,4; 17,0%, збір цукру з гектара відповідно 100,2; 91,4; 73,4 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5-1,8%.

Гібрид стійкий до цвітущості та ураження коренеїдом. Придатність до механізованого збирання 6,3-8,3 бала.

Рекомендований для вирощування у Степовій та Лісостеповій зонах.

Буряк кормовий**05046002 Бізон Полі**

Заявник: Грамінекс-Насіона Сп.з о.о

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина триплід. Тип ростковості багаторостковий. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка за розміром середня, за шириною широка з помірно інтенсивністю зеленого забарвлення. Форма верхівки тупа. Черешок за шириною середній, забарвлення основи світло-оранжеве. Коренеплід великого розміру, середній за довжиною, ширококонічної форми, наполовину загнблений в ґрунт.

За роки випробування (2005-2006) середня врожайність коренеплідів у зоні Степу становила 811ц/га, Лісостепу 775ц/га, Полісся 704 ц/га, вміст сухої речовини відповідно 15,2,; 15,4; 13,3%.

Сорт слабо уражується коренеїдом та церкоспорозом.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Сільськогосподарські: картопля**Картопля****02031005 Аріелль**

Заявник: Агріко Кооператив Б.А.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - напівпрямий, середньої висоти, листового типу. Листок - помірно зеленого кольору, закритого типу. Віночок квітки -білого кольору. Бульби - жовті, овально-округлої форми з неглибокими вічками, поверхня шкірки - гладенька. М'якуш - жовтий.

Урожайність, ц/га: С.- 271,0; Л.- 285,8; П.- 361,3. Гарантована прибавка, ц/га: С.- 54,1; Л.- 53,9; П.- 81,8. Гарантована прибавка, %: С.- 24,9; Л.- 23,3; П.- 29,3. Вміст крохмалю, %: С.- 11,7; Л.- 12,8; П.- 14,8. Збір крохмалю, ц/га: С.- 31,5; Л.- 32,8; П.- 47,4. Вегетаційний період, днів: С.- 100; Л.- 103; П.- 105. Маса бульб, гр: С.- 96; Л.- 87; П.- 96. Смакові якості, бал: С.- 6,5; Л.- 6,6; П.- 6,3. Група стиглості - середньоранній. Напрямок використання - столовий.

® 03031008 Довіра

Заявник: Інститут картоплярства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут картоплярства Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Кущ - напівпрямий, середньої висоти, листового типу. Листок - темно зелений, закритого типу. Віночок квітки - темно червоно-фіолетовий. Бульби - червоні з червоними вічками, овально-округлої форми, поверхня шкірки - гладенька. М'якуш -білий.

Урожайність, ц/га: П.- 326,6. Гарантована прибавка, ц/га: П.- 47,2. Гарантована прибавка, %: П.- 16,9. Вміст крохмалю, %: П.- 17,1. Збір крохмалю, ц/га: П.- 52,3. Вегетаційний період, днів: П.- 105. Маса бульб, гр: П.- 99. Смакові якості, бал: П.- 7,2. Група стиглості - середньоранній. Напрямок використання - столовий.

04031011 Карлик 04

Заявник: Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Куц - напівпрямий, низький. Стебло - тонке, без антоціану. Листок - помірно зеленого забарвлення, середнього розміру, проміжного типу. Віночок квітки - світло червоно - фіолетового кольору, яскравість квіток - велика. Бульби - овально-округлої форми, з гладенькою жовтою шкіркою. М'якуш - білий.

Урожайність, ц/га: С.- 223,6; Л.- 251,2; П.- 294,4. Гарантована прибавка, ц/га: С.- 19,6; Л.- 29,9; П.- 27,4. Гарантована прибавка, %: С.- 9,6; Л.- 13,5; П.- 10,3. Вміст крохмалю, %: С.- 15,1; Л.- 15,6; П.- 15,3. Збір крохмалю, ц/га: С.- 33,4; Л.- 35,7; П.- 42,4. Вегетаційний період, днів: С.- 86; Л.- 91; П.- 93. Маса бульб, гр: С.- 70, Л.- 81, П.- 80. Смакові якості, бал: С.- 6,3; Л.- 7,1; П.- 6,9. Група стиглості - ранньостиглий. Напрямок використання - столовий.

® 03031004 Левада

Заявник: Інститут картоплярства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут картоплярства Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Куц - напівпрямий, стебловий типу, середньої висоти. Листок - помірно зеленого кольору, закритого типу. Віночок квітки - блакитно-фіолетовий. Бульби - рожеві, округлої форми з червоними, середньої глибини вічками, поверхня шкірки - слабкошерхата. М'якуш - жовтий.

Урожайність, ц/га: П.- 299,2. Гарантована прибавка, ц/га: П.- 19,7. Гарантована прибавка, %: П.- 7,1. Вміст крохмалю, %: П.- 20,4. Збір крохмалю, ц/га: П.- 52,9. Вегетаційний період, днів: П.- 103. Маса бульб, гр: П.- 89. Смакові якості, бал: П.- 8,3. Група стиглості - середньоранній. Напрямок використання - столовий.

® 04031005 Легенда

Заявник: Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Куц - прямий, високий, проміжного типу із слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - темно - зеленого кольору, відкритого типу. Віночок квітки - червоно-фіолетового кольору. Бульби - рожеві, овальної форми з неглибокими червоними вічками, поверхня шкірки - слабкошерхата. М'якуш - кремовий.

Урожайність, ц/га: С.- 314,0; Л.- 235,9; П.- 328,7. Гарантована прибавка, ц/га: С.- 97,1; Л.- 4,1; П.- 49,2. Гарантована прибавка, %: С.- 44,8; Л.- 1,8; П.- 17,6. Вміст крохмалю, %: С.- 11,2; Л.- 14,7; П.- 14,0. Збір крохмалю, ц/га: С.- 35,4; Л.- 29,6; П.- 39,3. Вегетаційний період, днів: С.- 112; Л.- 115; П.- 117. Маса бульб, гр: С.- 117; Л.- 89; П.- 103. Смакові якості, бал: С.- 7,0; Л.- 7,0; П.- 9,0. Група стиглості - середньостиглий. Напрямок використання - столовий.

02031003 Марлен

Заявник: Агріко Кооператив Б.А.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Куц - розлогий, середньої висоти, проміжного типу із слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - помірно- зеленого кольору, проміжного типу. Віночок квітки - білого кольору. Бульби - жовті, округлої форми з неглибокими вічками. М'якуш - жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.-294,5 ц/га; П.-303,6 ц/га. Гарантована прибавка, ц/га: Л.-58,5 ц/га; П.- 38,5 ц/га. Гарантована прибавка,%: Л.- 24,8%, П.-14,5%. Вміст крохмалю,%: Л.-16,2%, П.-15,5%. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 42,9 ц/га; П.- 44,4 ц/га. Вегетаційний період, днів: Л.-115 днів, П.- 117 днів. Маса бульб, гр: Л.- 94 гр; П.- 92 гр. Смакові якості , бал: Л.- 7,1 бала, П.- 7,9 бала. Група стиглості - середньостиглий. Напрямок використання - столовий.

® 04031009 Нагорода

Заявник: Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче об'єднання "Чернігівеліткартопля"

Власник(и): Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче об'єднання "Чернігівеліткартопля"

Підтримувач(и):

Куц - високий, прямий, стеблового типу. Листок - світло зеленого забарвлення, великий, проміжного типу. Віночок квітки - світло червоно-фіолетовий. Бульби - жовтого кольору, овально-округлої форми, поверхня шкірки слабошерхата. М'якуш жовтого кольору.

Урожайність, ц/га: Л.-241,4 ц/га; П.-338,8 ц/га. Гарантована прибавка, ц/га: Л.-14,8 ц/га; П.- 67,6 ц/га. Гарантована прибавка,%: Л.- 6,7%, П.-25,3%. Вміст крохмалю,%: Л.-16,2%, П.-16,3%. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 38,8 ц/га; П.- 50,0 ц/га. Вегетаційний період, днів: Л.-96 днів, П.- 90 днів. Маса бульб, гр: Л.- 89 гр; П.- 95 гр. Смакові якості , бал: Л.- 7,3 бала, П.- 7,3 бала. Група стиглості - ранньостиглий. Напрямок використання - столовий.

® 04031001 Рів'єра

Заявник: Агріко Кооператив Б.А.

Власник(и): Агріко Кооператив Б.А.

Підтримувач(и):

Куц - напівпрямий, низький, листкового типу. Стебло - середньої товщини з слабким антоціаном. Листок - помірно зеленого забарвлення, великий, відкритого типу. Віночок квітки - білого кольору, яскравість квіток - низька. Бульби - овально-округлої форми, жовтого кольору. М'якуш - кремовий.

Урожайність, ц/га: С.- 358,0; Л.- 419,0; П.- 378,8. Гарантована прибавка, ц/га: С.- 154,0; Л.- 197,8; П.- 111,8. Гарантована прибавка,%: С.- 75,5; Л.- 89,4; П.- 41,9. Вміст крохмалю,%: С.- 11,0; Л.- 12,8; П.- 14,4. Збір крохмалю, ц/га: С.- 39,3; Л.- 48,5; П.- 45,6. Вегетаційний період, днів: С.- 86; Л.- 90; П.- 93. Маса бульб, гр: С.- 110, Л.- 71, П.- 91. Смакові якості , бал: С.- 6,5; Л.- 7,4; П.- 7,3. Група стиглості - ранньостиглий. Напрямок використання - столовий.

Сільськогосподарські: кормові

Сорго віникове

® 04135001 Красень

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Паросток, листкова пластинка і колоскова луска мають антоціанове забарвлення. Час викидання волоті ранній.

Суцвіття щільне, злегка поникле. Рослина висока. Листок середній за розміром. Стебло довге, середнє за товщиною. Колоскова луска дуже довга, за досягання має червоно-коричнєве забарвлення. Маса 1000 зерен середня.

За даними заявника сорт посухостійкий, стійкий до вилягання. Ранньостиглий. Вихід віників 4,0-4,9 тис.штук на 1га. Середня урожайність насіння – 37,4 ц/га. Маса 1000 насінин – 23,5 г. Висота рослин 277 см. Діаметр стебла на висоті 10 см від ґрунту – 1,0 - 1,4 см та біля волоті – 0,8 см.

Продуктивна кущистість – 2,1 стебел на одну рослину.

Напря́м використання – віники, щітки.

® 05135001 Фараон

Заявник: Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Наявне антоціанове забарвлення паростка і листка, інтенсивність помірна. Листок середній за розміром. Час викидання волоті середній. Волоть в кінці цвітіння пухка, злегка поникла, має хвилясті гілочки червоно-коричнєвого забарвлення. Рослина висока.

Технічної зрілості сорт досягає за 110 днів. Висота рослин 236 см. Продуктивна кущистість – 1,4 штук. Діаметр стебла на висоті 10 см від ґрунту – 2,0 см; діаметр стебла біля волоті – 1,2 см. Сорт посухостійкий, незначно уражується хворобами. Середній урожай насіння – 34,5 ц/га. Маса 1000 насінин – 20,4-25,4 г. Вихід віників з одного гектара становить 4,0 тисяч штук. Напря́м використання – віники, щітки.

Сорго цукрове

06010001 Сс 506

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має антоціанове забарвлення. Низька інтенсивність початкового росту. У рослини середня кількість листків. Час викидання волоті пізній. Листок короткий і широкий. Суцвіття веретеноподібне, похиле, середньої щільності, коротке.

Маса 1000 насінин – 27,8 г. Пізньостиглий. Залистяність – 37,8 %. Висота рослин 250-300 см. Посухостійкий, придатний до механізованого збирання. Сорт характеризується стабільним високим урожаєм зеленої маси, стійкістю до вилягання та ураження сажкою. Середня урожайність сухої речовини становить 100,0 ц/га, насіння – 35,5 ц/га. Вміст сирого протеїну 9,2 %, клітковини – 30,7%.

06010002 Г 1990

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток без антоціану. Низька інтенсивність початкового росту. У рослини середня кількість листків. Час викидання волоті середній. Листок середній за розміром. Сорт високий. Суцвіття веретеноподібне, пряме, нещільне, середнє за довжиною, вузьке.

Висота рослин 270 см. Залистяність – 33,5%. Сорт середньопізній, високопродуктивний. Середня урожайність сухої речовини становить 146,0 ц/га, насіння – 41,5 ц/га. Вміст сирого протеїну 8,7%, клітковини – 29,7%. Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи та ураження хворобами.

04010001 Сило 700Д

Заявник: Дочірнє підприємство "Рейлін"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має антоціанове забарвлення. Висока інтенсивність початкового росту. У рослини велика кількість листків. Час викидання волоті середній, за висотою середня. Листок середній за розміром. Суцвіття овальне, пряме, щільне.

Середньостиглий. Маса 1000 насінин – 25,2-30,5 г. Висота рослин 165 -180 см. Залистяність – 44,1-53,3%. Посухостійкий, придатний до механізованого збирання. Сорт характеризується стабільним високим урожаєм зеленої маси та насіння, стійкістю до вилягання та ураження сажкою. Середня урожайність сухої речовини за роки випробування на державних сортодослідних станціях становила: Степ - 93,8 ц/га, насіння – 65,7 ц/га; Лісостеп - 84,9 ц/га; насіння – 67,9 ц/га. Вміст сирого протеїну – 9,0%, клітковини – 29,2%.

03010001 Троїстий

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток без антоціану. Висока інтенсивність початкового росту. У рослини середня кількість листків. Час викидання волоті середній. Сорт високий. Листок довгий і широкий. Суцвіття овальне, пряме, щільне, довге.

Середньостиглий. Маса 1000 насінин – 26,6-30,5 г. Висота рослин 206 - 241 см. Залистяність – 37,8-44,2%. Посухостійкий, придатний до механізованого збирання. Сорт характеризується стійкістю до вилягання та ураження сажкою. Середня урожайність сухої речовини за роки випробування на державних сортовипробувальних станціях становила: Степ - 88,8 ц/га, насіння – 46,2 ц/га; Лісостеп - 84,0 ц/га; насіння – 58,0 ц/га. Вміст сирого протеїну – 9,0%, клітковини – 27,5%.

Сорго-суданкові гібриди

04063002 Арабат

Заявник: Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має дуже сильне антоціанове забарвлення.

У рослин спостерігається середній час викидання волоті.

Габітус - напіврозлогий, гібриди мають середню кількість пагонів, і велику кількість листків. Стебло середнє за товщиною. Рослина - висока. Листок широкий, середній за довжиною. Суцвіття нещільне, розкидисте, довге. Колоски видовжені за формою. Колоскова луска має зелено-жовте забарвлення під час цвітіння. За досягання колоскова луска набуває червонувато-коричневого кольору. Насінина після досягання солом'яно-жовтого кольору, середня за масою 1000 насінин.

Гібрид посухостійкий, незначно уражається хворобами. За роки випробування середня урожайність сухої речовини становила 107,2 ц/га. Висота рослин 189-200 см. Залистяність – 39,5-44,1%. Вміст сирого протеїну – 9,8%, клітковини – 30,9%. Середньостиглий.

03063001 Кадан 19

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має сильне антоціанове забарвлення.

У рослин спостерігається пізній час викидання волоті.

Габітус - напіврозлогий, гібриди мають малу кількість пагонів і середню - листків. Стебло середнє за товщиною. Рослина - середня за висотою. Листок широкий, середній за довжиною. Суцвіття нещільне, розкидисте, довге. Колоскова луска має жовто-зелене забарвлення під час цвітіння, слабке опушення. За досягання колоскова луска і насінина набувають світло-коричневого кольору. Маса 1000 насінин - середня.

Гібрид відноситься до середньостиглої групи стиглості. Висота рослин 196-224 см. Залистяність – 33,7-36,4%. Характеризується високою посухостійкістю, стійкістю до вилягання та незначно уражається хворобами. Вміст сирого протеїну - 8,7%, клітковини – 31,6%. За роки випробування середня урожайність сухої речовини становила 95,9 ц/га.

04063001 Чудовий ВМР

Заявник: Дочірнє підприємство "Рейлін"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток, а потім і листкова пластинка, мають дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення.

У рослин спостерігається пізній час викидання волоті.

Габітус - напіврозлогий, гібриди мають середню кількість пагонів і листків. Стебло середнє за товщиною. Рослина - середня за висотою. Листок широкий, дуже довгий. Суцвіття середнє за щільністю, напіввистиснуте, довге. Колоски овальні за формою, мають слабке опушення. Колоскова луска має жовте забарвлення під час цвітіння, відсутнє або слабке антоціанове забарвлення. За досягання колоскова луска набуває темно-червоного кольору.

Насінина після досягання жовтувато-білого кольору, середня за масою 1000 насінин.

Гібрид - високоврожайний, інтенсивно росте на початку вегетації і добре відростає після косіння. Гібрид переважає інші завдяки високій залистяності – 45,1-55,0%. Висота рослин 195 см. Вміст сирого протеїну 8,7-9,1%, клітковини – 30,5-31,6%. Середня урожайність сухої речовини становила за роки випробування - 99,3 ц/га. Гібрид відзначається соковитістю, стійкістю до хвороб, посухостійкістю, відноситься до групи середньостиглих.

Костриця східна

06110001 Лиманська

Заявник: Донецький ботанічний сад Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Габітус напівпрямий. Рослина середньої висоти. Листок довгий, середній за шириною. Суцвіття довге, має середню кількість колосків. Тенденція до утворення суцвіть в рік сівби помірна.

Багаторічний кореневищний злак висотою 94-123 см. Ранньостиглий. Інтенсивний ріст починається при середньодобовій температурі 15 градусів. Сорт має добру залистяність 60-70%. Може давати 2-3 укуси. Зимостійка. Характеризується стійкістю до хвороб, мало пошкоджується шкідниками. Середня урожайність сухої речовини - 80,9 ц/га, максимальна – 100,0 ц/га. Вміст клітковини -23,1%. Довговічна в ценозах з іншими видами злаків і бобовими, на одному місці у травостої зберігається до 20 років.

Костриця лучна

03054001 Діброва

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Рослина: габітус (восени в рік посіву) – напівпрямий, тенденція утворення суцвіття в рік посіву – відсутня або дуже слабка, час появи суцвіття ранній.

Габітус при появі суцвіття – напівпрямий, натуральна висота при появі суцвіття – довга. Листок: колір (восени в рік посіву) – зелений. Прапорцевий листок: довжина (прапорцевий листок на середньому стеблі впродовж 2 тижнів після появи суцвіття) – середній, ширина (прапорцевий листок на середньому стеблі впродовж 2 тижнів після появи суцвіття) – широкий. Стебло: довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – довге. Довжина суцвіття, коли воно повністю сформоване – середнє.

Сорт характеризується стійкістю до вилягання, посухи, ураження хворобами. Зимостійкий. Має високу кущистість. Середня урожайність сухої речовини за роки випробування становила – 78,4 ц/га, максимальна – 97,1 ц/га. Залістяність – 49,8%. Вміст сирого протеїну - 8,3 %, клітковини – 31,4 %. Середньостиглий, сінокісно-пасовищного типу.

Пажитниця багаторічна

® 06062002 Ніга

Заявник: Малопопська Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Диплоїд. Габітус восени в рік висіву проміжний, тенденція до утворення суцвіть відсутня або дуже слабка.

Навесні габітус напівпрямостоячий. Листок середній за розміром. Час викидання суцвіть пізній. Суцвіття має багато колосків

За даними заявника, сорт посухостійкий, стійкий до ураження хворобами, зимостійкий. Сходи сорту появляються після посіву на 6 -й день.

Урожайність насіння до 10 ц/га.

Горошок (Вика яра)

® 03047002 Ірина

Заявник: Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Власник(и): Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Сіянци рослин сорту через 3-4 тижні після появи сходів мають помірне антоціанове забарвлення основи стебла, зелене листя.

Час настання початку цвітіння у сорту середній. На цей час верхнє міжвузля стебла не опушене, антоціанове забарвлення пазух листків слабе, форма верхівки листочків на середній третині рослини ввігнута, листочки вузькі, антоціанове забарвлення залозок на прилистках слабе, квітка має світло-фіолетове забарвлення паруса.

У фазі повного розвитку боби мають слабе опушення, середню довжину і середню ширину, середню довжину дзьобика та середню кількість насінних зачатків.

За збирання, у фазі повної стиглості, сформоване насіння середнє за розміром та округле за формою. Воно має ос-новне сіро-коричнєве забарвлення насінної оболонки та тільки дифузну коричневу орнаментацию. Виразення коричневої орнаментации слабе. Блакитно-чорна орнаментация відсутня. Насіння має оранжеве забарвлення сім'ядолей.

Середня урожайність: сухої речовини - Степ - 59,1ц/га; Лісостеп - 62,9 ц/га; Полісся - 66,8 ц/га; насіння - Степ - 20,4 ц/га; Лісостеп - 16,9 ц/га; Полісся - 18,8 ц/га. Вміст сирого протеїну - 17,4 - 20,6,%. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами.

Залистяність - 57,9 - 60,5 % . Напрямок використання - кормовий

Еспарцет**04050001 Смарагд**

Заявник: Кіровоградський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту першого року життя мають високу схильність до цвітіння.

Рослини наступних років життя на початку бутонізації високі, прямі за габітусом, з помірним галузненням. Стебло довге, середньої товщини, немає антоціанового забарвлення та без опушення в середній його частині. Листя зелене, без сіро-зеленого забарвлення, довге, середньої товщини, має ланцетну форму.

Час початку цвітіння рослин і час повного їх цвітіння, а також і період від початку до повного цвітіння - середні. Су-цвіття середньої довжини, циліндричної форми. Квітка світло-рожевого кольору з нерівномірним забарвленням. Бобик середнього розміру, з короткими зубчиками.

Сорт середньостиглий. Має високу посухостійкість та зимостійкість. Стійкий до вилягання. Ураженість хворобами незначна. Середня урожайність сухої речовини за роки випробування у зоні Лісостепу - 52,5 ц/га, максимальна - 96,0 ц/га; в зоні Степу - 78,6 ц/га, максимальна - 130,0 ц/га. Залистяність становила 46,5-48,3%. Вміст сирого протеїну 16,9%.

Люцерна мінлива**04392001 Люба**

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Висота рослини - від середньої до високої.

Габітус - напівпрямий. Листок широкий і довгий.

Час початку цвітіння - від раннього до середнього.

Частота рослин з дуже темними синьо-фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками низька, а з кремовими і жовтими квітками дуже низька або зовсім відсутня.

Висота рослини в стадії викидання квітового бутона, після 3-го скошування, середня.

Сорт інтенсивного типу, характеризується високою урожайністю сухої речовини та насіння. Середня урожайність сухої речовини становить - 70,4 ц/га, максимальну - 95,0 ц/га, насіння - 2,96 ц/га. Має високу зимостійкість та посухостійкість. Сорт стійкий до бурі, жовтої плямистості та кореневої гнилі. Залистяність - 51,5 - 57,8 %. Вміст білку - 17,7%, клітковини - 34,2%. Середньостиглий, напрям використання - сінокісний.

® 06392001 Ласка

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Висота рослини - від середньої до високої.

Габітус - напівпрямий. Листок середнього розміру.

Час початку цвітіння - ранній.

Частота рослин з дуже темними синьо-фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками низька, а з кремовими і жовтими квітками дуже низька або зовсім відсутня.

Висота рослини в стадії викидання квіткового бутона, після 1-2 скошування від середньої до високої, а після 3-го - середня.

Сорт інтенсивного типу, характеризується високою урожайністю сухої речовини та насіння. Має скорочений період спокою і за рахунок цього відрізняється активним ростом рослин в осінній період при невисоких температурах і зменшенні тривалості дня. При достатній вологозабезпеченості у цей період формує додатковий укіс, що суттєво підвищує загальний урожай фуражу на протязі одного сезону. Середня урожайність сухої речовини становить - 112,0 ц/га, максимальну 120,2, насіння - 2,96 ц/га. Має високу зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до бурі, жовтої плямистості, стійкий до кореневої гнилі. Залистяність - 51,0 - 53,0 %. Вміст білку - 18,3 %, клітковини - 33,5%. Потягом року може дати 2-4 укоси. Сорт середньостиглий - від весняного відростання до дозрівання першого укосу 71-74 днів, насіння - 121 - 124 днів.

03392001 Росинка

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Висота рослини - від середньої до високої.

Габітус - напівпрямий. Листок зеленого забарвлення середнього розміру.

Час початку цвітіння - ранній. Частота рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками низька.

Після 3-го скошування рослина характеризується середньою висотою.

Сорт інтенсивного типу, відрізняється високою посухостійкістю та зимостійкістю. В умовах жорсткої посухи формує повноцінний травостій. Середня урожайність сухої речовини становить - 54,7 ц/га, максимальна - 80,0 ц/га, насіння - 2,6 ц/га. Вміст білку - 16,8 %, клітковини - 37,0%. Має високу стійкість до бурі, плямистості та кореневої гнилі. Залистяність - 48,7 - 53,2%. Ранньостиглий - від весняного відростання до дозрівання насіння 116 - 120 днів. Добре відростає навесні та після укосів.

Костриця овеча

® 06331001 Ноні

Заявник: Малопопська Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.

Власник(и): Малопопська Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.

Підтримувач(и):

Тетраплоїд. Габітус восени в рік висіву проміжний. Листок темно-зелений, наліт відсутній. Час викидання суцвіття від пізнього до дуже пізнього. Прапорцевий листок (на 2-й рік; за викидання волоті) короткий. Стебло коротке.

За даними заявника сорт має високу посухостійкість, зимостійкість, декоративність.

Костриця червона**® 06111001 Адіо**

Заявник: Малопопска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.

Власник(и): Малопопска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.

Підтримувач(и):

Гексаплоїд. Влітку в рік висіву сильне антоціанове забарвлення піхви листка, листкова пластинка скручена. Наявне кореневище. Габітус проміжний. Листок середній за розміром, зелений, наліт відсутній. Час викидання суцвіття середній. Квітуче суцвіття довге. Остюки відсутні. Відсутнє опушення нижньої квіткової луски (за повної стиглості).

Зз даними заявника сорт зимостійкий, посухостійкий, стійкий до ураження хворобами. Середня урожайність 10,0 ц/га. Початок сходів на 9-й день. Декоративний.

® 06111002 Лео

Заявник: Малопопска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.

Власник(и): Малопопска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.

Підтримувач(и):

Октоплоїд. Влітку в рік висіву листкова пластинка скручена. Наявне кореневище. Габітус проміжний. Листок середній за розміром, темно-зелений, наліт відсутній. Час викидання суцвіття дуже пізній. Квітуче суцвіття довге. Наявне опушення нижньої квіткової луски (за повної стиглості).

За даними заявника сорт зимостійкий, посухостійкий, стійкий до ураження хворобами. Середня урожайність 10,0 ц/га. Початок сходів на 9-й день. Декоративний.

® 06111003 Сава

Заявник: Малопопска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.

Власник(и): Малопопска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.

Підтримувач(и):

Сильне антоціанове забарвлення на піхві листка (влітку в рік висіву). Листкова пластинка скручена. Кореневище відсутнє. Габітус від напівпрямого до проміжного. Листок середній за розміром, зелений, наліт відсутній. Час викидання суцвіття середній.

За даними заявника сорт зимостійкий, посухостійкий, стійкий до ураження хворобами. Середня урожайність 7,0 ц/га. Декоративний.

Люцерна жовта (серповидна)

® 05462001 Наречена Півночі

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Рослина за висотою, через два тижні після осіннього рівнодення, висока.

Габітус - напіврозлогий. Листок середній за розміром.

Час початку цвітіння від раннього до середнього.

Частота трапляємості квіток з жовтим забарвленням - висока, з синім і зеленим - дуже низька або зовсім відсутня, квіток з білим, лимонним, салатним забарвленням - низька.

Частота трапляємості рослин з прямим бобом - низька, з 1-4 спіральними бобами - висока.

Середньостиглий. Має високу зимостійкість. Дає три укуси. Можна використовувати протягом десяти років. Залистяність – 38,3%. Посухостійкий. Сстійкий до ураження основних хвороб. Середня урожайність сухої речовини 106,0 ц/га, а максимальна 110,6 ц/га. Вміст сирого протеїну 21,5%, клітковини – 20,4%. Напрямок використання – сінокісно – пасовищний.

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан

® 04022003 Віола

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Власник(и): Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"
Кравченко Владислав Андрійович

Підтримувач(і):

Рослина висока з помірним антоціановим забарвленням. Листок широкоовальний, злегка хвилястий, зелений, помірно опушений. Квітка синьо-фіолетова, чашечка зелено-фіолетова, без шипів.

Плід овально-грушеподібний, темно-фіолетовий з чітко вираженим глянцем у технічній стиглості, довжиною 18-22 см, діаметром 6-8 см, без світлих смуг, не ребристий, без вигину біля основи. М'якуш щільний, жовтувато-білий, без гіркоти.

Ранньостиглий. Плодоносить на 120-125 день після появи сходів.

Ранній врожай – 5,8 кг/м², загальний – 16-17,5 кг/м². Маса товарного плоду 260-270 г. Вміст сухої речовини – 8,2%. Смакові якості високі - 4,4 балів.

Сстійкий до основних хвороб.

Перспективний для плівкових і гідропонних теплиць.

® 04022002 Пущанський-60

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Власник(и): Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"
Кравченко Владислав Андрійович

Підтримувач(і):

Рослина висока, з помірним антоціановим забарвленням. Листок широкоовальний, зелений, з слабким опушенням. Квітка яскраво-фіолетова, чашечка зелено-фіолетова, без шипів.

Плід темно-фіолетовий, з чітко вираженим глянцем, циліндричної форми, довжиною 25-32 см, діаметром 6-8 см, без витину біля основи, не ребристий, рівний. М'якуш щільний, білий, без гіркоти. Ранньостиглий. Від сходів до початку плодоношення 115-120 днів.

Загальний врожай 14-15 кг/м². Ранній врожай 6,8 кг/м². Маса товарного плоду 240-250 г. Вміст сухої речовини – 8,4%. Смакові якості високі 4,6 балів. Стійкий до основних хвороб. Для скляних і плівкових теплиць.

Буряк столовий

® 04023005 Бордо київський

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Сорт з багатосім'яним типом супліддя. Положення листків горизонтальне, середньої довжини, еліптичної форми, зелені з фіолетовими прожилками. Коренеплід еліптичної форми, з округлою основою, з інтенсивним пурпуровим забарвленням, на 3/4 заглиблений у ґрунт.

Загальна врожайність 45,0 – т/га, маса товарного плоду 170,0 г, період від повних сходів до початку досягання 120 діб.

® 04023001 Ларка

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Власник(и): Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Підтримувач(і):

Сорт з багатосім'яним типом супліддя. Листки злегка нахилені, середньої довжини, еліптичної форми, зелені з фіолетовими прожилками, блискучі. Коренеплід округлої форми, з округлою основою, з інтенсивним темно-червоним зовнішнім і внутрішнім забарвленням.

Загальна врожайність 42,0 – т/га, маса товарного плоду 110,0 г, період від повних сходів до початку досягання 75 діб. Рекомендований для зберігання, переробки, а також для споживання в свіжому вигляді. Придатний для дуже ранніх строків сівби, майже не спілкується. Оптимальна густота 40-50 рослин/м². Коренеплід не розтріскується, може давати великі коренеплоди високої якості, прекрасно зберігається.

® 04023002 Лома

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Власник(и):**Підтримувач(і):**

Сорт з багатосім'яним типом супліддя. Положення листків напівпряме, за довжиною короткі, еліптичної форми, зелені з фіолетовими прожилками, блискучі. Коренеплід видовжено-циліндричної форми, з округлою основою, з інтенсивним темно-червоним зовнішнім і внутрішнім забарвленням.

Загальна врожайність 35,0 – т/га, маса товарного плоду 85,0 г, період від повних сходів до початку досягання 85 діб.

У цьому сорті ідеально поєднуються високий вміст цукрів з порівняно низьким вміст нітратів. Коренеплід має прекрасні якості для переробної промисловості. Завдяки темно-червоному кольору коренеплоду, сорт надзвичайно привабливий для ринку свіжої продукції.

® 05023002 Цітадела

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(и): Приватне мале підприємство " Тирас"

Моравосід спол. с р.о.

Підтримувач(і):

Сорт з багатосім'яним типом супліддя. Положення листків напівпони́кле, середньої довжини, вузько-еліптичної форми, помірно-зеленого кольору з фіолетовими прожилками. Коренеплід видовжено-конічної форми, з загостреною основою, з інтенсивним пурпуровим зовнішнім і внутрішнім забарвленням.

Загальна врожайність 65,0 – т/га, маса товарного плоду 180,0 г, період від повних сходів до початку достигання 75 діб.
Сорт столового напрямку використання.

Диня

06025002 Сега F1

Заявник: Мей Сід Компані Лтд. (Мей Тохумсулук Зіраат ве Тісарет Лтд. Шті)

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина з помірно зеленими середніми листками. Листкова пластинка із помірно вираженими лопатями із сильною зубчастістю, помірною хвилястістю листків. Черешок напівпрямий. Квітки дводомні. Забарвлення шкірки плоду перед достиганням зелене. Плід у поздовжньому розрізі округлої форми, зеленого кольору. Плідоніжка важко відокремлюється від плоду, рубець маточки середній. Переважає зелений колір м'якуша. Насінина за розміром мала, вузько-еліптичної форми. Сорт характеризується раннім початком цвітіння і достигання.

Загальна урожайність 30-35,0 т/га, товарна урожайність 30,0 т/га, маса плоду 2,2г. Період від повних сходів до першого збирання 70 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Вміст сухої речовини 14,0 %. Транспортабельність 9 балів. Напрямок використання у свіжому вигляді.

® 04025002 Амал F1

Заявник: Клоз Тезьє

Власник(и): Клоз Тезьє

Підтримувач(і):

Рослина з сильними зеленими середніми листками. Листкова пластинка із слабо вираженими лопатями із помірною зубчастістю, помірною хвилястістю листків. Черешок напівпрямий, короткий за довжиною. Квітки однодомні. Забарвлення шкірки плоду перед достиганням зелене. Плід у поздовжньому розрізі видовженої форми, брунатно-жовтого кольору. Плідоніжка помірно відокремлюється від плоду, рубець маточки середній. Переважає кремовий колір м'якуша. Насінина за розміром середня, різко загостреної форми. Сорт характеризується середнім початком цвітіння і достигання.

Загальна урожайність 30,0 т/га, товарна урожайність 30,0 т/га, маса плоду 2,0г. Період від повних сходів до першого збирання 75 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Вміст сухої речовини 11 %. Транспортабельність 9 балів. Напрямок використання універсальний. Рекомендований для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

06025003 Анзер F1

Заявник: Мей Сід Компані Лтд. (Мей Тохумсулук Зіраат ве Тісарет Лтд. Шті)

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина з помірно зеленими великими листками. Листкова пластинка із сильно вираженими лопатями із сильною зубчастістю, помірною хвилястістю листків. Черешок напівпрямий, довгий. Квітки дводомні. Забарвлення шкірки плоду перед досяганням білий. Плід у поздовжньому розрізі округлої форми, зеленого кольору. Плодоніжка помірно відокремлюється від плоду, рубець маточки середній. Переважає кремовий колір м'якуша. Насінина за розміром мала, вузько-еліптичної форми. Сорт характеризується пізнім початком цвітіння і досягання.

Загальна урожайність 35-40 т/га, товарна урожайність 30,0 т/га, маса плоду 2,5г. Період від повних сходів до першого збирання 75 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Вміст сухої речовини 13,0%. Транспортабельність 9 балів. Напрямок використання у свіжому вигляді.

05025005 Борівчанка

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина з помірно зеленими середніми листками. Листкова пластинка із помірно вираженими лопатями із слабкою зубчастістю, помірною хвилястістю листків. Черешок горизонтальний. Квітки дводомні. Забарвлення шкірки плоду перед досяганням зелене. Плід у поздовжньому розрізі округлої форми, зеленого кольору. Плодоніжка помірно відокремлюється від плоду, рубець маточки середній. Переважає зелений колір м'якуша. Насінина за розміром середня, еліптичної форми, кремово-жовтого кольору. Сорт характеризується середнім початком цвітіння і досягання.

Загальна урожайність 12,6 т/га, товарна урожайність 12,6т/га, маса плоду 3,5г. Період від повних сходів до першого збирання 75 днів. Вміст сухої речовини 12,1%. Транспортабельність 4 балів. Напрямок використання для скляних і плівкових теплиць.

® 02025003 Діана

Заявник: Дніпропетровський державний аграрний університет

Власник(и): Дніпропетровський державний аграрний університет

Підтримувач(и):

Рослина з помірно зеленими середніми листками. Листкова пластинка із слабо вираженими лопатями із помірною зубчастістю, помірною хвилястістю листків. Черешок напівпрямий, короткий за довжиною. Квітки одностомні. Забарвлення шкірки плоду перед досяганням зелений. Плід у поздовжньому розрізі еліптичної форми, зеленого кольору. Насінина за розміром середня, еліптичної форми, переважає забарвлення слонової кістки. Сорт характеризується середнім початком цвітіння і досягання.

Загальна урожайність 23,3 т/га, товарна урожайність 21,2т/га, маса плоду 1,9г. Період від повних сходів до першого збирання 91 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 13,5 %. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді. Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

® 02025004 Думка

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Рослина з помірно зеленими середніми листками. Листкова пластинка із помірно вираженими лопатями із слабкою зубчастістю, сильно хвилястістю листків. Черешок напівпрямий, короткий за довжиною. Квітки однодомні. Забарвлення шкірки плоду перед досяганням зелений. Плід у поздовжньому розрізі округлої форми, брунато-жовтого кольору. Плодоніжка помірно відокремлюється від плоду, рубець маточки великий. Переважає кремовий колір м'якуша. Насінина за розміром середня, еліптичної форми, переважає забарвлення слонові кості. Сорт характеризується середнім початком цвітіння і досягання.

Загальна урожайність 15,4 т/га, товарна урожайність 14,9 т/га, маса плоду 1,4г. Період від повних сходів до першого збирання 83 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 7,8 %. Транспортабельність 4 бали. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді. Рекомендований для вирощування у зоні Степу та Лісостепу.

03025002 Дідона

Заявник: Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина з помірно зеленими малими листками. Листкова пластинка із слабо вираженими лопатями із помірною зубчастістю, помірною хвилястістю листків. Черешок напівпрямий, короткий за довжиною. Квітки однодомні. Забарвлення шкірки плоду перед досяганням зелене. Плід у поздовжньому розрізі округлої форми, зеленого кольору. Плодоніжка важко відокремлюється від плоду, рубець маточки середній. Переважає кремовий колір м'якуша. Насінина за розміром середня, еліптичної форми, переважає забарвлення слонові кості. Сорт характеризується середнім початком цвітіння і досягання.

Загальна урожайність 24,3 т/га, товарна урожайність 23,1 т/га, маса плоду 2,0г. Період від повних сходів до першого збирання 30 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 13,0%. Напрямок використання для споживання на харчові цілі. Рекомендований для вирощування у зоні Степу та Лісостепу

® 02025005 Забавка

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук
Національний аграрний університет

Підтримувач(и):

Рослина з помірно зеленими та середніми листками. Листкова пластинка із помірно вираженими лопатями із помірною зубчастістю, сильною хвилястістю листків. Черешок вертикальний, короткий за довжиною. Квітки однодомні. Забарвлення шкірки плоду перед досяганням зелений. Плід у поздовжньому розрізі округлої форми, зеленого кольору. Плодоніжка легко відокремлюється від плоду, рубець маточки великий. Переважає кремовий колір м'якуша. Насінина за розміром середня, вузько-еліптичної форми, переважає забарвлення слонові кості. Сорт характеризується раннім початком цвітіння і досягання.

Загальна урожайність 10,2т/га, товарна урожайність 9,3 т/га. Період від повних сходів до першого збирання 67 днів, дегустаційна оцінка 4 балів. Вміст сухої речовини 6,5 %. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді. Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

® 02025006 Мулатка

Заявник: Дніпропетровський державний аграрний університет

Власник(и): Дніпропетровський державний аграрний університет
Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжортнасінісєовоч"

Підтримувач(и):

Рослина з помірно зеленими середніми листками. Листкова пластинка із слабо вираженими лопатями із помірною зубчастістю, помірною хвилястістю листків. Черешок напівпрямий, середній за довжиною. Квітки однодомні. Забарвлення шкірки плоду перед досяганням помірно зелене. Плід у поздовжньому розрізі видовженої форми, жовто-зеленого кольору. Плідоніжка помірно відокремлюється від плоду, рубець маточки малий. Переважає кремовий колір м'якуша. Насінина за розміром середня, вузько-еліптичної форми, переважає забарвлення слонової кості. Сорт характеризується середнім початком цвітіння і досягання.

Загальна урожайність 25,4 т/га, товарна урожайність 21,9 т/га, маса плоду 2,1г. Період від повних сходів до першого збирання 83 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 13,5 %. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді. Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

05025013 Монарх

Заявник: Енза Заден Де Енхуйзер Заадхандел Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Листкова пластинка із слабо вираженими лопатями із помірною зубчастістю та хвилястістю листків. Квітки двоодомні. Забарвлення шкірки плоду перед досяганням зелене. Плід у поздовжньому розрізі еліптичної форми, зеленого кольору. Плідоніжка помірно відокремлюється від плоду, рубець маточки малий. Переважає зелений колір м'якуша. Насінина за розміром середня, вузько-еліптичної форми. Сорт характеризується середнім початком цвітіння і досягання.

Загальна урожайність 45,0 т/га, товарна урожайність 44 т/га, маса плоду 3,0г. Період від повних сходів до першого збирання 80 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Вміст сухої речовини 15,0 %. Транспортабельність 9 балів. Напрямок використання універсальний.

02025007 Ольвія

Заявник: Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина з помірно зеленими середніми листками. Листкова пластинка із сильно вираженими лопатями із слабкою зубчастістю, сильною хвилястістю листків. Черешок напівпрямий, середній за довжиною. Квітки однодомні. Забарвлення шкірки плоду перед досяганням білий. Плід у поздовжньому розрізі еліптичної форми, жовто-зеленого кольору. Плідоніжка помірно відокремлюється від плоду, рубець маточки середній. Насінина за розміром середня, вузько-еліптичної форми, кремово-жовтого забарвлення. Сорт характеризується середнім початком цвітіння і пізнім досяганням.

Загальна урожайність 15,4 т/га, товарна урожайність 14,2 т/га, маса плоду 2,3г. Період від повних сходів до першого збирання 76 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 12,4 %. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді та консервування. Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

Кабачок

03026004 Гайдамака

Заявник: Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина кущового габітусу з світлим та темним кольором стебла з відсутніми або рудиментальними вусиками. Листкова пластинка середнього розміру з слабкою розсіченістю, з малою крапчастістю. Черешок з шипами. Молодий плід білуватого кольору. Сиглий плід жовтого кольору. Насіння за розміром середнє, еліптичної форми, жовтуватого кольору.

Ранньосиглий. Товарний урожай 25 т/га. Середня маса плоду 300 г. Колір мя'куша білий. Рекомендований для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

05026001 Медуза F1

Заявник: Мей Сід Компані Лтд. (Мей Тохумсулук Зіраат ве Тісарет Лтд. Шті)

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина кущового габітусу з світло-зеленим кольором стебла з добре розвиненими вусиками. Листкова пластинка середнього розміру з сильною розсіченістю, з великою крапчастістю. Черешок з шипами. Молодий плід зеленого кольору з білуватою дифузною та плямистою крапчастістю. Сиглий плід кремового кольору. Насіння за розміром велике, еліптичної форми, жовтуватого кольору.

Ранньосиглий. Товарний урожай 450-500 ц/га. Середня маса плоду 250--280 г. Дегустаційна оцінка, лежкість дуже добра, Колір мякуша білий. Рекомендований для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

Кавун

02027002 Альянс

Заявник: Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина із сланким габітусом, головне стебло довге. Листкова пластинка сіро-зеленого забарвлення з слабкою хвилястістю краю та сильним ступенем розсіченості. Розмір пелюсток жіночих квіток середній із заокругленими верхівками. Плоди за поздовжнім розтином округлої форми, від середньої до великої за масою. Переважає зелений колір шкірки з наявними широкими зеленими середніми смугами та слабкою мармуровою крапчастістю. Мя'куш рожевий. Основний колір оболонки насінини коричневий без рисунку. Початок цвітіння та досягання середній.

Загальна урожайність 22,0 т/га, товарна урожайність 21,6 т/га. Маса товарного плоду 5,3 г. Період від повних сходів до першого збирання 72 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 12,4 %. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді. Рекомендований для вирощування у зоні Степу та Лісостепу.

05027002 Кенді MC F1

Заявник: Мей Сід Компані Лтд. (Мей Тохумсулук Зіраат ве Тісарет Лтд. Шті)

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина із сланким габітусом, головне стебло довге. Листкова пластинка сіро-зеленого забарвлення з помірною хвилястістю краю та середнім ступенем розсіченості. Розмір пелюсток жіночих квіток маленький із загостреними верхівками. Плоди за поздовжнім розтином еліптичної форми, дуже великої за масою. Переважає зелений колір шкірки з наявними широкими зеленими середніми смугами та середньою мармуровою крапчастістю. М'якуш рожевий. Основний колір оболонки насінини коричневий з наявним рисунком. Початок цвітіння та досягання ранній. Загальна урожайність 84,4-90,5 т/га, маса плоду 11,8г. Період від повних сходів до першого збирання 89 днів, дегустаційна оцінка 8 балів. Вміст сухої речовини 11,5 %. Транспортабельність 8 балів. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді. Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

® 04027001 Мишутка

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Власник(и): Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Підтримувач(і):

Головне стебло довге. Листкова пластинка сіро-зеленого забарвлення з сильною хвилястістю краю та сильним ступенем розсіченості. Розмір пелюсток жіночих квіток середній із заокругленими верхівками. Плоди за поздовжнім розтином округлої форми, дуже великою за масою. Переважає зелений колір шкірки з наявними широкими зеленими середніми смугами. М'якуш червоний. Основний колір оболонки насінини чорний. Початок цвітіння та досягання середній.

Загальна урожайність 1,87 т/га, товарна урожайність 1,87т/га, маса плоду 55г. Період від повних сходів до першого збирання 68 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 1,5 %. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді.

03027004 Спаський

Заявник: Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина із сланким габітусом, головне стебло довге. Листкова пластинка сіро-зеленого забарвлення з помірною хвилястістю краю та помірним ступенем розсіченості. Розмір пелюсток жіночих квіток середній із заокругленими верхівками. Плоди за поздовжнім розтином округлої форми, від середньої до дуже великої за масою. Переважає зелений колір шкірки з наявними широкими зеленими середніми смугами та середньою мармуровою крапчастістю. М'якуш червоний. Основний колір оболонки насінини чорний без рисунку. Початок цвітіння та досягання середній.

Загальна урожайність 33,2 т/га, товарна урожайність 33,2т/га, маса плоду 24,4г. Період від повних сходів до першого збирання 74 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 12,9 %. Транспортабельність 5 балів. Столовий напрям використання. Рекомендований для вирощування у зоні Степу та Лісостепу.

® 04027002 Стетсон F1

Заявник: Клоз Тезье

Власник(и): Клоз Тезье

Підтримувач(і):

Рослина із сланким габітусом, головне стебло довге. Листкова пластинка сіро-зеленого забарвлення з сильною хвилястістю краю та помірним

ступенем розсіченості. Розмір пелюсток жіночих квіток маленький із заокругленими верхівками. Плоди за поздовжнім розтином округлої форми, дуже великої за масою. Переважає зелений колір шкірки з наявними широкими зеленими середніми смугами та середньою мармуровою крапчастістю. М'якуш рожевий. Основний колір оболонки насінини коричневий з рисунком в крапках і плямах. Початок цвітіння та досягання середній.

Загальна урожайність 45 т/га, товарна урожайність 45 т/га, маса плоду 10,0г. Період від повних сходів до першого збирання 65 днів, дегустаційна оцінка 59балів. Вміст сухої речовини 14%. Напрямок використання універсальний. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

Капуста броколі

® 05148001 ТМ-04/ФЛ

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(и): Приватне мале підприємство " Тирас"
Моравосід спол. с р.о.

Підтримувач(і):

*Рослина середньої висоти. Утворює одне стебло. Листки середньої довжини та ширини, з багатьма частками. Листкова пластинка зеленого кольору, антоціанове забарвлення відсутнє. Хвилястість і зубчастість краю слабка. Черешок середньої довжини. Головка середнього розміру, округло-плеската, синьо-зелена. Структура тканини ніжна. Щільність середня. Наявні покривні листки. Вторинне суцвіття під час збиральної стиглості відсутнє. Квітка білого кольору. Збирають в середні строки.

*Товарний урожай 110 ц/га. Урожай ранньої продукції 100 ц/га. Щільність головки 9 балів. Дегустаційна оцінка 9 балів. Транспортабельність 98%. Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника

Морква

® 04034016 Колгоспниця

Заявник: Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Сорт має напівпрямую, середню за діаметром розетку листків – 35 – 45 см. Листок довжиною 34 – 38 см (разом з черешком), розсіченість листка – тонка. Листок зеленого забарвлення помірної інтенсивності без антоціану. Коренеплід довжиною 12,6 см, діаметром 5,8 – 6,0 см; індекс форми (відношення довжини до діаметру) – середній – 2,13. Коренеплід за формою у повздовжньому розрізі трикутний, форма плеча – плескато-округла; місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду тупа. Забарвлення по-верхні коренеплоду оранжеве, помірне. Борізки на поверхні коренеплоду помірно виражені, діаметр серцевини відносно загального діаметру коренеплоду – 48 – 50 %. Серцевина і флоєма (м'якуш) помірно оранжевого забарвлення. Зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки коренеплоду у повздовжньому розрізі – відсутнє. Сфери впровадження: приватний сектор, фермерські та сільськогосподарські підприємства різних форм власності в зоні Лісостепу і Полісся України.

Сорт середньораннього строку досягання. Загальна урожайність коренеплідів становить 445 ц/га, товарна – 376,6 ц/га при товарності – 85,0 %. Урожай ранньої продукції становить 120 ц/га. Середня маса одного товарного коренеплоду 145 – 150 г. Дегустаційна оцінка – 4,7 – 4,9 балів. Сухої речовини 18,2 %. Вміст каротину – 19,5 мг %. Лежкість під час зимового зберігання – 91 %. Сорт придатний до механізованих технологій вирощування. Рекомендується для споживання у свіжому вигляді та для переробки.

05035001 /Бейо 2640 F1/

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки сильного зеленого забарвлення із слабкою хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. У гібрида відсутня партенокарпія. Плід середній зі слабко вираженою ребристістю, з горбочками без смужок. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 60 т/га, товарна врожайність 55 т/га, довжина товарного плоду 11 см. Період від повних сходів до першого збирання 60 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Транспортабельність висока. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

06035002 Андрус F1

Заявник: Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче "Полан" Сп. з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням та помірною хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Плід середній зі середньою ребристістю, з горбочками та довгими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 50 т/га, товарна врожайність 40 т/га, маса плоду 110 г. Період від повних сходів до першого збирання 49 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 5 балів. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

05035040 Анулька F1

Заявник: Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче "Полан" Сп. з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід дуже короткий зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 27 т/га, товарна врожайність 2т/га, маса плоду 6г. Період від повних сходів до першого збирання 42 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 5 балів. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді та консервування. Рекомендований для вирощування для зон Лісостепу та Полісся.

*Дані заявника.

06035020 Атлет F1

Заявник: Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого ґрунту"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід короткий зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 27,1 кг/м², товарна врожайність 25,0 кг/м², маса плоду 190 г. Період від повних сходів до першого збирання 59 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 6 балів. Салатний напрямок використання.

*Дані заявника.

05035006 Борис F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з шипуватою поверхнею. У гібрида відсутня партенокарпія. Плід короткий зі середньою ребристістю, з горбочками та короткими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида пізній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 44 т/га, товарна врожайність 42 т/га, маса плоду 82 г. Період від повних сходів до першого збирання 35 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Вміст сухої речовини 55%. Транспортабельність висока. Напрямок використання універсальний. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

06035011 Буян F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннева фірма "Манул"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид з наявною партенокарпією. Плід короткий зі середньою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 22-26 кг/м², товарна урожайність 20-22 кг/м², маса плоду 150г. Період від повних сходів до першого збирання 41-44 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 2,4 %. Транспортабельність 5 балів. Напрямок використання для консервування.

*Дані заявника.

06035021 Бобрик F1

Заявник: Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого ґрунту"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням. Гібрид з наявною партенокарпією. Плід короткий зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 10,8 кг/м², товарна врожайність 10,0 кг/м², маса плоду 100 г. Період від повних сходів до першого збирання 36 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 7 балів. Салатний напрямок використання.

*Дані заявника.

05035008 Веселая Компанія F1

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК "

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з незначним опушенням та опушено-шипуватою поверхнею. У гібрида відсутня партенокарпія. Плід короткий зі слабкою ребристістю, з горбочками та середніми смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору без плям. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 45 т/га, товарна урожайність 42 т/га, маса плоду 82 г. Період від повних сходів до першого збирання 35 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Вміст сухої речовини 55%. Транспортабельність висока. Універсальний напрямок використання. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

05035011 Весна F1

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК "

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з слабким зеленим забарвленням із помірною хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з шипуватою поверхнею. Плід короткий зі слабкою ребристістю, з горбочками та довгими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 80 т/га, товарна врожайність 75 т/га, маса плоду 60 г. Період від повних сходів до першого збирання 37 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Транспортабельність висока. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

05035020 Внучок F1

Заявник:

Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із помірною хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням. Гібрид без партенокарпії. Плід середній з горбочками та середніми смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток. Загальна урожайність 2, 69 т/га, товарна врожайність 2, 43 т/га, маса плоду 140г. Період від повних сходів до першого збирання 54 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 1,02 %. Транспортабельність 5 балів. Напрямок використання у свіжому вигляді.

*Дані заявника.

06035025 Веласко F1

Заявник: Мей Сід Компані Лтд. (Мей Тохумсулук Зіраат ве Тісарет Лтд. Шті)

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із помірною хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід короткий зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 25,5 т/га, товарна врожайність 25,5 т/га, маса плоду 25-30г. Період від повних сходів до першого збирання 46 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Транспортабельність 8 балів. Напрямок використання у свіжому вигляді та для консервування.

*Дані заявника.

06035013 Верніє Друзья F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннева фірма "Манул"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид детермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (понад 3) на вузлі. Зав'язь чорного забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід короткий зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 600-800 ц/га, маса плоду 140г. Період від повних сходів до першого збирання 39 -41днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 1,7 %. Транспортабельність 5 балів. Універсального напрямку використання.

*Дані заявника.

06035009 Геркулес F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннева фірма "Манул"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з чоловічими і жіночими квітками, жіночих квіток (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з незначним опушенням на опушено-шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід середній зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 24,9-33,8 кг/м², товарна урожайність 22,9-30,1 кг/м², маса плоду 171г. Період від повних сходів до першого збирання 62 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 1,1 %. Транспортабельність 5 балів. Універсального напрямку використання.
*Дані заявника.

06035007 Горностай F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннєва фірма "Манул"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з чоловічими і жіночими квітками, жіночих квіток (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з незначним опушенням на опушено-шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід середній зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 25,1-32,5 т/га, товарна урожайність 24,1-30,0 т/га, маса плоду 164г. Період від повних сходів до першого збирання 99 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 2,0 %. Транспортабельність 5 балів. Салатний напрямок використання.
*Дані заявника.

05035005 Джин F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК "

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з слабким зеленим забарвленням та слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з опушено-шипуватою поверхнею. У гібрида відсутня партенокарпія. Плід короткий зі слабко вираженою ребристістю, з горбочками та середніми смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 45 т/га, товарна врожайність 42 т/га, середня маса плоду 82 г. період від повних сходів до першого збирання 35 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Вміст сухої речовини-55 %. Транспортабельність висока. Напрямок високістання для засолки. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

05035012 Денек F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК "

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із помірною хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з шипуватою поверхнею. Плід короткий зі слабкою ребристістю, з горбочками та довгими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 43 т/га, товарна врожайність 40 т/га, маса плоду 82 г. Період від повних сходів до першого збирання 35 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Транспортабельність висока. Напрямок використання для засолки. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

05035038 Ексельсіор

Заявник: Енза Заден Де Енхуйзер Заадхандел Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого кольору без ребер з горбочками та середніми смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 21,0 т/га, товарна урожайність 20,5 т/га, маса плоду 95г. Період від повних сходів до першого збирання 50 днів, дегустаційна оцінка 8 балів. Вміст сухої речовини 4,6 %. Транспортабельність 9 балів. Напрямок використання у свіжому вигляді.

*Дані заявника.

® 04035007 Знаток F1

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Власник(и): Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Кравченко Владислав Андрійович

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із помірною хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь з густим опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід середній зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 2,75 т/га, товарна врожайність 2,45 т/га, маса плоду 160г. Період від повних сходів до першого збирання 58 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 1,1 %. Транспортабельність 5 балів. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу та Полісся.

*Дані заявника.

05035016 Квартет F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК "

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з шипуватою поверхнею. Плід короткий зі слабкою ребристістю, з горбочками та середніми смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 80 т/га, товарна врожайність 75 т/га, маса плоду 60 г. Період від повних сходів до першого збирання 37 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Вміст сухої речовини 55 %. Транспортабельність висока. Напрямок використання для засолки. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

06035024 Казанова F1

Заявник: Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого ґрунту"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з чоловічими і жіночими квітками порівну, жіночих квіток (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з незначним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід довгий з горбочками та середніми смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 23,2 кг/м², товарна врожайність 20,0 кг/м², маса плоду 135 г. Період від повних сходів до першого збирання 67 днів. Салатний напрямок використання.

*Дані заявника.

06035018 Кураж F1

Заявник: Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого ґрунту"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з густим опушенням на шипуватій поверхні. У гібрида наявна партенокарпія. Плід середній з горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 17,5 кг/м², товарна врожайність 17,2 кг/м², маса плоду 120 г. Період від повних сходів до першого збирання 42 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 7 балів. Салатний напрямок використання.

*Дані заявника.

06035019 Кадет F1

Заявник: Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого ґрунту"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь чорного забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид з наявною партенокарпією. Плід короткий з горбочками та середніми смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 15,3 кг/м², товарна врожайність 14,5 кг/м², маса плоду 90 г. Період від повних сходів до першого збирання 44 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 7 балів. Універсального напрямку використання.

*Дані заявника.

06035008 Лорд F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннєва фірма "Манул"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід

короткий зі слабкою ребристістю та горбочками . Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору . У гібрида середній період розвитку жіночих квіток. Загальна урожайність 9-13 кг/м², товарна урожайність 8-12 кг/м², маса плоду 150г. Період від повних сходів до першого збирання 63 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 0,9 %. Транспортабельність 5 балів. Напрямок використання для консервування.
*Дані заявника.

05035014 Мотильок F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням та помірною хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з шипуватою поверхнею. Плід короткий зі середньою ребристістю, з горбочками та середніми смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 44 т/га, товарна врожайність 42 т/га, маса плоду 82 г. Період від повних сходів до першого збирання 35 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Вміст сухої речовини 55 %. Транспортабельність висока. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

® 04035006 Мудрець F1

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"

Власник(и): Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"
Кравченко Владислав Андрійович

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь з густим опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід середній зі середньою ребристістю та горбочками . Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору . У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 2,35 т/га, товарна врожайність 1,89 т/га, маса плоду 140г. Період від повних сходів до першого збирання 59 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 1,0 %. Транспортабельність 5 балів. Напрямок використання у свіжому вигляді.
*Дані заявника.

06035014 Мальчик-с-пальчик F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннєва фірма "Манул"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з незначним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид з наявною партенокарпією. Плід короткий з горбочками . Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору . У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 10-13 кг/м², товарна урожайність 9-12 кг/м², маса плоду 135г. Період від повних сходів до першого збирання 39-41 днів,

дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 2,0%. Транспортабельність 5 балів. Напрямок використання для консервування.
*Дані заявника.

06035012 Марта F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннєва фірма "Манул"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид з наявною партенокарпією. Плід короткий зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 16-31 кг/м², товарна урожайність 14-30 кг/м², маса плоду 15-20г. Період від повних сходів до першого збирання 42-45 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 2,5%. Транспортабельність 5 балів. Універсального напрямку використання.
*Дані заявника.

06035015 Олімпіада F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннєва фірма "Манул"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з чоловічими і жіночими квітками майже порівню, кількість жіночих квіток (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід середній зі слабкою ребристістю, з горбочками та короткими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 27-45 т/га, товарна врожайність 25-42 т/га, маса товарного плоду 200г. Період від повних сходів до першого збирання 58 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 2,5%. Транспортабельність 5 балів. Напрямок використання салатний для закритого ґрунту.
*Дані заявника.

06035023 Орлик F1

Заявник: Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого ґрунту"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з незначним опушенням на шипуватій поверхні. Плід довгий згорбочками та короткими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 17,5 кг/м², товарна врожайність 16,7 кг/м², маса плоду 140 г. Період від повних сходів до першого збирання 42 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 6 балів. Салатного напрямку використання.
*Дані заявника.

05035015 Поліна F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК "

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з шипуватою поверхнею. Гібрид без партенокарпії. Плід короткий зі середньою ребристістю, з горбочками та довгими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з великими неправильними плямами. У гібрида пізній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 40 т/га, товарна врожайність 38 т/га, маса плоду 82 г. Період від повних сходів до першого збирання 31 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Вміст сухої речовини 55 %. Транспортабельність висока. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

05035004 Родос F1

Заявник: Підприємство городнього насінництва і розсади Ожарув Мазовецькі (ПНОС)

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки сильного зеленого забарвлення із слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з шипуватою поверхнею. У гібрида відсутня партенокарпія. Плід дуже короткий зі слабко вираженою ребристістю, з горбочками та смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами.

Загальна урожайність 300 ц/га, товарна врожайність 255 ц/га, дегустаційна оцінка 9 балів. Транспортабельність добра. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостеп та Полісся.

05035007 Син Полка F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК "

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з незначним опушенням та опушено-шипуватою поверхнею. Сорт з відсутньою партенокарпією. Плід короткий зі слабкою ребристістю, з горбочками та середніми смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. Середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 45 т/га, товарна врожайність 42 т/га, маса плоду 82 г. Період від повних сходів до першого збирання 35 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Транспортабельність висока. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

05035017 Старекс F1

Заявник: Мей Сід Компані Лтд. (Мей Тохумсулук Зіраат ве Тісарет Лтд. Шті)

Власник(и):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з шипуватою поверхнею. Плід короткий зі слабкою ребристістю, з горбочками та довгими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 26,5 т/га, товарна врожайність 26,5 т/га, маса плоду 25-35 г. Період від повних сходів до першого збирання 45 днів, дегустаційна оцінка 8 балів. Транспортабельність добра. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування в зоні Степ та Лісостеп.

06035003 Сандер F1

Заявник: Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче "Полан" Сп. з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з слабким зеленим забарвленням із помірною хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з шипуватою поверхнею. Плід короткий, з горбочками та середніми смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 40 т/га, товарна врожайність 32 т/га, маса плоду 20г. Період від повних сходів до першого збирання 47 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 5 балів. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

® 03035008 Сувенір F1

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід середній зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Ранньостиглий. Від повних сходів до початку плодоношення 48-50 днів, бджолозапилюваний гібрид для весняних теплиць. Рослини переважно жіночого типу цвітіння. Салатного призначення. Плід довжиною 14-16 см, масою 112-117 г, не жовтіє, поверхня великогорбкувата, опушення білого кольору. Урожайність 20 кг/м², товарність – 90 %, віддача за перший місяць плодоношення 53%, відносно стійкий проти кореневих гнилей, борошнистої роси та пероноспорозу. Плоди транспортабельні. Насіннева камера середня, шкірка ніжна, дегустаційна оцінка свіжих плодів – 4,8 балів. Біохімічні показники знаходяться в межах стандарту гібриду Естафета F1. Для споживання у свіжому вигляді і консервування. Економічна ефективність: склала 1,75 грн/м². Рекомендується для вирощування у весняно-літній культурі розміні в плівкових і скляних з обігрівом і без обігріву і гідропонних теплицях у всіх зонах України.

® 04035008 Смушковий F1

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"

Власник(и): Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"

Кравченко Владислав Андрійович

Підтримувач(и):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із помірною хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь з густим опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 2, 56 т/га, товарна врожайність 2, 14 т/га, маса плоду 150г. Період від повних сходів до першого збирання 63 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 0,9 %. Транспортабельність 5 балів. Напрямок використання у свіжому вигляді.

*Дані заявника.

06035010 Салтан F1

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннева фірма "Манул"

Власник(и):

Підтримувач(и):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з незначним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид з наявною партенокарпією. Плід середній зі середньою ребристістю, з горбочками та короткими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 12-15 кг/м², товарна врожайність 9-11 кг/м², маса плоду 135 г. Період від повних сходів до першого збирання 41-43 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 2,7%. Транспортабельність 5 балів. Універсального напрямку використання.

*Дані заявника.

05035037 Тристан

Заявник:

Енза Заден Де Енхуйзер Заадхандел Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з незначним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид з наявною партенокарпією. Плід середній з середньою ребристістю без горбочків. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 27,0 т/га, товарна врожайність 26,4 т/га, маса плоду 300г. Період від повних сходів до першого збирання 70 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Вміст сухої речовини 4,5%. Транспортабельність 9 балів. Напрямок використання у свіжому вигляді.

*Дані заявника.

06035016 Тайга F1

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннева фірма "Манул"

Власник(и):

Підтримувач(и):

*Гібрид детермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з незначним опушенням на опушено- шипуватій

поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід середній, з горбочками та середніми смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 24,8-28,3 кг/м², товарна врожайність 23,1-24,2 кг/м², маса плоду 170г. Період від повних сходів до першого збирання 59 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 1,2 %. Транспортабельність 5 балів. Салатного напрямку використання.

*Дані заявника.

06035022 Трембіта F1

Заявник: Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого ґрунту"

Власник(и):

Підтримувач(и):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з густим опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид з наявною партенокарпією. Плід короткий з горбочками та короткими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 12,3 т/га, товарна врожайність 11,3 т/га, маса плоду 90 г. Період від повних сходів до першого збирання 45 днів, дегустаційна оцінка 7 балів. Транспортабельність 7 балів. Універсального напрямку використання.

*Дані заявника.

05035009 Філіппок F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із помірною хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з шипуватою поверхнею. У гібрида відсутня партенокарпія. Плід короткий зі середньою ребристістю, з горбочками та довгими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида пізній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 45т/га, товарна врожайність 42 т/га, маса плоду 82 г. Період від повних сходів до першого збирання 35 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Транспортабельність висока. Напрямок використання для засолення. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

06035005 Фермер F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннєва фірма "Манул"

Власник(и):

Підтримувач(и):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з сильним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід короткий зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 21,5-22,4 кг/м², товарна врожайність 20,1-22,1 кг/м², маса плоду 145 г. Період від повних сходів до першого збирання 40-45 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 1,7 %. Транспортабельність 5 балів. Напрямок використання для консервування.
*Дані заявника.

06035004 Хробри F1

Заявник: Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче "Полан" Сп. з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Плід короткий зі слабкою ребристістю, з горбочками та короткими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 35 т/га, товарна врожайність 30 т/га, маса плоду 31 г. Період від повних сходів до першого збирання 45 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 5 балів. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

06035017 Щедрик F1

Заявник: Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого ґрунту"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із відсутньою або дуже слабкою хвилястістю краю листової пластинки. Рослина з майже виключно жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з густим опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид з наявною партенокарпією. Плід короткий з горбочками та короткими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида ранній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 14,8 кг/м², товарна врожайність 13,8 кг/м², маса плоду 95 г. Період від повних сходів до першого збирання 43 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 5 балів. Універсального напрямку використання.
*Дані заявника.

Помідор**® 04040035 Астероїд**

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина детермінантна, компактна, середньооблисна, головне стебло середньої висоти, міжвузля короткі. Листок звичайний, зелений, середнього розміру. Суцвіття про-сте, має 4-5 плодів. Плодоніжка без колінця. Плоди плескато-округлої форми, масою 200-300 г, перші на китиці до 400 г, характеризуються високою щільністю та стійкістю щодо розтріскування. Забарвлення незрілого плоду світло-зелене, без темно-зеленої плями біля плодоніжки, при дозріванні – червоне. Плоди багатокамерні.

Ранньостиглий, досягає через 98-102 дні. Загальна врожайність – 38,6 т/га, товарна – 30,9 т/га, рання – 12,0 т/га. Дружність визрівання 31 %. Відзначається середньою стійкістю проти хвороб. Вміст сухої речовини 5,6 %, цукрів 3,6 %, аскорбінової кислоти 24,5 мг/%, кислотність 0,51 %. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 4,4 балів.

Сорт придатний до промислових технологій виробництва. Незважаючи на крупний розмір плоду 200-300 г сорт відзначається високими фізико-механічними властивостями, плоди стійкі до перестигання, придатні до транспортування. Відзначається компактним розміщенням плодів на рослині. Рекомендується для переробки на томат-продукти, свіжо-го споживання. Придатний до засолювання в діжки.

05040039 Гожий F1

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний, з високим стеблом. Генеративного типу. Листок звичайний, середній, зелений. Китиця проста, 5-6 плодів. Перша китиця розміщена над 8-9 листком, наступні – через 2-3 листки. Плоди округлі, без плями біля плодоніжки. Маса плоду 120-140 г. Середньоранній, досягає за 110-125 днів.

Загальний врожай в гідропонних теплицях 27,4 кг/м². Ранній – 4,9 кг/м². Вміст сухої речовини 6,4%, цукру – 3,4%. Дегустаційна оцінка 4,6 бала. Стійкий проти основних хвороб ТС5 F2. Для скляних теплиць.

05040038 Добродій F1

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний, з середнім стеблом. Генеративного типу. Листок звичайний, середній, зелений. Китиця проста, 4-6 плодів. Перша китиця розміщена над 8-9 листком, наступні – через 2-3 листка. Плоди округлі, без плями біля плодоніжки. Маса плоду 130-150 г. Середньоранній, досягає за 122 дні.

Загальний врожай в плівкових теплицях – 24,6 кг/м², ранній – 7,7 кг/м². Вміст сухої речовини 6,2%, цукру 3,4%. Дегустаційна оцінка 4,6 бала. Стійкий проти основних хвороб ТС5 F2. Для плівкових і скляних теплиць.

05040036 Достойний F1

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний, з середнім стеблом. Генеративного типу. Листок звичайний, середній, зелений. Китиця проста, 4-6 плодів. Перша китиця розміщена над 7-9 листком, наступні – через 2-3 листка. Плоди округлі, без плями біля плодоніжки.

Маса плоду 120-130 г. Середньоранній, досягає за 124 дні. Загальний врожай в плівкових теплицях 21,2 кг/м². Ранній – 8,1 кг/м². Вміст сухої речовини 6,4%, цукрів – 3,5%. Дегустаційна оцінка 4,7 бала. Стійкий проти основних хвороб – ТС5F2. Для плівкових і скляних теплиць.

® 04040032 Клондайк

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослина детермінантна, компактна, середньооблисна, головне стебло середньої висоти, міжвузля короткі. Листок звичайний, світло-зелений, середнього розміру. Суцвіт-тя проміжне, має 4-5 плодів. Плодоніжка без колінця. Плоди плескато-округлі, фасцировані, слаборебристі, середньою масою 280 г, характеризуються стійкістю щодо розтріскування. Забарвлення незрілого плоду світло-зелене, без темно-зеленої плями біля плодоніжки, при дозріванні – оранжевого забарвлення. Багатокамерні.

Середньостиглий, досягає через 98-104 дні. Загальна врожайність – 36,3 т/га, товарна – 24,7 т/га, рання – 10,2 т/га. Дружність досягання 28 %. Відзначається середньою стійкістю проти хвороб. Вміст сухої речовини 5,7 %, цукрів 3,7 %, аскорбінової кислоти 23,0 мг/%, кислотність 0,48 %. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 5,0 балів.

Сорт салатного призначення, має високі смакові, дієтичні і лікувально-профілактичні властивості. Відзначається підвищеним вмістом β -каротину – 0,97 мг/%. Рекомендується для вирощування у частному секторі в доповнення високорослим сортам салатного типу – Салатний Жовтий, Серце Ашхабаду, Хурма, Жовтий Велика та інші.

® 04040033 Малинове Віканте

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослина детермінантна, компактна, середньооблисна, головне стебло середньої висоти, міжвузля короткі. Листок звичайний, темно-зелений, середнього розміру. Суцвіття просте, має 4-5 плодів. Плодоніжка з колінцем. Плоди плескато-округлі, фасцировані, слаборебристі, середньою масою 250 г, характеризуються середньою щільністю та стійкістю щодо розтріскування. Забарвлення незрілого плоду світло-зелене, без темно-зеленої плями біля плодоніжки, при дозріванні – малинового забарвлення. Багатокамерні.

Середньостиглий, досягає через 97-102 дні. Загальна врожайність – 34,2 т/га, товарна – 23,9 т/га, рання – 10,9 т/га. Дружність досягання 32 %. Відзначається середньою стійкістю проти хвороб. Вміст сухої речовини 5,6 %, цукрів 3,7 %, аскорбінової кислоти 23,0 мг/%, кислотність 0,49 %. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 5,0 балів.

Сорт є першим салатним малиновоплідним сортом детермінантного типу. На відміну від широко розповсюджених високорослих сортів – Салатний Рожевий, Рожевий велика, Волове Серце та інших, які мають велику популярність серед населення, новий сорт більш пристосований до умов відкритого ґрунту, він не потребує підв'язки та пасинкування, більш скоростиглий і забезпечує високий врожай крупних салатних плодів добрих смакових якостей. Рекомендується для свіжого споживання та переробки на сік

® 04040021 Принадний

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Власник(и): Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Кравченко Владислав Андрійович

Підтримувач(і):

Детермінантний. Стебло середнє. Листок звичайний, середній, зелений.

Китиця проста – 4-6 плодів. Перша китиця розміщена над 6-7 листком.

Плід плескато-округлий, масою 120-150 г, гладенький із легкою зеленою плямою, яка при досяганні зникає. Плодоніжка з коліном – коротка, прикріплення до плода злегка заглиблене, середнього розміру.

Форма верхівки плоду - кругла, з маленькою крапкою. Перикарпій – тонкий, 3-4 мм. Кількість камер – 3-4. Колір плоду яскраво червоний, м'якуша – червоний.

Сорт ранній, досягає за 95-105 днів. Стійкість до хвороб – середня. Загальний врожай – 60-80 т/га, урожайність ранньої продукції 14,0-16,0 т/га, період плодоношення 30-35 днів, дружність досягання 45-50%. Вміст сухої речовини – 5,6%, вміст цукру 2,5-2,7%, вітаміну С – 19,8%, сухої речовини в соку 5,2%, загальна кислотність – 0,5%.

® 04040034 Цвітік F1

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Ранньостиглий. Вегетаційний період 106-108 днів. Плід округлий, без плями біля плодоніжки, масою 100-135 г. Стійкий проти хвороб. Дружність досягання 66 %. Висока товарність – 97 %. Вміст сухої речовини у плодах 5,1 %, загального цукру 4,3 %, аскорбінової кислоти 20,7 мг %, кислотність 0,62 %. Загальна врожайність 16,6 кг/м². Смакові якості – 4 бали.**® 02040011 Чайка**

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослина детермінантна, штамбова, компактна, прямостояча, слабооблишена, голо-вне стебло низьке. Листок проміжний, типовий для штамбових, темно-зелений, середньо-го розміру, сильно гофрований. Суцвіття просте, компактне має 5-6 плодів, перше закладається над 5-6 листком, наступні через 1-2. Плодоніжка без колінця. Плоди округлі, вирівняні, гладенькі, масою 65-80 г, характеризуються високою щільністю та стійкістю щодо розтріскування. Забарвлення незрілого плоду світло-зелене, без темно-зеленої плями біля плодоніжки, при дозріванні – насичено-червоне. Кількість камер 3-5 шт.

Ранньостиглий, досягає через 94-99 днів. Загальна врожайність – 42,0 т/га, товарна – 36,8 т/га, рання – 18,6 т/га. Дружність досягання 44 %.

Відзначається стійкістю проти фузаріозу. Вміст сухої речовини 5,98 %, цукрів 3,83 %, аскорбінової кислоти 22,58 мг/%, кислотність 0,43 %. Декус-таційна оцінка свіжих плодів 4,8 балів.

Сорт придатний до промислових технологій виробництва. Рекомендується для ціль-ноплідного консервування та переробки на томат-продукти.

® 04040031 Шевальє F1

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослина детермінантна, компактна, середньооблиснена, стеблом середньої висоти, міжвузля короткі. Листок звичайний, зелений, середнього розміру. Суцвіття просте, має 6-7 плодів. Плоди округлої форми, гладенькі, рівні, масою 70-86 г, рівномірно забарвлені, без зеле-ної плями біля плодоніжки. Плодоніжка без колінця. Кількість камер 4-5 шт. Плоди яскраво за-барвлені, з високими фізико-механічними властивостями.

Ранньостиглий. Вегетаційний період 94-97 днів. Загальна врожайність – 52,0 т/га, товарна – 47,8 т/га, рання – 24,4 т/га. Дружність досягання 47 %. Відзначається стійкістю проти основних хвороб. Плоди мають добрі смакові якості. Вміст сухої речовини – 5,5 %, цукрів – 3,3 %, аскорбінової кислоти – 23,0 мг/%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 4,5 балів.

Гібрид Шевальє F1 відзначається дружним плодоношенням, компактним розмі-щенням плодів в китиці і на рослині, плоди стійкі до перестигання, тривалий час зберіга-ють товарні якості на рослині, плоди яскраво-червоного забарвлення, без пігментних плям.

Придатний для механізованого збирання плодів. Плоди рекомендується викорис-товувати для цільноплідного консервування та переробки на томат-продукти.

05040037 Шафер F1

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний, з середнім стеблом. Генеративного типу. Листок звичайний, середній, зелений. Китиця проста, 4-5 плодів. Перша китиця розміщена над 6-8 листком, наступні – через 1-2 листки. Плоди округлі, без плями біля плодоніжки

маса плоду 110-120 г. Ранньостиглий, досягає за 110 днів.

Загальний врожай в плівкових теплицях – 16,2 кг/м2, ранній – 8,6 кг/м2. Вміст сухої речовини – 5,8%, цукру 3,7%. Дегустаційна оцінка 4,6 бала. Стійкий проти основних хвороб – ТСЗФ1. Для плівкових теплиць.

Цибуля городня

03041002 Львівська

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Селекції ІОБ УААН. Сорт цибулі городньої Львівська гострий, середньостиглий. Вегетаційний період складає 90-95 днів. Форма цибулини округла. Забарвлення сухих лу-сок жовте з золотистим відтінком. Соковиті луски білі.

Маса товарної цибулини 150-200 г. Сорт містить 13-15% сухої речовини, 8-9% загального цукру, 7-8 мг % вітаміну С. Зага-льна урожайність 43 т/га, товарна – 42 т/га. Лежкість 97- 98%. Призначення універсальне. Сорт рекомендується для вирощування в зоні Лісостепу України.

Гарбуз волоський**05415001 Народний**

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Широкоеліптична форма сім'ядолей. Габітус плетистий. Листкова пластинка велика за розміром, черешок довгий і товстий. Плід великий за розміром, середній за довжиною. Форма у повздовжньому розрізі кругла, наявна ребристість. Основний колір кори оранжевий, вторинний колір - кремовий, розподілений смугами. М'якуш товстий, жовтий. Насіння велике за розміром, еліптичної форми, гладеньке, білуватого кольору. Маса 1000 сухих насінин велика.

Сорт середньостиглий, вегетаційний період становить 115-120 днів. Середня маса плода 8,9 кг. Сорт має високу стійкість до низьких плюсових температур, хвороб та шкідників. Середня урожайність плодів становить 595 ц/га, максимальна – 640 ц/га. Транспортабельність плодів висока. Сорт може зберігатись 120 днів, має середню посухостійкість. Вміст цукру – 3,3%, каротину – 4,4 %, сухих речовин – 4,0%. Напрям використання сорту - кормовий. Сорт відзначається підвищеною насінневою продуктивністю за рахунок маси 1000 насінин, що в середньому становить - 404 г.

Сільськогосподарські: інші**Васильки справжні****® 05340001 Аметіст**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Підтримувач(и):

* Сорт пізньостиглий. Рослина середньоросла, прямостояча, куц помірної щільності. Інтенсивність антоціанового забарвлення на стеблах сильна, опушення відсутнє. Рослина утворює біля трьох квіткових пагонів. Листки середнього розміру овальної форми. Сильне антоціанове забарвлення верхнього боку листової пластинки поширюється по всій поверхні. Профіль поперечного перерізу листової пластинки увігнутий. Міжвузля квітконосів середньої довжини, квітконоси - середньої довжини. Колір віночка квітки рожевий, колір маточки - блідо-фіолетовий.

*Дані заявника.

Середня врожайність наземної маси 174 ц/га, середня врожайність ранньої продукції 170 ц/га, середня врожайність насіння - 4,8 ц/га. Маса 1000 насінин - 1,47 г. Вміст вітаміну С - 230 мг/%. Стійкий до хвороб та шкідників. Універсального напрямку використання. Рекомендовано для зон Степу, Лисостепу та Полісся України.

*Дані заявника.

® 06340001 Етруск

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и): Приватне підприємство "Агросвіт"

Приватне підприємство науково-дослідна селекційна станція "Наско"

Агрофірма "Наско"

Підтримувач(и):

Сорт дуже пізньостиглий. Рослина висока, прямостояча, кущ середньої щільності. Інтенсивність антоціанового забарвлення на стеблах середня, опушення відсутнє. Листки середнього розміру широкояйцевидної форми. Антоціанове забарвлення верхнього боку листової пластинки поширюється по всій поверхні. Листкова пластинка слабо пухирчаста. Квітконос середньої довжини. Колір віночка квітки рожевий.

*Дані заявника.

Середня врожайність наземної маси 350 ц/га, середня врожайність ранньої продукції 250 ц/га. Стійкий до хвороб та шкідників. Пропонується для споживання у свіжому вигляді, як салатний, у зоні Степу, Лисостепу та Полісся України.

*Дані заявника.

06340002 Філософ

Заявник: Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого ґрунту"

Власник(и):

Підтримувач(и):

* Сорт ранньостиглий. Рослина низька, прямостояча, кущ середньої щільності. Інтенсивність антоціанового забарвлення на стеблах середня, опушення відсутнє. Рослина напіврозлога, створює гілки 3-4 порядку. Листки середнього розміру яйцевидної форми. Антоціанове забарвлення верхнього боку листової пластинки поширюється по всій поверхні. Профіль поперечного перерізу листової пластинки увігнутий. Квітконосів - три. Довжина міжвузлів квітконосів - коротка, квітконоси - середньої довжини. Колір віночка квітки темно-фіолетовий, колір маточки - світло-фіолетовий.

*Дані заявника.

Середня врожайність наземної маси 309 ц/га, середня врожайність ранньої продукції 4,5 ц/га. Вміст вітаміну С 150 - 230 мг/%. Стійкий до хвороб та шкідників. Універсального напрямку використання. Рекомендовано для зон Степу та Лисостепу України.

*Дані заявника.

Коріандр

® 05185001 Американо

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Підтримувач(и):

* Рослина за габітусом прямостояча, висока. Стебло має антоціанове забарвлення. Розвинутий листок розсічений темно-зеленого забарвлення. Віночок квітки білого кольору.

*Дані заявника.

* Середній врожай наземної маси 345 ц/га, середній врожай насіння 19,9 ц/га, маса 1000 насінин 11,7 г. Вміст ефірної олії 1,73 %, збір - 36 кг/га. Вміст в ефірній олії ліналоолу 75 %. Висока врожайність ніжних великих дуже ароматних листків. Рекомендовано для зон Степу, Лисостепу, Полісся України.

*Дані заявника.

05185002 Міус

Заявник: Інститут ефіроолійних і лікарських рослин Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

* Рослина за габітусом напіврозлога помірно щільна. Рослина середньої висоти. Стебло пряме гіллясте з поздовжніми боріздками, не опушене, помірного зеленого кольору. Листок видовжений вкритий слабким восковим нальотом. Верхні листки розсічені, нижні – непарно-перісто-розсічені з добре, гілкування дуже високе. Плід темно-солом'яний слабо еліпсоїдної форми.

*Дані заявника.

*Середній врожай насіння 11,1 ц/га, маса 1000 насінин 6,7 г. Вміст ефірної олії 2,65 %. Вміст в ефірній олії ліналоолацетату 66,5 %. Рекомендовано для зон Степу, Лісостепу України.

*Дані заявника.

Котяча м'ята

® 04112001 Переможець 3

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

* Сходи мають антоціанове забарвлення. Рослина висока, за габітусом компактна. Листкова пластинка коротка і вузька, середньо опушена темно-зеленого кольору трикутно-яйцевидної форми. Стебло сильно гіллясте. Суцвіття - китиця. Пелюстки квітки брудно-білого кольору з пурпуровими цятками на нижній губі. Суцвіття та листки мають цитральний аромат.

*Дані заявника.

*Середньо стійкий до хвороб і шкідників. Середня врожайність зеленої маси - 70 ц/га. Маса 1000 насінин 0,53 г. Рослина заввишки 0,70 м. Збір ефірної олії 34,8 кг/га. Вміст ефірної олії у суцвіттях - 0,5 %, у сухій вегетативній масі - 0,31%. Склад ефірної олії: нерол - 33,2 %, гераніол - 30 %, цитраль - 22,4 %, нераль+ гераніаль - 22,4 %. Рекомендовано для зони Степу України.

*Дані заявника.

Тютюн

® 05019001 Галицький оригінальний

Заявник: Українська дослідна станція тютюництва

Власник(и): Українська дослідна станція тютюництва

Підтримувач(и):

Рослина висока, за формою циліндрична. Стебло світло-зелене. Листок світло-зелений, за довжиною середній, широкий, яйцевидний, вушка малі. Суцвіття сферичне, помірно щільне. Початок цвітіння середній.

За даними заявника: Урожайність повітряно сухих листків 27,4 ц/га, вихід 1 товарного сорту 76,6%, 2 товарного сорту 8,3%. Тип сировини ароматичний. Кількість технічно придатних листків 27 штук. Кількість днів до дозрівання листків останнього ламання 107 днів. Вміст нікотину 1,1%, число Шмука 0,40. Ураження хворобами незначне.

Цмин італійський

99296001 ВІМ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Сорт середньостиглий. Антоціанове забарвлення пагонів саджанців відсутнє. Рослина середньої висоти, за габітусом компактна, гілкування сильне. Діаметр куща великий. Стебло тонке. Листкова пластинка сизо-білого забарвлення коротка сильно опушена. Листки сидячі. Суцвіття головчасте щільне, до 30 великих кулястих кошиків у суцвітті. Квітки жовто-помаранчеві. Плід - сім'янка округлої форми, дрібна з великими довгастими залозками.

*Дані заявника.

Середньо стійкий до хвороб та шкідників. Середня врожайність сирої наземної маси 74,6 - 85,96 ц/га, середній урожай з куща - 0,37 кг, маса 1000 насінин - 0,51 г. Збір ефірної олії - 14,61 кг/га. Вміст ефірної олії у вегетативній масі - 0,42 %, вміст лinaloolu - 30 %, лinalylacetate - 10,1 %, неріл-ацетату - 3,6 %. Витримує зниження температури до - 20° С .

*Дані заявника.

99296002 Кристал

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Сорт середньостиглий. Антоціанове забарвлення саджанців відсутнє. Рослина середньої висоти, за габітусом напіврозлога, гілкування сильне. Діаметр куща великий. Стебло тонке. Листкова пластинка сизо-зеленого забарвлення вузька і коротка, сильно опушена. Листки сидячі. Суцвіття щиткоподібне не щільне, до 10 - 12 дрібних (яйцеподібних у фазі бутонізації) циліндричних кошиків у суцвітті. Квітки світло-жовті. Плід - сім'янка округлої форми, яскраво-коричнева, дрібна з великими довгастими залозками.

*Дані заявника.

* Середньо стійкий до хвороб та шкідників. Середня врожайність сирої наземної маси 98,7 ц/га, середній урожай з куща - 0,49 кг, маса 1000 насінин - 0,50 г. Збір ефірної олії - 14,61 - 17,5 кг/га. Вміст ефірної олії у вегетативній масі - 0,42 - 0,19 %, вміст лinaloolu - 1,3 %, лinalylacetate - 1,0 %, неріл-ацетату - 21 %. Витримує зниження температур до - 20° С . Рекомендовано для зони Степу України.

*Дані заявника.

Чабер гірський**99371001 Кримський Смарагд**

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Сорт ранньостиглий. Антоціанове забарвлення саджанців відсутнє. Рослина середньої висоти, за габітусом компактна, гілкування сильне. Стебло малого діаметра. Листкова пластинка темно-зеленого забарвлення коротка вузька сильно опушена. Суцвіття - китиця 18-23 см завдовжки, до 300 суцвіть на рослині. Пелюстки квітки біло-рожевого з пурпуровими цяточками забарвлення.

*Дані заявника.

*Середньо стійкий до хвороб та шкідників. Середня врожайність сирої наземної маси 76,6 ц/га, середній урожай з куща - 0,42 кг, маса 1000 насінин - 0,24 г. Збір ефірної олії - 43 кг/га. Вміст ефірної олії у вегетативній масі - 0,64 %, вміст карвакролу - 74,96 %. Рекомендовано для зони Степу України.

*Дані заявника.

Чебрець камфорний**00473001 Світлячок**

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Рослина середньої висоти, за габітусом напіврозлога. Листок сильно опушений зелений з сизуватим відтінком. Стебло прямостояче гіллясте. Суцвіття короткоциліндричні, із 5-7 кільчаток. Пелюстки квітки білого кольору. Плід - горішок дрібний світло-коричневого забарвлення еліптичної форми. Рослина має аромат камфори.

*Дані заявника.

Стійкість до хвороб і шкідників середня. Середня врожайність наземної маси 66,5 ц/га. Маса 1000 насінин 0,411 г. Рослина заввишки 0,45 м. Збір ефірної олії 43,8 кг/га. Вміст ефірної олії - 1,31 %, 1,8-цинеолу - 74,3 - 80 %, п-цимолу - 0,67%. Рекомендовано для зони Степу України.

*Дані заявника.

Монарда трубчатa

® 05445001 Прем'єра

Заявник: Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру

Власник(и): Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - наукового центру

Підтримувач(і):

* Рослина висока (до 95 см.), кущ напіврозлогий. Листок довгий широкий темно-зеленого кольору опушений. Рослина сильно розгалужується. Стебло слабо опушене із сильним антоціановим забарвленням. Утворює середню кількість суцвіть. Квітки рожевого кольору. Горішок гладенький, світло-коричневого кольору видовжено-овальної форми середнього розміру. Коріння довгі до 40 см.

* Дані заявника.

* Середня врожаність наземної маси 180 ц/га, з куща - 0,34 кг. Маса 1000 насінин 0,28 г. Стійкість до хвороб і шкідників середня. Вміст ефірної олії у сухій масі 2,2 %, збір - 121 кг/га. Ефірна олія містить до 20 компонентів. Склад ефірної олії: тимолу - 76,5 %, ліналоолу - 0,8 %, карвакролу - 1,81 %.

* Дані заявника.

Плодові та ягідні

Яблуна

® 05086001 Аполлон

Заявник: Ужгородський національний університет

Власник(и): Ужгородський національний університет

Підтримувач(і):

Заявник - Ужгородський національний університет.

* Дерево помірної сили росту, з піднесеною кроною. Плодоносить, в основному, на коротких пагонах (spur). Однорічний пагін помірно опушений, середньої товщини, з міжвузлями середньої довжини. На пагоні середня кількість сочевичок. Квітковий пагін світло-рожевого забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка не доторкуються. Листок розміщений паралельно до пагона. Листкова пластинка середньої довжини та ширини, з рифленими надрізами по краю. Листковий черешок середньої довжини. Плід середнього розміру, кулясто-конічної форми, слабо ребристий. Огрубіння й нерівності на кінці чашечки відсутні або дуже слабкі. Чашечка частково відкрита, середнього розміру. Чашолистки середньої довжини. Блюдце середньої глибини та ширини. Плідоніжка середньої товщини. Лійка помірно глибока, середньої ширини. Восковий наліт на шкірці відсутній або дуже слабкий, маслянистість слабка. Основне забарвлення плоду жовто-біле. Велика частина поверхні вкрита суцільним зі смугами червоним рум'янцем. Заіржавлення плоду відсутнє або дуже слабе. М'якоть білого кольору, м'яка. Насінні комірки частково відкриті. Час початку цвітіння - середній. Час збиральної стиглості - ранній.

* Дані заявника.

* За даними заявника: середня врожайність - 512 ц/га, середній урожай з дерева - 41 кг, середня маса плоду - 166, максимальна - 198 г. Дегустаційна оцінка - 9 балів, зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів, стійкість до ураження хворобами - 9 балів, ураженість шкідниками - 1 бал.

Напрямок використання - столовий і для технічної переробки. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

04086001 Брейберн

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сади Тавриди"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Заявник - ТОВ "Сади Тавриди".

*Дерево помірної сили росту, з розлогою кроною. Плодоносить на довгих пагонах. Однорічний пагін помірно опушений, середньої товщини, з міжвузлями середньої довжини. Сочевичок мало. Квітковий пагін світло-рожевого забарвлення. Квітка середнього розміру. Листок піднесений стосовно пагона. Листкова пластинка середньої довжини, вузька, з пилчастими надрізами по краю. Листковий черешок середньої довжини. Плід середнього розміру, кулясто-конічної форми, слабко ребристий. Огрубіння й нерівності на кінці чашечки слабкі. Чашечка частково відкрита, середнього розміру. Чашолистки короткі. Блюдце середньої глибини та ширини. Плодоніжка товста й коротка. Лійка помірно глибока, середньої ширини. Восковий наліт на шкірці відсутній або дуже слабкий. Маслянистість відсутня або дуже незначна. Основне забарвлення плоду жовто-зелене. Помірна частина поверхні плоду вкрита суцільним зі смугами, червоним рум'янцем. Заіржавлення поблизу чашечки та плодоніжки слабе. М'якоть кремового забарвлення, тверда. Насінні комірочки закриті. Час початку цвітіння - ранній. Час збиральної стиглості - пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 400 ц/га, середній урожай з дерева - 16 кг, середня маса плоду - 165 г. Зимостійкість - 7 балів, посухостійкість - 7 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси - 8 балів, парші - 8 балів. Дегустаційна оцінка - 8-9 балів. Сорт пізньостиглий. Напрямок використання - десертний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 06086002 Внучка

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН.

*Дерево помірної сили росту, з розлогою кроною. Плодоносить на коротких пагонах (spur). Однорічний пагін помірно опушений, середньої товщини, з короткими міжвузлями. Сочевичок мало. Квітковий пагін світло-рожевий. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка не доторкуються. Листок піднесений стосовно пагона. Листкова пластинка довга, середньої ширини, з пилчастими надрізами по краю. Листковий черешок короткий. Плід великий, кулясто-плескатий, слабко ребристий. Огрубіння й нерівності на кінці чашечки відсутні або дуже слабкі. Чашечка закрита, середнього розміру. Чашолистки середньої довжини. Блюдце середньої глибини та ширини. Плодоніжка середньої товщини, коротка. Лійка глибока, середньої ширини. Восковий наліт на шкірці слабкий. Маслянистість відсутня або дуже незначна. Основне забарвлення плоду жовте. Велика частина поверхні плоду вкрита розмитим червоним рум'янцем. Заіржавлення поблизу чашечки й на поверхні відсутнє або дуже слабе, поблизу плодоніжки - сильне. М'якоть кремового забарвлення, помірно пружна. Насінні комірочки цілком відкриті. Час початку цвітіння - середній. Час збиральної стиглості - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 354 ц/га, середній урожай з дерева - 13,3 кг, середня маса плоду - 250 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7-8 балів. Стійкість проти ураження хворобами: борошнистою росою - 9 балів, паршею - 8 балів. Стійкість проти пошкодження шкідниками: плодожеркою - 8 балів. Дегустаційна оцінка - 8-9 балів. Сорт зимового строку досягання.

Напрямок використання - для споживання у свіжому вигляді. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

® 06086001 Мавка

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН.

*Дерево помірної сили росту, із звислою кронею. Плодоносить на коротких і довгих пагонах. Однорічний пагін слабо опушений, середньої товщини, з міжвузлями середньої довжини. Сочевичок багато. Квітковий пагін темно-рожевого забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка не доторкуються. Листок піднесений стосовно пагона. Листкова пластинка середньої довжини та ширини, з пилчастими надрізами по краю. Листковий черешок середньої довжини. Плід від середнього до великого розміру, видовжено-конічний. Ребристість відсутня або дуже слабка. Огрубіння й нерівності на кінці чашечки відсутні або дуже слабкі. Чашечка частково відкрита, середнього розміру. Чашолистки середньої довжини. Блюдце середньої глибини та ширини. Плодоніжка довга й тонка. Лійка плодоніжки глибока, середньої ширини. Восковий наліт на шкірці відсутній або дуже слабкий. Маслянистість відсутня або дуже незначна. Основне забарвлення плоду жовте. Мала частина поверхні плоду вкрита розмитим червоним рум'янцем. Заіржавлення поверхні й поблизу плодоніжки - слабе. М'якоть кремового забарвлення, тверда. Насінні комірочки частково відкриті. Час початку цвітіння - середній. Час збиральної стиглості - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 360 ц/га, середній урожай з дерева - 13,5 кг, середня маса плоду - 166 г. Зимостійкість - 7-9 балів, посухостійкість - 7-8 балів. Стійкість проти ураження хворобами: борошнистою росою - 9 балів, паршею - 9 балів. Стійкість проти пошкодження шкідниками: плодожеркою - 8 балів. Дегустаційна оцінка - 7-9 балів. Сорт зимового строку досягання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

® 05086002 Старсол

Заявник: Ужгородський національний університет

Власник(и): Ужгородський національний університет

Підтримувач(і):

Заявник - Ужгородський національний університет.

*Дерево від помірного до сильнорослого, розлоге. Плодоносить, в основному, на коротких пагонах (spur). Однорічний пагін помірно опушений, середньої товщини, з короткими міжвузлями. Сочевичок - середня кількість. Квітковий пагін темно-рожевого забарвлення. Квітка середнього розміру, пелюстки доторкуються. Листок розміщений паралельно до пагона. Листкова пластинка середньої довжини, широка, з рифленими надрізами по краю. Листковий черешок середньої довжини. Плід від середнього до великого, широко-кулясто-конічний, слабо ребристий. Огрубіння й нерівності на кінці чашечки відсутні або дуже слабкі. Чашечка частково відкрита, середнього розміру. Чашолистки середньої довжини. Блюдце середньої глибини та ширини. Плодоніжка середньої товщини й довжини. Лійка помірно глибока, середньої ширини. Восковий наліт на шкірці відсутній або дуже слабкий. Маслянистість шкірки слабка. Основне забарвлення плоду жовто-зелене. Дуже велика частина поверхні вкрита сіцильним зі смугами, червоним рум'янцем. Заіржавлення плоду відсутнє або дуже слабе. М'якоть кремового забарвлення, помірно пружна. Насінні комірочки цілком відкриті. Час цвітіння - середній. Час збиральної стиглості - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 550 ц/га, середній урожай з дерева - 44 кг, середня маса плоду - 178, максимальна - 208 г. Дегустаційна оцінка - 8 балів, зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 8 балів, ураженість борошнистою росою - 1, паршею - 1 бал, пошкодження плодожеркою - 2 бали.

Напрямок використання - столовий і для технічної переробки. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

04086002 Чемпіон

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сади Тавриди"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - ТОВ "Сади Тавриди".

*Дерево помірної сили росту, з розлогою кронаю. Плодоносить на довгих пагонах. Однорічний пагін слабко опушений, середньої товщини, з короткими міжвузлями. На пагоні середня кількість сочевичок. Листок розміщений піднесено стосовно пагона. Листкова пластинка середньої довжини та ширини, з пилчастими надрізами по краю. Листковий черешок середньої довжини. Плід від середнього до великого розміру, кулястий. Ребристість відсутня або дуже слабка. Огрубіння й нерівності на кінці чашечки відсутні або дуже слабкі. Чашечка частково відкрита, велика. Чашолистки середньої довжини. Блюдце середньої глибини та ширини. Плідоніжка товста. Лійка глибока й широка. Восковий наліт на шкірці відсутній або дуже слабкий. Маслянистість шкірки відсутня або дуже незначна. Основне забарвлення плоду жовто-зелене з червоним суцільним зі смугами рум'янцем. Заіржавлення поблизу чашечки й на поверхні відсутнє або дуже слабке, поблизу плодоніжки - помірне. М'якоть жовтуватого кольору, помірно тверда. Насінні комірочки частково відкриті. Час початку цвітіння - середній. Час збиральної стиглості - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 400 ц/га, середній урожай з дерева - 16 кг, середня маса плоду - 165 г. Зимостійкість - 7 балів, посухостійкість - 7 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси - 8 балів, парші - 8 балів. Дегустаційна оцінка - 8-9 балів. Сорт середньостиглий. Напрямок використання - десертний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

Груша

® 05076004 Золотава

Заявник: Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Краснокутський НДЦ Інституту садівництва УААН.

*Дерево помірної сили росту, пряме, помірно гіллясте. Однорічний пагін прямий, з міжвузлями помірної довжини, помірно-коричневий на підсонячному боці. Сочевичок - середня кількість. Вегетативні бруньки притиснуті до пагона. Молодий пагін в період активного росту має помірне антоціанове забарвлення. Інтенсивність опушення верхньої третини пагона помірна. Листкова пластинка коротка, середньої ширини, з тупою основою. Надрізи по краю - відсутні. Кінчик листкової пластинки короткий. Центральна жилка - помірно вигнута. Черешок листка короткий. Прилистки - наявні. Квіткові бруньки розташовані головним чином на шпорцях. Брунька середньої довжини. Чашолисток середньої довжини, притиснутий до яйцевидної форми. Пелюстки віночка доторкуються одна до одної. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Пелюстки віночка середнього розміру, жовто-зелений. Плодоніжка середньої довжини й товщини, слабо викривлена. Лійка плодоніжки відсутня або дуже мілка. Чашолистки - розкриті. Блюдце мілке, нешироке, злегка ребристе. М'якоть слабо зерниста, м'яка, соковита. Зернятко - вузькоеліптичне. Час початку цвітіння - середній. Час збиральної стиглості - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 236,5 ц/га, середній урожай з дерева - 83,0 кг, середня маса плоду - 195 г, максимальна - 280 г. Зимостійкість - 7 балів, посухостійкість - 7-8 балів. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 0,5 балів, паршею - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, плодохеркою - 1 бал. Вміст загального цукру - 8,5%. Вміст вітаміну С - 0,95 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 7-8 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт осіннього строку досягання.

Напрямок використання - для споживання у свіжому вигляді. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

® 06076001 Платонівська

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН.

*Дерево сильноросле, пряме, помірно гіллясте. Однорічний пагін хвилястий, з міжвузлями помірної довжини, сіро-коричневого забарвлення на підсонячному боці. Сочевичок середня кількість. Вегетативні бруньки з гострими верхівками, відхилені від пагона. Молодий пагін у період активного росту має помірне антоціанове забарвлення. Інтенсивність опушення верхньої третини пагона помірна. Положення листкової пластинки стосовно пагона обвисле. Пластинка середньої довжини та ширини, з тупою основою й округлою верхівкою, округлозубчастими надрізами по краю. Кінчик - короткий. Центральна жилка листкової пластинки помірно вигнута. Черешок середньої довжини. Прилистки - наявні. Квіткові бруньки розташовані головним чином на шпорцях. Брунька середньої довжини. Чашолисток відігнутий від віночка. Пелюстки віночка доторкуються. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Пелюстки віночка середнього розміру, округлої форми. Чашолистки нестиглого плоду зеленого кольору. Плід великий, симетричний, опуклий з боків. Основний колір шкірки - жовто-зелений з помаранчевим відтінком. Плодоніжка середньої довжини й товщини, помірно викривлена. Лійка плодоніжки мілка. Чашолистки за досягання розкриті. Блюдце мілке, середньої ширини, плескате. М'якоть слабо зерниста, м'яка, дуже соковита. Зернятко - еліптичне. Час початку цвітіння - середній. Час збиральної стиглості - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 192,0 ц/га, середній урожай з дерева - 42,9 кг, середня маса плоду - 175 г. Зимостійкість - 8 балів, посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 0,5 балів, паршею - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: попелицею - не пошкоджується, плодожеркою - 1 бал. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Сорт осіннього строку досягання. Напрямок використання - десертний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

® 06076002 Яніс

Заявник: Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Придністровська дослідна станція Інституту садівництва УААН.

*Дерево помірної сили росту, пряме, помірно гіллясте. Однорічний пагін зигзагоподібної форми, з міжвузлями помірно довжини, сіро-зеленого кольору на підсонячному боці. Сочевичок мало. Верхівка вегетативної бруньки тупа. Бруньки слабо відхилені від пагона. Листкова подушка мала. Антоціанове забарвлення молодого пагона в період інтенсивного росту слабе. Положення листової пластинки стосовно пагона обвисле. Пластинка середньої довжини та ширини, з тупою основою й кінчиком, округлозубчастими надрізами по краю. Центральна жилка листка помірно вигнута. Черешок середньої довжини. Прилистки наявні. Квіткові бруньки середньої довжини, розташовані головним чином на шпорцях. Чашолисток середньої довжини, притиснутий до віночка. Пелюстки віночка середнього розміру, округлі, розташовані вільно. Приймочка маточки розміщена на рівні пиляків. Нігтик - короткий. Чашолистки нестиглого плоду зелено-коричневого кольору. Плід великий, симетричний, увігнутий з боків. Основний мілкий. Блюдце середньої глибини та ширини, плескате. М'якоть слабо ребриста, помірно тверда, соковита. Зернячко - вузькоеліптичне. Час початку цвітіння - ранній. Час збиральної стиглості - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 348,6 ц/га, середній урожай з дерева - 41,8 кг, середня маса плоду - 300 г, максимальна - 450 г. Зимостійкість - 8-9 балів, посухостійкість - 8-9 балів. Ураженість хворобами: борошнистою росою, паршею - не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею, плодожеркою - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 10,2%. Вміст вітаміну С - 5,8 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 8-9 балів. Сорт пізньоосіннього строку досягання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

Алича

® 06072002 Генерал

Заявник: Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук
Власник(и): Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук
Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявники - Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН, Інститут садівництва УААН.

*Дерево сильноросле. Крона - помірно щільна. Однорічна гілка розміщена напіввертикально. Плодушка - коротка. Вегетативна брунька дуже мала, конічної форми, притиснута до пагона. Листок спрямований догори. Листкова пластинка еліптичної форми, з гострим кінчиком, темно-зеленого забарвлення та помірно глянцева з верхнього боку. З нижнього боку - слабко опушена. Край листової пластинки - городчастий. Черешок листка довгий. Опушення верхньої сторони відсутнє або дуже слабке. Боріздка - глибока. Залозки розміщені на основі листка й на черешку. Плодоніжка - довга. Квітки на однорічних гілочках наявні. Квіток з повними пелюстками дуже багато. Квітка середнього розміру. Пелюстки - доторкуються. Чашолисток - широкоовальний. Пелюстка середнього розміру, округла, слабко хвиляста по краю. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід дуже великий, продовгуватий, нерівнобокий. Верхівка - плеската. Лійка - глибока. Основне покривне забарвлення плоду фіолетово-синє. М'якоть помаранчевого забарвлення, щільна, помірно соковита. Кісточка приросла до м'якоті. Кісточка середнього розміру, округло-еліптична в профіль. Вид кісточки зі шва - плескатий, з основи - видовжено-еліптичний. У профіль - не симетрична, зі шва - симетрична. Поверхня кісточки зерниста. Краї спинних швів - переривчасті. Черевний шов - вузький. Основа кісточки - широка й тупа. Верхівка - гостра. Час цвітіння - ранній. Строк достигання - пізній.

* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 300,0 ц/га, середній урожай з дерева - 45,0 кг, середня маса плоду - 45 г, максимальна - 61 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 9 балів. Моніліальним опіком не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, кісточковою мухою - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 6,7%, вітаміну С - 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 7-8 балів. Транспортабельність - 9 балів. Сорт середньопізнього строку достигання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявників.

® 06072001 Тетяна

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук
Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук
Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявники - Інститут садівництва УААН, Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН.

*Дерево сильноросле. Крона - помірно щільна. Положення однорічної гілки - напіввертикальне. Плодушка коротка. Вегетативна брунька, мала, овальна, притиснута до пагона. Листок розміщений горизонтально стосовно пагона. Листкова пластинка широкоовальна, з гострим кінчиком, помірного зеленого забарвлення. З верхнього боку - помірно глянцева, з нижнього - слабко опушена. Край листової пластинки городчастий. Черешок середньої довжини. Опушення верхнього боку відсутнє або дуже слабке. Боріздка - середньої глибини. Залозки розміщені на основі листка й на черешку. Плодоніжка середньої довжини. Квітки на однорічних гілочках наявні. Квітка мала, пелюстки віночка доторкуються. Чашолисток - широкоовальний. Пелюстка - обернено-широко-еліптична, слабко хвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, округлий, нерівнобокий. Верхівка - плеската, лійка - глибока. Основне покривне забарвлення плоду помаранчево-жовте. М'якоть жовта, щільна, помірно

соковита. Кісточка середнього розміру, приросла до м'якоті. У профіль - округло-еліптична, зі шва - плеската. Поверхня кісточки - дрібно-зерниста. Краї спинних швів суцільні. Черевний шов - вузький. Основа кісточки вузька й тупа, верхівка - гостра. Час цвітіння - ранній. Строк досягання - пізній.
* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 234,0 ц/га, середній урожай з дерева - 56,0 кг, середня маса плоду - 41 г, максимальна - 52 г. Зимостійкість - 8 балів, посухостійкість - 8 балів. Моніліальним опіком не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, кісточковою мухою - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 6,0%, вітаміну С - 5,3 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 7-8 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт середньопізннього строку досягання.
Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.
* Дані заявників.

Черешня

® 04085003 Аншлаг

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, вузька. Інтенсивність зеленого забарвлення з верхнього боку - сильна. Черешок листка довгий, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка округлої форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескاته. Шкірка середнього розміру. Пелюстки сочевичок - середня кількість. Сік - пурпуровий, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка - середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 126,0 ц/га, середній урожай з дерева - 48,0 кг, середня маса плоду - 12,6 г, максимальна - 15,3 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 11,3%, вітаміну С - 8,1 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів і транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

02085005 Віха

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Завник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони піднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, вузька, з верхнього боку - темно-зелена. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки жовто-зеленого забарвлення. Квітка велика. Пелюстки віночка широко-еліптичної форми, не доторкуються одна до одної. Плід - великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескате. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок мало. Сік та

м'якоть червоного кольору. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини, тонка, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - ранній.
* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 114,8 ц/га, середній урожай з дерева - 56,3 ц, середня маса плоду - 9,5 г, максимальна - 14,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокмікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею та кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 9,5%, вітаміну С - 5,3 мг%. Дегустаційна оцінка й транспортабельність - 8 балів. Строк досягання - пізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

02085002 Визнання

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильросле. Середньо розгалужене. Форма крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона від слабкого до помірного. Листкова пластинка середньої довжини та ширини, світло-зеленого кольору з верхнього боку. Черешок - середньої довжини, наявні залозки жовто-зеленого забарвлення. Квітка середня, пелюстки віночка - широко-еліптичні, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескاته. Забарвлення шкірки плоду жовте, сочевичок - мало. Сік - безбарвний, м'якоть - кремово-біла, середньої пружності. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка - середньої довжини, тонка, відсутній прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала, округла. Час цвітіння - ранній. Час досягання плодів - дуже ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 102,3 ц/га, середній урожай з дерева - 50,1 кг, середня маса плоду - 6,0 г, максимальна - 8,0 г. Зимостійкість і посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 3 бали. Пошкодження шкідниками: кісточковою мухою й попелицею - 1 бал. Вміст загального цукру - 10,0%, вітаміну С - 4,5 мг%. Дегустаційна оцінка - 8 балів. Транспортабельність - 7 балів. Строк досягання - ранній.

Напрямок використання - десертний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

02085004 Дебют

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, середньої ширини, темно-зелена з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки жовто-зеленого забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки широко-еліптичної форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки плоду - плескате. Забарвлення шкірки темно-червоне, сочевичок мало. Сік - червоний, м'якоть - червона, пружна. Кислотність плоду низька, вміст цукрів - високий. Плід середньо соковитий. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює її від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - пізній. Час

достигання плодів - пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 108,3 ц/га, середній урожай з дерева - 48,8 кг, середня маса плоду - 8,5 г, максимальна - 10,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 бали, кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 12,1%, вміст вітаміну С - 5,9 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 7 балів. Строк достигання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.

® 04085001 Дивна

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона - слабе. Листкова пластинка довга, середньо широка. Інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку сильна. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - загострене. Шкірка - темно-червоного забарвлення, сочевичок середня кількість. Сік - червоний, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 126,0 ц/га, середній урожай з дерева - 46,0 кг, середня маса плоду - 11,7 г, максимальна - 14,4 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 9,8%, вітаміну С - 7,1 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк достигання - пізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

89085002 Епос

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, середньої ширини, темно-зеленого кольору з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка - середня. Пелюстки - широко-еліптичної форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки плоду плескاته. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок мало. Сік - червоний, м'якоть - червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній. Плодоніжка середньої довжини, тонка, відсутній прошарок, що відокремлює плід від плодоніжки. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - середньопізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 149,8 ц/га, середній урожай з дерева - 73,8 кг, середня маса плоду - 9,0 г, максимальна - 12,0 г. Зимостійкість і посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 3 бали. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 бали, кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 14,0%, вітаміну С - 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.

89085003 Ера

Заявник:

Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка - довга, вузька, темно-зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-чепвоно забарвлення. Квітка середнього розміру. Пелюстки - широко-еліптичні, доторкуються одна до одної. Плід - великий, округлий. Закінчення лійки - плескاته. Шкірка плоду темно-червоного кольору, сочевичок мало. Сік і м'якоть - червоні. М'якоть - пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини, тонка, відсутній прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка мала. Округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 160,0 ц/га, середній урожай з дерева - 78,8 кг, середня маса плоду 10,5 г, максимальна маса - 14,5 г. Зимостійкість і посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 1 бал, моніліальним опіком - 3 бали. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 11,3%, вітаміну С - 8,8 мг%. Дегустаційна оцінка - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - ранній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

® 06085002 Любава

Заявник:

Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук
Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявники - Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН, Інститут садівництва УААН.

*Дерево помірної сили росту, сильно розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні - середня кількість сочевичок. Вегетативні бруньки злегка відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона - слабе. Листкова пластинка довга, середньо широка. Черешок - довгий, наявні оранжево-жовтого забарвлення залозки. Віночок квітки великий. Пелюстки округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Лійка - заглиблена. Забарвлення шкірки - кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні. На шкірці - середня кількість малих сочевичок. Сік - безбарвний, м'якоть - жовта. Плід середньої пружності, дуже соковитий, помірно кислий, вміст цукрів - високий. Плодоніжка - середньої довжини й товщини. Наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, широкоеліптична. Час цвітіння - пізній. Час досягання - пізній.

* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 197,0 ц/га, середній урожай з дерева - 35,5 кг, середня маса плоду - 8,4 г, максимальна - 12,5. Зимостійкість - 7 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 1 бал, моніліальним опіком - не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 бали, кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 13,0%, вітаміну С - 3,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8,7 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт середньопізннього строку досягання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 06085002 Любава

Заявник: **Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук**

Власник(и): **Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук
Інститут садівництва Української академії аграрних наук**

Підтримувач(и):

Заявники - **Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН, Інститут садівництва УААН.**

*Дерево помірної сили росту, сильно розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні - середня кількість сочевичок. Вегетативні бруньки злегка відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона - слабке. Листкова пластинка довга, середньо широка. Черешок - довгий, наявні оранжево-жовтого забарвлення залозки. Віночок квітки великий. Пелюстки округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Лійка - заглиблена. Забарвлення шкірки - кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні. На шкірці - середня кількість малих сочевичок. Сік - безбарвний, м'якоть - жовта. Плід середньої пружності, дуже соковитий, помірно кислий, вміст цукрів - високий. Плодоніжка - середньої довжини й товщини. Наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, широкоеліптична. Час цвітіння - пізній. Час досягання - пізній.

* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 197,0 ц/га, середній урожай з дерева - 35,5 кг, середня маса плоду - 8,4 г, максимальна - 12,5 г. Зимостійкість та посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 1 бал, моніліальним опіком - не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею та кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 13,0%, вітаміну с - 3,2%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8,7 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт середньопізннього строку досягання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявників.

® 06085001 Легенда Мліїва

Заявник: **Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук**

Власник(и): **Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук**

Підтримувач(и):

Заявник - **Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН.**

*Дерево - помірної сили росту, середньо розгалужене. Крона - напівпіднесена. Сочевичок на однорічному пагоні мало. Вегетативні бруньки - злегка відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабке. Листкова пластинка довга, середньо широка. Черешок листка дуже великий, ниркоподібний. Закінчення лійки - плескате. Забарвлення шкірки плоду - кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні. Сочевичок на шкірці мало. Сік - безбарвний, м'якоть жовта, пружна, кислотність - низька. Вміст цукрів - середній, соковитість - висока. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округлої форми. Час цвітіння - ранній. Час

достигання плодів - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 145 ц/га, середній урожай з дерева - 51 кг, середня маса плоду - 8,8 г, максимальна - 9,5 г. Зимостійкість та посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 1 бал, моніліальним опіком - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, кісточковою мухою - 2 бали. Вміст загального цукру - 11,4%, вітаміну С - 3,5 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 7 балів. Строк достигання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

® 04085005 Ласуня

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, бруньки - злегка відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, середньої ширини, помірного зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного кольору. Квітка середнього розміру. Пелюстки - округлі, доторкуються одна до одної. Плід - великий, серцеподібний. Закінчення лійки загострене. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок - багато. Сік - пурпуровий, м'якоть - темно-червона, середньої пружності. Кислотність - помірна, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 122,0 ц/га, середній урожай з дерева - 43,0 кг, середня маса плоду - 8,0 г, максимальна - 9,8 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 8,4%, вітаміну С - 6,6 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 7-8 балів. Строк достигання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

® 04085002 Любимиця Туровцева

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона помірне. Листкова пластинка довга, середньо широка. Інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку сильна. Черешок середньої довжини, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка мала. Пелюстки віночка округлої форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескате. Шкірка темно-червоного забарвлення, сочевичок середня кількість. Сік - червоний, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: Середня врожайність - 138,0 ц/га, середній урожай з дерева - 43,0 кг, середня маса плоду - 12,1 г, максимальна - 14,6 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 7,5%, вітаміну С - 6,7 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 8 балів. Строк достигання - пізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

02085006 Простір

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок. Вегетативні бруньки - виразно відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка середньої довжини та ширини, темно-зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного кольору. Квітка велика. Пелюстки віночка широко-еліптичні, доторкуються одна до одної. Плід дуже великий, серцеподібний. Закінчення лійки плоду - плескاته. Шкірка - темно-червона, сочевичок мало. Сік - червоний, м'якоть - темно-червона. Пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній. Соковитість плоду середня. Плодоніжка середньої довжини й товщини. Наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - середньопізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 105,4 ц/га, середній урожай з дерева - 47,8 кг, середня маса плоду - 10,0 г, максимальна - 12,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 3 бали, моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 8,7%, вітаміну С - 5,9 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 8 балів. Строк достигання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ. Лісостеп.

* Дані заявника.

02085003 Суперниця

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона - слабе. Листкова пластинка темно-зелена, довга, вузька. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки світло-червоного забарвлення. Квітка - велика. Пелюстки віночка широко-еліптичної форми, розміщені вільно. Плід дуже великий, серцеподібної форми. Закінчення лійки плоду - плескате. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок - мало. Сік - червоний, м'якоть - червона. Плід - пружний, середньо соковитий, кислотність - низька, вміст цукрів - середній. Плодоніжка середньої довжини, тонка, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 136,5 ц/га, середній урожай з дерева - 62,0 кг, середня маса плоду - 9,0 г, максимальна - 14,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 10,3%, вітаміну С - 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - середньопізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.

89085001 Темпоріон

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньорозгалужене. Крона - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, середньої ширини, темно-зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного кольору. Квітка велика. Пелюстки еліптичної форми, доторкуються одна до одної. Плід дуже великий, серцеподібний. Закінчення лійки плоду плескاته. Шкірка - темно-червоного забарвлення, сочевичок мало. Сік - червоний, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - помірна, вміст цукрів - середній. Соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини, тонка, відсутній прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 153,0 ц/га, середній урожай з дерева - 75,3 кг, середня маса плоду - 10,5 г, максимальна - 14,0 г. Зимостійкість і посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 3 бали. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 3 бали. Вміст загального цукру - 12,2%, вітаміну С - 6,7 мг%. Дегустаційна оцінка - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - пізній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.

® 04085004 Шанс

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - злегка відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона помірне. Листкова пластинка середньої довжини та ширини, помірного зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок середньої довжини, залозки - відсутні. Квітка середнього розміру. Пелюстки - округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескате. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок - багато. Сік - пурпуровий м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - помірна, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка - середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час досягання плодів - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 137,1 ц/га, середній урожай з дерева - 46,0 кг, середня маса плоду - 9,8 г, максимальна - 11,8 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 10,8%, вітаміну С - 6,8 мг%. Дегустаційна оцінка й транспортабельність - 9 балів. Строк досягання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

Слива

® 06080001 Ненька

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН.

*Дерево слаборосле. Крона - помірно щільна. Однорічна гілка розміщена напіввертикально. Плодушка середньої довжини. Вегетативна брунька мала, конічна, злегка відхилена від пагона. Листок розташований горизонтально стосовно пагона. Листкова пластинка широкоовальна, з прямим або майже прямим кінчиком, темно-зеленого забарвлення з верхнього боку. Глянцуватість верхнього боку слабка, опушення нижнього боку - слабе. Край листової пластинки пилчастий. Черешок середньої довжини, слабо опушений з верхнього боку. Борізка - мілка. Залозки розташовані на основі листка й на черешку. Квітки на однорічних гілочках відсутні. Квітка середнього розміру, пелюстки віночка доторкуються. Чашолисток - вузькоеліптичний. Пелюстка обернено-яйцевидної форми, слабо хвиляста по краю. Приймочка маточки розташована на рівні пилків. Плід великий, продовгуватий, рівнобокий. Верхівка - плеската. Лійка - мілка. Основне покривне забарвлення плоду - фіолетово-синє. М'якоть жовта, щільна, соковита. Кісточка добре відділяється від м'якоті. Середнього розміру, округло-еліптична - у профіль. Зі шва кісточка майже кулеподібна, з основи - округло-еліптична. Симетрична - зі шва та у профіль. Бокова поверхня кісточки - зерниста. Край спинних швів суцільний. Черевний шов - середньої ширини. Кісточка середньої ширини, з прямою або майже прямою основою та гострою верхівкою. Час цвітіння - середній. Строк досягання - ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність 154,3 ц/га, середній урожай з дерева - 37,0 кг, середня маса плоду - 42,1 г, максимальна - 58,7 г. Зимостійкість - 8 балів, посухостійкість - 8 балів. Ураженість хворобами: моніліальним опіком - 5%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1-2 бали, кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 9,4%, вітаміну С - 5,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт раннього строку досягання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

Агрус

® 06071001 Легінь

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН.

*Рослина слабкоросла, нещільна, яйцеподібної форми. Однорічний пагін прямий, дуже слабо вигнутий. Базальних пагонів кілька. Колючки - відсутні. У верхній третині пагона щетинки відсутні або їх дуже мало. Антоціанове забарвлення молодого пагона слабе. Молодий листок помірного зеленого забарвлення. Антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабе. Повністю розвинутий листок середнього розміру, помірно глянцевавший з верхнього боку. Кут основи відносно черешка - гострий. Переважна кількість квіток у суцвітті - дві. Антоціанове забарвлення зав'язі слабе, опушення - відсутнє або дуже слабе. Ягода - велика, еліпсоподібна, червоного кольору. Восковий наліт - слабкий. Волохатість - відсутня або дуже слабка. Жилкування - помірне. Шкірка - середньої товщини. Подовження основи ягоди середнє. Плодоніжка середньої довжини. Час розпускання бруньок - пізній. Час цвітіння - пізній. Час досягання ягід - пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 184,0 ц/га, середній урожай з куща - 2,3 кг, середня маса ягоди - 4,7 г, максимальна - 8,9 г. Зимо- та посухостійкість - 7-8 балів. Стійкість проти хвороб: антракнозу та борошнистої роси - 7-8 балів. Вміст загального цукру - 6,76%, вітаміну С - 35,3 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 7 балів. Транспортабельність - 7-8 балів. Строк досягання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

Малина

® 05077002 Космічна

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Підтримувач(і):

Заявник - Національний аграрний університет.

*Рослина утворює середню кількість молодих пагонів без шипів. Восковий наліт на повністю розвинутих пагонах сильний. Пагони поточного року середньої довжини. Рельєфність між жилками листка сильна. Листочків - іноді три, іноді п'ять. Вони доторкуються один до одного. Інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку листка помірна. Черешок нижньої пари бічних листочків дуже короткий. Квітка середнього розміру. Антоціанове забарвлення квітконіжки відсутнє. Плодоносні пагони середньої довжини. Плід помірно-червоний, великий, довший, ніж ширший, твердий, помірно глянцевавший. Схильність до утворення квітколожа помірна. Період основного плодоношення - на пагонах поточного року, восени. Час появи пагонів - ранній. Час досягання - ранній. Тривалість урожайного сезону - довга.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 82,0 ц/га (осінній збір), середня маса ягоди - 3,4 г, максимальна - 8,3 г. Ступінь підмерзання бруньок - 2 бали. Посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: пурпуровою плямистістю й антракнозом - 1 бал. Шкідниками не пошкоджується. Вміст загального цукру - 6,4%, вітаміну С - 55,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 8 балів. Сорт ремонтантний.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 06077002 Персея

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут садівництва УААН.

*Рослина утворює середню кількість молодих пагонів. Дуже молоді пагони мають помірне антоціанове забарвлення. На пагоні наявні пурпурового кольору шипи, щільність яких у центральній третині помірна. На повністю розвинутих пагонах восковий наліт відсутній або дуже слабкий. Пагони в стані спокою середньої довжини, сіро-коричневого кольору. Рельєфність між жилками листка помірна. Листочків - іноді три, іноді п'ять. Вони доторкуються один до одного. Верхній бік листка - темно-зеленого забарвлення. Черешок нижньої пари бічних листочків короткий. Квітка середнього розміру. Квітконіжка із сильним антоціановим забарвленням. Плодоносні пагони середньої довжини. Плід темно-червоний, великий, довший, ніж ширший, твердий, помірно глянуватий. Схильність до утворення квітколожа - помірна. Період основного плодоношення - на пагонах минулого року, влітку. Час розпускання бруньок - середній. Час цвітіння - середній. Час достигання - ранній. Тривалість урожайного сезону - середня.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 175,7 ц/га, середня маса ягоди - 4,1 г, максимальна - 4,7 г. Ступінь підмерзання бруньок - 1 бал. Посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: пурпуровою плямистістю й антракнозом - 1 бал. Пошкодження шкідниками: малиновим довгоносом - 0,5 балів, попелицею - 1 бал. Вміст загального цукру - 6,54%, вітаміну С - 28,07 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 06077001 Саня

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут садівництва УААН.

*Рослина утворює середню кількість молодих пагонів. Дуже молоді пагони із сильним антоціановим забарвленням. Молоді пагони вкриті пурпуровими шипами, щільність яких у центральній третині рідка. Восковий наліт на повністю розвинутих пагонах відсутній або дуже слабкий. Пагони в стані спокою довгі, сіро- та пурпурово-коричневі. Між жилками листка помірна рельєфність. Листочків іноді три, іноді п'ять. Вони доторкуються один до одного. Верхній бік листка помірного зеленого забарвлення. Черешок нижньої пари бічних листочків короткий. Квітка середнього розміру. Квітконіжка з помірним антоціановим забарвленням. Плодоносні пагони середньої довжини. Плід помірно-червоний, великий, довший, ніж ширший, середньо твердий, помірно глянуватий. Схильність до утворення квітколожа - помірна. Період основного плодоношення - на пагонах минулого року, влітку. Час розкриття бруньок - середній. Час цвітіння - середній. Час достигання - ранній. Тривалість урожайного сезону - коротка.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 196,1 ц/га, середня маса ягоди - 3,8 г, максимальна - 4,6 г. Ступінь підмерзання бруньок - 1 бал, посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: пурпуровою плямистістю - 1 бал, антракнозом - 1,5 балів. Пошкодження шкідниками: малиновим довгоносом - 0,5 балів, попелицею - 1 бал. Вміст загального цукру - 5,28%, вітаміну С - 26,15 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 05077003 Сяйво

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Підтримувач(и):

Заявник - Національний аграрний університет.

*Рослина утворює середню кількість молодих пагонів без шипів. На повністю розвинутих пагонах сильний восковий наліт. Пагони поточного року короткі. Рельєфність між жилками листка помірна. Кількість листочків - звичайно три. Вони доторкуються один до одного. Верхній бік листка темно-зеленого забарвлення. Черешок нижньої пари бічних листочків дуже короткий. Квітка середнього розміру. Антоціанове забарвлення квітконіжки відсутнє. Плодоносні пагони короткі. Плід темно-червоний, середнього розміру, однакової довжини й ширини, помірно твердий, помірно глясуватий. Схильність до утворення квітколожа - помірна. Період основного плодоношення - на пагонах поточного року, восени. Час появи пагонів - дуже ранній. Час достигання - дуже ранній. Тривалість урожайного сезону - довга.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 78,0 ц/га (осінній збір), середня маса ягоди - 2,7 г, максимальна - 6,1 г. Ступінь підмерзання бруньок - 1,8 балів. Посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: пурпуровою плямистістю - 1,5 балів, антракнозом - 1 бал. Шкідниками не пошкоджується. Вміст загального цукру - 7,0%, вітаміну С - 60,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт - ремонтантний. Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 99077002 Феномен

Заявник: Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Краснокутський науково-дослідний центр Інституту садівництва УААН.

*Рослина утворює малу кількість молодих пагонів. Дуже молоді пагони з помірним антоціановим забарвленням. Молоді пагони вкриті пурпуровими шипами, розташованими нещільно у центральній третині пагона. Восковий наліт повністю розвинутих пагонів - слабкий. Пагони у стані спокою середньої довжини, сіро-коричневого кольору. Рельєфність між жилками листка - помірна. Кількість листочків - звичайно п'ять. Вони доторкуються один до одного. Верхній бік листка - помірного зеленого забарвлення. Черешок нижньої пари бічних листочків середньої довжини. Квітка - велика. Антоціанове забарвлення квітконіжки - відсутнє. Плодоносні пагони - довгі. Плід - пурпуровий, великий, довший, ніж ширший, твердий, помірно глясуватий. Період основного плодоношення - на пагонах минулого року, влітку. Час розкриття бруньок - середній. Час цвітіння - середній. Тривалість урожайного сезону - довга.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 146,0 ц/га, середня маса ягоди - 7,1 г, максимальна - 10,2 г. Ступінь підмерзання бруньок - 0,5 балів. Посухостійкість - 8 балів. Ураженість хворобами: пурпуровою плямистістю - 1,5 балів, антракнозом - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: малиновим довгоносом - 1 бал, попелицею - 1,5 балів. Вміст загального цукру - 7,6%, вітаміну С - 44,7 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 7-8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

Порічки (червоні і білі)

® 06082001 Ласуня

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Інститут садівництва УААН.

*Рослина середньоросла, середньощільна, кущиста. Головних пагонів - середня кількість. Час розпускання бруньок - середній. Цвітіння - середнє. У суцвітті багато квіток. Вісь суцвіття зі слабким антоціановим забарвленням. Квітка середнього розміру. Чашечка - блюдцеподібна, з помірним антоціановим забарвленням. Час початку цвітіння - середній. Молодий листок темно-зеленого забарвлення. Антоціанове забарвлення молодого пагона - помірне, опушення - помірне. Повністю розвинутий листок середнього розміру, темно-зелений - з верхнього боку. Черешок листка середньої товщини. Час досягання ягід - ранній. Загальна довжина грона - середня, довжина стрижня - середня. Ягода середнього розміру, округла, червона, тверда.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 120,0 ц/га, середня маса ягоди - 0,9 г, максимальна - 1,1 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 8 балів. Ураженість хворобами: борошнистою росою - не уражується, антракнозом - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем - не пошкоджується, попелицею - 0,5 балів. Вміст загального цукру - 9,1%, вітаміну С - 57,8 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 7 балів.

Напрямок використання - десертний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

Смородина чорна

® 06083001 Консул

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка.

*Кущ середньої висоти, із середньою кількістю скелетних пагонів. Антоціанове забарвлення бруньки слабе, восковий наліт - слабкий. Молодий пагін із слабким антоціановим забарвленням. Листок з верхнього боку темно-зеленого забарвлення, помірно блискучий. Форма язичка листової пластинки - відкрита. Черешок листка зі слабким антоціановим забарвленням, що розташоване рівномірно по черешку. З однієї бруньки утворюється одне або два квіткових грона. Антоціанове забарвлення часток оцвітини - помірне, зав'язі - слабе. Ягода дуже велика, округла, помірно тверда, чорного кольору. Маса 100 штук ягід - велика. Час розвитку бруньок - ранній. Час початку цвітіння - ранній. Час досягання ягід - ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 155,0 ц/га, середня маса ягоди - 2,5 г, максимальна - 4,1 г. Зимо- та посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: борошнистою росою й антракнозом - 1-2 бали. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем і попелицею - 1 бал. Вміст загального цукру - 6,4%, вітаміну С - 224,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 9 балів. Транспортабельність - 7 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

® 06083003 Оріана

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут садівництва УААН.

*Кущ високий, із середньою кількістю скелетних пагонів. Антоціанове забарвлення бруньки поміrne, восковий наліт - помірний. Молодий пагін з помірним антоціановим забарвленням. Листок з верхнього боку помірного зеленого кольору, помірно блискучий. Форма язичка листової пластинки - відкрита. Черешок листка з помірним антоціановим забарвленням, що розташоване рівномірно по черешку. З однієї бруньки утворюється більше двох квіткових грон. Антоціанове забарвлення часток оцвіттини слабе, зав'язі - відсутнє або дуже слабе. Ягода велика, округло-овидовжена, тверда, чорного кольору. Маса 100 штук ягід велика. Час розвитку бруньок - середній. Час початку цвітіння - середній. Час досягання ягід - ранньо-середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 195,5 ц/га, середня маса ягоди - 2,2 г, максимальна - 3,5 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 8 балів. Ураженість хворобами: борошнистою росою - не уражується, антракнозом - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем - 0,5 балів, попелицею - 0,5 балів. Вміст загального цукру - 8,8%, вітаміну С - 216,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 7 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 05083002 Пам'яті Леоніда Михайлевського

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Підтримувач(і):

Заявник - Національний аграрний університет.

*Кущ середньої висоти, із середньою кількістю скелетних пагонів. Антоціанове забарвлення бруньки відсутнє або дуже слабе, восковий наліт - слабкий. Антоціанове забарвлення молодого пагона відсутнє або дуже слабе. Інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку листка помірна, блиск - слабкий. Форма язичка листової пластинки проста. Антоціанове забарвлення черешка листка відсутнє або дуже слабе. З однієї бруньки формується одне або два квіткових грона. Антоціанове забарвлення часток оцвіттини та зав'язі - відсутнє або дуже слабе. Ягода - дуже велика, округло-плеската, помірно тверда, чорного кольору. Маса 100 штук ягід - велика. Час розвитку бруньок - ранній. Початок цвітіння - дуже ранній. Час досягання ягід - дуже ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 140,0 ц/га, середня маса ягоди - 1,5 г, максимальна - 4,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 5-6 балів. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 0,5 балів, антракнозом - не уражується. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем - 0,5 балів, попелицею - не уражується. Вміст загального цукру - 8,0%, вітаміну С - 220,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 7-8 балів. Транспортабельність - 7 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 05083001 Університетська

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет

Підтримувач(і):

Заявник - Національний аграрний університет.

*Кущ середньої висоти, вузький, з великою кількістю скелетних пагонів. Антоціанове забарвлення бруньки помірне, восковий наліт - слабкий. Молодий пагін з помірним антоціановим забарвленням. Листок з верхнього боку темно-зеленого кольору, помірно блискучий. Форма язичка листкової пластинки проста. Антоціанове забарвлення черешка листка слабке, розташоване рівномірно по черешку. З однієї бруньки формується одне або два квіткових грона. Антоціанове забарвлення часток оцвітчини та зав'язі - слабке. Ягода велика, округловидовжена, тверда, чорного кольору. Маса 100 штук ягід - середня. Час розвитку бруньок - пізній. Початок цвітіння - пізній. Достигання ягід - пізніє.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 170,0 ц/га, середня маса ягоди - 1,2 г, максимальна - 3,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7-8 балів. Хворобами - не уражується. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем - 0,5 балів, попелицею - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 8,4%, вітаміну С - 230,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

Суніця

® 05084008 Симфонія

Заявник: Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд

Власник(и): Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд

Підтримувач(і):

Заявник - Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд.

*Рослина кулясто-сплюснена, помірно щільна, помірної сили росту. Листок помірно блискучий, слабо пухирчастий, темно-зелений - з верхнього боку. Верхівковий листочок довший, ніж ширший, з тупою основою, зубчастий - по краях. Волоски на черешку - сильно відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка відсутнє або дуже слабке. Рослина утворює середню кількість помірно опушених вусів помірного антоціанового забарвлення. Суцвіття розміщене під листками. Квітка середнього розміру. Чашечка більша за віночок. Пелюстки віночка перекриваються одна з одною. Плід дещо довший, ніж ширший, дуже великий, конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона плоду, вільна від зерняток, відсутня або дуже мала. Нерівності на поверхні - сильні. Плід рівномірного темно-червоного кольору, із сильним блиском. Зернятка розташовані врівень з поверхнею плоду. Чашечка дещо більша за діаметр плоду, розташована на рівні плоду, частки - відлеглі. М'якоть помірно тверда, темно-червона. Повітряна комірка - велика. Червоне забарвлення м'якоті розташоване на периферії та в середині плоду. Час цвітіння - середньопізній. Час достигання - середньопізній. Спосіб плодоношення - не повторює плодоношення.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 195,0 ц/га, середня маса ягоди - 12,6 г, максимальна - 45,3 г. Зимо- та посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси та сірої гнилі - 9 балів. Стійкість проти шкідників: сунічного кліща та нематод - 9 балів. Вміст загального цукру - 7,6%, вітаміну С - 67,14 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8 балів. Транспортабельність - 8-9 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 06084001 Веселка

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Інститут садівництва УААН.

*Рослина куляста, середньощільна, сильноросла. Листок помірно блискучий, сильно пухирчастий, темно-зелений - з верхнього боку. Верхівковий листочок довший, ніж ширший, з гострою основою та зубчастим зазубленням по краях. Волоски на черешку злегка відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка помірне. Рослина утворює багато помірно опушених вусів помірного антоціанового забарвлення. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка середнього розміру. Чашечка менша за віночок. Пелюстки віночка доторкуються одна до одної. Плід переважно ширший, ніж довший, великий, переважно округло-широкий. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона плоду, вільна від зерняток, помірна. Нерівності на поверхні відсутні або дуже слабкі. Плід рівномірного помаранчево-червоного забарвлення, із сильним блиском. Зернятка виступають на поверхні плоду. Чашечка - виступаюча. Частки - відлеглі. Чашечка дещо менша за діаметр плоду. М'якоть помірно тверда, помаранчево-червона. Повітряна комірka відсутня або дуже мала. Червоне забарвлення м'якоті розташоване на периферії та в середині плоду. Час цвітіння - ранній. Час достигання - ранній. Спосіб плодоношення - не повторює плодоношення.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 194,9 ц/га, середня маса ягоди - 13,2 г, максимальна - 40,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 8 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси та сірої гнилі - 9 балів. Стійкість проти шкідників: суничного кліща - 8,5 балів. Вміст загального цукру - 6,88%, вітаміну С - 68,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 7 балів. Транспортабельність - 8 балів. Напрямок використання - десертний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 05084009 Ерос

Заявник: Меосіс Лімітед

Власник(и): Меосіс Лімітед

Підтримувач(і):

Заявник - Меосіс Лімітед.

*Рослина кулясто-сплюснена, середньощільна, сильноросла. Листок слабко блискучий, слабко пухирчастий, зелений - з верхнього боку. Верхівковий листочок набагато довший, ніж ширший, з округлою основою та пилчастим зазубленням по краях. Волоски на черешку сильно відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка слабке. Рослина утворює середню кількість помірно опушених вусів помірного антоціанового забарвлення. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка велика. Чашечка більша за віночок. Пелюстки перекриваються одна з одною. Плід однакової ширини й довжини, великий, переважно конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помітна. Зона плоду, вільна від зерняток, помірна. На поверхні - сильні нерівності. Плід злегка нерівномірного червоного кольору, помірно блискучий. Зернятка розташовані врівень з поверхнею плоду. Чашечка - виступаюча, частки - відхилені. М'якоть помірно тверда, ясно-червона. Повітряна комірka середнього розміру. Червоне забарвлення поширене на периферії та в середині плоду. Час цвітіння - середньопізній. Час достигання - середньопізній. Спосіб плодоношення - не повторює плодоношення.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 165 ц/га, середня маса ягоди - 11,9 г, максимальна - 38,7 г. Зимостійкість - 7 балів, посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси - 9 балів, сірої гнилі - 7 балів. Стійкість проти шкідників: суничного кліща - 7 балів, нематод - 9 балів. Вміст загального цукру - 7,95%, вітаміну С - 61,23 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 8-9 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.

® 05084010 Корона

Заявник: Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

Власник(и): Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

Підтримувач(і):

Заявник - Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

*Рослина куляста, середньощільна, помірної сили росту. Листок - темно-зелений з верхнього боку, помірно блискучий. Пухирчастість - помірна. Верхівковий листочок довший, ніж ширший, з тупою основою та пилчастим зазубленням по краях. Волоски на черешку сильно відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка відсутнє або дуже слабе. Рослина утворює середню кількість помірно опушених вусів помірного антоціанового забарвлення. Суцвіття розміщене під листками. Квітка середнього розміру. Чашечка однакового розміру з віночком. Пелюстки віночка доторкуються одна до одної. Плід великий, дещо довший, ніж ширший, переважно конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона плоду вільна від зерняток відсутня або дуже мала. Нерівності на поверхні - відсутні або дуже слабкі. Плід рівномірного червоного забарвлення, помірно блискучий. Зернятка та чашечка - заглиблені. Частки чашечки - відлеглі. М'якоть червона, помірно тверда. Повітряна комірka середнього розміру. Червоне забарвлення м'якоті розташоване тільки на периферії плоду. Час цвітіння - ранній. Час досягання - ранній. Спосіб плодоношення - не повторює плодоношення.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 160,0 ц/га, середня маса ягоди - 12,5 г, максимальна - 33,1 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси й сірої гнилі - 7 балів. Стійкість проти шкідників: сунічного кліща та нематод - 9 балів. Вміст загального цукру - 7,93%, вітаміну С - 62,23 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8 балів. Транспортабельність - 7-8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 05084003 Полка

Заявник: Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

Власник(и): Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

Підтримувач(і):

Заявник - Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.

*Рослина куляста, середньощільна, сильноросла. Листок помірно блискучий, зелений, сильно пухирчастий. Верхівковий листочок довший, ніж ширший, з гострою основою, із зубчастим зазубленням по краях. Волоски на черешку злегка відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка слабе. Рослина утворює багато помірно опушених вусів із слабким антоціановим забарвленням. Суцвіття розміщене на рівні листків. Квітка середнього розміру. Чашечка однакового розміру з віночком. Пелюстки віночка доторкуються одна до одної. Плід середнього розміру, дещо ширший, ніж довший, переважно округлої форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона плоду, вільна від зерняток, мала. Нерівності на поверхні - відсутні або дуже малі. Плід дуже блискучий, злегка нерівномірного червоного кольору. Зернятка розміщені врівень з поверхнею. Чашечка - виступаюча. Частки - відлеглі. М'якоть - ясно-червона, помірно тверда. Повітряна комірka середнього розміру. Червоне забарвлення розташоване лише на периферії плоду. Час цвітіння - ранній. Час досягання - середньопізній. Спосіб плодоношення - не повторює плодоношення.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 180,0 ц/га, середня маса ягоди - 10,2 г, максимальна - 27,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси та сірої гнилі - 9 балів. Стійкість проти шкідників: сунічного кліща - 7 балів, нематод - 9 балів. Вміст загального цукру - 6,8%, вітаміну С - 62,11 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 7-8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

Горіх грецький

® 97075002 Рудківський

Заявник: Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Придністровська дослідна станція Інституту садівництва УААН.

*Дерево сильноросле, розлоге, середньощільне. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів, на гілках, вік яких від 2 років. Річний пагін світло-коричневого кольору. Бічні листочки листка еліптичної форми. Чоловічих суцвіть - багато. Горіх великий, широко-трапецієвидний - у поздовжньому розрізі через шов і перпендикулярно до нього, округлий - у поперечному розрізі. Коефіцієнт округлості горіха - низький. Форма основи - зрізана, верхівка - округла. Помітність апікального кінчика - помірна. "Сідельце" розташоване у верхній третині шва, помітність - помірна, ширина - помірна. Боріздка вздовж "сідельця" неглибока. Шкаралупа горіха слабо боріздчаста, тонка. Половинки з'єднані слабо, роз'єднуючі перетинки тонкі. Ядро легко видаляється зі шкаралупи, велике. Час дозрівання - ранній. Час листопаду - середній. Листок обпадає, оплодень - обпадає повністю. Час розпускання вегетативних бруньок - ранній. Час цвітіння чоловічих квіток - між дуже раннім і раннім. Час цвітіння жіночих квіток - між пізнім і дуже пізнім.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 6,9 ц/га, середній урожай з дерева - 5,5 кг, середня маса плоду - 13,6 г. Зимостійкість - 7 балів. Стійкість проти хвороб: марсоніозу - 7 балів. Дегустаційна оцінка ядра - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

Яблуня (підщепа)**® 05086006 КД 4**

Заявник: Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Краснокутський НДЦ Інституту садівництва УААН.

*Рослина середньоросла, розлога. Утворює багато гілок хвилястої та зигзагоподібної форми росту. Опушення верхньої половини пагона слабе, глянцеватість кори відсутня або дуже слабка. Пагін середньої товщини, з короткими міжвузлями. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок. Вони малі, широко-еліптичної форми. Переважаючий колір на підсонячній стороні пагона коричневий. Брунькові виступи малі. Форма верхівки бруньки округла. Бруньки притиснуті до стебла. Верхівка пагону, що росте, має зеленувате забарвлення. Листок, що розгортається має бронзовий відтінок антоціанового забарвлення. Листкова пластинка розташована горизонтально стосовно пагона. Вона коротка й широка, з округло-зубчастими надрізами по краю. Кінчик листової пластинки середньої довжини. Антоціанове забарвлення жилок - слабе. Черешок листка середньої довжини. Прилисток - малий. Час початку розпускання бруньок - ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: посухостійкість - 7-9 балів, зимостійкість - 8-9 балів, морозостійкість - 8-9 балів. Ступінь підмерзання коренів - 1 бал. Ураженість хворобами: борошнистою росою, паршею - не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,4%. Сумісність із прищепою - 100%. Вихід стандартних відсадків - 74 тис.шт./га.

Напрямок використання - клонова підщепа яблуні. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 05086007 КД 5

Заявник: Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Краснокутський НДЦ Інституту садівництва УААН.

*Рослина середньоросла, пряма. Утворює середню кількість хвилястих та зигзагоподібних пагонів. Верхня половина пагона слабко опушена. Глянцеватість кори відсутня або дуже слабка. Пагін середньої товщини, з короткими міжвузлями. Сочевичок - багато. Вони малі й округлі. Переважаючий колір пагона на підсонячній стороні коричневий. Брунькові виступи - малі. Верхівка бруньки округлої форми. Бруньки притиснуті до пагона. Верхівка, що росте, зеленуватого забарвлення. Пластинка листка, що розгортається, немає антоціанового забарвлення. Листкова пластинка займає напіввисхідне положення стосовно пагона. Вона довга, середньої ширини, із пилчастими надрізами по краю. Кінчик листової пластинки довгий. Опушеність нижньої сторони пластинки слабка. Антоціанове забарвлення жилок - слабе. Черешок листка середньої довжини. Прилисток - малий. Час початку розпускання бруньок - ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: посухостійкість - 7 балів, зимостійкість - 8-9 балів, морозостійкість - 9 балів. Ступінь підмерзання коренів - 1 бал. Ураженість хворобами: борошнистою росою, паршею - не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1%. Сумісність із прищепою - 100%. Вихід стандартних відсадків - 71 тис.шт./га.

Напрямок використання - клонова підщепа яблуні. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

Виноград

Виноград

® 97073003 Альмінський

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт технічного напрямку використання пізньостиглий, у середньому 148 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівка молодого пагона відкрита повністю. Колір верхнього боку листової пластинки молодого листка жовто-зелений. Пагін напівпрямий, колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) сторони зелений. Послідовних вусиків менше трьох, вони дуже довгі. Квітка має добре розвинуті тичинки і маточку. Розвинутий листок великого розміру п'ятикутний, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Зубці довгі, обидва боки випуклі. Черешок однаковий за довжиною з головною жилкою. Гроно середнього розміру, середньощільне. Ягода за розміром середня кругла, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синя середньої товщини. М'якоть соковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін темно-коричневий, борознистий.

* Дані заявника.

*Сорт технічного напрямку використання, пізньостиглий, у середньому 148 днів від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 132 ц/га, середня маса грона – 206 г, середня маса 100 ягід – 238г. Цукристість – 26,8 %, кислотність – 8,0 г/л. Вихід соку (сусла) 66 %. Зимостійкість середня. Має мускатний аромат. Рекомендовано використовувати для виготовлення сухих та міцних (десертних) вин, диетичних соків у 2-ій виноградарській зоні України.

* Дані заявника.

® 00073006 Анателікон

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт дуже пізньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 174 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розпускаються пізно. Верхівка молодого пагона повністю відкрита. Верхній бік листової пластинки жовто-зелений. Положення пагона у просторі напівпряме, колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середній за розміром п'ятикутний, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Глибина верхніх листових вирізів глибокі. Зубці середньої довжини, обидва боки випуклі. Черешок однакової довжини із головною жилкою. Гроно середньовелике щільне, ніжка - середньої довжини. Ягода дрібна еліптична, важко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору товста. М'якоть малосоковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін темно-коричневий, ребристий.

* Дані заявника.

* Сорт дуже пізньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 174 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 142 ц/га, середня маса грона – 220 г, середня маса 100 ягід – 300 г. Цукристість – 30,6 %, кислотність – 9,5 г/л. Вихід соку (сусла) 65 %. Зимостійкість середня. Десертне вино з ароматом вершків та шоколаду. Рекомендовано використовувати у 2-ій виноградарській зоні України.

* Дані заявника.

94073015 Біанка

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

*Сорт середньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 136 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, технічна стиглість настає, в середньому, 10 вересня. Бруньки розпускаються в середні строки. Верхівка молодого пагона напіввідкрита, прилеглі волоски мають слабе антоціанове забарвлення. Верхній бік листової пластинки жовто-зелений. Положення пагона у просторі напівпряме, колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів та вентральної (без прямого попадання денного світла) – зелений із червоними смугами. Послідовних вусяків три і більше, вони довгі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середній за розміром, пластинка округла з трьома лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті, біля черешка - слабо відкриті. Верхні листові вирізи неглибокі. Зубці середньої довжини, обидва боки увігнуті. Черешок листка значно довший головної жилки. Гроно середнє за розміром і щільністю, ніжка – середньої довжини. Ягода середня за розміром, овальна, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка жовто-зеленого кольору тонка. М'якоть дуже соковита, м'яка. Особливий запах відсутній. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін жовтувато-коричневий ребристий.

* Дані заявника.

* Середньостійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 130 ц/га, з куща – 5,9 кг, середня маса грона – 108 г, середня маса 100 ягід – 180 г. Цукристість –22,6 %, кислотність – 9,1 г/л. Вихід соку (сусла) 85,2 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано використовувати для виготовлення портвейну та мадери.

* Дані заявника.

® 97073001 Геркулес

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

* Сорт столового напрямку використання дуже пізньостиглий, 172 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів пагона - зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Листок середній 7- лопатевий, пластинка п'ятикутна. Верхні листові вирізи (між лопатями листка) - дуже глибокі. Верхні лопаті листових вирізів злегка перекривають одна одну, біля черешка - широко відкриті. Гроно велике середньої щільності. Ягода велика еліптична, колір шкірки рожевий. М'якоть тверда, соковита. Насіння повноцінне.

* Дані заявника.

*Сорт столового напрямку використання. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 118 ц/га, середня маса грона – 254 г, середня маса 100 ягід – 571 г. Цукристість –19,1 %, кислотність – 7,7 г/л. Вихід товарних грон 95 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано використовувати у 6-ій виноградарській зоні України.

* Дані заявника.

® 05073004 Добриня

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

*Час розгортання бруньок середній. Форма верхівки молодого пагона закрыта. Прилеглі волоски на верхівці відсутні або дуже рідкі. Антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці відсутнє або дуже слабке. Колір верхнього боку пластинки жовто-зелений. Відхилені та прилеглі волоски між жилками із нижнього боку пластинки молодого листка відсутні або дуже рідкі. Положення пагонів у просторі, ще не підв'язаних, пряме. Колір дорсального (добре освітленої) боку міжвузлів - червоний, вентрального (без прямого попадання денного світла) - зелений. Кількість послідовних вусяків пагону менше трьох. У квітки відхилені тичинки і добре розвинута маточка. Розмір пластинки розвиненого листка великий. Форма пластинки розвиненого листка округла. Розвинутий листок у поперечному перерізі згорнутий всередину. Пухирчастість верхнього боку пластинки відсутня або дуже слабка. Розвинений листок п'ятилопатевий. Верхні листові вирізи середні, відкриті, лопаті біля черешка широко відкриті. Листкові зубці середні, за формою обидва боки випуклі. Антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки відсутнє або дуже слабке. Черешок розвиненого листка за довжиною трохи коротший головної жилки. Основне забарвлення здерев'янілого пагона жовтувато-коричнєве. Поверхня здерев'янілого пагона борізчаста.

*Дані заявника.

*Слабко утворює пасинки, утворює гроно. Сила росту однорічних пагонів середня. Сорт зимостійкий, посухостійкий. Стійкий до філоксери, мілдью, оїдіуму. Ступінь досягання однорічних пагонів становить 96 %. Вихід стандартних чубуків з куща - 25 шт., 55,5 т. шт/га. Вихід кореневласних саджанців першого ґатунку - 70 %.

* Дані заявника.

® 05073002 Етюд

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

**Сорт столового напрямку використання, середньостиглий – 144 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Верхівка молодого пагона повністю відкрита. Послідовних вусяків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Листок середній 3 - лопатевий, пластинка округла. Лопаті біля черешка - дуже широко відкриті. Гроно від великого до дуже великого за розміром, щільне. Ягода за розміром від середньої до великої, кругла, колір шкірки жовто-зелений, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. М'якоть м'яка, соковита. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін жовтувато-коричневий.

* Дані заявника.

*Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 124,5 ц/га, середня маса грона – 576,5 г, середня маса 100 ягід – 525 г. Цукристість – 16,4 %, кислотність – 8,5 г/л. Вихід товарних грон 89 %. Зимостійкість середня.

* Дані заявника.

® 05073007 Кишмиш таїровський

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт столового напрямку використання, пізньостиглий – 147 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Верхівка молодого пагона закрыта. Колір верхнього боку пластинки молодого листка жовто-зелений. Колір дорсальної (добре освітленої) частини міжвузлів пагона - зелений із червоними смугами, вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусяків менше трьох, вони довгі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середнього розміру серцевидний, з п'ятьма лопатями. Верхні листові вирізи глибокі, верхні лопаті злегка перекривають одна одну, біля черешка - широко відкриті. Зубці довгі, обидва боки прямолінійні. Гроно нещільне. Ягода яйцеподібна рожева, соковита, м'яка, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Насіння відсутнє. Основне забарвлення здерев'янілого

пагона жовтувато-коричневе, поверхня гладенька.

*Дані заявника.

*Стійкий до сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 58 ц/га, з куща - 2,6 кг, середня маса грона - 253 г, середня маса 100 ягід – 165 г. Цукристість - 19,3 %, кислотність – 7,0 г/дм³. Вихід товарних грон 91 %. Транспортабельний.

* Дані заявника.

® 90073015 Огоньок таїровський

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт столового напрямку використання, дуже ранньостиглий – 125 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Час розгортання бруньок ранній. Антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці молодого пагону відсутнє або дуже слабе. Колір дорсального (добре освітленої) боку міжвузлів пагону та колір вентрального (без прямого попадання денного світла) міжвузлів пагону зелений. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Листок округлий, середній за розміром, верхні листкові вирізи мілкі, лопаті біля черешка широко відкриті. Черешок однакової довжини із головною жилкою. Лопаті листка не виділяються. Зубці наявні, середні, обидва боки зубців прямолінійні. Гроно середнє за розміром, середньої щільності. Ягода велика, овальна, рожева, соковита. М'якоть ягоди тверда, аромат - відсутній. Ягода відокремлюється від плодоніжки порівняно легко. Насіння повноцінне. Основне забарвлення здерев'янілого пагону фіолетове.

* Дані заявника.

*Стійкий до мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 88 - 125 ц/га, з куща - 3,96 -5,65 кг, середня маса грона - 485 г, середня маса 100 ягід – 520 г. Цукристість - 16,8 %, кислотність – 6,9 г/дм³. Вихід товарних грон 78 %. Транспортабельний.

*Дані заявника.

® 83073001 Рислінг Магарача

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт технічного напрямку використання, пізньостиглий, у середньому 155 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівка молодого пагона відкрита повністю. Колір верхнього боку листової пластинки молодого листка зелений із антоціановими плямами. Положення у просторі пагону пряме, колір дорсальної (добре освітленої) і вентральної (без прямого попадання денного світла) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами). Послідовних вусиків менше трьох, вони короткі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинутий листок середнього розміру округлий з трьома лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті мілкі, біля черешка - широко відкриті. Зубці середні, один бік випуклий, другий - увігнутий. Черешок трохи коротший за головну жилку. Гроно середнього розміру, середньощільне, ніжка - коротка. Ягода середня за розміром, широко-еліптична, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка жовто-зелена середньої товщини. М'якоть дуже соковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін жовтувато-коричневий, борознистий.

* Дані заявника.

*Сорт технічного напрямку використання, пізньостиглий, у середньому 155 днів від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 149 ц/га, середня маса грона – 172 г, середня маса 100 ягід – 276 г. Цукристість – 21,2 %, кислотність – 8,6 г/л. Вихід соку (сусла) 70 %. Зимостійкість середня. Пропонується для виготовлення ігристих (шампанських), сухих та міцних вин, диєтичних соків. Має рислінговий аромат.

* Дані заявника.

® 82073001 Спартанець Магарача

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт технічного напрямку використання, пізньостиглий, у середньому 142 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівка молодого пагона напіввідкрита. Колір верхнього боку листової пластинки молодого листка світлий мідно-червоний. Пагін напівпрямий, колір дорсальної (добре освітленої) і вентральної (без прямого попадання денного світла) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами). Послідовних вусиків менше трьох, вони дуже короткі. Квітка має добре розвинуті тичинки і маточку. Розвинений листок середнього розміру округлий, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів закриті, біля черешка - широко відкриті. Зубці довгі, один бік випуклий, другий - увігнутий. Черешок трохи довший за головну жилку. Гроно середнього розміру, середньо щільне, ніжка - коротка. Ягода середня за розміром, широко-еліптична, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка жовто-зелена середньої товщини. М'якоть соковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін темно-коричневий борознистий.

* Дані заявника

*Сорт технічного напрямку використання, пізньостиглий, у середньому 142 дні від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 126 ц/га, середня маса грона – 172 г, середня маса 100 ягід – 223 г. Цукристість – 24,9 %, кислотність – 8,6 г/л. Вихід соку (сусла) 65 %. Зимостійкість середня. Має мускатний аромат. Рекомендовано використовувати для виготовлення ігристих (шампанських), сухих та міцних вин, дієтичних соків у 2-й виноградарській зоні України.

* Дані заявника.

® 84073003 Таїр

Заявник: Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

* Сорт столового напрямку використання, ранньостиглий, 133 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Верхівка молодого пагона напіввідкрита. Колір верхнього боку пластинки молодого листка жовто-зелений. Колір дорсальної (добре освітленої) частини міжвузлів пагона - зелений із червоними смугами, вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше 3. Листок великий трилопатовий, слабкорозсічений згорнутий всередину. Гроно дуже велике нещільне. Ягода дуже велика яйцеподібна чорно-синя, соковита, тверда. Насіння повноцінне. Основне забарвлення здерев'янілого пагона темно-коричнєве, поверхня борідчаста.

* Дані заявника.

*Стійкий до мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 99,3 ц/га, з куща - 3,4 кг, середня маса грона - 316 г, середня маса 100 ягід – 443 г. Цукристість - 16,3 %, кислотність – 8,2 г/л. Транспортабельний.

Рекомендовано використовувати у 2,6,8,9,11,13,14-й виноградарських зонах України.

* Дані заявника.

® 00073005 Чорна опіана

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

*Сорт дуже пізньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 174 доби від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розпускаються пізно. Верхівка молодого пагона повністю відкрита. Верхній бік листової пластинки жовто-зелений. Положення пагону у просторі напівпряме, колір дорсальної (добре освітленої) частини міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середнього розміру п'ятикутний, з п'ятьма лопатями. Листові верхні листкових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Верхні листкові вирізи глибокі. Зубці середньої довжини, обидва боки випуклі. Черешок однакової довжини із головною жилкою. Гроно середнє за розміром щільне, ніжка - довга. Грона часто подвійні. Ягода середнього розміру еліптична, важко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору дуже товста. М'якоть малосоковита, тверда. Ягоди з ароматом мускату. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін темно-коричневий ребристий.

*Дані заявника.

*Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 160 ц/га, середня маса грона – 295 г, середня маса 100 ягід – 348 г. Цукристість – 30,8 %, кислотність – 5,6 г/л. Вихід соку (сусла) 65 %. Зимостійкість середня. Десертне вино світло-рубинового забарвлення. Ягоди з ароматом мускату. Рекомендовано використовувати у 6-й виноградарській зоні України.

*Дані заявника.

® 97073010 Ялтинський безнасінний

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

*Сорт столового напрямку використання середньостиглий, 145 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Колір дорсальної (добре освітленої) і вентральної (без прямого попадання денного світла) частини міжвузлів пагона - зелений із червоними штрихами (смугами). Листок великий 7-лопатевий, пластинка п'ятикутна. Верхні листкові вирізи (між лопатями листка) - глибокі. Верхні лопаті листкових вирізів сильно перекривають одна одну, біля черешка - злегка перекривають одна одну. Гроно середнє за розміром нещільне. Ягода дрібна широкоеліптична, колір шкірки фіолетово-червоний. М'якоть м'яка, соковита. Насіння рудиментарне.

*Дані заявника.

*Сорт столового напрямку використання, середньостиглий, 145 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 139 ц/га, середня маса грона – 350 г, середня маса 100 ягід – 241 г. Цукристість – 16,3 %, кислотність – 7,4 г/л. Вихід товарних грон 96 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано використовувати у 6-й виноградарській зоні України.

*Дані заявника.

Декоративні та лікарські Ехінацея пурпурова

04303001 Зірка Миколи Вавилова

Заявник: Самородов Віктор Миколайович

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Сорт середньостиглий, диплоїд. озеткові листки широкі, але короткі. Рослина висока прямостояча. У рік сівби рідко утворює суцвіття. Головний корінь не потовщений. Свіже коріння має сильний пекучий присмак. Листок темно-зеленого забарвлення. Стебло слабо опушене, антоціанове забарвлення верхівки стебла поміrne. Пелюстки квітки пурпурового кольору, пилки - жовті. Сім'янки світлого забарвлення. Рослина цвіте 65 - 75 днів.

*Дані заявника.

*Рослина цвіте 65 - 75 днів. Середня врожайність наземної маси 88,2 ц/га, середня врожайність коренів і кореневищ 15-21,7 ц/га, середня врожайність насіння - 6,5 ц/га, маса 1000 сім'янок - 3,2 г. Вміст гідроксикоричних кислот (за цикорієвою кислотою) - 2,5 - 4,5 % у листках та 1,5 - 2,5 у коріннях з кореневищами, у суцвіттях понад 4 %. Рекомендовано для зон Степу, Лисостепу, Полісся України.

*Дані заявника.

® 05303002 Поліська красуня

Заявник: Потопальський Анатолій Іванович

Власник(и): Потопальський Анатолій Іванович

Юркевич Лариса Назарівна

Інститут оздоровлення і відродження народів України

Підтримувач(і):

* Сорт середньостиглий. Сім'ядольні листки світло-зеленого забарвлення великого розміру. Рослина висока прямостояча. У рік висіву суцвіття викидає пізно. Корінь світло-бурого забарвлення потовщений помірно розгалужений. Прикореневий листок широкий. Листок середнього розміру темно-зеленого забарвлення. Стебло помірно опушене ребристе, багато генеративних пагонів. Сім'янки темнуватого забарвлення. Пелюстки квітки пурпурового кольору, пилки - жовті. Інтенсивність антоціанового забарвлення на стеблах середня. Рослини стійкі до понижених температур, солестійкі.

*Дані заявника.

*Тривалість цвітіння 78 днів. Середня врожайність наземної маси 85 ц/га, середня врожайність коренів і кореневищ 42,5 ц/га, середня врожайність насіння - 3,0 ц/га, маса 1000 сім'янок - 4,0 г. Вміст екстрактивних речовин - 43,6 %, вихід - 478 кг/га. Рекомендовано для зон Степу, Лисостепу, Полісся України.

*Дані заявника.

® 05303001 Чарівниця

Заявник: Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук

Власник(и): Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

* Сорт середньостиглий. Сім'ядольні листки зеленого забарвлення великого розміру. Рослина висока прямостояча. Корінь бурого забарвлення середньої товщини, помірно розгалужений. Прикореневий листок широкий. Листок середнього розміру помірно-зеленого забарвлення. Стебло без опушення ребристе, багато генеративних пагонів. Кошик повний. Пелюстки квітки пурпурового кольору. Інтенсивність антоціанового забарвлення на стеблах середнє, опушення відсутнє. Тривалість цвітіння 91 день.

* Дані заявника.

* Тривалість цвітіння 91 день. Середня врожайність наземної маси 92,8 ц/га, середня врожайність коренів і кореневищ 23,1 ц/га, середня врожайність насіння - 3,5 ц/га, маса 1000 сім'янок - 3,9 г. Вміст полісахаридів - 7,4 %.

* Дані заявника.

® 04303002 Юзівська

Заявник: Донецький ботанічний сад Національної академії наук України

Власник(и): Донецький ботанічний сад Національної академії наук України

Підтримувач(и):

Диплоїд. Габітус прямий. Листок темно-зелений, довгий, середній за шириною, зазубленість відсутня. За висотою рослина середня. Час викидання суцвіть середній.

Головний корінь потовщений, на зрізі чи зламі наявне фітомеланінове забарвлення.

Стебло слабогалузиться, опушеність відсутня або дуже слабка, наявне помірне антоціанове забарвлення верхівки (останні 10 см).

Час цвітіння середній. Суцвіття має середню кількість кошиків. Язичкові квітки пурпурові, трубчасті квітки довгі.

Багаторічна кормова і лікарська рослина, висотою 85-90 см. На одному місці може зростати від 4-х і більше років. Середньостигла. Весняне відростання починається на початку або в середині квітня, бутанізація з середини червня, зацвітає на початку липня. Технологічна стиглість на зелену масу настає в середині або наприкінці червня. Сорт стійкий до ураження хвороб та ушкоджень шкідниками, має високу посухо- і зимостійкість, що важливо при вирощуванні в умовах степової зони. Середня урожайність сухої речовини 43,0 ц/га, максимальна - 56,0 ц/га. Вміст сирого протеїну - 14,4%, клітковини - 17%.

Розторопша плямиста

® 05194001 Бойківчанка

Заявник: Івано - Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Івано - Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

* Сім'ядольні листки зеленого забарвлення, середні за розміром. Рослина висока. Корінь середньої товщини. Листок сильно розсічений темно-зеленого забарвлення, на краю листкової пластинки жовті шипи. Стебло прямостояче, вкрите борошністим нальотом, без опушення і без антоціанового забарвлення. Пелюстки квітки пурпурового кольору, зібрані у кулясті кошики на кінцях стебел. Плід - сім'янка з чубчиком без опушення.

Сім'янка еліптичної форми, злегка здавлена з боків, від білого до коричневого кольору, блискуча або матова.

* Дані заявника.

* Середня врожайність насіння - 10-15 ц/га. Маса 1000 насінин 27-32 г. Рослина заввишки 150-300 см. Стійкість до хвороб і шкідників середня. Вміст сілімарину в оболонці до 7 %, у насінні до 1 %. Вміст ефірної олії до 35 %. Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу України.

* Дані заявника.

Троянда

® 05246011 Селдрім

Заявник: Терра Нігра Холдінг Б.В.

Власник(и): Терра Нігра Холдінг Б.В.

Підтримувач(і):

Габітус рослини вузькокущовий, молоді пагони мають червонясто-коричнєве забарвлення. Листок за розміром середній, помірно зелене забарвлення листка, листок у поперечному перерізі плоский, Кількість квіток на квітконосному пагоні середня, тип квітки - повна, квітка за діаметром середня, вигляд квітки зверху - зіркоподібна. Пелюстка колір середньої зони внутрішньої сторони за шкалою - RHS 9A, колір крайової зони внутрішньої сторони RHS 52 A-52B, колір середньої зони зовнішньої сторони RHS 7C, колір крайової зони зовнішньої сторони RHS 54A

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	25
2 Висота рослини (см)	95
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	3500
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	75
5 Продуктивність обрізання (шт)	20
6 Розмір квітки (см)	11
7 Оцінка сорту (б)	8
8 Стан під час масового цвітіння (б)	9
9 Борошниста роса (%)	8
10 Діаметр качана (мм)	
11 Довжина квітконосу (см)	
12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)	12
13 Зимостійкість (б)	
14 Процент укорінення живців (ц/га0	

® 05246011 Селдрім

Заявник: Терра Нігра Холдінг Б.В.

Власник(и): Терра Нігра Холдінг Б.В.

Підтримувач(і):

Габітус рослини вузькокущовий, молоді пагони мають червонясто-коричнєве забарвлення. Листок за розміром середній, помірно зелене забарвлення листка, листок у поперечному перерізі плоский, Кількість квіток на квітконосному пагоні середня, тип квітки - повна, квітка за діаметром середня, вигляд квітки зверху - зіркоподібна. Пелюстка колір середньої зони внутрішньої сторони за шкалою - RHS 9A, колір крайової зони внутрішньої сторони RHS 52 A-52B, колір середньої зони зовнішньої сторони RHS 7C, колір крайової зони зовнішньої сторони RHS 54A

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	
2 Висота рослини (см)	
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	
5 Продуктивність обрізання (шт)	
6 Розмір квітки (см)	
7 Оцінка сорту (б)	

- 8 Стан під час масового цвітіння (б)
- 9 Борошниста роса (%)
- 10 Діаметр качана (мм)
- 11 Довжина квітконосу (см)
- 12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)
- 13 Зимостійкість (б)
- 14 Процент укорінення живців (ц/га0

® 06246002 Лексаелат

Заявник: Лекс Воорн Розенвеределинк Б.В.

Власник(и): Лекс Воорн Розенвеределинк Б.В.

Підтримувач(і):

Габітус рослини вузькокущовий, листок за розміром великий, тип квітки - повна, колір пелюстки середньої зони внутрішньої сторони RHS 155 A, корір пелюстки крайової зони внутрішньої сторони RHS 155 C, пелюстка колір середньої зони зовнішньої сторони RHS 155 C, Пелюстка колір крайової зони зовнішньої сторони RHS 155 C. Хвилястість краю слабка,

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	40
2 Висота рослини (см)	80
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	2500
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	50
5 Продуктивність обрізання (шт)	200
6 Розмір квітки (см)	5
7 Оцінка сорту (б)	9
8 Стан під час масового цвітіння (б)	9
9 Борошниста роса (%)	50
10 Діаметр качана (мм)	15
11 Довжина квітконосу (см)	60
12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)	14
13 Зимостійкість (б)	
14 Процент укорінення живців	100

® 06246003 Лексані

Заявник: Лекс Воорн Розенвеределинк Б.В.

Власник(и): Лекс Воорн Розенвеределинк Б.В.

Підтримувач(і):

Габітус рослини вузькокущовий, антоціанове забарвлення молодих пагонів дуже слабке, забарвлення листка світло-зелене глянуватість помірна, діаметр квітки середній вигляд квітки зверху зіркоподібна, пелюстка: колір середньої зони внутрішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір крайової зони внутрішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір плями на основі внутрішньої сторони RHS 2Д, пелюстка: колір середньої зони зовнішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір крайової зони зовнішньої сторони RHS 155B

- 1 Урожай черенків (шт/1 рослину) 50
- 2 Висота рослини (см)
- 3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)

- 4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)
- 5 Продуктивність обрізання (шт)
- 6 Розмір квітки (см)
- 7 Оцінка сорту (б)
- 8 Стан під час масового цвітіння (б)
- 9 Борошниста роса (%)
- 10 Діаметр качана (мм)
- 11 Довжина квітконосу (см)
- 12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)
- 13 Зимостійкість (б)
- 14 Процент укорінення живців (ц/га0

® 06246003 Лексані

Заявник: Лекс Воорн Розенвеределинк Б.В.

Власник(и): Лекс Воорн Розенвеределинк Б.В.

Підтримувач(і):

Габітус рослини вузькокущовий, антоціанове забарвлення молодих пагонів дуже слабке, забарвлення листка світло-зелене глянцеуватість помірна, діаметр квітки середній вигляд квітки зверху зіркоподібна, пелюстка: колір середньої зони внутрішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір крайової зони внутрішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір плями на основі внутрішньої сторони RHS 2Д, пелюстка: колір середньої зони зовнішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір крайової зони зовнішньої сторони RHS 155B

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	50
2 Висота рослини (см)	70
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	2500
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	50
5 Продуктивність обрізання (шт)	250
6 Розмір квітки (см)	5
7 Оцінка сорту (б)	9
8 Стан під час масового цвітіння (б)	9
9 Борошниста роса (%)	50
10 Діаметр качана (мм)	
11 Довжина квітконосу (см)	60
12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)	14
13 Зимостійкість (б)	
14 Процент укорінення живців	100

® 06246007 Олійредсп

Заявник: Олій Інновейшн БВ

Власник(и): Олій Інновейшн БВ

Підтримувач(і):

Габітус вузькокущовий. Молоді пагони мають слабке антоціанове забарвлення, на пагонах наявні шипи, середня кількість, забарвлення листка помірно до темного, листочок у поперечному розтині увігнутий, кінцевий листочок за формою основи заокруглений, тип квітки - повна, вигляд квітки

зверху - неправильноокругла.. Пелюстка колір середньої зони внутрішньої сторони за шкалою RHS 44 В, пелюстка колір крайової зони внутрішньої сторони за шкалою RHS 46 В, пелюстка колір плями на основі внутрішньої сторони RHS 6А, пелюстка колір середньої зони зовнішньої сторони RHS 44В, пелюстка колір крайової зони зовнішньої сторони RHS 44 В. Увігнутість краю пелюстки від помірної до сильної, хвилястість краю слабка.

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	30
2 Висота рослини (см)	70
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	2200
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	40
5 Продуктивність обрізання (шт)	150
6 Розмір квітки (см)	6
7 Оцінка сорту (б)	8
8 Стан під час масового цвітіння (б)	8
9 Борошниста роса (%)	50
10 Діаметр качана (мм)	20
11 Довжина квітконосу (см)	55
12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)	12
13 Зимостійкість (б)	
14 Процент укорінення живців	75

® 05246012 Селаурум

Заявник: Терра Нігра Холдінг Б.В.

Власник(и): Терра Нігра Холдінг Б.В.

Підтримувач(и):

Габітус рослини вузькокущовий, листок за розміром середній, помірна глянцеватість верхньої сторони, листок у попечному розтині плоский, хвилястість краю слабка, тип квітки повна, квітка за діаметром велика, вигляд квітки зверху зіркоподібна, слабкий аромат, колір пелюстки середньої зони внутрішньої сторони RHS45A, колір пелюстки крайової зони внутрішньої сторони RHS45A, Колір плями на основі внутрішньої сторони RHS13A, колір середньої зони зовнішньої сторони RHS46 А, колір крайової зони зовнішньої сторони RHS45A, колір плями на основі зовнішньої сторони RHS5A

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	23
2 Висота рослини (см)	100
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	3500
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	70
5 Продуктивність обрізання (шт)	18
6 Розмір квітки (см)	12
7 Оцінка сорту (б)	8
8 Стан під час масового цвітіння (б)	8
9 Борошниста роса (%)	50
10 Діаметр качана (мм)	
11 Довжина квітконосу (см)	
12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)	12
13 Зимостійкість (б)	
14 Процент укорінення живців	75

® 06246005 Тан01994

Заявник: Розен Тантау. Матиас Тантау Нахфольгер

Власник(и): Розен Тантау. Матиас Тантау Нахфольгер

Підтримувач(і):

Габитус вузькокущовий. Молоді пагони мають сильне антоціанове забарвлення,, на пагонах наявні шипи, середня кількість, забарвлення листка помірно до темного, Листочок у поперечному розтині увігнутий, кінцевий листочок за формою основи заокруглений, тип квітки - повна, Вигляд квітки зверху - зіркоподібна. Пелюстка колір середньої зони внутрішньої сторони за шкалою RHS 46 A та 46 B, пелюстка колір крайової зони внутрішньої сторони за шкалою RHS 46 A та 46 B, пелюстка колір плями на основі внутрішньої сторони RHS 4, пелюстка колір середньої зони зовнішньої сторони RHS 57A, пелюстка колір крайової зони зовнішньої сторони RHS 57 та RHS 57 C. Увігнутість краю пелюстки від помірної до сильної, хвилястість краю слабка.

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	35
2 Висота рослини (см)	120
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	2500
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	90
5 Продуктивність обрізання (шт)	245
6 Розмір квітки (см)	8
7 Оцінка сорту (б)	8
8 Стан під час масового цвітіння (б)	8
9 Борошниста роса (%)	50
10 Діаметр качана (мм)	15
11 Довжина квітконосу (см)	100
12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)	12
13 Зимостійкість (б)	
14 Процент укорінення живців	100

Шавлія лікарська**® 05203001 Бужеле**

Заявник: Херсонський державний аграрний університет

Власник(и): Херсонський державний аграрний університет

Підтримувач(і):

*Сорт середньостиглий. Сім'ядольні листки темно-зеленого забарвлення дрібні. Рослина висока, кущ компактний. Корінь і кореневище темно-бурого забарвлення середньої товщини. Листок середнього розміру темно-зеленого забарвлення. Стебло без опушення із антоціановим забарвленням. Пелюстки квітки (перед розкриттям) бузкового кольору.

* Дані заявника.

*Середня врожаність сухої наземної маси 33,4 ц/га, насіння - 3,3 кг/га. Маса 1000 насінин 8,2 г. Стійкість до хвороб і шкідників середня. Вміст ефірної олії у сухій масі 1,7 %, збір - 32,2 кг/га. Ефірна олія містить: d-a -пинену - 3,9 %, борнеолу - 8,7 %, камфори - 8,1 %. Рекомендовано для зон Степу та Лисостепу України.

* Дані заявника.

Полин кримський**® 04432001 Алупка**

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

* Сорт пізньостиглий. Рослина середньої висоти напіврозлога, гілок 1-го порядку створює середню кількість. Стебло малого діаметра. Листкова пластинка сірувато-зеленого кольору, коротка, вузька помірно опушена. Суцвіття зібрані у китицеподібну волоть середньої довжини яйцеподібної форми. Пелюстки квітки сіро-зеленого забарвлення. Рослина середньої висоти, напіврозлога, гілок 1 порядку створює середню кількість. Стебло малого діаметру. Листкова пластинка сірувато-зеленого кольору, коротка, вузька, помірно опушена. Суцвіття зібрані у китицеподібну волоть, середньої довжини, яйцеподібної форми. Пелюстки квітки сіро-зеленого забарвлення. Середня врожайність сирової наземної маси 90,9 ц/га, середній урожай з куща - 0,36 кг, середня врожайність насіння - 2,4 ц/га, маса 1000 насінин - 0,24 г. Збір ефірної олії - 59,8 кг/га. Вміст ефірної олії у абсолютно сухій масі - 1,4 %, вміст туйонів - 86,6 %.

*Дані заявника.

*Середня врожайність сирової наземної маси 90,9 ц/га, середній урожай з куща - 0,36 кг, середня врожайність насіння - 2,4 ц/га, маса 1000 насінин - 0,24 г. Збір ефірної олії - 59,8 кг/га. Вміст ефірної олії у абсолютно сухій масі - 1,4 %, вміст туйонів - 86,6 %. Рекомендовано для зони Степу України.

*Дані заявника.

Полин лікарський**® 04433001 Евксин**

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

* Рослина висока, за габітусом розлога, діаметр куща великий. Листкова пластинка вузька слабо опушена темно-зеленого кольору перисто розсіченої форми. Стебло гіллясте, помірно антоціанового забарвлення. Суцвіття - довга розлога волоть. Головна ось суцвіття має помірне антоціанове забарвлення лише в нижній частині. Кошик кулястий. Плід - сім'янка овальної форми світло-коричневого забарвлення.

*Дані заявника.

Середньо стійкий до хвороб і шкідників. Середня врожайність надземної маси - 72,2 ц/га. Середня врожайність насіння - 2,1 ц/га. Маса 1000 насінин 0,217 г. Рослина заввишки до 1,0 м. Збір ефірної олії 13,72 кг/га. Вміст ефірної олії - 0,53 %. Вміст 1,8- ценіолу - 62,5 %. Рекомендовано для зони Степу України.

*Дані заявника.

Заявник, власник, підтримувач та їхні адреси

Код	Назва	Адреса
1	МейяАнд Стар Розз САА.АААА	Вул. Пушкінська, 9, к. 11, м. Київ, 252034
15	Всеросійський науково-дослідний інститут рису	П/в Білозерне, м. Краснодар, Росія, 350921
16	Державна научна установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)	Вул. Філатова, 17, м. Краснодар-38, Росія, 350038
20	Державна наукова установа - Кримська дослідно-селекційна станція Всеросійського науково-дослідного інституту рослинництва	М. Кримськ -4, Краснодарський Край, Росія, 353330
23	Кубанська дослідна станція Всеросійського науково-дослідного інституту рослинництва	П/в Ботаніка, Гулькевицький р-н, Краснодарський Край, Росія, 352183
25	Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка	П/в 12, м. Краснодар, Росія, 350012
29	Дочірнє підприємство "Рейлін"	Вул. І. Сірка 15, м. Київ, 03143 тел. 044-522-21-21 факс. 044-522-57-60
30	Кейджо, Інк.	20 Вілвуд Лейн, Скарбороу, Мейн, США
32	Селекційна станція Горна Стреда, Словачія	Партриганська 401, 91624, Горна Стреда, Словачія
34	Крючков Анатолій Васильович	Вул. Щербаківська 54, кв. 39, м. Москва, 105187
39	Монахос Григорій Федорович	Бескудніковський б-р 21, корп. 1, кв. 49, м. Москва, 127474
40	Пацурія Джерені Володимирович	Вул. Юннатів 17, кв. 208, м. Москва, 125083
44	Лежніна Алла Олексіївна	Вул. Стартова 11, кв. 462, м. Москва, 129330
47	Судденко Василь Григорович	Вул. Паркова 2а, пос. Міхнево, Московська обл., 124840
49	Закрите акціонерне товариство Науково - виробнича фірма "Російські сімена"	вул. Селезнівська 11а, стр. 2, м. Москва, 127030
50	Спільне українсько-польське підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "КРОКУС" Лтд	46020, м. Тернопіль, вул. Коновальця, 4 тел. +38-0352-26-89-80 факс. +38-0352-26-33-05
51	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Агронасіннясервіс"	Вул. Воровського 65, м. Сімферополь, АР Крим, 95053
57	Ставропольська селекційно-дослідна станція	Вул. Селекційна, м. Ставрополь, Росія, 355000
92	Воронезька овочева дослідна станція	П/в Спаське, Верхнє-Хавський р-н, Воронезька обл., Росія, 396116
113	Вест Ресурс	Кишинів, вул. Н.Йорга, 21, Молдова
122	ТОВ "Уніфер"	Вул. Мелітопольська, 17б, м. Каховка, Херсонська обл, Україна, 74800 тел.+38-05536-27131
126	Товариство з обмеженою відповідальністю агропромислова фірма "Еліта Дона"	пров. Сільськогосподарський 6, м. Ростов - на-Дону, 344038, Росія
134	Погорлецький Борис Костянтинович	Вул. Прохоровська 2, кв. 5, м. Одеса, 65091
141	Всеросійський науково-дослідний інститут рослинництва ім. М.І. Вавилова	Вул. Герцена, 44, Санкт-Петербург, Росія, 190000
142	Семенсес Прогрейн ІНК	Ранг Вас-Рівієр НОРД, Сант-цезар, Квебек
149	Всеросійський науково-дослідний інститут селекції і насінництва овочевих культур (ВНДІ)	П/в Лісове містечко, Одинцовський р-н, Московська обл., Росія, 143080
155	Селянсько-фермерське господарство "Степове"	Україна, Запорізька обл, Запорізький р-н, с. Степове, вул. Ясна, 32
157	Установа "Селекційна станція ім. М.М. Тімофєєва"	Вул. Пасічна, 5, Москва, Росія, 127550
163	Всеросійський селекційно-технологічний інститут садівництва і розсадництва	Бірюлево-Загор'є, Москва, Росія, 115547
169	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рапсол"	Вул. Молодіжна 9, стм. Гостомель, Київська обл.
177	Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету	Вул. Шевченко, 10, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 тел. +38-04631-2-52-70 факс. +38-04631-2-53-81
181	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннева компанія "Маїс"	19635, с. Білозір'я, вул.Леніна, 2, Черкаського р-ну, Черкаської обл. Тел.30-08-51; 30-08-52 факс. 30-02-03

Код	Назва	Адреса
191	Мельничук Максим Дмитрович	Вул. Ломоносова, 24, кв. 123, м. Київ, 03022
192	Заградова Майя Йосипівна	Проїзд Тутковського, 6, кв. 13, м. Житомир
201	ВНДІ зернобобових і круп'яних культур	П. Стрелецький, м. Орел, Росія, 303112,
209	Північно-Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Донського зонального науково-дослідного інституту сільського господарства	П/в Дослідна станція, Тарасівський р-н, Ростовська обл., Росія, 346055
212	Державна наукова установа Всеросійський науково - дослідний інститут зернових культур ім. І.Г.Калиненко	Науковий городок, 3, м. Зерноград, Ростовська обл., Росія, 347740
215	Вілморін	49250 La Menitre, Franse
216	ДНУ "Донська дослідна станція ім. А.О. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур"	П/в Суходольськ, п. Опорний, Азовський р-н, Ростовська обл., Росія, 346754
224	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Перспектива"	Вул. Леніна 112, с. Білозір'я, Черкаський р-н, Черкаська обл., 19635
230	Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська насіннева компанія"	Вул. Озерна 14 кв. 124, м. Київ, 04209
272	Науково-виробниче товариство "Насіння"	03022, м. Київ, вул. Васильківська, 28, оф. 406, Україна
273	Мей Агро Сід Корпорейшн (Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С)	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина
279	Ходовля Рослин Рольничих "Насьона Кобежиц"спулка з о.о.	Вул. Спортова, 21, 55-040, Кобежице, Польща
286	Сілван Угорщина ЛТД	2330 Dunaharasti Irinyi Janjs ut 1
293	Товариство з обмеженою відповідальністю "Біоальянс"	Вул. Колекторна 30, м. Київ, 02099 тел. 044 - 451 63 53
294	Москаленко Василь Ілліч	Вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003
295	Марчук Ніна Степанівна	
302	Національний науковий центр "Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича Української академії аграрних наук"	03680, м.Київ, вул.акад.Заболотного, 19 тел. +38-044-526-67-98
303	Ялтушківська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Ялтушків, Барський р-н, Вінницька обл., 23021
304	Уладово-Люлінецька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Жовтневе, Калинівський р-н, Вінницька обл., 22412
305	Інститут кормів Української академії аграрних наук	Проспект Юності, 16, Вінниця, 21100 тел/факс +38-0432-46-41-16
306	Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук	Вул. Мічуріна, 1, с. Агрономічне, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23227
307	Волинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	С. Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626
308	Лавринєць Григорій Семенович	Вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003
309	Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	П/в Металіст, Слов'яносербський р-н., Луганська обл., 93733 тел./факс +38-0642-52-71-19
310	Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	Вул. Дослідна, 1, п/в Олександрівка, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52041 тел. 712-61-14
311	Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук	Вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ, 49027 тел./факс +38-0562-450-236;(0372) 529-220 факс +38-0562-362-618
312	Дніпропетровський державний аграрний університет	Вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49600
313	Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	П/в Дослідне, Ясинуватський р-н., Донецька обл., 86081 тел. +38-0622-51-54-18 факс. +38-06236-4-30-37
314	Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	Вул. Ілліча 7,с. Опитне, Артемівський р-н, Донецька обл., 84571

Код	Назва	Адреса
315	Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	С. Піски, Ясинуватський р-н, Донецька обл., 86053 тел. +38-06236-48-7-32
317	Донецький ботанічний сад Національної академії наук України	Пров. Ілліча, 110, Донецьк-59, 83053 тел.+38-0622-94-1280 факс. +38-0622-94-6157
318	Інститут хмелярства Української академії аграрних наук	Вул. Київська, 191, м. Житомир, 10000
319	Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук	П/в Пересувне 2, Малинський р-н, Житомирська обл., 11605
320	Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук	Вул. Київське шосе, 131, Житомир-7, 10007 тел. +38-0412-36-62-31, факс.+38-0421-36-61-10, 36-61-13
323	Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Пр.Свободи,17, С. Велика Бакта, Березівський р-н, Закарпатська обл., 295520 тел. +38-03141-23-404
324	Ужгородський національний університет	Вул. Підгірна 46, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000
325	Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук	Вул. Вакуленчука, 99, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72311; тел.8(0619)43-13-78; 43-13-20
328	Запорізький державний університет	Вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69063
329	Інститут олійних культур Української академії аграрних наук	Вул. Весняна, 1, с. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл., 70417 тел.+38-0612-59-74-73 факс. +38-0612-59-77-80
330	Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	С. Пядики, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., 78254 тел./факс +38-03433-23-804
332	Івано - Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Розумовського, 9а, м. Івано-Франківськ, 76028 тел. +38-0342-52-25-50 факс. +38-0342-52-25-98
333	Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук	Вул. Заболотного, 150, Київ, 03143
334	Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук	Вул. Клінічна, 25, Київ, 03141 тел. 044-275-50-00
335	Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Мала Вільшанка, 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175 тл +38-04463-2-54-55
336	Маслівський державний аграрний технікум	П/в Маслівка, Миронівський р-н, Київська обл., 08850
337	Київська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"	С. Литвинівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07334 тел. +38-04496-39-174, факс. +38-04496-39-174
339	Скви́рська дослідна станція Інституту агроєкології Української академії аграрних наук	вул. Селекційна, 1, м. Сквиря, Київська обл., 09000 тел./факс. +38-044-68-2-83-23, 2-83-30
340	Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	Вул. Горького 3, п/в Раївка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., тел/факс +38-05663-46-728
341	Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук	П/в Центральне, Миронівський р-н, Київська обл, 08853
343	Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	П/в Борова, Фастівський р-н, Київська обл., 08520 т/ф +38-04465-4-12-99
344	Інститут садівництва Української академії аграрних наук	Вул. Садова 6 ,смт. Новосілки, м.Київ, 03027 тел. +38-044-526-65-48 факс. +38-044-526-65-48
345	Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"	Вул. Машинобудівників 3, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., , 08162 тел. 044-526-23-27
347	Інститут картоплярства Української академії аграрних наук	Вул. Чкалова, 22, смт. Немішаєво, Бородянський р-н, Київська обл., 07853 тел. (04477) 41-533 факс (04477) 41-542
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України	Вул. Тімірязєвська, 1, Київ, 01014 тел. +38-044-285-41-05; 285-01-16 факс. +38-044-285-26-46
350	Національний аграрний університет	Вул. Героїв оборони, 15, Київ, 03041
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України	Вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022 тел/факс +38-044-257-51-60

Код	Назва	Адреса
356	Кіровоградський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	П/в Сазонівка, м. Кіровоград, 27602 тел. +38-0522-31-57-95
357	Кримська дослідна станція овочівництва Інституту південного овочівництва і баштництва Української академії аграрних наук	С. Укромне, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим, 97536 тел. +38-0652-310-918
358	Кримський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	П/в Клепініно, Красногвардійський р-н, Автономна Республіка Крим, 97010
359	Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	С. Маленьке, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим, 97517 тел. +38-0652-323-408
360	Кримська дослідна станція тютюництва інституту винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук	С. Табачне, Бахчисарайський р-н, Автономна Республіка Крим, 98430
361	Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" НАУ	смт Аграрне, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95492 тел. (0652) 26-37-52, 22-72-67 факс. (0652) 22-39-66
362	Кримська науково-дослідна станція лікарських рослин Консорціуму "Укрфітотерапія"	Вул. Верхня, 1, с. Лікарське, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим, 97557
363	Кримська помологічна станція Української академії аграрних наук	с. Вавилова, 1, м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, 99000
364	Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук	Вул. Кірова, 31, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, 98600
365	Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук	Смт Нікіта, м.Ялта, Автономна Республіка Крим, 98648
366	Інститут ефіроолійних і лікарських рослин Української академії аграрних наук	вул. Київська, 150, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95493 тел. (0652) 267-007 факс (0652) 267-039
368	Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка	Вул. Гоголя, 34, м. Дрогобич, Львівська обл., 293720
369	Львівський державний аграрний університет	М. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381 тел. +38-0322-294-69-19, факс+38-0322-298-07-65
370	Передкарпатський філіал Інституту землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук	с. Лішня, Дрогобицький р-н, Львівська обл., 82127
371	Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук	С. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115 тел 0322-396-174
372	Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	С. Неслухів, Кам'янсько-Бузький р-н, Львівська обл., 80455
376	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"	Вул. Ходарєва 1а, с. Дерезувате, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52523 тел./ факс 0562- 399-125; 0562 - 399-111
378	Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук	Овідіопольська дорога, 3, Одеса, 65036 +38-0482-395-427, +38-0482-395-289
379	Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук	Вул. 40-річчя Перемоги, 27, смт. Таїрове, м. Одеса, 65496 тел. +38-048-741-59-50; +38-0482-69-45-44; факс. +38-0482-40-44-56
381	Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Маяська дорога, 1, с. Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667 тел.+38-048-750-8020 факс. +38-048-750-80-00
385	Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук	С. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37535
386	Полтавська державна аграрна академія	Вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003 тел. +38-0532-50-23-51; факс +38-0532-50-23-51
387	Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція	Вул. Шведська, 86, Полтава, 36029
388	Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Вереміївка, Семенівський р-н, Полтавська обл., 38251 тел.+38-05341-96-1-43 факс.+38-05314-96-1-41

Код	Назва	Адреса
389	Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук	П/в Устимівка, Глобинський р-н, Полтавська обл., Україна, 39074
390	Сарненська дослідна станція Інституту гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук	М. Сарни, 1, Рівненська обл., 34501
391	Рівненська державна сільськогосподарська дослідна станція	С. Шубків, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35325
392	Сумський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Паркова, 3, с. Сад, Сумський р-н., Сумська обл., 42343 тел. +38-0542-21-04-65 факс. +38-0542-34-24-05
393	Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук	Вул. Терещинків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 тел. +38-05444-2-21-35 факс. +38-05444-2-27-58
394	Іванівська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Сонячне, Охтирський р-н, Сумська обл., 42768
395	Подільська дослідна станція Тернопільського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Незалежності, 19, м. Хоростків, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., 48240 тел. +38-03557-511-47 факс. +38-03557-511-31
396	Українська дослідна станція тютюнництва	Вул. І. Франка, 26, Мельниця-Подільськ, Борщівський р-н., Тернопільська обл., 48751 тел./факс. +38-03541-41-5-45
399	Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	м. Красноград, Харківська обл., 63308 тел./факс. +38-057-44-93-145
401	Інститут шовківництва Української академії аграрних наук	М. Мерефа, Харківська обл., 62472
402	Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	В/з Селекційний, Харківський р-н, Харківська обл., 62478 тел./факс (057) 748-91-91
403	Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	вул.Тельмана, 10, смт. Краснокутськ, Харківська обл., 62000 тел.+38-05756-3-09-88
404	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук	Московський проспект, 142, м. Харків, 61060; тел. (057) 392-13-43, факс: (057) 779-77-63
405	Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва	П/в Комуніст, 1, Харків, 62483
409	Херсонський державний аграрний університет	Вул. Рози Люксембург, 23, м. Херсон, 73006
410	Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	Вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600 тел. 05539-2-63-12 факс (05539)-2-63-22
411	Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук	С. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483 тел. (0552) 59-31-96 факс. (0552) 59-33-90
412	Інститут рису Української академії аграрних наук	С. Антонівка, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75705 тел./факс +38-055-37-34-648
413	Степовий ім. В. М. Виногорова філіал Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького	Вул. Комунарів, 62/26, м. Цюрупинськ, Херсонська обл., 75100
414	Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	С. Новоолексівка, 3, Генічеський р-н, Херсонська обл., 75560 тел. +38-05534-255-83
416	Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Сосвий вік"	25006, м. Кіровоград, вул. Мурманська, 29 "Г" тел./факс. +38-0522-24-06-48
417	Подільський державний аграрно-технічний університет	Вул. Шевченка 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32316,тел./ф 03849-2-52-18, 3-92-20
420	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сади Тавриди"	Вул. Леніна 1а, с. Тінисте, Бахчисарайський р-н, АР Крим, 98452
422	Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Верхнячка, Христинівський р-н, Черкаська обл., 20022 тел. 04745 2-25-54
423	Науково-виробнича фірма "Геліо"	Вул.Карла Маркса,40,м. Вінниця,21034
424	Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук	С. Мліїв, Городищенський р-н, Черкаська обл., 19512
425	Уманський державний аграрний університет	вул.Інтернаціональна, 1, П/в Софіївка, м. Умань, Черкаська обл., 20305 тел.+38-04744-34-163; факс: +38-04744-333-65

Код	Назва	Адреса
427	Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук	Вул. Вавилова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500
428	Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче об'єднання "Чернігівеліткартопля"	Вул. Я. Лизогуба, 13, п/в Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522 тел. (04622) 7-49-74, факс (04622) 4-41-54
429	Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	С. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17035 тел. +38-04646-3-63-10 факс. +38-04646-3-63-18
430	Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	С. Дослідне, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17131 тел. 046 - 42-20-577
432	Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Кузнєцова, 21а, м. Чернівці, 58026 тел./факс. +38-037-22-59-03-88
433	Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук	вул.Яблунівська, 1, м. Чернівці, 58013 тел/факс +38-03722-43707
435	Кравченко Владислав Андрійович	Вул. Васильківська 11/11 кв. 50, м. Київ, 07032
437	Монсанта Інтернешнл Сьорл	Ру дес Вігнеронс 1А, 1110, Моргес, Швейцарія
454	Республіканське унітарне підприємство "Могилювська обласна сільськогосподарська дослідна станція"	Вул. Паркова 14, п/в Дашковка, Могилювський р-н, Могилювська обл., Білорусь, 213108
457	Республіканське унітарне підприємство "Білоруський науково-дослідний інститут льону"	с. Устье, Оршанський р-н, Вітебська обл., Білорусь, 211003
461	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "АНК"	Вул. Лайоша Гавро 9-є, кв. 304, м. Київ, 04211, 044-464-99-06; 044-464-99-12
462	Білявська Людмила Григорівна	Вул. Сковороди 1/3, гурт. 3, м. Полтава, 36003, тел. 8-050-948-17-57
465	РАГТ Генетик С.А.	Вул. Еміля Сінглія - сай місєвєст Бурран п/с 3336, FR-12033, Розе Седєкс 9
466	Гайдаш Василь Дмитрович	Вул. Матейки 33, м. Івано-Франківськ
468	Гуринович Степан Йосипович	Вул. Будівельників 10 кв. 21, м. Івано-Франківськ
469	Мазур Валерій Олександрович	Вул.Миколайчука 7 кв. 69, м. Івано-Франківськ
470	Москвич Степан Овсійович	Вул.Кравчука 9 кв. 11, м. Луцьк
471	Харук Ігор Дмитрович	Вул. Стуса 5 кв. 44, м. Івано-Франківськ
472	Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіас 2000"	Аеропорт б 42, м. Дніпропетровськ, 49042
477	Самородов Віктор Миколайович	Пров. Шевченка 5 кв. 24, м. Полтава, 36019
479	Поспєлов Сергій Вікторович	Вул. Зигіна 4 кв. 30, м. Полтава, 36014
484	Розен Тантау. Матиас Тантау Нахфольгер	Торнешер Вег 13, 25436, Уетерзен, тел.+ 49(0) 41-22-70-84
485	Кассад Семанс	З.І. Де Мо п/с 109 82303 Кассад Седєкс
504	Насіннева компанія Лаєн Сідс Лімітед	СМ96СН Ессєкс, Вудхем Мортімер
511	Жемела Григорій Пимонович	Вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003
513	Шамшева Надія Михайлівна	
520	Луганський національний аграрний університет	М. Луганськ-8, 91008 тел. 0642-952246
531	Гроетзнєр Пфланцензухт ГмБХ	Каналлатц 6, 21079 Гамбург
538	Ситнік Ігор Данилович	Вул. Генерала Родимцева 3а кв. 45, м. Київ, 03041
541	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК"	вул. Орджонікідзе 10, м. Москва, 117071
557	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Поділля-Плант"	вул.Наукова, б 1, к.23, с.Медвеже Вушко, Вінницький р-н, Вінницька обл. 23226
568	Приватне підприємство "Насіннева фірма "Софія"	вул. Героїв оборони 10, офіс 17 м.Київ 03680

Код	Назва	Адреса
569	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Деметра"	вул.Бориспільська, 2а с.Щасливе, Бориспільський р-н, Київська обл., 08325 (044) 568-10-12, ф. 568-12-06
583	Науково-дослідне аграрне підприємство "Мак України" у формі ТОВ	вул. Сім"ї Хохлових м.Київ,
596	Потопальський Анатолій Іванович	м.Київ, вул. Голосіївська, 4 кв 37 03039
597	Юркевич Лариса Назарівна	м.Київ, вул.Теремківська, 15 кв 18, 03187
598	Грамінекс-Насіона Сп.з о.о	вул.Кароліновська, 72 97-300 Піотрков Тріб. +004844 647 66 43
600	Євро Грас Брідінг ГмБХ і Ко. КГ	вул.Вайсенбургер, 5 59557 Ліпштадт
601	Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.	вул. Друвендаалсестег, 6 6, (6708 ПБ) м.Вагенінген
614	Науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства Молдови	Вул. Фруктова, 14, м. Кишинів, Молдова, 277019
635	Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"	вул.Генерала Наумова, буд. 23-Б 03164
637	Дочірнє підприємство "Українські газони"	вул.Садова, 26 с.Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 03027 тел. (044)- 526-32-35; факс (044)-526-32-27
645	Приватне підприємство "Лирис"	вул. Обручева, 2, кв. 1, с. Фурси, Білоцерківський район, Київська обл., 09150
646	Терра Нігра Холдінг Б.В.	Мійншеренвег 23 1433 AP Куделстаарт
647	Приватне підприємство "Агросвіт"	вул.Горького, 40, м.Нова Каховка, Херсонська обл., 74900 тел. +38-055-49-7-11-89 тел/факс+38-05549-7-81-00 E.mail: agrosvit@Kahovka.net
654	Агрофірма ім.Івана Франка	с.Івашківці, Шаргородський р-н, Вінницька обл., 76006, +38-03422-6-75-72
670	Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд	Інвергоурі Данді DD2 5ДА, Шотландія
672	Меосіс Лімітед	Бредбурн Хаус Стебл Блок, Іст Моллінг, Кент ME19 6 ДЗ Англія
703	Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насінове фірма "Манул"	Ярославское шосе, д. 116, м.Митици, Московська обл,
711	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"	07400, Київська обл., м.Бровари, тел. +38-044-207-47-48, факс +38-044-207-47-47
712	"Спуйня" Селекція і наслідництво городніх рослин с.п. з о.о. у Нохові	Вул. Ліпова, 12, 63-100, Шрем, Польща
713	Адванта Інтернешнл Б.В., (СЕС - Європа Н.В./С.А.)	Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgium
719	Адванта Інтернешнл Б.В. (Ван дер Хаве, Голландія, та Зенека, Бельгія)	П.я. Бокс 1, 4420 AA Капелла, Дійквелсестраат 70
720	Сільськогосподарський дослідний інститут Угорської академії наук, Мартонвашар	Н - 2462, Мартонвашар, Р.О.В., Угорщина
721	Сатімекс Кведлінбург	Німеччина, 06484, м. Кведлінбург, вул. Гросс Орден, 19
736	ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"	ОФ.36, вул. Ломоносова 30/2, Київ, Україна, 03022 тел/факс 044-259-06-47
738	Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.	П.О.бокс, 9801, Б.Д. Леуварден, Голландія
740	Інносід Б.В.	П.О.Вокс 10000, 5250 ГА Віймен, Голандія
741	Агріко Кооператив Б.А.	П.О. Б. 70 8300 АБ Емелорд, Нідерланди
743	СесВандерхаве Н.Б./С.А.	Індустріпарк, 15 В-3300, м.Тінен, Бельгія
744	СВС Холланд Б.В.	П.О.Б. 22, 1600 АА Енахуизен, Голандія
751	Бейо Заден Б.В.	П.О.Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхьюзен, Голандія.
753	Нюнемс БВ.	П.О.Бокс 4005, 6080 АА, Хелен, Голандія. Пр.
758	Жемойда Віталій Леонідович	Пров. Сільськогосподарський, 1, кв.29, Київ, Україна, 03041
759	Хмарський Микола Іванович	Вул. Академіка Заболотного, 112, кв. 10, Київ, Україна, 03187
760	Калінчук Олег Іванович	Вул. Калініна, 57, кв. 174, м. Черкаси, Україна, 18000
765	ТОВ агрофірма "Нібас"	Вул. Польова 100-А, смт Петропавлівка, Дніпропетрівська обл., Україна, 52700
766	Декалб Дженетікс Корпорейшн	3100 Сікаморе Роуд Декалб, Ілліноїс 60115, USA. Пр.: бульвар Лепсе, 4, " Сільвер Центр", Київ, 03067
767	Піонер Семена Холдінг ГезмБХ	Індустрігеланде, Піонерштрассе, А - 7111, Парндорф, Австрія.

Код	Назва	Адреса
770	MTI Maïс Технолоджіс Інтернейшнл ГмбХ	Ludwig Boltzmann Strabe 2, 7100 Neusiedl am See (office@maizetec.com)
772	Лекс Воорн Розенвеределинк Б.В.	П.Я 94, 1430 АВ Аальсмеер Нідерланди
773	Олій Інновейшн БВ	Ахтервег 73, 1424 РР Де Квакел
786	Мей Сід Компані Лтд. (Мей Тохумсулук Зіраат ве Тісарет Лтд. Шті)	Саманлі Махаллесі Їгтілер Каддесі, №28 Їлдрім, 16280, Бурса, Туреччина
788	Даніско Сід ГмбХ	Бреуншвайгер Штр., 22 б, Д - 38154, Кенігілютер ам Ельм, Німеччина
793	Лімагрейн Вернеуль Холдінг	Ферме де Летан БПЗ 77390 Вернуль Летан Франція
796	С.А. Флоримонд Депре	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242
798	Колодій Юрій Антонович	С. Хиначи, Володимирецький р-н, Рівненська обл., 34313
806	Євраліс Семанс	Авеню Гастон Фоебюс, 64231 Лескар Седекс, Франція.
807	Дойче Заатфеределунг Ліппштадт-Бремен ГмбХ	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина. Пр.: фірма " Голландське насіння Ltd", а/с 249, вул. Луначарського, 1А, кв 12, Київ, 02002
808	Інститут оздоровлення і відродження народів України	Музей НАП України, смт. Пирогів, Київ, 03026
809	Земундо Б.В.	Поштова скринька 2.9970, АА Ульрум
812	В. фон Боріс-Екендорф ГмбХ енд Ко	Більфельдер штрассе 233, 33818 Леопольдсхохе, Німеччина
824	Лохов-Петкус ГмбХ	Поштфах 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина
826	Пархоменко Анатолій Костянтинович	Вул. Родімцева 11, кв. 156, Київ, Україна, 03041
829	Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген	Поштфах 1363, 38358 Шонінген, Німеччина. Пр.: с. Хоцки, Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл., 08473
840	Енза Заден Де Енхуйзер Заадхандел Б.В.	Постбас 7, 1600 АА Енхуйзен
841	ТОВ "Земун Поле плюс"	смт Чабани, Києво- Святошинський р-н, Київська обл., 08162
869	Вінницький державний аграрний університет	Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, Україна, 21008
872	Селект Бучани	Словачина 91928, Бучані, Словенско
873	Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія - Нова", Української академії аграрних наук	Смт Асканія - Нова, Чаплинський р-н, Херсонська область, Україна, 75230
875	ТОВ Науково-виробнича фірма "Еліта"	вул. Октябрська. 14 с. Металіст, Слов'яносербський район, . Луганська обл., Україна, 937333
879	Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад	М. Горкого 30, 21000 Нові Сад, Югославія
880	Селген, а.с.	Янковцова 18, 170 37 Прага 7, Чеська Республіка
884	Кутновска Годовла Бурака Цукрового Сп. з о.о.	Вул. Чопіна 25, 99-300 Кутно, Польща
887	Нікерсон- Цваан Б.В.	Постбух 28, 4920 АА МАДЕ, Голландія
888	Приватне мале підприємство " Тирас"	Вул. Живова, 32, м. Тернопіль, Україна 46008, тел./факс +38-0352-23-50-22
892	Науково- виробнича агрофірма " Гібрид"	с. Калинівка, Броварський р-н, Київська обл.
893	Товариство з обмеженою відповідальністю " Агрофірма Гавриш"	103287, Москва, вул 2-а Хуторська, 11, стр.1. Росія
898	Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого ґрунту"	127287, м.Мсква, 2-га Хутірська, буд. 11, с. 1
900	Клоз Тезье	3.1. Ля Моте, авеню Луіс Саліант П.С.-83., 26802 , Порт Лес Валанс, Франція
901	Комбісід	Вул. Буйше-Шілінській, 50,21, X - 1054, Будапешт, Угорщина
906	Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова	Вул. Петра Великого, 2, м. Одеса, Україна, 270000, тел. 23 52 54
909	Науково-виробнича асоціація "Кримський міжнародний інститут нетрадиційного рослинництва, екології та здоров'я"	Вул. Київська, буд. 67/2, кв. 3, м. Сімферополь-17, АР Крим, Україна, 95017
912	Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ	24363 Хохенліті, Хользісес, Німеччина.
914	Піксід Канада Інк.	п/с.304, Грінфілд Роад 1, Ліндсей, Онтаріо, К9V4S3

Код	Назва	Адреса
917	Державний проектно- конструкторський технологічний інститут "Плодмашпроект"	Вул. Київська/пт. Перемоги, 75/1, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95017
919	Сумський національний аграрний університет	Вул. Кірова, 160, м. Суми, Україна, 40021 тел. (0542) 22-24-48, факс. 22-35-30
920	Приватне підприємство "Сорт"	П/в Центральне, Миронівкий р-н, Київська обл., Україна, 08853 тел. 04447 - 74-490
922	Закрите акціонерне товариство "Селена"	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, Україна, 65036
924	Маїсадур семанс	BP27 route de Saint Sever 40001 Mont de Marsan Cedex FRANCE
926	Заатен-Уніон ГмбХ	Айзенштрассе 12, 30916 Ізернхаген ХБ, Німеччина
927	Золана Аграр-Продукте ГмбХ унд Ко. КГ	Кіпортале 9, Д - 20144 Гамбург, Німеччина
936	Інститут кукурудзи "Земун Поле"	с. Баїка 1, 11080 Белграде, Югославія
937	Зернова дослідна неприбуткова компанія	шегед, ПФ. 391, 6701, Угорщина
938	КВС ЗААТ АГ	П.О.Бокс 1463, Д - 37555 Айнбек, Німеччина.
943	Г.А.Е. - Грулеман Агріколь Ессонуа	91720 Мес сюр Ессон, Франція
946	Осева Ексімпо Прага с.р.о.	Бженец 1436, 69681 Бзенек, ІСО: 639 86175, Чеська Республіка
950	Інститут агроєкології та біотехнології Української академії аграрних наук	Вул. Метрологічна, 12, Київ, Україна, 03143
952	Мале підприємство "Нива 1"	вул.Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003 тел. +38-0532-50-23-51; факс. +38-0532-50-23-51
954	Приватна виробнича фірма " Агроцентр"	Вул. Мільмана, 110, м. Дніпропетровськ, Україна, 49049
955	Агро-Тіп	Ам Тобербух 7, Д - 21255, Тошtedт, Німеччина
957	Костюченко Віктор Іванович	Будинок 42, кв 10, с.Дослідне, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52071
962	Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"	Вул. Гагарина 21, с. Веселе, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52502 тел./факс 056785 25 47
964	Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско"	вул.Горького, 40, м.Нова Каховка, Херсонська обл., 74900 тел. +38-055-49-7-11-89 тел/факс+38-05549-7-81-00 E.mail: agrosvit@Kahovka.net
966	Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробнича комерційна фірма "Селекта"	Вул. Гагарина 16, п/в Синельникове, с.Веселе, Дніпропетровська обл., Україна, 52500 тел. +38-05663-39673
969	Моравосід спол. с р.о.	69201 Мікулов-Муслов, Чеська Республіка
971	Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ унд Ко.КГ	47800 Крефельд-Бокум, Магдебург шрт., 2, Гевебегебіт Бокум-Норд, Німеччина
974	Приватне сільськогосподарське підприємство " Аграрне"	С.Логвин, Володарський р-н, Київська обл., Україна, 09321
984	Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	Вул. Незалежності 39, с. Крути, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., Україна, 16645 тел.+38-04631-69-4-39
986	Боярська лісова дослідна станція Національного аграрного університету	Вул. Лісодослідна, 12, Київська обл., м. Боярка, Україна, 08150
987	Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені Пастернака	Вул. Грушевського, 31, м. Івано-Франківськ, Україна, 76800
991	Малополска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.	30-002 Краков, вул. Збозова, 4, Польща
993	БЦ Інститут селекції і рослинництва	пл.Маруличев 5/1, 10 000 Загреб, Хорватія
995	С. Мейер б.в.	Stationsweg 18a, Р. О. Box 1, 4416 ZG Kruiningen, The Netherlands. Пр.: БАТ " Крафт Фудз Україна", вул.Набережна 28а, м. Тростянець, Сумська обл.
998	Кішкун Дослідний Центр	Кішкунхалас Х - 6400, Фузеспустца, 42, Угорщина
999	Компанія (Товариство з обмеженою відповідальністю) " Агрозовнішнаукa"	Вул. Суворова 9, м. Київ, Україна, 01010
1000	Семена АГ Базель	Бірзіг штр. 4, 4054 Базель, Швейцарія
1001	Товариство з обмеженою відповідальністю " Соя - Сєвер Ко"	Староборисівський тракт 34, Мінськ, Білорусь, 220141 тел. +375 17- 264-23-34 факс +375 17-263-58-27
1006	Заатцухт Фритц Ланге КГ	Постфах 1352, Д - 23602 Бад Швартау, Німеччина

Код	Назва	Адреса
1010	Заявник не зареєстрований	Не визначено
1011	Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ	Парквег 4, Д - 18190 Грос Люзевіц, Німеччина
1012	Товариство з обмеженою відповідальністю фермерське господарство "Владам"	Вул. В. Морська, 107, м. Миколаїв, Україна, 327001
1013	Поп Врієнд Сідз Б.В.	П.О.Бокс 52 16193 Г Андійк, Голандія
1019	Ефімов Олександр Павлович	Вул. Дімітрова 3, кв. 8, м. Севастополь, Україна, 99002
1024	НВО "Еліта" Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук	Пр. Московский, 42, м. Харків, Україна, 61060
1025	Інститут захисту рослин Української академії аграрних наук	Вул. Васильківська, 33, Київ, Україна, 01033
1027	Вітвіцький Михайло Антонович	Вул. Машинобудівників, 7/19, смт. Чабаны, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08162
1028	Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"	проспект Глушкова, 30, кв 175, м. Київ, 03187
1029	Ботанічний сад Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна	Пл. Свободи 4, м. Харків, Україна, 61077
1031	Сидорчук Валерій Іванович	Вул. Вокзальна, 3, кв. 57, м. Біла Церква, Київська обл., Україна тел.6-16-26
1032	Беттасід, Інк.	1788 Маршал Роуд, Шейкопі, МН 55379, США
1039	Приватна фірма "Зернова компанія "Слав'янське поле"	Україна, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 56.
1041	ЗАТ "Агрофірма Насіння"	Вул. Гоголя, 1, с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська область, Україна, 38715
1042	ТОВ "Селекційна станція " ТСГА ім. М.М. Тимофіїва	Вул. Пасична, 5, м. Москва, Росія, 127550
1044	Агрофірма "Наско"	Вул. Володимирська 91, Київ, Україна, 03150
1046	Європлант Пфланценцухт ГмбХ	Бернхард-Ріман штр., 1-3, 21335, Лунебург, Німеччина
1048	Секобра Речерчес	Центр де Буа Енді - 78580 МОЛЬ, Франція
1050	Сінгента Сідз	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкайзен, Голландія. Пр.: вул., Предславінська, 19, Київ, 03150
1051	Акціонерне товариство "Українська соя"	Вул. Жуковського, 20, м. Одеса, Україна, 65036
1054	Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"	Вул. Полкова 57, м. Київ, 04078 тел. +38-044-462-95-50 факс +38-044-434-86-66
1059	Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю	91490, м. Луганськ, с. Тепличне, вул. Степова, 11
1067	Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру	Вул.Садова 1, с. Плодове, м. Нова Каховка, Україна, 74992
1068	Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"	Вул. Мухіна, 24, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, 334203
1069	Ковальчук Ольга Марковна	С. Укромне, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим, Україна, 97536
1070	Мале науково-виробниче підприємство "Корн"	С. Ольгино, Горностаєвський р-н, Херсонська область, Україна, 74621
1071	Підприємство городнього насінництва і розсади, "ЦНОС"	60-951 Познань, вул Копаніна 28/32, Польща.
1072	Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче "Полан" Сп. з о.о.	30-130 Краков, вул. Ридля 53/55, Польща. Пр.: ТЗОВ "Свитязь", вул. Городоцька, 174, м. Львів, 79022
1073	Н.Л. Крестензен Ерфуртер Замен унд Пфланценцухт ГмбХ	Markstrasse 38, 99084 Erfurt, Germany, Пр. : Пахаренко і Партнери, вул. Пушкінська, 9, к.11, Київ, 252034
1074	Карпатська лісова науково-дослідна станція	Вул. Духновича, 105, м. Мукачеве, Україна, 89600
1079	Сінгента Сідз С.А.С.	12, шемєн де л'Обі Б.П. 27, 31790 СенСовер, Франція.
1080	Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Елітсортнасіння"	Артема 11, Київ, 04053, Україна
1081	Підприємство городнього насінництва і розсади Ожарув Мазовецькі (ПНОС)	Вул. Жеромського 3, 05-850 Ожарув Мазовецькі, Польща.

Код	Назва	Адреса
1082	Закрите акціонерне товариство "Ворскла"	Вул. Б.Хмельницького, 37, м. Тростянець, Сумська обл., Україна, 42600
1083	Товариство з обмеженою відповідальністю "Технаука"	Вул. Степова 11а, с. Тепличне, м. Луганськ, Україна, 94490 тел./факс. +38-0642-91-04-61
1086	Сингента Сідс АБ	Зокербруксваген 1, БОКС 302, С-261 23, Ландакрона, Швеція.
1087	БАТ "Крафт Фудз Україна"	Вул. Набережна 28А, м.Тростянець, Сумська обл., Україна, 42460
1091	Сидорчук Валерій іванович	Кв. 57, 3, вул. Вокзальна, м. Біла Церква, Україна, 09100
1092	Синьогуб Сергій Васильович	09100 м.Біла Церква, Київська обл., вул.Леваневського, 47/1, кв. 124, тел.7-62-28
1093	Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"	Вул. Шушенська, 65, м. Запоріжжя-89, Україна, 69089 тел./факс +38-0612-578-381
1096	Бурлов В.В.,Карпенко О.О.,Краєвський А.М.,Крутько В.И.	Вул. Леніна, 51/27, с. Металіст, Слов"яносербський р-н, Луганська обл., Україна, 349020
1097	Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна	П/в Мала Вільшанка-1, Білоцерківський р-н, Київська обл., Україна, 09175
1100	Спільне підприємство "Виробниче об'єднання "Агро-Пром-Сервіс "	Вул. Велика Бердичівська , 52/19, м. Житомир, Україна, 10008 тел./факс +38-0412-25-18-37
1102	Рійк Цваан Велвер ГмбХ	Верлер штрассе, 1, Д - 59514, Вельвер, Німеччина. Пр.: Вул. Академіка Туполева, 12/1, Київ, 03062 факс 044 - 241-97-57 тел. 241-97-37
1103	Мейянд Ентернасьйональ С.А.	Domaine de Saint-Andre, Le Cannet Des Maures, 83340 Le Luc En Provence - France, Пр. :Пахаренко і Партнери, вул. Пушкінська, 9, к. 11, Київ, 252034
1104	Ходовля Рослин Нізнаніце Сп. з о.о.	42-270 Кломніце, воєв. Сласке, Польща
1106	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рапсодія"	Немирівське шосе, 26, м. Вінниця, Україна., 23200
1108	Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство "Фітон - МВ"	Вул. С. Бандери, 62, м. Івано-Франківськ, Україна, 76014
1109	Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Онопрієнка, 10, м. Черкаси, Україна, 18034
1110	Акціонерна компанія "Контакт"	Пров. Слюсарний, 1, м. Харків, Україна, 61003
1111	Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Донбасу"	с. Піски, Ясинуватський р-н, Донецька обл., Україна, 86053, (06236) 4-87-30, 4-87-29
1112	Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"	Вул. Героїв Оборони 10, Київ, Україна, 03680 тел. 044-257--51-15
1114	Агропромислова фірма "Флора" у формі товариства з обмеженою відповідальністю	Вул. Спирідонівська, буд. 26, кв. 3, Одеса, Україна, 65045 тел.+38-048-730-97-01, факс. +38-482-395-019
1115	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрний науково-дослідний інститут "АНДІ"	Вул. С. Бандери, 62, м. Івано-Франківськ, Україна, 76014
1116	"Науково -виробнича фірма Сінтез - Агро" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю	Вул. Академіка Вільямса 81/3, кв70, м. Одеса, Україна, 65104
1117	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче мале підприємство "Антарія"	Вул. Машинобудівників, 25, стм. Чабани Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08162 тел. 044-526-23-16 факс 044-526-03-79
1119	Приватне підприємство Агрофірма "Сортцвєтовоц"	Вул. Кооперативна, 22, Харків, Укоаїна, 61003
1120	Приватне підприємство "Віткос"	Вул. Машинобудівників, 2/19, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08162
1121	Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"	С. Металіст, Славяносербський р-н, Луганська обл., Україна, 93733 тел. +38-0642-59-66-40 факс. +38-0642-59-66-40
1123	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд"	Вул. Рози Люксембург, 23, Херсон, Україна, 73006
1124	Приватне сільськогосподарське селекційно-дослідне підприємство "БОР"	Вул. Затишна, 17, с. Дачне, Біляївський р-н, Одеська обл., Україна, 67624 тел. +38-04852-37-374
1127	ТОВ МакКейн Фудз Україна	Вул. Госпітальна, 12, Київ, 252023, Пр.: вул. Фролівська, 3/34, Київ, Україна, 04070
1141	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"	Вул. Акад. Проскури 1, м. Харків 61070, Україна тел. +38-0572-58-52-65; +38-0577-140164
1147	БАТ "Кримсортнасіннеовоч"	Вул. Кубанська, 17, м. Сімферополь, 95022, Жиліну Сергію Яковичу
1149	Заатцхут Йозеф Бройн Гдбр	Амсельвеч 1-Д 91074 Герцогенаурах

Код	Назва	Адреса
1153	"ГАЕ Решерш"	41 rue de riv'єr 91720 Месс
1155	Агрі Обтансіон СА	Шемен де ля Мінієр- п/я 36, 78041 ПІАНКУР Седекс-Франція-
1157	Букша Олексій Юхимович	Вул. Низова 36, м. Прилуки, Чернігівської обл., 17500
1159	Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"	Вул. Салютна 20 А кв. 26, м. Київ, 03190
1161	Плант Селект - товариство з обмеженою відповідальністю	Грубчице 111, 798 21 Будигошть
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю "Свитязь"	Вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 тел. +38-032-240-99-70, факс. +38-032-240-39-94
1165	Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжортнасінеовоч"	Вул. Чумаченко 23, м. Запоріжжя, 69104
1167	Науково-виробниче підприємство "Агродніпро-насіння"	Вул. Станційна 1, с. Сурсько-Литовське, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52064 тел. +38-0562-35-02-18 факс. +38-0562-35-02-19
1169	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково - виробнича фірма "Агротехнологія"	Вул. Межева 1, смт Кушугум, Запорізький р-н, Запорізька обл., 70450
1172	Селянське (фермерське господарство) "Тритікум"	смт Авангард, Овідіопольський р-н, Одеська обл., 67806
1174	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"	с. Мельники, Канівського р-н, Черкаської обл., 19043, тел. 04736 - 9-63-45
1178	Заклад Огородничий Пшиборув Сп. з о.о.	Пшиборув 123, 39-217, Грабіни, Польща
1180	Закрите акціонерне товариство агропромислова корпорація "Зоря"	с. Зоря, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35314 тел. +38-03626-330-70 факс. +38-0362-275-380
1182	Товариство з обмеженою відповідальністю "Верес"	вул. Петропавловська 15, м. Київ, 04086
1184	Закрите акціонерне товариство "Агроком"	Вул. Ленінградська 6, с. Сурсько-Литовське, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52064
1192	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець"	с. Полігон, Жовтневий р-н, Миколаївська обл., 57217
1194	P2n	Авеню Сант Пьер, Сіте де Боуран, 122033 Родез Седекс 9
1197	Де Ройтер Сідз	П.Б. 1050, 2660 ВВ Бергменходк
1199	Науково-виробнича фірма "Фунгі" приватне підприємство	Овідіопольська дорога 3, м. Одеса, 65036
1213	"Ралс ГБР" насінневе господарство	Лундсгард, 24977, Грундхоф