МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
MINAGROPOLICY OF UKRAINE

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
STATE SERVICE ON RIGHT PROTECTION FOR PLANT VARIETIES

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

КАТАЛОГ
СОРТІВ РОСЛИН ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ у 2011 році
(I і II частини)

КИЇВ 2011

МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
MINAGROPOLICY OF UKRAINE
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
STATE SERVICE ON RIGHT PROTECTION FOR PLANT VARIETIES
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний бюлетень	*Видається щоквартально*	*Заснований у січні 2003 р.*	Каталог сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2011 р. (I і II частини)

Каталог сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2011 році

(I і II частини)

Мінагрополітики України
MINAGROPOLICY OF UKRAINE
Державна служба з охорони прав на сорти рослин
STATE SERVICE ON RIGHT PROTECTION FOR PLANT VARIETIES
Український інститут експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ЗАСНОВНИК –
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

Головний редактор *С. І. Мельник*
Editor-in-chief S. Melnyk

Київ
ТОВ „Алефа”
2011

УДК 347.77:633(055)
ББК 67.404.1
0-92

0-92	Охорона прав на сорти рослин: офіц. бюл. / Каталог сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2011 році (I і II частини). // Мінагрополітики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин, Український інститут експертизи сортів рослин. – К.: ТОВ „Алефа", 2011. – 510 с. Каталог сортів рослин придатних для поширення в Україні видається на виконання Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" з метою організації інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин. Поширюється для селекціонерів, власників сортів, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насіннєвих фірм, науково-дослідних інститутів, вузів, технікумів, а також представляє інтерес для господарств різних форм власності та городників і садівників. УДК 347.77:633(055) ББК 67.404.1

Адреса засновника та редакційної колегії:
Державна служба з охорони прав на сорти рослин,
вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: 257-99-33, факс :257-99-63
e-mail: sops@sops.gov.ua www.sops.gov.ua

© Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 2011
© Український інститут експертизи сортів рослин, 2011

ЗМІСТ

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2011 р. (частина І)	17
Сільськогосподарські: злаки	18
Пшениця м'яка озима	18
Пшениця м'яка яра	26
Пшениця тверда озима	27
Пшениця тверда яра	28
Жито озиме	28
Тритикале озиме	30
Тритикале яре	31
Овес посівний	31
Ячмінь звичайний озимий	32
Ячмінь звичайний ярий	34
Кукурудза	38
Пшениця шарозерна	57
Сільськогосподарські: бобові	57
Горох посівний	57
Сочевиця харчова	58
Нут звичайний	59
Чина посівна	59
Квасоля звичайна	59
Сільськогосподарські: круп'яні	59
Гречка їстівна	59
Просо посівне	60
Сорго звичайне двокольорове	61
Сориз	62

Рис посівний ярий	63
Сільськогосподарські: олійні та прядивні	63
Соняшник однорічний	63
Соя	75
Ріпак озимий	79
Ріпак ярий	83
Льон низький, кудряш	85
Рижій посівний	85
Гірчиця сарептська	85
Гірчиця біла	86
Рицина звичайна	86
Мак снотворний	86
Арахіс підземний	87
Кунжут індійський	87
Суріпиця озима	87
Суріпиця яра	87
Льон звичайний, довгунець	87
Коноплі посівні	88
Бавовник звичайний	88
Гірчиця сарептська озима	88
Гірчиця чорна	88
Смикавець їстівний (Чуфа)	88
Сільськогосподарські: буряк	88
Буряк цукровий	88
Буряк кормовий	94
Сільськогосподарські: картопля	94
Картопля	94

Сільськогосподарські: кормові	99
Пайза (плоскуха хлібна)	99
Сорго віникове	99
Сорго цукрове	100
Сорго суданське	100
Сорго-суданквий гібрид	101
Елевсина (Дагуса)	101
Пажитниця однорічна (Вестервольдська)	101
Грястиця збірна	101
Житняк	102
Костриця Регеля	102
Костриця лучна	102
Костриця очеретяна	102
Мітлиця велетенська	103
Очеретянка звичайна	103
Пирій видовжений	103
Райграс високий	103
Пажитниця багаторічна	103
Гребінник звичайний декоративний	104
Костриця червона мінлива	105
Костриця жорстка	105
Костриця овеча	105
Костриця різнолиста	105
Костриця червона	105
Костриця тонколиста	106
Костриця шорстколиста	106
Мітлиця повзуча	106
Мітлиця тонка	107
Тонконіг звичайний	107
Тонконіг лісовий	107
Тонконіг лучний	107

Белардіохлов фіолетова	108
Стоколос безостий	108
Тимофіївка лучна	108
Сорго багаторічне (Трава Колумба)	109
Пажитниця багатоквіткова	109
Боби кормові	109
Горошок (Вика озима)	109
Горошок (Вика яра)	110
Конюшина відкритозіва	110
Конюшина олександрійська	110
Люпин білий	111
Люпин жовтий	111
Люпин вузьколистий	111
Середела посівна	112
Горох польовий (пелюшка)	112
Буркун білий	112
Еспарцет	112
Люцерна мінлива	112
Козлятник лікарський	113
Козлятник східний	113
Конюшина лучна	113
Конюшина гібридна	114
Конюшина біла (повзуча)	114
Люцерна посівна	114
Лядвенець рогатий	115
Чина лісова (гібридна)	115
Щириця	116
Мальва кучерява (калачики)	116
Мальва пульхела	116
Мальва Мелюка	116
Топінамбур	117

Топінсоняшник	117
Хатьма тюрінгська (Лаватера)	117
Щавель тяншанський	117
Сильфій пронизанолистий	117
Свербига східна	117
Тіфон	117
Фацелія пижмолиста	117
Мальва гібридна	118
Сіда багаторічна	118
Турнепс	118
Гарбуз кормовий	118
Пирій середній	118
Костриче-райграсовий гібрид	118
Люцерна жовта (серповидна)	118
Еспарцет закавказький	118
Стоколос прибережний	119
Сільськогосподарські: овочеві	119
Баклажан їстивний	119
Боби кінські	119
Буряк столовий	120
Гірчиця салатна	121
Гарбуз звичайний	121
Горох овочевий	122
Диня посівна (звичайна)	122
Кабачок	123
Кавун звичайний	124
Капуста білоголова	126
Капуста броколі	130
Капуста червоноголова	130
Капуста кольрабі	131

Капуста пекінська	131
Капуста цвітна	131
Квасоля овочева	133
Крес-салат	134
Кукурудза розлусна	134
Кукурудза цукрова	134
Мангольд	135
Морква посівна	135
Огірок посівний	138
Пастернак посівний	142
Патисон	142
Перець гіркий	142
Перець солодкий	142
Петрушка гордня	145
Помідор їстивний	146
Ріпа	152
Редиска	152
Редька посівна	153
Редька олійна	154
Салат головчастий	154
Салат латук	154
Селера листкова	156
Фізаліс клейкоплідний	156
Цибуля батун	156
Цибуля городня	156
Цибуля порей	159
Цибуля скорода (шніт)	159
Цибуля слизун	160
Цибуля шалот	160
Цикорій коренеплідний	160
Часник (цибуля посівна)	160

Чорнушка посівна (Нігела)	160
Шпинат городній	160
Щавель кислий	161
Цибуля запашна	161
Цибуля галузиста	161
Гібіск їстівний (Бамія)	161
Гарбуз мускусний	161
Гарбуз крупноплідний	161
Селера коренеплідна	161
Сільськогосподарські: інші	161
Аніс звичайний	161
Васильки справжні	162
Гісоп лікарський	162
Ельшольція Стаунтона	162
Змієголовник	162
Змієголовник молдавський	162
Кмин звичайний	162
Коріандр посівний (кінза)	163
Котяча м'ята лимонна	163
Кріп запашний	163
Лаванда вузьколиста	163
Лавандин	164
Лофант ганусовий	164
Майоран садовий	164
Меліса лікарська	164
Меліса лимонна	164
Молочай чиновий	164
М'ята	164
Полин лимонний	165
Розмарин лікарський	165

Сафлор красильний	165
Троянда дамаська	165
Фенхель звичайний	165
Хміль звичайний	165
Чабер садовий	166
Чебрець	166
Шавлія мускатна	166
М'ята довголиста	166
Плодові та ягідні	167
Яблуня домашня	167
Груша звичайна	168
Айва довгаста	171
Хеномелес японська	171
Абрикос звичайний	171
Алича (слива розлога)	172
Вишня звичайна	172
Черешня	173
Слива домашня	175
Персик звичайний	175
Нектарин	176
Дерен (кизил) звичайний	177
Агрус відхилений	177
Актинідія	178
Жимолость синя	178
Калина звичайна	178
Лимонник китайський	178
Малина	179
Обліпиха крушиновидна	179
Порічки звичайні	179
Смородина	180

Суниця	181
Горіх грецький	181
Мигдаль звичайний	182
Хурма східна	182
Актинідія пурпурова актинідія гостра	182
Яблуня (підщепа)	182
Виноград	183
Виноград справжній	183
Декоративні та лікарські	187
Азалія	187
Алтея лікарська	187
Бузок	187
Валеріана лікарська	188
Гладіолус	188
Головатень круглоголовий	188
Ехінацея пурпурова	188
Жовтушник лакфіолевидний	189
Жоржина садова	189
Звіробій козячий	190
Калістефус китайський	190
Канна індійська	191
Ломиніс	191
Мачок жовтий	191
Наперстянка пурпурова	191
Наперстянка шерстиста	191
Оман високий	191
Півонія	191
Подорожник блошиний	192
Подорожник великий	192

Розторопша плямиста	192
Ромашка аптечна	192
Троянда	192
Тюльпан	193
Флокс волотистий	193
Хризантема	193
Целозія гребінчаста	194
Цмин пісковий	194
Шавлія лікарська	195
Щириця Мантегацца	195
Щириця хвостата	195
Череда трироздільна	195
Деревій майже звичайний	195
Інші	195
Глива звичайна	195
Печериця двоспорова	195
Характеристики сортів рослин, занесених до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2011 році (частина II)	196
Сільськогосподарські: злаки:	197
Пшениця м'яка озима	197
Пшениця м'яка яра	208
Пшениця тверда озима	209
Пшениця тверда яра	210
Жито озиме	211
Тритикале озиме	212
Овес посівний	214
Ячмінь звичайний озимий	216
Ячмінь звичайний ярий	219
Кукурудза	223

Кукурудза – батьківські компоненти	267
Сільськогосподарські: бобові	274
Горох посівний	275
Квасоля звичайна	279
Сільськогосподарські: круп'яні	281
Гречка їстівна	281
Просо посівне	283
Сорго звичайне двокольорове	284
Сориз	288
Рис посівний ярий	289
Сільськогосподарські: олійні та прядивні	290
Соняшник однорічний	290
Соя	327
Ріпак озимий	336
Ріпак ярий	346
Гірчиця сарептська	349
Гірчиця біла	350
Мак снотворний	350
Льон звичайний, довгунець	352
Коноплі посівні	352
Сільськогосподарські: буряк	352
Буряк цукровий	352
Буряк кормовий	362
Сільськогосподарські: картопля	362
Картопля	362

Сільськогосподарські: кормові	369
Сорго-суданквий гібрид	369
Костриця лучна	370
Пажитниця багаторічна	370
Горошок (Вика яра)	370
Еспарцет	371
Конюшина лучна	372
Люцерна посівна	372
Щириця	373
Костриця червона	374
Сільськогосподарські: овочеві	374
Баклажан їстивний	374
Буряк столовий	375
Горох овочевий	376
Диня посівна (звичайна)	386
Кабачок	389
Кавун звичайний	390
Капуста білоголова	395
Капуста броколі	402
Капуста брюсельська	402
Капуста червоноголова	403
Капуста пекінська	404
Капуста савойська	404
Капуста цвітна	405
Квасоля овочева	406
Кукурудза цукрова	408
Морква посівна	411
Огірок посівний	415
Перець гіркий	418
Перець солодкий	419

Петрушка городня	422
Помідор їстивний	422
Редиска	439
Салат головчастий	440
Салат латук	440
Цибуля городня	442
Цибуля порей	450
Цибуля скорода (шніт)	450
Цибуля шалот	451
Шпинат городній	451
Гарбуз мускусний	451
Гарбуз крупноплідний	452
Селера коренеплідна	452
Монарда двійчаста	452
Огірочник лікарський	454
Сільськогосподарські: інші	454
Гісоп лікарський	454
Сафлор красильний	454
Хміль звичайний	455
Плодові та ягідні	455
Яблуня домашня	456
Груша звичайна	459
Айва довгаста	460
Абрикос звичайний	461
Алича (слива розлога)	464
Черешня	466
Слива домашня	467
Персик звичайний	467
Жимолость синя	475

Суниця	476
Горіх грецький	476
Мигдаль звичайний	478
Унабі справжній (зізіхус)	478
Ліщина велика (Фундук)	479
Айва х яблуня	480
Хурма східна	480
Вишнево-черешневий гібрид	483
Ожина звичайна	483
Виноград	484
Виноград справжній	484
Декоративні та лікарські	485
Астильба	485
Калістефус китайський	485
Лінійник	487
Льон великоквітковий (декоративний)	488
Півонія	488
Троянда	489
Флокс волотистий	494
Азиміна трилопатева	495
Адреси заявників, власників, підтримувачів сорту та інші	496
Скорочення термінів	509

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2011 р. (частина І)

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Сільськогосподарські: злаки													
Пшениця м'яка озима			- 225										
Апогей Луганський	® 02007020	2006	309 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	8	6-8	8-9	7-8	слн
Астет	01007037	2006	404 /	СЛ	7	зерн	ср	7-9	7-9	7-9	8-9	7-9	слн
Альянс	04007052	2008	404 /	С	7-8	зерн	ср	8	7-8	8-9	9	7-8	слн
Астрон	07007044	2010	926 /	П	8	зерн	сп	7-8	8	9	9		цін
Артеміда	02007022	2008	736 /	ЛП	7-8	зерн	сс	8	7-8	8,5	8	7-8	цін
Актер	® 05007030	2008	807 /	П	7-8	зерн	сс	6-7	7-8	8-9	8-9	8-9	слн
Антонівка	® 05007007	2008	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	8-9	7-8	8-9	8-9	7-8	слн
Ассоль	® 04007038	2008	376 /	С	7-8	зерн	ср	8-9	8	9	9	7-8	слн
Антара	® 04007030	2008	376 /	С	8	зерн	ср	7-8	8	8-9	9	7-8	слн
Анулька	® 05007029	2008	376 /	С	7-8	зерн	ср	8-9	8	8-9	9	8	слн
Аналог	® 05007032	2008	345 /	Л	7-8	зерн	рс	8	8	8-9	8	8	слн
Акратос	07007045	2010	926 /	СЛП	8-9	зерн	сп	7-8	8	8-9	8-9		цін
Ареал ювілейний	® 07007004	2010	920 /	ЛП	8-9	зерн	сс	8	8	8	8-9		цін
Бунчук	® 06007006	2009	378 /	СЛП	8-9	зерн	рс	7-8	8-9	8	8-9	7-8	слн
Білоцерківська напівкарликова	® 94007028	1999	1097 / 1097, 335	ЛП	7	зерн	рс	7	5	7-9	5	5	цін
Батько	02007029	2006	25 / 1112	С	5-7	зерн	рс	5-7	8	8-9	8-9	7-9	слн
Богдана	® 03007018	2006	355 /	СЛП	8-9	зерн	сс	7-9	8-9	8-9	8-9	7-9	слн
Білосніжка	01007017	2006	315 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-9	8-9	8-9	8-9	7-9	слн
Богемія	® 07007028	2010	880 /	ЛП	8-9	зерн	сс		8	8-9	8-9		слн
Благодарка одеська	® 06007011	2009	378 /	СЛП	8	зерн	рс	7	8-9	8	8-9	7-8	слн
Бенефіс	® 05007033	2008	345 /	Л	7-8	зерн	сс	7-8	8	8	8	7-8	цін
Борвій	® 07007015	2010	378 /	С	8	зерн	ср	8-9	9	9	9		слн
Безмежна	® 04007008	2008	922 /	СЛ	7-8	зерн	ср	8-9	7-8	8-9	8-9	7-8	слн
Богиня	® 04007021	2008	315 /	СЛ	8	зерн	ср	8	7-8	9	8-9	7-8	слн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Веста	00007004	2003	341 / 341	ЛП	9	зерн	сс	7	5	7-9	7-9	5	цін
Вікторія одеська	® 93007001	1998	378 / 378	Л	9	зерн	ср	6-7	7	5	7-9	5	цін
Вдала	® 03007009	2006	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7-8	слн
Витязь	® 93007003	1998	520 / 520	С	5	зерн	рс	7-8	7-9	5	7-9	5	цін
Василина	® 01007038	2005	404 / 404	ЛП	7-8	зерн	сс	8-9	7-8	8	8	8-9	слн
Відрада	® 07007034	2010	335 /	СЛП	7-8	зерн	ср	8-9	8	7-8	8-9		слн
Веснянка	02007007	2005	355 /	СЛП	6-7	зерн	рс	7	8	8	8-9	7-8	слн
Вільшана	07007012	2010	386 /	Л	8	зерн	сс	8-9	8	7-8	8-9		слн
Волошкова	® 04007026	2008	341 /	ЛП	8-9	зерн	сс	8	8	8	8	7-8	цін
Володарка	02007006	2005	355 /	ЛП	7-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	8-9	цін
Віта	03007026	2007	25 / 1112	СЛ	7	зерн	ср	7-9	8	8-9	8-9	7	цін
Вінничанка	® 04007023	2008	888 /	ЛП	8-9	зерн	сс	8	8	8	8-9	7-8	цін
Глібовчанка	98007008	2002	388 /	Л	7	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	слн
Годувальниця одеська	® 06007012	2009	378 /	СЛП	8	зерн	ср	7-8	8	7-8	8-9	7-8	слн
Господиня	® 04007006	2007	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7	8	8-9	8-9	5-7	слн
Гордовита	® 06007048	2010	404 /	П	7	зерн	сс	8	7	8-9	8-9		цін
Донецька 48	93007045	1997	315 /	СЛ	9	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	цін
Дріада 1	® 00007001	2004	1123 / 1123	С	9	зерн	рс	7-9	7-9	7-9	7-9	7	слн
Достаток	® 05007016	2009	355 /	СЛП	8	зерн	сс	7-8	7-8	8	8-9	7-8	цін
Донський сюрприз	01007023	2006	212 / 1112	СЛ	7	зерн	рс	7-9	7-9	8-9	8-9	7-9	слн
Дорідна	05007064	2009	404 /	ЛП	7-8	зерн	сс	8-9	7-8	7-8	8	7-8	слн
Дромос	07007046	2010	926 /	ЛП	8-9	зерн	сс	7-8	8	8-9	9		ф
Дар Луганщини	01007005	2005	309 /	С	7	зерн	ср	8-9	8	8	8	7	слн
Добірна	02007008	2005	355 /	СЛП	7	зерн	сс	7	8	8	9	8-9	слн
Диканька	® 02007013	2005	386 /	Л	7	зерн	сс	8-9	7	8	9	8	слн
Дальницька	® 00007015	2005	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7	8	8	8-9	8	слн
Девіз	05007059	2008	212 /	Л	8	зерн	ср	8	8	7-8	8,5	8	слн
Деметра	® 00007005	2005	341 / 1025, 341	ЛП	7-8	зерн	сс	7	7	8-9	9	7-8	цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Досконала	04007054	2008	404 /	Л	7-9	зерн	сс	7-8	8	7-8	8-9	7-8	слн
Дюк	® 05007011	2008	378 /	С	7-8	зерн	ср	8-9	8	8-9	8-9	7-8	слн
Елегія	® 99007003	2003	335 /	ЛП	7	зерн	сс	7	7	7-9	7-9	7	цін
Економка	® 05007022	2008	341 /	ЛП	8	зерн	сс	8-9	8	8	8-9	8	слн
Емеріно	® 07007048	2010	989 /	П	8	зерн	сс	8	8	9	9		цін
Епоха одеська	® 07007006	2010	378 /	СЛП	8	зерн	ср	8	8	7-8	8-9		слн
Еміт	® 07007022	2010	749 /	ЛП	8	зерн	сс	8	8	7-8	8-9		цін
Єврофіт	® 07007049	2010	989 /	ЛП	8	зерн	сс	8	8	8-9	8-9		цін
Єдність	® 05007008	2008	378 /	СЛП	8-9	зерн	ср	8,5-9	8	8-9	8-9	7-8	слн
Ссаул	05007050	2008	25 /	СЛП	8	зерн	ср	9	8	9	9	8	слн
Єрмак	01007025	2005	212 / 1112	СЛ	7-9	зерн	ср	8	8	8-9	8	8-9	слн
Жайвір	07007014	2010	378 /	СЛП	8	зерн	ср	8	8	7-8	8-9		слн
Золотоколоса	® 03007020	2006	355 /	СЛП	9	зерн	сс	7	7	8-9	9	7-9	цін
Землячка одеська	® 03007007	2006	922 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8-9	8-9	8-9	7-8	цін
Збруч	90007012	1994	355 /	Л	5-7	зерн	сс	5-7	7	7	7-9	7	цін
Знахідка одеська	® 96007005	2001	378 / 378, 378	С	7	зерн	рс	>5	7-9	6-7	7-9	5	слн
Зерноградка 11	01007028	2005	212 / 1112	С	8	зерн	ср	7-8	8-9	8-9	9	8-9	слн, зрош
Зміна	® 03007006	2007	922 /	С	7-9	зерн	ср	5-7	8-9	8-9	8-9	7	слн
Запорука	® 04007018	2008	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	8	8	9	8-9	7-8	слн
Зіра	01007001	2005	340 /	СЛ	7	зерн	ср	7-8	8	7-8	8-9	8	цін
Зимоярка	® 04007010	2007	355 /	Л	7-9	зерн	сс	<5	7-8	9	8-9	7	слн
Заграва одеська	® 07007007	2010	378 /	СЛП	8	зерн	ср	8	8	7-8	8-9		слн
Златоглава	® 07007031	2010	1059 /	СЛП	8	зерн	ср	8,5	8	7-8	8		слн
Заможність	® 05007012	2008	922 /	СЛ	8	зерн	ср	8	8	7-8	8-9	7-8	цін
Іванівська остиста	93007010	1997	394 /	Л	7	зерн	сс	7	5	5	7-9	5	ф
Іришка	® 07007039	2010	25 /	СП	8	зерн	ср	8	8-9	9	9		слн
Іліас	05007043	2008	934 /	П	7-8	зерн	сс	6-7	8	8-9	8	8	цін
Істина одеська	® 07007005	2010	378 /	СЛП	8	зерн	ср	8-9	8	8	8-9		слн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Київська 7	94007006	1998	355/	П	7	зерн	ср	7	5	5	7-9	5	дф
Колумбія	® 00007010	2003	355/341	СЛП	9	зерн	рс	5-6	5	7-9	7-9	7-9	слн,зрош
Київська 8	97007014	2000	355/	СЛП	9	зерн	сс	7-8	7-9	7-9	7-9	5	слн
Коломак 5	93007039	1997	386/386	Л	7	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	слн
Красуня одеська	93007011	1997	378/378	СЛ	7	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	слн
Коломак 3	93007038	1997	386/386	СЛП	7	зерн	сс	7-8	5	7-9	7-9	5	слн
Красень	® 06007007	2009	378/	СЛП	8-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7-8	цін
Крижинка	® 98007004	2002	341/341	ЛП	9	зерн	сс	8-9	5	5	7-9	5	цін
Київська остиста	92007018	1995	355/	ЛП	5	зерн	сс	5	5	7-9	7-9	5	слн
Куяльник	® 99007007	2003	378/	СЛ	9	зерн	ср	5	7-9	7	7-9	7	слн
Калинова	® 05007027	2008	341/	ЛП	8	зерн	сс	7-8	7-8	8	8-9	7	цн
Кубус	06007037	2009	824/	ЛП	8	зерн	сс	6-7	8	8-9	8-9	7-8	слн
Копилівчанка	98007007	2003	345/345	ЛП	5	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	цін
Краснодарська 99	03007027	2006	25/1112	С	7-8	зерн	рс	7	8	8-9	8-9	7-8	слн
Комплімент	® 03007022	2007	807/	П	7-9	зерн	сп	5	7-8	8-9	9	7-9	цін
Кобіра	® 04007002	2008	279/	ЛП	8-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	8	цін
Кірія	® 00007017	2004	378/	С	8-9	зерн	ср	7	8	8-9	9	7	слн
Кохана	® 05007068	2009	411/	СЛ	8	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7-8	слн
Кірена	® 07007032	2010	1123/	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	7-8	8-9		слн
Косовиця	® 04007005	2008	378/	СЛ	8-9	зерн	ср	8-9	8	8-9	8-9	7-8	слн
Косоч	® 05007045	2008	627/	Л	7-8	зерн	рс	7-8	8	9	8	7-8	цін
Колос Миронівщини	® 05007025	2008	341/	ЛП	8	зерн	сс	8	8	8-9	8,5	7-8	цін
Краплина	® 04007022	2008	315/	С	8-9	зерн	ср	8	8	9	9	7-8	слн
Кіона	® 04007009	2008	381/	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	8,5-9	8-9	7-8	цін
Красота	02007030	2007	25/1112	Л	7-9	зерн	ср	7-8	7-8	8-9	8-9	7	слн
Кольчуга	® 03007011	2007	1192/	С	5-7	зерн	рс	7-8	8	8-9	9	7	цін
Левада	® 01007007	2005	386/	Л	7-8	зерн	сс	8-9	7	8	9	8	слн
Лупус	06007025	2009	1034/	ЛП	8	зерн	сс	8	8	7-8	8,5	7-8	слн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг ання	осипання	хвороб	
Либідь	® 03007021	2006	335 /	СЛП	7-9	зерн	сс	7-9	7-8	7-9	7-9	7	слн
Ліона	® 01007019	2005	378 /	СЛ	8-9	зерн	ср	6-7	8	8	8	8	слн
Ларс	® 00007020	2005	926 / 926	П	7-8	зерн	сс	6	7	8-9	9	8-9	цін
Лугастар	® 05007017	2008	1121 /	С	8-9	зерн	ср	8-9	7-8	9	8-9	7-8	слн
Ласуня	02007009	2007	355 /	СЛ	5-7	зерн	сс	7-9	7-8	9	8-9	7	слн
Лист 25	® 03007023	2007	1059 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7	цін
Литанівка	® 05007009	2008	378 /	С	7-8	зерн	ср	8-9	8	8-9	9	7-9	слн
Лісова пісня	® 05007035	2008	335 /	ЛП	8	зерн	сс	8	8	8	8	8	слн
Миронівська 66	® 95007006	2000	341 / 341	П	7	зерн	сс	6	5	5	7-9	5	цін
Миронівська 65	® 95007005	2000	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс	6-7	5	5	7-9	5	цін
Миронівська ранньостигла	® 98007012	2002	341 / 341	ЛП	5	зерн	рс	6	5	5	7-9	5	цін
Миронівська 67	98007003	2002	341 / 341	П	9	зерн	сс	6	5	5	7-9	5	цін
Мирхад	® 95007004	2000	341 / 341	П	7	зерн	сс	5	5	7	7-9	7-9	ф
Миронівська 61	86007024	1989	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	цін
Мирлена	® 06007020	2009	341 /	ЛП	7-8	зерн	сс	7-8	7-8	8	8-9	7-8	слн
Мадярка	® 05007023	2008	341 /	П	7-8	зерн	сс	5-6	8	9	9	7-8	слн
Миронівська сторічна	® 06007023	2009	341 /	ЛП	8	зерн	сс	7-8	8	8	8-9	7-8	цін
Монотип	® 05007024	2008	341 /	ЛП	8-9	зерн	сс	7-8	8	8-9	8-9	8	цін
Місія одеська	® 06007009	2009	378 /	СЛП	8-9	зерн	ср	7-8	8	7-8	8-9	7-8	слн
Нота	05007046	2008	25 /	С	8-9	зерн	ср	8	8	8-9	9	8	слн
Наталка	® 06007018	2009	355 /	СЛП	8	зерн	ср	8-9	8	8	8-9	7-8	слн
НС 100/01	® 05007038	2008	879 /	Л	8	зерн	ср	7-8	8	8,5	8,5	8	слн
Нела	94007001	1998	946 /	П	9	зерн	сп	5	5	7-9	7-9	5	цін
Новокиївська	® 06007016	2009	355 /	СЛП	8-9	зерн	ср	8	8	8	8-9	7-8	слн
Ніконія	® 95007003	2000	378 / 378	С	9	зерн	ср	6-7	7-9	7-9	7-9	5	слн
НС 40 С/00	® 05007039	2008	879 /	П	7-8	зерн	сс	6-7	8	8	8	8	цін
Національна	® 01007016	2005	350 /	ЛП	7	зерн	сс	8-9	8	8-9	8	8	цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Нива Київщини	® 07007017	2010	355/	СЛП	8-9	зерн	сс	8-9	8,5	8	8-9		слн
НС 124/01	® 05007041	2008	879/	С	7-8	зерн	ср	8	7-8	8-9	8-9	8	слн
Одеська 267	93007033	1997	378/378	СЛ	9	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	слн
Олеся	® 97007009	2001	1097/335, 1097	ЛП	9	зерн	ср	6-7	7-9	7-9	5	5	цін
Овідій	® 05007067	2009	411/	СЛП	8-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7-8	слн
Оградська	05007051	2008	25/	С	8	зерн	ср	8	8	9	9	8	цін
Олексіївка	® 04007020	2008	315/	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7-8	слн
Отаман	® 05007013	2008	922/	С	8	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	8	слн
Оксана	01007013	2007	378/	С	5-7	зерн	ср	5-7	8	8-9	9	7	цін
Повага	® 99007008	2003	378/	СЛП	9	зерн	ср	6-7	8	8	9	7-8	слн
Пивна	® 03007019	2006	355/	ЛП	8-9	зерн	сс	7-8	7-8	8-9	8-9	7-9	ф
Пам'яті Ремесла	® 06007022	2009	341/	ЛП	8	зерн	сс	7-8	8	8	8-9	7-8	слн
Польовик	® 06007008	2009	378/	С	8	зерн	ср	7-8	8	8	8-9	7-8	слн
Писанка	® 01007011	2006	378/	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8-9	7-8	8-9	7-9	слн
Перлина лісостепу	® 98007013	2001	335/1097, 335	ЛП	9	зерн	сс	7	5	5	7-9	5	цін
Палма	96007015	2002	720/1112	ЛП	9	зерн	сп	5	5	7-9	7-9	7-9	цін
Подолянка	® 00007009	2003	355/341	СЛП	9	зерн	ср	7-8	7-8	7-8	7-9	7	слн,зрош
Поліська 90	90007028	1994	345/345	ЛП	5	зерн	сс	7	5	5	7-9	5	цін
Поверна	® 07007027	2010	404/	П	8	зерн	сс	8-9	6-7	8	9		цін
Почаївка	® 06007017	2009	355/	СЛП	7	зерн	рс	7-8	8	7-8	8	7-8	слн
Повелія	® 06007028	2009	376/	ЛП	7-8	зерн	ср	7-8	8	7	8	7-8	слн
Попелюшка	® 03007004	2007	315/	СЛ	7-9	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7	слн
Почесна (Престиж)	03007038	2007	209/1112	СЛ	7	зерн	ср	7-9	8-9	8-9	8-9	7	слн
Побєда 50	97007024	2005	25/1112	СЛ	7	зерн	ср	6-7	8	7-8	9	7	слн
Пам'ять	04007046	2008	25/	Л	8	зерн	ср	8	7-8	8-9	8-9	7-8	слн
Переяславка	01007014	2004	355/341	СЛП	7-9	зерн	ср	7-8	7	7-9	9	7-9	слн
Подяка	® 04007017	2008	378/	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8-8,5	8-9	8	7-8	слн
ПАЛПИЧ	04007044	2008	25/	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	9	8-9	7-8	слн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Пошана	® 00007018	2004	378 / 378	С	7-9	зерн	ср	5	7-9	7	7-9	7	слн
Паляниця	® 04007035	2008	1059 /	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	9	8-9	7-8	цін
Русія	® 05007042	2008	879 /	С	8-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7-8	слн
Рогнеда	® 05007040	2008	879 /	СП	7-8	зерн	ср	7-8	7-8	8-9	9	7-8	слн
Романтика	® 06007038	2009	335 /	ЛП	7-8	зерн	ср	7-8	8	8	8-9	7-8	слн
Ренан	92007049	2006	1155 /	Л	7	зерн	сс	5-7	7	9	8-9	8-9	слн
Розкішна	05007065	2009	404 /	СЛП	8	зерн	ср	8	8	7-8	8-9	7-8	слн
Ремеслівна	® 00007007	2004	341 / 341	СЛП	7-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	9	7-8	слн
Росинка тарасівська	03007036	2007	209 / 1112	С	7-8	зерн	ср	7-8	8	7-8	8-9	7	слн
Росинка	® 02007040	2007	412 /	С	7-8	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7	слн
Сніжана	00007003	2004	341 / 341	ЛП	5	зерн	сс	7-9	5	7-9	7-9	7	ф
Смуглянка	01007015	2004	355 / 341	СЛП	9	зерн	ср	6	7-9	9	7-9	7-9	слн
Селянка	® 97007008	2001	378 / 378	С	9	зерн	ср	5-6	7-9	5	7-9	5	слн
Супутниця	® 02007019	2006	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	8-9	8-9	8-9	7-9	слн
Сирена одеська	® 97007006	2002	378 / 378	С	7	зерн	ср	6-7	7-9	5	7-9	5	слн
Саскія	98007017	2002	946 /	ЛП	9	зерн	сп	5	5	7-9	7-9	7-9	цін
Солоха	® 06007014	2009	355 /	СЛП	8-9	зерн	рс	7-8	8	8	8-9	7-8	слн
Служниця одеська	® 06007010	2009	378 /	СЛП	8	зерн	ср	7-8	8	7-8	8-9	7-8	слн
Світанок 1	® 02007001	2006	1124 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	7-9	8-9	8-9	7-9	слн
Скарбниця	® 04007003	2007	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	8	7-8	8-9	8-9	7	слн
Сагайдак	07007011	2010	386 /	ЛП	8	зерн	сс	8-9	8	8	8-9		слн
Самурай	® 07007029	2010	807 /	ЛП	8-9		сс	7-8	8	9	8-9		ф
СО 207	06007046	2011	485 /	СЛП	8	зерн	сс	7-8	8	8-9	8-9		цін
Снігурка	® 04007012	2007	355 /	СЛ	8-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	7	слн
Сонечко	® 06007015	2009	355 /	СЛП	8-9	зерн	ср	7-8	8	8	8-9	7-8	слн
Станична	01007033	2005	212 / 1112	С	7	зерн	рс	7	8	8	8	8	слн
Северодонецька ювілейна	05007063	2008	217 /	С	7-8	зерн	ср	8	8	8-9	9	8	слн
Скаген	® 06007039	2010	926 /	ЛП	8-9	зерн	сс	8	8,4	8,6	8,6		цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Столична	01007003	2005	345 / 345	ЛП	7-9	зерн	сс	7-8	7	7-8	8	8-9	цін
Славна	® 07007019	2010	355 /	СЛП	9	зерн	ср	8-9	8	8-9	9		слн
Станіслава	04007019	2008	1121 /	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	8-9	8-8,5	7-8	слн
Співанка	00007019	2005	312 /	С	7-9	зерн	ср	5-6	8	8	8	7-8	слн
Торрілд	® 05007031	2008	926 /	ЛП	8	зерн	сс	7-8	8	9	8,5	8	цін
Тронка	® 00007032	2005	1124 / 1159, 659	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	8	8-9	8	8	слн
Гурунчук	® 05007010	2008	378 /	С	7-8	зерн	ср	8-9	8	9	9	7-8	слн
Тітона	® 05007006	2008	1124 /	СЛП	8-9	зерн	ср	8	8	8	8-9	7-8	слн
Українка одеська	92007002	1995	378 / 378	СЛП	7	зерн	ср	7	7-9	5	7-9	5	цін
Ужинок	® 07007013	2010	378 /	СЛП	8	зерн	ср	8-9	8	8	8-9		слн
Фантазія одеська	92007056	1996	378 / 376, 378	С	9	зерн	ср	6-7	7-9	7-9	7-9	5	слн
Фарандоль	02007027	2006	1155 /	ЛП	7-9	зерн	сс	>5	7	9	8-9	8-9	цін
Фаворитка	02007010	2005	355 /	ЛП	8	зерн	сс	7	7	8-9	8-9	8-9	цін
ФТ Вандер	® 07007021	2010	749 /	П	8	зерн	сс	8	8	8	8		ф
Фішт	02007028	2007	25 / 1112	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7	слп
Херсонська безоста	97007005	2002	411 /	СЛП	9	зерн	ср	7	5	7-9	7-9	5	цін,зрош
Харус	® 99007004	2002	404 / 404	СЛ	9	зерн	сс	7-8	7	7-9	7-9	7-8	цін
Харківська 105	96007010	2001	404 / 404	Л	7	зерн	сс	7	5	<5	7-9	5	ф
Херсонська 99	99007011	2005	411 /	С	7	зерн	ср	7	8	8	8-9	7-8	цін, зрош
Хазарка	® 05007015	2008	355 /	СЛП	8	зерн	ср	8	7-8	8-9	8-9	8	слн
Хоревиця	® 07007016	2010	355 /	СЛП	8	зерн	ср	8	8-9	8-9	8-9		слн
Хуртовина	® 04007011	2007	355 /	СЛ	8-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	7	слн
Циганка	94007005	1998	355 /	ЛП	7	зерн	пс	<5	5	5	7-9	7-9	цін
Царівна	® 05007036	2008	335 /	ЛП	8	зерн	ср	8,5-9	8	8-9	8	7-8	слн
Чорнява	® 07007020	2010	355 /	СЛП	8	зерн	ср	8-9	8,5	8,5	8-9		слн
Шестопалівка	® 03007001	2007	1124 / 1159	СЛ	8-9	зерн	рс	8	8	8-9	8-9	7	слн
Юнона	® 07007040	2010	25 /	СЛП	8	зерн	ср	8	8	8-9	8-9		слн
Ювіляр Миронівський	® 06007021	2009	341 /	ЛП	8	зерн	сс	8	8	8	8-9	7-8	цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Ювілейна 100	04007045	2008	25/	СЛ	8-9	зерн	рс	8	8	9	8	7-8	слн
Ятрань 60	97007010	2000	355/	СЛП	9	зерн	сс	6-7	7-9	7-9	7-9	5	слн
Ясочка	01007039	2006	335/	Л	8	зерн	сс	7-8	7-8	8-9	8-9	7-9	цін
Ясногірка	® 05007014	2009	355/	СЛП	8	зерн	ср	7-8	8	7-8	8-9	7-8	слн
Яворина	® 07007018	2010	355/	СЛП	8	зерн	рс	8	8	8-9	8-9		цін
Ярославна	® 07007033	2010	1123/	СЛ	8	зерн	ср	8	8	8	8-9		слн
Пшениця м'яка яра			-	36									
Ажурная	® 03007028	2006	920/	ЛП	6	зерн	сс	-	7	8	8-9	7-9	слн
Аншлаг	® 06007047	2010	856/	СЛ	7	зерн	сс	-	7-8	8-9	8-9	7-8	цін
Аранка	® 04007027	2007	888/	СЛП	7-9	зерн	сс	-	7-8	8-9	8	7	слн
Венера	03007013	2005	879 / 879	Л	7	зерн	ср	-	7	9	8	8	цін
Гренні	05007056	2009	1034/	П	7-8	зерн	сс	-	8	9	9	8	цын
Гвадалуп	08007020	2009	796/	Л	7-8	зерн	сс	-	7-8	8-9	8-9	7-8	цін
Героїня	® 02007036	2005	404 / 404	С	5-7	зерн	сс	-	7	9	8	7-8	слн
Елегія миронівська	® 00007023	2004	341 / 341	ЛП	7-9	зерн	сс		7	7	7-9	7	слн
Етос	® 07007053	2010	926/	П	7-8	зерн	сс	-	7-8	8-9	9		цін
Етюд	® 03007029	2006	341/	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8	8-9	8-9	7-9	цін
Євдокія	® 04007043	2008	404/	Л	7-8	зерн	ср	-	8	6	8	7-8	слн
Колективна 3	® 96007002	2000	341 / 341	Л	7	зерн	сс		5	7-9	7-9	7	цін
Краса Полісся	® 00007022	2003	430 / 1112, 430	П	7	зерн	сс		5	7-9	7-9	7	цін
Кокса	06007013	2009	694/	Л	8-9	зерн	сс	-	8	8-9	8,5	8	цын
Недра	® 03007034	2007	345/	ЛП	7-8	зерн	сс	-	7-8	8	8-9	7	цін
Наташа	® 07007056	2009	879/	СЛ	8	зерн	ср	-	7-8	8-9	8-9	7-8	цін
Печерянка	00007025	2004	305/	Л	5	зерн	сс	-	7	7	7-9	7	цін
ПХРСВ - 02	06007003	2008	687/	ЛП	6-7	зерн	рс	-	8	7-8	8	7-8	слн
ПХРСВ - 03	® 06007004	2008	686/	Л	6-7	зерн	рс	-	8	9	8	7-8	слн
Рассвет	® 06007043	2009	447/	СЛП	7-8	зерн	сс	-	7-8	8-9	8-9	7	слн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Рання 93	93007063	1996	345 / 345	ЛП	7	зерн	ср		5	7	7-9	7	цін
Срібнянка	® 03007031	2006	1112 / 1112	Л	7-8	зерн	сс	-	7-8	8-9	8-9	7-9	ф
Скороспілка 99	® 99007010	2003	345 / 345	ЛП	7	зерн	рс		5	7	7-9	7	цін
Сюїта	® 04007047	2007	341 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8-9	6-8	8-9	7	слн
Струна миронівська	® 05007057	2008	341 /	ЛП	8-9	зерн	ср	-	8,5	8,5-9	8-9	7-8	цін
СН Рублі	® 08007002	2009	807 /	ЛП	8	зерн	сс	-	7-8	8-9	9	7-8	цін
Стависька	® 04007042	2007	350 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8	7-8	8-9	7	цін
Трізо	® 01007036	2004	807 /	ЛП	7-9	зерн	сс	-	7	7-9	7-9	7-9	цін
Тазос	® 07007054	2010	926 /	Л	7-8	зерн	сс	-	7	8-9	8		цін
Тюбалт	® 06007005	2008	926 /	СЛП	8-9	зерн	ср	-	8,5-9	8,5-9	8,5-9	7-8	цін
Торчинська	® 04007053	2008	500 /	ЛП	8-9	зерн	ср	-	8-9	8-8,5	8,5-9	7-8	цін
Харківська 26	96007019	2000	404 / 404	СЛ	7	зерн	сс		5	7-9	7-9	7	цін
Харківська 30	® 99007009	2003	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7-9	5	7-9	7	цін
Хофман	06007024	2008	749 /	П	7-8	зерн	сс	-	8,5	7-8	9	7-8	ф
Ясна	® 04007001	2005	279 /	ЛП	7-9	зерн	сс		7	9	8	8-9	ф
Яргора	07007052	2010	350 /	П	7-8	зерн	сс		8	8	8-9		слн
Пшениця тверда озима			- 16										
Аргонавт	® 98008001	2002	378 /	С	7	зерн	ср	<5	5	5	7-9	5	х
Алий парус	89008001	1994	378 / 378	С	9	зерн	ср	5	5	5	7-9	5	х
Айсберг одеський	85008001	1990	378 / 378	С	7	зерн	ср	5	7	5	7-9	5	х
Бурштин	® 03008001	2007	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	5	8	8-9	8-9	7	х
Гардемарин	® 02008001	2006	378 /	СЛ	7	зерн	ср	5	8	8-9	9	7-9	х
Дніпряна	94008002	2000	411 /	СЛ	9	зерн	ср	5	5	5	7-9	5	х
Дельфін	® 94008006	2000	378 / 378	С	7	зерн	ср	<5	5	5	7-9	5	х
Золоте руно	® 00008001	2004	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	5	7	8-9	8-9	7	х
Кассіопея	® 04008002	2008	1123 /	СЛ	8	зерн	ср	5	8	8,5	9	7-8	х
Континент	® 05008001	2008	378 /	СЛ	8	зерн	ср	5	8	8-9	8-9	7-8	х

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Крейсер	® 07008003	2010	378 /	СЛ	8	зерн	ср	7	8	7-8	9		х
Лінкор	® 07008001	2010	378 /	СЛ	8	зерн	ср	7	8	7	9		х
Лагуна	® 01008001	2005	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	4-5	7	7-8	8	8	х
Перлина одеська	® 99008001	2002	378 /	С	9	зерн	ср	5	7-9	7-9	7-9	5	х
Таврида	® 06008002	2009	378 /	СЛ	8	зерн	ср	5	8	8-9	8-9	7-8	х
Харківська 32	92008005	1997	404 / 404		7	зерн	сс	>5	5	5	7-9	5	х
Пшениця тверда яра			-	13									
Букурія	® 00008004	2004	430 / 1112, 430	П	5	зерн	ср		5	7-9	7-9	7	х
Дарина	01008006	2004	309 /	Л	7	зерн	ср		7-9	7	7-9	7	х
Жізель	® 05008006	2008	341 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8,5-9	7-8	8-9	7-8	х
Ізольда	® 00008003	2004	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс		7	7	7-9	7	х
Кучумовка	® 04008001	2007	404 /	СЛ	7-8	зерн	ср	-	8-9	8	8-9	7	х
Метиска	07008002	2010	350 /	СЛ	7-8	зерн	ср		7	8-9	8-9		х
Нащадок	® 05008007	2008	404 /	СЛП	7-8	зерн	сс	-	7-8,5	7-8,5	8-9	7-8	х
Славута	® 05008005	2009	350 /	СЛ	8	зерн	сс	-	7	8-9	8-9	8	харч
Спадщина	® 03008003	2006	404 /	С Л	5-7	зерн	сс		8	7-8	8-9	7-9	х
Харківська 41	® 99008002	2003	404 / 404	Л	7	зерн	сс		7-9	7	7-9	7	х
Харківська 39	® 98008002	2002	404 / 404	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	7	х
Харківська 27	94008005	1999	404 / 404	СЛ	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7	х
Чадо	® 00008002	2004	404 / 404	Л	7	зерн	сс		7	7	7-9	7	х
Жито озиме			-	32									
Аскарі	07003005	2010	926 /	ЛП	9	зерно	сс	9	8	7	8	9	
Боротьба	87003001	1993	429 /	СЛП	7	зерн	сс	7	7	5	5	5	зерн
Богуславка	91003010	1995	430 /	СЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Верасень	84003010	1989	447 /	ЛП	7	зерн	пс	7	5	5	7	5	зерн
Велитень	01003002	2005	422 /	ЛП	7	зерн	сс	8	7	7	7,5	7	зерн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Воля	91003008	1996	430 /	П	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Древлянське	93003005	1997	808 /	ЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Дозор	® 00003001	2005	430 / 430	ЛП	7	зерн	сс	7	7	8	7	8	зерн
Забава	07003004	2010	430 /	ЛП	9	зерно	сс	9	8	8	8	9	
Ірина	® 01003001	2004	307 /	ЛП	8	зерно	сс	8	8	7	8	8	зерно
Інтенсивне 95	95003005	1999	345 / 345	П	7	зерн	сс	7	7	5	7	5	зерн
Інтенсивне 99	® 99003002	2002	345 / 345	ЛП	7	зерн	сс	7	5	7	5	5	зерн
Клич	00003002	2003	320 /	П	7	зерн	сс	7	7	5	7	5	зерн
Купалинка	04003004	2008	447 /	СЛ	7	зерн	сс	8	6	7	7	8	зерн
Матадор	® 01003004	2004	926 / 926	ЛП	8	зерно	сс	7	8	7	8	7	зерн
Пікассо	® 05003005	2009	824 /	ЛП	9	зерн	сс	9	9	6	8	8	зерн
Паллада	® 91003009	1996	307 / 307	ЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Первісток F1	® 00003003	2003	404 /	ЛП	9	зерн	сс	7	7	7	7	5	зерн
Пуховчанка	80003005	1987	447 /	ЛП	7	зерн	сс	7	5	5	5	5	зерн
Полікросне	99003003	2003	422 /	П	9	зерн	сс	7	7	7	7	7	зерн
Полі 2	01003003	2005	422 /	ЛП	7	зерно	ср	7,5	7,5	7	7	7,5	зерн
Пам`ять Худоєрка	® 07003002	2010	404 /	ЛП	9	зерно	сс	9	8	8	8	9	
Радомирське	07003003	2010	319 /	ЛП	9	зерно	сс	9	8	8	8	9	
Синтетик 38	® 03003003	2006	430 /	СЛП	8	зерн	сс	8	7	7	7	7	зерн
Слобожанець F1	® 05003002	2008	404 /	СЛ	7-6	зерн	сс	8	8	7	8	8	зерн
Сіверське	® 03003001	2007	345 /	СЛП	5	зерн	сс	8	7	5	5	7	зерн
Фестус	07003006	2010	926 /	ЛП	9	зерно	сс	9	8	8	8	9	
Харківське 98	94003004	1999	404 / 404	СЛП	7	зерн	сс	7	7	5	7	5	зерн
Хасто	® 99003001	2002	404 / 404	Л	9	зерн	сс	7	7	7	7	5	зерн
Хамарка	® 04003001	2007	404 / 1112	С	7	зерн	ср	7	7	7	7	7	зерн
Хлібне	® 03003002	2007	430 /	СЛП	7	зерн	сс	7	7	7	7	7	зерн
Юр'ївець	® 04003002	2007	404 / 404	СП	7	зерн	сс	7	7	6	7	5	зерн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Тритикале озиме			- 28										
Амфідиплоїд 256	98011004	2001	404 / 404	СЛП	9	зерн	сс	7	7-9	7-9	7-9	7-9	зерн
АДМ 11	95011014	2000	341 / 341	Л	9	зерн	сс	>5	5	7-9	7-9	7-9	зерн
Аякс	® 05011002	2008	920 /	Л	7	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7-9	зерн
Амфідиплоїд 44	89011009	1993	404 / 404	СЛП	8	корм	сп	7	7	7	7	6	вклiт
АДМ 8	93011006	1998	341 / 341	П	7	зерн	сс	5	5	5	7-9	7-9	зерн
Амфідиплоїд 52	95011010	2000	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс	7	5	5	7-9	7-9	зерн
Амур	® 07011006	2010	341 /	СЛП	9	зерно	сс	9	9	9	8	9	
Атлет	® 07011005	2010	920 /	СЛП	9	зерно	сс	9	9	9	9	9	
Алкід	02011002	2006	736 /	СЛП	7-8	зерн	сс	8-9	8-9	7-8	8-9	8-9	зерн
Валентин 90	04011008	2008	25 /	ЛП	8	зерн	ср	8,5-9	8	8-8,5	8-9	8-9	зерн
Гарне	® 01011008	2004	404 / 404	ЛП	7-9	зерн	сс	9	7	9	9	7-9	зерн
Дон	05011011	2008	217 /	СЛП	7	зерн	ср	8-9	7-8	8-9	8-9	7-9	зерн
Інтерес	® 04011001	2008	1121 /	СЛП	8	зерн	ср	8,5-9	8-8,5	8,8,5	8-9	8-9	зерн
Київське раннє	95011007	1998	355 /	ЛП	7	зерн	рс	5	5	7-9	7-9	7-9	зерн
Кологрів	05011009	2008	217 /	Л	7-8	зерн	ср	8	8	8-9	9	7-9	зерн
Кентавр	05011010	2008	217 /	СЛП	7	зерн	ср	8-9	7-8	8-9	8-9	7-9	зерн
Ладне	® 99011004	2002	404 / 404	ЛП	9	зерн	сс	>5	7-9	7-9	7-9	7-9	зерн
Мудрець	02011006	2007	25 / 1112	Л	7-8	зерн	ср	8-9	8-9	8-9	8-9	8	зерн
Поліський 7	98011003	2002	345 / 345	Л	9	зерн	сс	>5	5	5	7-9	7-9	зерн
Прорив	02011005	2006	25 / 1112	СЛ	7-8	зерн	ср	8-9	8-9	8-9	8-9	7-9	зерн
Папсуєвська	® 03011003	2005	376 /	СЛП	7-9	корм,зерн	сс	7-9	7-9	7-9	9	7-9	бiл, вклiт,зерн
Пурпурний	® 04011010	2008	500 /	ЛП	7-8	зерн	сс	8	8,5	7,5-8	9	8-9	зерн
Паво	06011002	2009	694 /	ЛП	8-9	зерн	сс	8-9	7-8	9	8-9	9	зерн
Раритет	® 04011004	2008	404 /	ЛП	8	зерн	ср	8	8-8,5	7,5-8	8-9	8-9	зерн
Ратне	® 03011002	2007	404 /	СЛП	8-9	зерн	сс	9	8	7-8	8-9	8	зерн
Славетне	01011002	2003	430 /	ЛП	7	зерн	сс	7-9	7	7	7-9	7-9	зерн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Союз	02011004	2006	25 / 1112	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	8-9	8-9	8-9	7-9	зерн
Тритикале яре			-	**15**									
Арсенал	99011005	2002	920 /	П	7	зерн	сс		7	7-9	7	7-9	зерн
Аіст харківський	91011001	1995	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7	7	7	9	зерн
Вікторія	00011004	2003	430 /	П	7	зерн	сс		7	7	7	7-9	зерн
Всеволод ®	06011004	2009	350 /	ЛП	7	зерн	ср		8	8-9	8-9	9	зерн
Вересоч ®	05011006	2008	350 /	П	7	зерн	сс	-	8,5	7-8	8-9	8-9	зерн
Жайворонок харківський ®	98011005	2002	404 / 404	Л	7	зерн	рс		7	7	7	7-9	зерн
Кобзар ®	03011005	2007	1159 /	ЛП	7	зерн	сс	-	8	8-9	8-9	7	зерн
Коровай харківський ®	04011006	2007	404 /	СЛП	7-8	зерн	сс	-	8-9	8-9	8-9	7	зерн
Лосинівське ®	04011005	2007	350 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8	8-9	8-9	7	зерн
Легінь харківський ®	04011007	2008	404 /	П	7-8	зерн	сс	-	8,5	7-8	8-9	8-9	зерн
Микола ®	02011007	2006	1112 /	С	6	зерн	сс	-	7	9	9	7-9	зерн
Оберіг харківський ®	05011008	2009	404 /	ЛП	7	зерн	ср		7-8	7-8	8-9	9	зерн
Соловєй Харківський ®	03011006	2006	404 /	СЛП	7-8	зерн	сс	-	8-9	8-9	8-9	7-9	зерн
Хлібодар харківський ®	00011005	2003	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7	7	7	7-9	зерн
Харків АВІАС ®	06011003	2009	404 /	ЛП	7	зерн	ср		7-8	8-9	8-9	9	зерн
Овес посівний			-	**24**									
Абель	96005003	2000	946 /	П	5-7	зерн	ср		5-7	7-9	5-7	5-7	голоз
Ант	02005001	2006	371 /	П	7	зерн	сс		7-9	7-9	9	5-7	цін
Аркан	03005001	2007	371 /	Л	7-8	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Бусол ®	06005002	2010	340 /	С	7-8	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	7-9	фж
Дарунок	07005001	2010	422 /	СЛП	5 -7	зерн	сс		6-8	5 -7	7 -9	5-7	фж
Декамерон	03005002	2007	422 /	ЛП	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Закат	06005003	2009	430 /	СЛП	7-8	зерн	сс		7-8	5-7	5-7	7-9	фж
Зірковий ®	04005005	2008	430 /	П	7-8	зерн	сс		6-8	6-8	5-7	5-7	фж

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Марафон	08005001	2010	447 /	СЛП	5 -7	зерн	сс		5 -7	5 -7	5 -8	7 -9	голоз
Нептун	01005003	2005	430 /	П	7-9	зерно	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Парламентський	® 05005001	2009	429 /	ЛП	7 -8	фж	ср		5 -7	5 -7	5 -7	7 -9	зерн
Ранньостиглий	96005001	2000	950 /	П	7	зерн	рс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Спурт	® 06005001	2009	340 /	СЛП	7-8	зерн	сс		7-9	5-7	5-9	7-9	фж
Скарб України	07005003	2010	430 /	СЛП	5 -7	зерн	сс		6 -8	5-7	6 -8	5 -7	голоз.
Самуель	® 04005001	2007	1174 /	Л	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	голоз
Саломон	® 04005002	2007	1174 /	Л	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	голоз
Саргон	® 04005003	2007	376 /	Л	7-8	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Чернігівський 27	86005014	1990	429 /	СП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Чернігівський 28	92005014	1996	429 /	СЛП	7-9	корм	сс		7	7	7	>5	скліт
Шервуд	07005002	2010	749 /	СЛП	5 -7	зерн	сс		5 -7	5 -7	6 - 8	7 -9	фж
Славутич	95005002	2000	950 /	П	7	зерн	ср		5	5-7	5-7	5-7	фж
Деснянський	95005001	1998	430 /	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Райдужний	98005002	2001	430 /	П	5-7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Синельниківський 1321	91005009	1994	311 /	ПЛ	5	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	цін
Ячмінь звичайний озимий			- 41										
Аборигєн	® 02012011	2007	378 /	С	7	зерн	ср	7	7	8	8	8	зерн
Актіон	06012012	2009	983 /	СЛП	9	зерн	ср	7	8	8	8	7	зерн
Буран	88012003	1993	358 /	СЛП	7	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Борисфен	® 02012015	2006	341 /	ЛП	8	зерн	рс	7	7	7	7	8	зерн
Восход	98012016	2002	358 /	СЛП	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	зерн
Вінтмальт	® 06012013	2009	824 /	ЛП	8	зерн	сс	8	8	9	8	8	зерн
Дністер	01012002	2002	371 /	СЛП	9	корм	рс	7	8	7	8	8	вклі
Добриня 3	01012005	2005	25 / 1112	СЛП	7	зерн	сс	7	8	7	8	8	зерн
Достойний	® 02012002	2006	378 /	СЛ	7	зерн	рс	7	8	7	8	8	зерн
Екзистенс	06012011	2009	983 /	ЛП	7	зерн	сс	7	8	7	8	6	зерн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Жерар	® 06012026	2010	341 /	СЛП	9	зерн	сс	8	8	8	8	8-9	зерн
Зимовий	® 00012006	2005	378 /	СЛП	7	зерн	сс	7	8	7-8	8	8	зерн
Зубен	05012014	2009	341 /	ЛП	8	зерн	сс	6	7	7	8	7	зерн
Кормовий	93012019	1997	371 /	СП	8	корм	сс	7	7	7	7	7	скліт
Ковчег	® 03012001	2007	341 /	С	7	зерн	ср	5	7	7	7	7	зерн
Кондрат	® 07012009	2010	25 /	СЛП	9	зерн	сс	8	9	9	9	9	зерн
Луран	97012009	2000	946 /	СЛП	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	зирн
Метелиця	® 00012004	2003	378 /	СЛ	7	зерн	ср	5	7	7	7	5	зерн
Михайло	97012019	2001	25 / 1112	СЛП	7	зерн	ср	5	7	7	7	5	зерн
Майбріт	® 06012014	2009	926 /	СЛП	9	зерн	сс	7	8	7	7	8	зерн
Мастер Зерноградa	05012022	2008	212 /	СЛП	8	зерн	ср	7	8	6	8	6	зерн
Миронівський 87	92012018	1995	341 / 341	СЛП	7	зерн	сс	5	7	5	7	5	зерн
Морозко	04012023	2007	25 / 1112	С	7	зерн	ср	5	8	8	7	7	зерн
Наомі	07012015	2011	926 /	СЛП	8	зерн	ср	7	8-9	8-9	8-9	7	зерн
Онега	93012027	1999	358 /	Л	7	зерн	сс	5	7	5	5	5	зерн
Огоньковський	00012003	2003	358 /	СЛ	7	зерн	ср	5	7	5	5	5	зерн
Основа	90012008	1994	378 / 378	С	7	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Паллідум 77	® 94012018	1999	341 / 341	П	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	зерн
Переможець	® 07012008	2010	1059 /	СЛП	8	зерн	сс	8	9	8	9	9	зерн
Платон	® 07012010	2010	25 /	СЛП	9	зерн	сс	8	9	8	9	9	зерн
Росава	83012006	1988	378 / 378	СЛП	7	зерн	сс	5	7	5	5	5	зерн
Селена стар	® 02012013	2006	922 /	СЛП	8	зерн	рс	7	7	7	5	7	зерн
Сейм	® 04012019	2008	341 /	СП	8	зерн	ср	7	7	8	8	8	зерн
Сіндерелла	® 05012005	2008	807 /	СЛП	7	зерн	ср	7	7	7	8	6	зерн
Скарпія	07012007	2011	926 /	СЛП	8	зерн	рс	7	8-9	8	8-9	7	зерн
Тутанхамон	® 04012016	2008	341 /	СЛ	8	зерн	ср	7	8	7	8	6	зерн
Тамань	91012006	1995	378 / 378	СЛ	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Трудівник	® 02012001	2006	378 /	СЛП	8	зерн	сс	7	8	7	7	8	зерн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Фантаст	04012024	2007	25 / 1112	С	5	зерн	ср	5	5	7	7	5	зерн
Хайлайт	® 07012005	2010	807 /	СЛП	9	зерн	сс	9	8-9	8	8	8-9	зерн
Широколистий	82012028	1987	371 /	СП	7	корм	сс	7	6	6	7	6	скліт
Ячмінь звичайний ярий			- 111										
Адапт	94012008	1998	378 / 378	С	5-7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5	фж
Аскольд	97012020	2001	341 / 341	П	5-7	зерн	сс		5	5-7	5-7	5-7	пв
Аннабель	® 01012018	2004	926 / 926	П	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Аспект	® 03012011	2007	404 /	ЛП	5-7	зерн	сп		5-7	5-7	5-8	5-8	пв
Азалеа	07012032	2009	1048 /	СЛП	7-8	зерн	сс		8	7-9	8	5-8	пв
Авгій	® 04012020	2008	341 /	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	7	7	5-7	пв
Антігон	® 08012003	2009	989 /	СЛП	7-8	зерн	сс		7-8	8	8	7-8	фж
Бадьорий	96012004	1999	404 / 404	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	пв
Беатрікс	® 06012002	2009	926 /	ЛП	7 -9	зерн	сс		7 -8	7 -8	7 -9	7 -8	пв
Баланс	06012005	2008	749 /	ЛП	7-8	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Белана	07012027	2009	926 /	СЛП	7-8	зерн	сс		7-8	7-8	7-8	7-8	пв
Брюссфілд	06012006	2008	749 /	П	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Бойос	® 05012026	2009	1390 /	П	7 - 8	зерн	сп		7 -9	7 -9	7 -9	7 -9	пв
Варіант	® 00012013	2004	430 / 430	П	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Вакула	® 00012005	2003	378 /	СЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Всесвіт	® 06012016	2009	378 /	СЛП	7-8	зерн	сс		8	7-8	8	8	пв
Вінницький 28	00012016	2004	306 / 791	П	7	зерн	ср		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Водограй	® 02012012	2005	378 / 378	ЛП	9	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Віват	® 04012006	2007	1112 / 1112	П	7-8	зерн	пв		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Виклик	® 04012018	2008	404 /	ЛП	5-7	зерн	ср		5-7	7	7	5-7	пв
Візрець	® 05012019	2009	404 /	ЛП	7 - 8	зерн	сс		7 -9	7	7 - 9	8	фж
Гося	® 05012021	2009	430 /	ЛП	7 -8	зерн	сс		7 -8	7 -8	7 -8	7 -8	пв
Гетьман	® 98012020	2001	378 / 378	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Галактик	® 94012015	1999	378 / 378	СЛП	5-7	зерн	сс		7-9	7-9	5-7	5-7	пв
Геліос	® 03012008	2006	922 /	СЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	9	5-7	пв
Дніпровський 257	94012013	1998	311 /	Л	5	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	фж
Донецький 12	96012001	1999	315 /	СЛ	5	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Доказ	® 06012018	2009	404 /	СЛП	5-7	зерн	сп		7-8	8	7-8	7-8	фж
Докучаєвський 15	98012023	2003	405 /	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	пв
Донецький 15	98012017	2002	315 /	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	5-7	5	цін
Джерело	96012003	1999	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5-7	пв
Донецький 14	97012003	2000	315 /	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5	цін
Данута	® 00012017	2003	926 / 926	СЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Джерзей	® 96012013	2000	934 / 740	СЛП	7-9	зерн	сп		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Джей Бі Мальтазія	06012029	2010	1149 /	СЛП	7-8	зерн	сс		7-8	7-8	7-8	7-8	пв
Ефект	® 98012006	2002	404 / 404	П	5-7	зерн	сп		5	5-7	5-7	5	пв
Етикет	® 02012008	2006	404 / 404	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	7	пв
Еней	® 05012011	2008	378 /	СЛП	5-7	зерн	ср		7-9	7-9	9	5-7	пв
Ібсон	® 04012008	2008	946 /	ЛП	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Жозефін	® 03012006	2006	1048 /	ЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Звершення	94012010	1997	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	пв
Зоряний	® 97012004	2000	378 / 378	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	пв
Здобуток	® 03012015	2007	404 /	ЛП	5-7	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Інклюзив	® 05012017	2009	404 /	СЛ	7	зерн	сс		7-8	7 -8	9	7 -9	пв
Ілот	® 06012010	2009	340 /	С	5-7	зерн	ср		7-8	7-9	7-8	7-8	фж
ІН 0616	® 07012029	2010	934 /	СЛП	7 -9	зерн.	сс		7 -9	7 -9	8 -9	7 -8	пв
Козак	00012009	2004	405 /	ЛП	7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	7-9	пв
Княжий	00012008	2003	371 / 371	П	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Ксанаду	® 02012016	2005	926 / 926	ЛП	9	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Кангу	® 07012001	2009	934 /	СЛП	7-9	зерн	сп		7-8	7-9	7-9	7-9	пв
Кончіта	® 06012020	2009	824 /	СЛП	7-8	зерн	сп		7-8	7-8	7-8	7-8	пв

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Карат	94012024	1998	307/	П	7	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	фж
Козацький	06012030	2010	430/	П	5-6	зерн	сс		7	7	7	7	фж
Командор	® 04012012	2007	378/	ЛП	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Казковий	® 01012010	2005	378/	ЛП	9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	7-9	пв
Кристалія	® 05012001	2010	549/	П	6-8	зерн	сс		5 -7	7 -9	7-9	5-7	пв
Лотос	97012002	2000	306/	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Лофант	® 02012007	2006	306/	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	7	5-7	пв
Марте	® 07012028	2009	926/	СЛП	7-9	зерн	сс		7-8	7-8	7-9	7-9	фж
Мауріття	® 04012010	2008	824/	П	7	зерн	сс		7	7-9	7-9	7-9	пв
Мономах	® 03012016	2007	405/	Л	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7	пв
Максим	® 04012002	2008	1112/	СЛП	7-8	зерн	сс		7-9	7-8	7-9	5-7	пв
Мальз	® 04012007	2007	946/	ЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Неофіт	® 94012017	1999	306/ 306	ЛП	5	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Незабудка	® 03012010	2007	306/	П	5-7	зерн	п		5-7	5	5-7	5-7	пв
Надія	94012003	1998	371/	П	5	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	пв
Носівський 21	® 97012014	2002	430/	Л	7	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5	пв
Новосадськи 294	® 05012003	2009	879/	СЛ	7 -8	зерн	р		7 -8	7 - 8	7- 8	7 -8	фж
Новосадський 448	® 05012008	2009	879/	С	7 -8	зерн	р		7- 9	7 -9	7 -9	7 -9	фж
Набат	® 04012026	2008	306/	СП	5-7	зерн	сп		7-9	7	7-8	5-7	пв
Оболонь	® 98012021	2001	378/ 378	ПЛ	7-9	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Оберіг	® 06012015	2010	306/	С	7	зерн	сс		7	8	7	7	фж
Оксамитовий	® 02012003	2005	303/	Л	7	зерно	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Престиж	® 02012006	2004	465/	П	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	7-9	пв
Пек	® 05012002	2009	879/	СЛ	7	зерн	р		7	7 -9	9	7 -9	фж
Південний	® 98012004	2001	378/ 378	СЛ	7	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Прерія	89012017	1992	378/ 376, 378	С	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	цін
Персей	® 00012012	2004	341/ 341	П	7	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5	фж
Парнас	® 04012022	2008	404/	СЛ	5-7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5-7	пв

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг ання	осипання	хвороб	
Псьол	® 05012016	2009	341 /	Л	7	зерн	сс		7 - 8	8	8	7 -9	фж
Партнер	® 03012009	2008	315 /	С	5-7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5-7	фж
Приазовський 9	® 04012005	2006	212 / 1112	Л	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	7	5-7	фж
Растко	® 05012007	2009	879 /	СЛП	7 -9	зерн	сс		7 -9	7 -9	7 -9	7- 9	пв
Ростенций	® 04012013	2008	376 /	СЛП	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Ратник	06012009	2010	212 /	СЛП	7-8	зерн	сс		8	7	8	8	фж
Стратус	06012003	2009	694 /	Л	7	зерн	сс		7	7 -9	7 -9	7-8	пв
Селеніт	® 01012008	2004	378 / 922, 378	ЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Соборний	® 00012011	2004	341 / 341	П	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Скіф	® 99012004	2003	306 / 306	П	5	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	пв
Сталкер	93012009	1997	378 / 378	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Сільфід	08012004	2009	796 /	СЛП	7-9	зерн	сп		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
СН 28	96012007	2000	356 /	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5	фж
Санктрум	® 04012001	2006	376 /	ЛП	7	зерн	сс		7	7-9	7-9	5-7	пв
Совіра	® 06012028	2010	340 /	С	5-7	зерн	сс		8	7-8	7-8	7-9	фж
Сяйво	® 06012027	2009	350 /	СП	5-7	зерн	сс		7-8	7-8	7-8	7-8	пв
Себастьян	® 05012024	2008	947 /	ЛП	7-8	зерн	сс		5-7	5-7	9	5-7	пв
Сернанок	® 04012025	2008	500 /	П	5	зерн	сп		5	7	7	5-7	пв
Святогор	® 07012021	2009	378 /	СЛП	7-8	зерн	сс		8	7-8	7-8	7-9	пв
Созонівський	® 04012009	2008	356 /	ЛП	5	зерн	сс		5-7	7	9	5-7	фж
Сонцедар	® 03012007	2007	341 /	ЛП	7-9	зерн	сп		7-9	5-7	7-9	5-7	пв
Тюрінгія	® 96012015	2000	926 / 926	П	7	зерн	сс		5	5-7	5-7	5-7	пв
Терен	95012002	1998	306 /	ЛП	5	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Тройчан	® 04012011	2007	376 /	Л	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Торгал	® 06012001	2008	1048 /	П	5-7	зерн	сс		5-7	7	7	7	пв
Фенікс	97012005	2000	404 / 404	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5	фж
Хадар	® 05012015	2010	341 /	С	5-7	зерн	сс		7-8	8	8	7-8	фж
Цезар	95012003	1998	341 / 341	ЛП	7	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	пв

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Чарівний	® 01012007	2004	378 /	ЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Чудовий	® 99012003	2002	378 / 378	Л	7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Шакіра	® 07012026	2009	926 /	СЛП	5-8	зерн	сс		7-8	7-9	7-9	6-8	пв
Юкатан	® 04012021	2007	341 /	Л	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Кукурудза			- 523										
Анжу 249	95004084	1998	355 /	СЛ	7	зерн,сил	рс (180)		7	7		7	
Адоніс 180 СВ	92004025	1995	311 /	С	5	зерн,сил	рс (160)		5	5		5	
Аматус	05004068	2008	938 /	ЛП	8-9	зерн	рс (180)		8-9	7-9		9	
Бліц 160 МВ	® 02004050	2006	962 /	Л	7-8	зерн	р/с/160/		5-7	8,8		9,0	
Баксос	® 05004095	2008	1194 /	С зр, Л	10-8	зерн	рс (195)		8-9	6-9		9	
Буг СВ	® 04004043	2007	345 /	Л	7-8	зерн	р/с (180)		8,6	8,9		7-8	
Бц 178	® 05004024	2007	993 /	ЛП	8,5	зерн	р/с (170)		9,0	9,0		7-8	
Віраж 178 МВ	® 04004061	2008	311 /	СЛП	5-7	зерн	рс (170)		8-9	8-9		9	
Гран 220	00004017	2003	736 /	Л	7	зерн	рс (190)		5	5		7	
Гіас 182 СВ	® 05004065	2009	311 /	С	8	зерн	рс (150)		9	8,3		8,7	
Гардемарин 185 СВ	® 05004064	2009	311 /	С	8	зерн	рс (160)		9	7,3		8,7	
Говерла МВ	® 03004014	2005	345 / 345	СЛ	9	зерн	р/с(190)		8	9		9	
Дніпровський 181 СВ	99004018	2002	311 /	П	7	зерн	рс (180)		7	7		7	
Діана 180 СВ	06004073	2009	311 /	С	7-8	зерн	рс (190)		7	9		9	
Депутат МВ	® 03004013	2005	345 / 345	СЛП	8	зерн	р/с (195)		8	9		9	
Депозит МС	® 07004040	2010	962 /	С	7	зерн	рс		8	9		9	
Дельфін	04004003	2006	806 /	СЛП	9	зерн	рс/190/		8,4	7-9		7-9	
Джекпот МС	® 05004082	2008	962 /	Л	7-8	зерн	рс (170)		8-9	8-9		9	
Ензо	95004080	1999	806 /	ЛП	7	зерн	рс (170)		5	7		7	
ЕС Поттер	07004026	2010	806 /	С	6,3	зерн	рс (180)		6,7	8,8		9	
Ерлі Стар	01004001	2003	806 /	ЛП	9	зерн	рс (180)		7	7		7	
Енергі Стар	02004008	2006	806 /	С	7-9	зерн	рс/190/		8,6	9		7-9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
ЕСМ 601х	05004092	2008	806 /	С зр	10	зерн	рс (180)		9	7		9	
ЕС Інберроу	07004027	2009	806 /	С	7-8	зерн	рс (160)		8,2	9		9	
Зорень	01004012	2004	355 /	СЛП	7-9	зерн	рс (180)		8,6	8,9		9	
Заліщицький 191 СВ ®	04004060	2007	311 /	ЛП	9,0	зерн	р/с/190/		8,5	8,7		9,0	
Кишкун СЦ 4194	97004005	2001	998 /	ЛП	7	зерн	рс (160)		5	7		5	
Кліфтон	05004073	2009	938 /	СП	6-9	зерн	рс (180)		8	9		9	
Колізей 180 ВС ®	04004098	2007	954 /	ЛП	8-9	зерн	р/с/180/		8,6-9,0	8,8		8,5	
Краснодарський 194 МВ	05004033	2008	25 /	СЛ	5-8	зерн	рс (190)		8-9	8-9		8-9	
Квітневий 187 МВ ®	07004062	2010	311 /	СП	8	зерн	рс		8	9		9	
ЛГ 2244	95004022	1999	793 /	ЛП	7	зерн	рс (180)		5	7		7	
Мотрин 178 СВ ®	06004050	2009	1028 /	С	8	зерн	рс (180)		8	9		9	
Матеус	03004050	2006	938 /	СЛП	9	зерн	р/с (185)		8,8	9,0		7-9	
МОС 182 СВ ®	02004060	2006	966 /	СЛП	7-9	зерн	р/с/180/		8,5	8,9		7-9	
Маріїн 190 СВ ®	02004075	2005	1180 /	СЛП	9	зерно	р/с (190)		8,7	9		9	
МАС 18Т	07004136	2010	924 /	СЛ	7-8	зерн	рс		8	9		9	
НС 101	98004087	2001	879 / 879	СЛ	7	зерн	рс (110)		5	7		5	
НС 208 ®	03004018	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	р/с (190)		9	9		9	
Неріса	06004010	2009	1079 /	СЛ	7-9	зерн	рс (190)		9	9		9	
Оксана (SZE TC 191)	95004029	1998	937 /	П	7	зерн	рс (160)		7	7		7	
Остер СВ ®	04004042	2006	345 /	ЛП	7-9	зерн	р/с/190/		8,9	8,9		7-9	
Остреч СВ ®	07004029	2010	345 /	С	8	зерн	рс		8	9		9	
Оріоль ®	05004017	2008	924 /	СЛП	5-9	зерн	рс (190)		8	8-9		8-9	
ПР39Г32	02004028	2005	767 /	СЛП	9	зерн	рс/180/		8	9		9	
ПР39Б93	06004088	2009	767 /	С	8	зерн	рс (170)		8,6	8,6		9	
Поліський 177 МВ	01004013	2004	355 /	СЛП	7	зерн	рс (170)		9	9		9	
Петрівський 169 СВ ®	98004041	2001	1028 /	СЛП	7	зерн,сил	рс (170)		5	5		7	
ПР39І 12	00004042	2003	767 /	ЛП	9	зерн	рс (180)		7	7		7	
ПР39Г93	06004086	2009	767 /	С	8	зерн	рс (180)		8	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
ПР39А61	07004047	2010	1055 /	СЛ	8	зерн	рс		8	9		9	
ПР39Д60	07004046	2010	1055 /	С	7	зерн	рс		8	9		9	
ПР39А50	07004048	2010	1055 /	СЛП	8	зерн	рс		8	9		9	
ПВ 75 - 01	® 06004027	2008	685 /	Л	8-9	зерн	ср (160)		8-9	9		9	
Премія 190 МВ	® 02004049	2005	962 /	СЛП	9	зерн	р/с (190)		9	9		9	
Почаївський 190 МВ	06004069	2009	311 /	С	7-8	зерн	рс (190)		7	9		9	
ПР39П39	07004049	2010	1055 /	СЛ	8	зерн	рс		8	9		9	
Пірс МВ	® 05004050	2008	378 /	Л	7-8	зерн	рс (190)		8-9	8-9		9	
Подих МВ	® 05004047	2008	404 /	ЛП	7-8	зерн	рс (190)		8-9	8-9		9	
Руно 198 СВ	® 02004041	2005	311 /	СЛП	8	зерн	р\с (190))		8	9		9	
Ріст СВ	06004049	2010	1028 /	С	7	зерн	рс		8	9		9	
Стіжок 192 СВ	05004063	2008	432 /	Л	8	зерн	рс (190)		8	8		9	
Суботівський 190 СВ	® 06004040	2008	355 /	СЛП	5-8	зерн	рс (190)		8-9	8-9		9	
Смотрич МВ	® 07004030	2010	345 /	С	7	зерн	рс		8	9		9	
Случ СВ	® 03004015	2005	345 / 345	СЛП	9	зерн	р/с (195)		8,6	9		9	
Товтрянський 188 СВ	® 04004054	2007	311 /	ЛП	8-9	зерн	р/с/180/		8,6-9,0	8,8-9,0		8,5	
Тендра	® 03004024	2008	411 /	СЛП	5-8	зерн	рс (190)		7-8	8-9		9	
Ушицький 167 СВ	® 04004062	2007	311 /	СЛ	8,7	зерн	р/с/160/		8,7	8,5		8,8	
Філу	03004007	2005	924 /	СЛП	9	зерн	р/с (180)		8	9		9	
Харківський 195 МВ	98004095	2002	404 / 404	Л	5	зерн	рс (190)		5	5		5	
ХЛ 2017	06004044	2008	749 /	ЛП	7-8		рс (150)		8-9	8-9		9	
ХЛ 2093	06004045	2008	749 /	ЛП	7-8	зерн	рс (180)		8-9	8-9		9	
ХЛ 2015	07004013	2010	749 /	С	6,5	зерн	рс		8	9		9	
Явдошин 200 СВ	01004048	2004	336 /	ЛП	5-7	зерн	рс (190)		8,8	9		9	
Явір 180 СВ	® 04004013	2006	355 /	СЛП	9	зерн	р/с/180/		8,6	8,9		7-9	
Яринин 176 СВ	® 04004071	2007	1028 /	ЛП	8,5-8,8	зерн	рс		8,5	9,0		8,6	
Ятрань МВ	® 08004001	2010	345 /	С	7,5	зерн	рс		8	9		9	
Анжу 292	04004010	2006	793 /	СЛП	9	зерн	ср		7-9	9		7-9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
СУМ 1088	07004074	2010	926/	СЛП	8	зерн	ср (220)		8	9		9	
СУМ 1304	® 07004077	2010	926/	С	7	зерн	ср		8	9		9	
СУМ1487	® 07004075	2010	926/	СЛП	8-9	зерн	ср		8,5	9		9	
СУМ 1467	® 07004073	2010	926/	С	7	зерн	ср		8	9		9	
СУМ 1359	® 07004076	2010	926/	С	8	зерн	ср		8	9		9	
МАС 20Ф	05004028	2008	924/	Л	8-9	зерн	ср (220)		8-9	9		9	
Аттракт	06004042	2008	806/	Л	9	зерновий	ср (240)		8-9	9		9	
Авангард	00004001	2003	938/	ЛП	7	зерн	ср (260)		5	5		5	
Астері КС	05004099	2009	485/	П	8-9	зерновий	ср (220)		8,6	8,4		9	
Авіас 277 СВ	® 04004063	2007	311/	СЛП	8,6	зерн	с/р/270/		8,7	8,8		8,9	
Артемів 280 СВ	® 06004051	2010	1028/	С	8	зерн	ср (280)		7,2	9		9	
Ааспід	® 07004125	2010	793/	С	7,5	зерн	ср		8	9		9	
Авіксен	06004095	2010	1194/	СЛ	7-8	зерн	ср		8	9		9	
Аякс	06004099	2010	1194/	П	8	зерн	ср		8	9		9	
Адеміо	06004054	2010	793/	С	7	зерн	ср		8	9		9	
Аробас	03004047	2006	1079/	СЛП	9	зерн	с/р/230/		7-9	9		9	
Арабіка	® 05004027	2008	924/	Л	8-9	зерн	ср (210)		8-9	9		9	
Агральп - 260	08004027	2010	558/	С	7,5	зерн	ср		8	9		9	
Анкора	08004020	2010	989/	С	8,8	зерн	ср		8,5	9		9	
Амеліор	® 05004030	2008	924/	Л	9-10	зерн	ср (260)		8-9	9		9	
Акселль	® 05004020	2008	924/	Л	9-10	зерн	ср (270)		8-9	9		9	
Арріго	05004041	2010	1034/	СП	8-9	зерн	ср		9	9		9	
Адоніс 224 СВ	® 04004104	2008	340/	Л	7-8	зерновий	ср (250)		8-9	9		9	
Агральп - 200	08004038	2010	558/	С	7,5	зерн	ср		8	9		9	
БМ 281 СВ	93004011	1996	432/	СЛ	5	зерн,сил	ср (280)		5	5		5	
Бігстар	06004043	2008	806/	Л	8-9	зерновий	ср (210)		9	9		9	
БМ 281 АСВ	96004016	1999	432/	Л	7	зерн	ср (280)		5	5		7	
Богун	01004015	2004	355/	СЛП	7-9	зерн	ср (250)		8,7	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Борисфен 250 МВ	99004031	2003	1070/	Л	9	зерн	ср (270)		7	7		7	
Бц 288 Б	® 05004025	2007	993/	СЛП	8,8	зерн	с/р/290/		8,5	8,6		8,8	
Борозенський 277 МВ	® 05004060	2008	376/	Л	8-9	зерновий	ср (270)		8-9	9		9	
Бц 182	07004001	2010	993/	С	7	зерн	ср (210)		7,6	8,8		9	
Боржава 290 СВ	® 05004059	2008	311/	Л	9	зерновий	ср (290)		9	8-9		9	
Базальт 270 ВС	04004096	2007	954/	ЛП	8,5-8,9	зерн	с/р/270/		8,7	8,8		8,9	
Бц 282	® 05004023	2007	993/	СЛП	8,7	зерн	с/р/280/		8,5	8,7		9,0	
Балерина	08004010	2010	989/	С	9	зерн	ср		9	9		9	
Боян 277 МВ	07004018	2010	355/	С	8	зерн	ср (280)		8	9		9	
Бангі	02004063	2005	793/	СЛП	9	зерно	с/р (250)		9	9		9	
Бюрлі	06004026	2008	485/	Л	8-9	зерновий	ср (230)		8-9	8-9		9	
Бц 244	® 08004009	2010	993/	С	8	зерн	ср		8	9		9	
Бц 223	® 08004008	2010	993/	С	7,6	зерн	ср		8,3	9		9	
Батурин 287 МВ	® 07004034	2010	311/	С	8	зерн	ср		8	8		9	
Бестселер 287 СВ	® 04004059	2007	311/	СЛ	9,0	зерн	с/р/280/		8,6	8,7		9,0	
Богатир	01004045	2006	938/	СЛП	7-9	зерн	с/р/240/		8,6	8,8		7-9	
Білозірський 295 СВ	® 02004040	2005	311/	СЛП	9	зерн	с/р (290)		9	9		9	
Барвінок МВ	® 04004087	2008	404/	Л	7-8	зерновий	ср (230)		8-9	9		9	
Василів 273 СВ	® 02004076	2006	1028/	СЛП	7-9	зерн	с/р/270/		8,5	8,8		7-9	
Вись 287 СВ	® 05004057	2008	311/	Л	9	зерновий	ср (280)		9	9		9	
Варта МВ	06004060	2010	404/	С	7	зерн	ср		7,5	9		9	
Верітіс	03004009	2006	806/	СЛ	9	зерн	ср/210/		8,4	9		7-9	
Вексель МС	® 07004039	2010	962/	С	9	зерн	ср		8	9		9	
Вимпел МВ	® 05004044	2008	404/	Л	9	зерновий	ср (260)		9	9		9	
Гран 5	98004110	2001	736/	Л	5	зерн	ср (260)		5	5		7	
Гран 310	00004019	2003	736/	Л	7	зерн	ср (280)		5	5		5	
Гран 6	99004026	2002	736/	Л	7	зерн	ср (260)		5	7		5	
Гран 1	98004035	2001	736/	Л	7	зерн,сил	ср (230)		5	5		7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Гексер ®	04004002	2006	1194 /	ЛП	7-9	зерн	с/р/240/		8,5	9		7-9	
Григорів 270 СВ ®	02004073	2005	1028 /	СЛП	9	зерн	с/р (270)		8,6	9		9	
Голосіївський 260 СВ	06004037	2008	568 /	Л	9	зерновий	ср (260)		8-9	8-9		9	
Делітоп	02004003	2004	1079 /	ЛП	7-9	зерн	ср (250)		9	8,7		9	
ДК 291	06004016	2009	437 /	С	9	зерновий	ср (290)		9	9		9	
Дніпровський 273 АМВ	85004014	1988	311 /	СЛ	5	зерн,сил	ср (270)		5	7		5	
ДКС 2949	06004023	2009	437 /	С	7-8	зерновий	ср (270)		9	9		9	
Дніпровський 228 МВ	93004014	1996	340 /	С	5	зерн	ср (220)		5	5		5	
ДКС 2960	06004022	2008	437 /	Л	9	зерновий	ср (250)		8-9	8-9		9	
ДКС 3420	06004018	2008	437 /	Л	9	зерновий	ср (290)		8-9	9		9	
ДКС 3759	06004020	2008	437 /	Л	9	зерновий	ср (290)		9	9		9	
ДК 315	03004002	2005	437 /	СЛП	9	зерн	с/р (290)		9	9		9	
ДКС2870	06004113	2010	437 /	С	8	зерн	ср		7,6	9		9	
Дніпровський 257 СВ ®	04004056	2007	311 /	СЛ	8,8	зерн	с/р/290/		8,5	8,7		9,0	
ДКС 2971	07004079	2010	437 /	С	8	зерн	ср		8	9		9	
ДК 287	06004015	2010	437 /	С	8,5	зерн	ср		8,5	9		9	
ДКС 3472	07004080	2010	437 /	С	8	зерн	ср		8	9		9	
ДОК МВ ®	05004054	2008	378 /	Л	8-9	зерновий	ср (270)		8-9	9		9	
ДКС 3476	07004083	2010	437 /	С	8,4	зерн	ср		7,5	9		9	
ДКС 3871 ®	07004082	2010	437 /	СЛ	8-9	зерн	ср		8	9		9	
ДК 243	03004003	2007	437 /	СЛ	9,0	зерн	с/р/240/		8,8	9,0		9,0	
ДКС3795	07004088	2010	437 /	СЛ	8-10	зерн	ср		8,5	9		9	
Елегія МВ ®	00004038	2003	378 /	ЛП	7	зерн	ср (240)		7	7		7	
Еліта	98004007	2000	767 /	ЛП	9	зерн	ср (270)		7	7		7	
Еден Стар	00004044	2003	806 /	ЛП	9	зерн	ср (230)		7	7		7	
ЕС Марко	07004114	2010	806 /	С	7,6	зерн	ср		7,6	8,6		9	
ЕС Бітл	06004107	2010	806 /	С	7	зерн	ср (200)		7,7	9		9	
ЕС Анамур ®	05004004	2008	806 /	Л	8-9	зерновий	ср (220)		8-9	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
ЕС Сігма	07004112	2010	806/	СЛП	8,7-9-9	зерн	ср		8,3-8,7	8,6-9		9	
ЕСМ 602х	05004090	2008	806/	Л	9	зерновий	ср (220)		8-9	9		9	
Ера МС	(к) 05004078	2008	962/	Л	8-9	зерновий	ср (290)		9	9		9	
ЕС Макіла	06004106	2010	806/	СП	7,5-9	зерн	ср (230)		7,5-9	9		9	
ЕС Лаймс	(к) 05004003	2008	806/	Л	8-9	зерновий	ср (210)		8-9	9,0		9,0	
ЕС Крістель	06004108	2010	806/	СП	8-9	зерн	ср (240)		8-9	9		9	
Еміліо	(к) 03004051	2007	938/	СЛП	8,9	зерн	ср (250)		8,9	9,0		9,0	
ЕС Паролі	(к) 05004005	2008	806/	Л	8-9	зерновий	ср (260)		8-9	9		9	
Свростар	98004138	2001	806/	СП	7	зерн	ср (210)		7	7		7	
СС Тріо	06004041	2008	806/	Л	9	зерновий	ср (220)		8-9	9		9	
Жаззі	05004100	2008	485/	Л	8-9	зерновий	ср (235)		8-9	8-9		9	
Жавір 290 МВ	02004044	2005	962/	СЛП	9	зерн	с/р (290)		9	9		9	
ЗУМ 0307	06004036	2010	926/	СЛП	8,5-9	зерн	ср (290)		8-9	9		9	
ЗУМ 0235	(к) 05004011	2009	926/	Л	9-10	зерновий	ср (280)		8,7	9		9	
Зомба	05004086	2008	793/	Л	8-9	зерновий	ср (260)		8-9	8-9		9	
Іннагуа	98004076	2001	806/	С	7	зерн	ср (220)		5	7		7	
Ізяслав 220 МВ	(к) 07004035	2010	311/	С	7	зерн	ср		8	9		9	
Йогі КС	07004123	2010	485/	С	8	зерн	ср		8	9		9	
Капітан	00004035	2004	938/	ЛП	7-9	зерн	ср (220)		8,8	8,8		9	
Кадр 267 МВ	98004024	2001	311/	Л	7	зерн,сил	ср (260)		5	7		7	
Кишкун СЦ 4297	91004058	1994	998/	С	5	зерн	ср (290)		5	7		7	
Кий 250 СВ	98004042	2001	1028/	П	7	зерн,сил	ср (250)		5	7		7	
Кишкун ТЦ 190	91004057	1994	998/	С	7	зерн	ср (200)		5	7		7	
Кремінь 200 СВ	00004026	2003	311/	ЛП	7	зерн	ср (210)		7	7		7	
Король	99004050	2003	938/	ЛП	7	зерн	ср (280)		5	5		7	
Кішкун ТЦ 4250 (Джіна)	02004014	2007	998/	СЛП	8,6	зерно	с/р		8,4	8,6		8,5	
Кішкун СЦ 4282 (Жужанна)	02004016	2006	998/	ЛП	7	зерн	с/р/250/		7-9	7-9		7-9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Кішкун СЦ 4280 (Ленчі)	02004015	2006	998/	ЛП	7-8	зерн	с/р/260/		7	7-9		7-9	
Кларіті	07004122	2010	485/	С	8	зерн	ср		8	9		9	
Корнаді КС	07004120	2010	485/	С	8	зерн	ср		8	9		9	
Кадет ®	05004109	2008	924/	Л	9-10	зерновий	ср (260)		8-9	8-9		9	
Кіцманський 215 СВ ®	05004062	2008	311/	Л	9-10	зерновий	ср (235)		8-9	9		9	
Космо 230 ®	04004107	2008	279/	Л	8	зерновий	ср (240)		8-9	9		9	
Криничанський 257 СВ ®	05004061	2008	311/	Л	9	зерновий	ср (250)		8-9	8-9		9	
Контур 250 ВС ®	04004097	2007	954/	СЛ	9,0	зерн	с/р/250/		8,5	8,7		9,0	
Кішкун СЦ 4291 (Ольга)	02004017	2005	998/	СЛ	9	зерн	с/р (240)		8	9		9	
Кріспі	07004131	2010	924/	С	8	зерн	ср		9	9		9	
Коло МС 280 ®	04004093	2008	962/	Л	9-10	зерновий	ср (280)		9	9		9	
Кразі	07004119	2010	485/	СП	8,5	зерн	ср		8	9		9	
Краснодарський 291 АМВ	05004034	2008	25/	Л	9-10	зерновий	ср (290)		9	9		9	
Корнелі	05004010	2007	485/	СЛП	9,0	зерн	с/р/250/		8,5	8,6		9,0	
Канада	02004086	2005	1079/	СЛП	9	зерн	с/р (290)		9	9		9	
Коксімо ®	04004114	2007	1194/	Сб,зрЛП	9,0	зерн	с/р/220/		8,5	9,0		9,0	
Корсунський 297 МВ ®	05004014	2007	355/	СЛП	9,0	зерн	с/р/290/		8,7	8,9		9,0	
Кішкун 4230	04004041	2007	998/	ЛП	8,0	зерно	с/р		8,5	8,4		8,6	
Клаптон	03004006	2005	924/	СЛП	9	зерн	с/р (230)		9	9		9	
КВ 2704 ®	04004106	2007	279/	ЛП	9,0	зерн	с/р/260/		8,6	8,7		8,9	
Кішкун 4220 (Наталія)	04004040	2007	998/	ЛП	8,5	зерно	с/р		8,4	8,3		8,8	
Кішкун 4244	02004013	2007	998/	ЛП	7-8	зерн	ср		8,5	8,7		8,6	
Луганський 287 МВ	94004009	1997	309/	СЛ	5	сил	ср (280)	5	5	5		5	
ЛГ 3214	93004033	1996	793/	С	7	зерн	ср (270)		7	7		7	
ЛГ 2306	01004044	2004	793/	СЛП	7-9	зерно	с/р (250)		8,5	9		9	
ЛГ 2289	99004012	2002	793/	СЛ	7	зерн	ср (280)		5	7		7	
ЛГ 2195	01004043	2006	793/	СЛП	9	зерно	ср	7-9	7-9	9		7-9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Леона	08004019	2010	989/	С	8	зерн	ср		8,1	9		9	
ЛГ3258	® 07004124	2010	793/	С	7,5	зерн	ср		8	9		9	
Любава 279 МВ	® 04004057	2007	311/	Л	9,0	зерн	с/р/270/		8,6	8,4		8,6	
Лотар	08004024	2010	558/	С	7	зерн	ср		7,5	9		9	
Любена	® 05004035	2008	966/	СЛ	6-9	зерновий	ср (240)		7-9	8-9		9	
Лелека МВ	® 04004085	2007	404/ 404	ЛП	8,5	зерн	с/р/260/		8,5	8,7		8,6	
Латізана	04004006	2007	793/	ЛП	8,5	зерн	с/р/230/		8,5	8,6		9,0	
ЛГ 3215	04004004	2006	793/	СЛП	9	зерно	ср		8,0	9		7-9	
ЛГ3285	® 07004129	2010	793/	СП	8,5	зерн	ср		8	9		9	
Лайка	® 05004111	2008	924/	Л	9	зерновий	ср (250)		8-9	9		9	
Монумснтал	99004004	2001	437/	СП	7	зерн	ср (280)		7	7		7	
Маїс 226 МВ	® 01004006	2004	962/ 962	СЛП	7-9	зерн	с/ р (220)		8,3	9	-	9	
МВ 251	® 04004047	2006	720/ 1112	СЛП	9	зерн	с/р/250/		7-9	9		7-9	
Маг	® 05004058	2008	311/	Л	9	зерновий	ср (280)		8-9	8-9		9	
МВ ТС 277	® 04004049	2006	720/ 1112	СЛП	9	зерн	с/р/270/		8,5	9		7-9	
Монкада	03004045	2006	1079/	СЛП	9	зерн	с/р/240/		9	9		7-9	
Морісат	08004011	2010	989/	С	8	зерн	ср		8	9		9	
Модем МС 280	® 03004049	2006	962/	СЛП	9	зерн	с/р/280/		8,6	9		7-9	
Маді	08004026	2010	558/	С	8	зерн	ср		8,4	8,7		9	
МАС 26К	07004135	2010	924/	СЛП	8-8,5	зерн	ср		8,5	9		9	
Мозаїк	08004033	2010	1267/	СЛП	7-9	зерн	ср		7-9	9		9	
Мучо	02004085	2005	1079/	СЛП	9	зерн	с/р (290)		9	9		9	
МЕЛ 272 МВ	® 02004057	2005	966/	СЛП	8	зерн	с/р (270)		9	9		9	
МАС 24А	® 05004021	2008	924/	Л	9-10	зерновий	ср (260)		8-9	9		9	
НК Пекта	06004003	2009	1079/	СП	7-9	зерновий	ср (240)		8-8,5	9-8,5		9-8,5	
Наутилус	00004016	2003	350/	ЛП	7	зерн	ср (290)		7	7		7	
Нептун СВ	96004002	1999	355/	СЛП	5	зерн,сил	ср (280)		5	7		5	
НК Равело	® 04004110	2008	1079/	Л	9-10	зерновий	ср (190)		8-9	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
НК Сімба	06004116	2010	1079 /	СЛП	8,6-9,6-9	зерн	ср (290)		8-9	8-9		9	
НК Ігл	07004093	2010	8 /	СЛ	8-9	зерн	ср		8,5	9		9	
НС 2016	® 07004015	2010	879 /	С	7,6	зерн	ср (200)		8	9		9	
НС 2022	® 07004102	2010	879 /	С	7,7	зерн	ср (200)		8	8,6		9	
НК Джитаго	07004096	2010	8 /	С	7,4	зерн	ср		8	9		9	
НС 2014	07004100	2010	879 /	С	8	зерн	ср		8	9		9	
НС 251	® 03004020	2005	879 / 879	ЛП	9	зерн	с/р (250)		9	9		9	
НС 205	® 05004022	2007	879 /	СЛ	8,6	зерн	с/р/210/		8,6	9,0		9,0	
НС 2012	® 05004007	2007	879 /	ЛП	8,5	зерн	с/р/240/		8,7	8,7		9,0	
НК Фалькон	06004008	2008	1079 /	Л	8-9	зерновий	ср (240)		9	8-9		9	
НК Перформ	06004009	2008	1079 /	Л	9-10	зерновий	ср (240)		8-9	9		9	
Нексос	® 03004005	2006	1194 /	СЛП	/	зерн	с/р/230/		8,3	8,8		7-9	
НК Тон	07004097	2010	8 /	С	7,5	зерн	ср		8	9		9	
ОДЛ-1	99004045	2003	1083 / 1083	Л	7	зерн	ср (240)		7	7		7	
Олдхем	02004004	2004	1079 /	ЛП	7-9	зерн	ср (270)		9	9		9	
Опока	08004003	2010	1253 /	С	7,5	зерн	ср		8	9		9	
Олегів 286 СВ	® 05004043	2006	1028 /	ЛП	9	зерн	с/р/280/		7-9	9		7-9	
Олігарх МВ	® 07004067	2010	404 /	С	8,7	зерн	ср		8	9		9	
Оржиця 237 МВ	® 06004071	2010	311 /	СЛ	7,6-8,8	зерн	ср (230)		7-8	8-9		9	
Овідій 295 МВ	® 02004072	2006	378 /	СЛ	7-9	зерн	с/р/290/		8,3	9		7-9	
ПР39Д81	98004102	2001	767 /	П	9	зерн	ср (260)		7	7		7	
ПР39Н72 (Сандріна)	00004043	2003	767 /	Л	9	зерн	ср (220)		7	7		7	
ПР39Б76	® 05004104	2009	767 /	С	10-11	зерновий	ср (280)		9	9		9	
Порумбень 295 АСВ	93004002	1996	612 /	СЛП	5	зерн,сил	ср (290)	5	7	7		7	
Піонер-Гран 3978	98004107	2001	736 /	Л	5	зерн	ср (260)		5	7		7	
Прім 247 МВ	01004029	2004	311 /	Л	7	зерн	ср (240)		9	9		9	
ПР39Т13	® 05004002	2008	767 /	Л	9	зерновий	ср (240)		9	9		9	
Пустоварівський 280 СВ	® 05004037	2008	655 /	Л	8-9	зерновий	ср (280)		8-9	8-9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Подільський 274 СВ	® 04004055	2007	311/	СЛП	8,5-8,9	зерн	с/р/270/		8,5	9,0		8,9	
ПР39Ф58	04004018	2007	767/767	СЛ	9,0	зерн	с/р/230/		8,7	8,8		9,0	
ПР39К13	® 05004103	2009	767/	С	7	зерновий	ср (220)		7,5	9		9	
Переяславський 230 СВ	® 06004039	2008	355/	СЛП	5-9	зерновий	ср (230)		8-9	9		9	
ПВ 81-01	® 06004031	2008	691/	Л	8-9	зерновий	ср		8-9	9		9	
ПР39Р20	® 05004108	2008	767/	Л	9-10	зерновий	ср (280)		9	8-9		9	
Прікслі	06004092	2009	1194/	С	11-12	зерновий	ср (230)		9	6		9	
ПР39Р86	® 02004029	2005	767/	СЛП	9	зерн	с/р (275)		9	9		9	
ПР39Г45	04004020	2007	767/767	СЛ	8,8	зерн	с/р/240/		8,4	8,7		9,0	
ПАН 240	05004009	2010	558/	СП	8,5	зерн	ср		9	9		9	
П'ятихатський 270 СВ	® 03004025	2006	311/	СЛП	9	зерн	с/р/270/		8,6	9		7-9	
ПР39Г83	04004019	2006	767/767	СЛП	9	зерн	ср/230/		7-9	9		9	
Полтава	® 07004032	2010	966/	С	8,5	зерн	ср		8,1	9		9	
Реаллі КС	07004121	2010	485/	С	9	зерн	ср		8	9		9	
Роналдініо	04004103	2008	938/	СЛП	5-9	зерновий	ср (210)		7-9	8-9		9	
Сплендіс	98004136	2002	806/	ЛП	9	зерн	ср (250)		7	7		7	
Слобожанський МВ	® 04004084	2008	404/	Л	7-8	зерновий	ср (290)		8-9	8-9		9	
Скафор	06004059	2010	485/	СП	7-8	зерн	ср		8	9		9	
Санжарський 289 МВ	® 04004077	2008	311/	СЛ	6-9	зерновий	ср (280)		7-8	9		9	
Сквирський 280 СВ	® 06004048	2010	655/	С	7	зерн	ср (280)		7,7	8,9		9	
Сплав МС 290	® 04004089	2007	962/	СЛ	8,9	зерн	с/р/290/		8,6	8,7		8,6	
Сочава	® 05004012	2007	568/	СЛП	8,8	зерн	с/р/240/		8,6	8,7		9,0	
Салюдо	06004112	2010	1194/	СЛП	7-8	зерн	ср		8	9		9	
Сеіді	® 04004082	2008	485/	СЛП	6-9	зерновий	ср (280)		7-9	8-9		9	
Сталкер	® 03004021	2006	404/	СЛП	7	крохмал	с/р/260/		7	7-9		7-9	
Союз	® 02004051	2005	311/	СЛП	9	зерн	с/р (200)		9	9		9	
Сиваш	02004062	2005	411/	СЛ	9	зерн	с/р (280)		8,6	9		9	
Солонянський 298 СВ	® 03004026	2006	311/	СЛП	9	зерн	с/р/280/		7-8	9		7-9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг ання	осипання	хвороб	
Тарас	01004010	2004	355 /	ЛП	7	зерн	ср (230)		9	9		9	
Тясьмин МВ	97004018	2001	355 /	Л	7	зерн,сил	ср (250)		5	7		7	
Титан 220 СВ	97004019	2000	355 /	СЛП	7	зерн	ср (220)		7	7		7	
Торонто	08004025	2010	558 /	С	8	зерн	ср		8	9		9	
Тібор	07004134	2010	924 /	С	8,5	зерн	ср		8	9		9	
Ударник	® 02004081	2006	938 /	СЛП	9	зерн	с/р/230/		8,5	8,6		7-9	
Успіх МВ	® 04004079	2008	378 /	СЛ	6-8	зерновий	ср (290)		7-9	8-9		9	
Фантастік	04004007	2006	793 /	СЛ	7-9	зерно	ср		8,6	9		7-9	
Харківський 291 МВ	99004036	2003	404 / 404	Л	7	зерн	ср (290)		5	5		7	
Хельга	91004035	1996	767 /	Л	7	зерн	ср (300)		7	7		7	
Харківський 295 МВ	98004051	2001	404 / 404	Л	5	зерн,сил	ср (290)		5	5		7	
Харківський 250 МВ	94004021	1999	404 / 404	П	5	сил	ср (250)		5	5		5	
ХЛ 2222	06004046	2008	749 /	Л	8-9	зерновий	ср (230)		8-9	9		9	
Ханні	® 04004081	2008	485 /	СЛ	6-8	зерновий	ср (240)		7-9	9		9	
Хмельницький	® 04004064	2007	311 /	Сб,зрЛП	8,9	зерн	с/р/250/		8,9	9,0		8,7	
Чигиринський 267 СВ	® 05004015	2007	355 /	ЛП	8,6	зерн	с/р/260/		8,7	9,0		9,0	
Чемеровецький 260 СВ	® 04004053	2007	311 /	СЛ	8,5	зерн	ср (260)		8,5	8,7		8,8	
Шаролта	07004002	2010	937 /	СП	8	зерн	ср		8	9		9	
Сілекс	06004098	2010	1194 /	СЛ	8-9	зерн	сс		8	9		9	
Альфа	95004027	1999	1079 /	С	7	зерн	сс (380)		7	7		7	
Апостолівський 310 ВС	® 04004095	2008	954 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (310)		8-9	8-9		9	
Аалвіто	95004042	1999	713 /	С	5	зерн	сс (370)		5	7		7	
Армані	05004018	2008	924 /	Л	8-9	зерновий	сс (310)		8-9	9		9	
Арія МС 330	® 03004055	2006	962 /	СЛ	9	зерн	с/с/330/		8,9	9		7-9	
Азов	® 04004050	2008	411 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (330)		8-9	8-9		9	
Аманда	® 03004053	2007	938 /	СЛ	9,0	зерн	с/с/330/		8,6	9,0		9,0	
Аванс МС 350	® 04004090	2007	962 /	С	9,0	зерн	с/с/350/		8,7	8,9		8,6	
Бц 394	® 05004026	2008	993 /	Л	9	зерновий	сс (330)		9	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Богдан	01004016	2004	355 /	СЛ	7	зерн	сс (350)		8,9	9		9	
Бренди	06004121	2010	1034 /	СЛ	8-9	зерн	сс		8,5	9		9	
Веселка МВ	® 00004039	2003	378 /	Л	7	зерн	сс (340)		5	7		7	
Витязь МВ	® 04004086	2008	404 /	Л	7-8	зерновий	сс (340)		8-9	9		9	
Гіаліт 391 МВ	® 05004069	2009	311 /	Л	8	зерновий	сс (390)		8,8	9		9	
Гифт 310 СВ	® 05004080	2008	962 /	Л	8-9	зерновий	сс (310)		9	9		9	
Гельвін 387 МВ	® 05004070	2008	311 /	Л	8-9	зерновий	сс (380)		9	9		9	
Гунор	® 04004046	2006	720 / 1112	СЛ	9	зерн	с/с/330/		7-9	9		7-9	
Галера МВ	® 03004041	2008	378 /	СЛ	6-8	зерновий	сс (370)		7-9	8-9		9	
Донор МВ	® 05004045	2008	404 /	Л	8-9	зерновий	сс (310)		9	9		9	
ДКС 3880	06004021	2009	437 /	Л	9	зерновий	сс (320)		8,4	9		9	
ДК 391	02004007	2004	437 /	Л	9	зерн	сс/350/		8,6	9		9	
Дніпровський 325 МВ	93004015	1996	311 /	С	7	зерн	сс (320)		5	7		5	
Долар	92004139	1995	1079 /	СЛ	7	зерн	сс (390)		7	7		7	
Джуксін	® 05004096	2008	1194 /	Л	9-10	зерновий	сс (330)		9	9		9	
Діалог	® 05004053	2008	378 /	Л	8	зерновий	сс (350)		8-9	9		9	
Дніпровський 310 МВ	82004026	1987	311 /	СЛ	5	зерн,сил	сс (310)		5	7		5	
ДКС 3511	03004001	2008	437 /	С	7	зерновий	сс (330)		8-9	9		9	
ДК 434	06004017	2009	437 /	Л	9	зерновий	сс (380)		8,4	9		9	
ДК 440	99004007	2003	437 /	Сзр,Л	9	зерн	сс (350)		7	7		7	
ДК 312	® 05004094	2008	1194 /	Л	8	зерновий	сс (310)		8-9	9		9	
ДКС 4626	03004004	2005	437 /	СЛ	9	зерн	с/с (360)		9	9		9	
ДМС Сектор	® 07004037	2010	962 /	СЛ	9,7-9	зерн	сс		8,5	9		9	
Джайв	® 06004078	2010	378 /	С	9	зерн	сс (360)		8,7	9		9	
ДМС Адаптер	® 07004038	2010	962 /	С	7,5	зерн	сс		7,5	9		9	
ДКС 4964	® 07004085	2010	437 /	СЛ	10-9	зерн	сс		8,8	9		9	
ЕС Беніта	05004089	2008	806 /	Л	8-9	зерновий	сс (320)		9	9		9	
ЕС Гарант	® 07004111	2010	806 /	С	8,5	зерн	сс		8	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
ЕС Сенсор	07004113	2010	806 /	СЛ	8,7-9,5	зерн	сс		8,4	9		9	
Еврика МВ	® 02004071	2005	378 /	СЛ	8	зерн	с|с (390)		9	9		9	
ЕС Нінфеа	05004091	2008	806 /	Л	9	зерновий	сс (330)		9	9		9	
Екватор 338 МВ	01004024	2006	957 /	СЛ	9	зерн	с/с/330/		8,6	9		7-9	
ЄВРО 301 МВ	® 99004028	2003	962 / 962	Л	9	зенр	сс (300)		7	7		7	
Злагода МВ	® 01004004	2005	404 / 404	СЛ		зерн	сс(310)		8,4	9		9	
Збруч	® 04004069	2008	311 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (350)		8-9	8-9		9	
ЗУМ 0243	® 04004025	2006	926 /	СЛ	9	зерн	сс/350/		8,6	9		7-9	
Запорізький 333 МВ	® 06004072	2010	311 /	СЛ	8-9	зерн	сс (330)		8,5	9		9	
ЗУМ 1093	06004035	2010	926 /	С	7,5	зерн	сс (320)		7,8	9		9	
Інгрід	06004056	2010	793 /	СЛ	7-8	зерн	сс		8	9		9	
Іскра МВ	® 02004067	2006	404 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/340/		7-8	9		7-8	
Індустрія МВ	06004062	2010	404 /	С	8	зерн	сс		8	9		9	
Корона 350 МВ	® 01004007	2004	962 / 962	СЛ	7	зерн	сс/350/		8,5	9		9	
Комета МВ	® 99004023	2002	355 /	СЛ	9	зерн	сс (300)		7	7		7	
Кларіка	98004003	2000	767 /	СЛ	7	зерн	сс (340)		5	7		7	
КВС 381	05004066	2008	938 /	Л	9	зерновий	сс (350)		8-9	9		9	
КВС Амбер	05004072	2008	938 /	Л	9	зерновий	сс (350)		8-9	9		9	
Кобза МВ	01004040	2005	378 /	СЛ		зерн	сс (350)		9	9		9	
Командос	06004065	2010	938 /	СЛ	7-9	зерн	сс (330)		8,5	9		9	
Кішкун 4368 (Ліза)	04004031	2008	998 /										
Кредит МВ	® 06004061	2010	404 /	Сб,зр	6,8; 11,2	зерн	сс (310)		8	9; 8,2		9	
Кішкун СЦ 4337 (Ізабелла)	04004029	2008	998 /	Л	8-9	зерновий	сс (337)		9	9		9	
Красилів 327 МВ	® 07004036	2010	311 /	С	9	зерн	сс		9		9	9	
Кішкун СЦ 4340 (Лейла)	02004020	2006	998 /	СЛ	7	зерн	с/с/340/		7	9		7-9	
Каріфолс	07004070	2010	938 /	СЛ	8,5-9	зерн	сс		8,5	9		9	
Круг 340 ВС	® 02004047	2006	962 /	СЛ	9	зерн	с/с/340/		8,6	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Пазва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Кішкун ТЦ 4344 (Шеріна)	04004028	2007	998 /	Л	8,5	зерно	с/с		8,5	8,6		8,9	
Кішкун СК 4345 (Раса)	04004033	2008	998 /										
ЛГ 3330	05004087	2008	793 /	Л	8-9	зерновий	сс (340)		9	9		9	
ЛГ 3232	05004088	2008	793 /	Л	8-9	зерновий	сс (390)		9	9		9	
ЛГ 2305	02004064	2006	793 /	СЛ	9	зерн	сс		8,5	9		7-9	
Лаксот (к)	04004113	2007	1194 /	Л	9,0	зерн	с/с		8,5	8,6		8,8	
ЛГ3350 (к)	07004126	2010	793 /	С	8,5	зерн	сс		8	9		9	
ЛГ 3362	02004066	2006	793 /	СЛ	9	зерн	сс		8,4	9		7-9	
ЛГ 2372	02004065	2005	793 /	СЛ	9	зерн	с/с (380)		8,5	9		9	
МВ 355	91004023	1994	720 / 1112	Л	7	зерн	сс (350)		7	7		7	
Моналіза	98004009	2000	767 /	СЛ	9	зерн	сс (340)		7	7		7	
Меридіан 341 МВ	01004020	2004	957 /	Л	7-9	зерн	сс/340/		9	9		9	
МАС 33А (к)	05004019	2008	924 /	СЛ	7-9	зерновий	сс (330)		8-9	9		9	
Моніка 350 МВ (к)	03004029	2006	311 /	СЛ	7-9	зерн	сс/350/		8,5	9		7-9	
Метеор 317 МВ (к)	03004011	2005	355 /	СЛ	9	зерн	с/с (310)		9	9		9	
НС 300	97004038	2000	879 / 879	С	7	зерн	сс (300)		7	7		7	
НК Леморо	06004011	2008	1079 /	Л	9	зерновий	сс (300)		9	9		9	
Натура	05004031	2008	924 /	Л	8	зерновий	сс (320)		9	9		9	
НК Альтіус	06004004	2008	1079 /	СЛ	5-8	зерновий	сс (300)		7-8	8-9		9	
НС 400	98004086	2001	879 / 879	С	9	зерн	сс (400)		5	5		7	
НС 3014 (к)	07004014	2010	879 /	СЛ	9	зерн	сс (350)		7,5-8,6	9		9	
Новація МВ (к)	03004039	2006	378 /	СЛ	7-9	зерн	сс/330/		8,6	9		7-9	
НК Канзас	07004099	2010	8 /	С	7,5	зерн	сс		8	9		9	
Нованія	08004018	2010	989 /	С	8,6	зерн	сс		8,5	9		9	
Нива МВ (к)	02004070	2005	404 / 404	СЛ	8	зерн	сс (320)		8	9		9	
НК Термо	02004083	2005	1079 /	СЛ	9	зерн	с/с (390)		9	9		9	
НК Луціус	07004095	2010	8 /	С	8	зерн	сс		8	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
НС 301	® 03004019	2005	879 / 879	СЛ	9	зерн	с/с(300)		9	9		9	
Оазис 315 СВ	01004021	2004	957 /	СЛ	7	зерн	сс (350)		8,9	9		9	
Одеський 346 МВ	92004019	1995	378 / 378	С	5	зерн	сс (360)		5	5		5	
Одеський 375 МВ	® 99004053	2002	378 /	СЛ	7	зерн	сс (380)		5	5		7	
Орлик 330 МВ	® 06004038	2008	355 /	СЛ	5-9	зерновий	сс (330)		8-9	9		9	
Одеський 385 МВ	98004037	2001	378 / 378	С	7	зерн	сс (380)		5	5		7	
ОдМа 310 М	84004085	1987	720 / 378	СЛ	7	зерн,сил	сс (350)		7	7		7	
Одеський 360 МВ	® 98004103	2002	378 / 378	С	7	зерн	сс (350)		5	7		7	
Орільський 357 СВ	® 05004056	2008	311 /	Л	9	зерновий	сс (350)		9	9		9	
Оксітан	02004027	2004	1079 /	СЛ	9	зерн	сс (340)		8	9		9	
Петропавлівський 392 МВ	01004018	2004	957 /	С бог, зр	5-7	зерн	сс (360)		7,8	9		9	
Платан МВ	94004013	1997	378 / 378	С	7	зерн	сс (340)		5	7		5	
ПР38Д89 (Синонім: Анаста)	98004072	2001	767 /	Л	9	зерн	сс (330)		7	7		7	
ПР38Б12	® 05004101	2008	767 /	СЛ	7-9	зерновий	сс (300)		8-9	9		8-10	
Порумбень 351 МВ	95004006	1999	612 /	СЛ	7	зерн	сс (340)7		5	7		7	
Престиж 365 МВ	01004019	2004	957 /	Л	7	зерн	сс (320)		9	9		9	
ПР38М27	06004089	2009	767 /	Л	9-10	зерновий	сс (300)		8,4	9		9	
П9571	06004083	2009	767 /	СЛ	8,4 - 9,6	зерновий	сс (370)		8-8,7	9		9	
ПВ 90 - 04	® 06004030	2009	685 /	Л	8-9	зерновий	сс		8,6	9		9	
ПР39К38 (Синонім: Валюта)	98004069	2001	767 /	Л	9	зерн	сс (300)		7	7		7	
Песо	98004061	2001	1079 /	СЛ	7	зерн,сил	сс (320)		5	7		7	
ПР37И12	05004106	2009	767 /	Л	9-10	зерновий	сс (380)		8,3	9		9	
ПАН 350	05004008	2009	558 /	Л	8-9	зерновий	сс (350)		8,8	9		9	
ПР38В91	® 04004021	2007	767 /	С	9,0	зерн	с/с/330/		8,7	8,9		9,0	
ПР38Р92	® 02004031	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с (330)		9	9		9	
ПР37Н01	07004057	2010	1055 /	СЛ	9	зерн	сс		8	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляганння	осипання	хвороб	
ПР38А79	07004055	2010	1055 /	С	7,5	зерн	сс		8	9		9	
ПР38Н86	07004052	2010	1055 /	СЛ	7-8	зерн	сс		8	9		9	
ПР38А22	07004045	2010	1055 /	СЛ	8,5	зерн	сс		8	9		9	
ПР38Ф10	® 02004030	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с (330)		9	9		9	
ПР37Д25	® 02004088	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с (390)		9	9		9	
ПР38Г67	® 02004032	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с(370)		9	9		9	
ПР38Б85	® 04004015	2006	767 /	СЛ	7-9	зерн	сс/340/		7-9	9		9	
Ранг МС 310	® 04004092	2008	962 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (310)		8-9	9		9	
Розівський 311 СВ	04004068	2008	311 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (310)		8-9	9		9	
Селест	02004005	2004	1079 /	СЛ	9	зерн	сс (330)		8,5	9		9	
Сапрія	® 05004093	2009	924 /	Л	9	зерновий	сс (360)		8,6	9		9	
Стожар 330 МВ	04004094	2008	954 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (330)		8-9	8-9		9	
Сегеді ТС 367	07004004	2010	937 /	СЛ	8	зерн	сс		8	9		9	
Собор МС	® 07004041	2010	962 /	С	8	зерн	сс		8	9		9	
Сов 329 СВ	® 04004058	2007	311 /	СЛ	9,0	зерн	с/с/320/		8,7	8,6		9,0	
Сегеді 363	07004003	2010	937 /	С	8	зерн	сс		8	9		9	
Трон МС	® 05004083	2009	962 /	Л	8	зерновий	сс (390)		8,8	9		9	
Тон 320 ВС	® 02004043	2005	962 /	СЛ	9	зерн	с/с (320)		9	9		9	
ТАР 349 МВ	® 03004022	2007	966 /	С	8,9	зерн	с/с/340/		8,5	8,9		9,0	
Усмішка	® 05004055	2008	378 /	Л	8-9	зерновий	сс (360)		9	9		9	
Флагман	® 05004051	2008	378 /	Л	7-8	зерновий	сс (360)		8-9	9		9	
Фанжіо	® 05004016	2008	924 /	СЛ	7-9	зерновий	сс (320)		8-9	9		9	
Футура	04004100	2008	938 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (330)		8-9	9		9	
Фонд 404 МВ	® 02004045	2005	962 /	СЛ	9	зерн	с/с (400)		9	9		9	
Фруктіс	03004008	2005	806 /	СЛ	9	зерн	с/с (330)		9	9		9	
Харківський 311 МВ	93004029	1996	404 / 404	С	5	зерн	сс (310)		5	7		5	
Харківський 329 МВ	99004038	2003	404 / 404	Л	7	зерн	сс (320)		5	5		7	
Харківський 340 МВ	99004039	2002	404 / 404	Л	7	зерн	сс (340)		5	7		7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Харківський 325 МВ	98004093	2002	404 / 404	Л	5	зерн	сс (330)		5	7		5	
Шаланда МВ	® 03004040	2006	378 /	СЛ	7	зерн	с/с/350/		7-9	9		7-9	
Юніон	® 03004027	2006	311 /	СЛ	9	зерн	с/с/340/		8,5	9		7-9	
Ярем 326 МВ	® 02004059	2006	966 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/320/		8,5	9		7-9	
НК Хеліко	06004120	2009	1079 /	С	9-10	зерновий	сп (510)		8,6	9		9	
Аталіс	02004002	2003	806 /	С	7-9	зерн	сп/450/		9	9		9	
Бистриця 400 МВ	06004067	2009	311 /	С	9	зерновий	сп		8,6	9		9	
Бриз 396 МВ	01004026	2004	957 /	С зр	7	зерн	сп (410)		-	9		9	
Базис	01004046	2005	938 /	С	9	зерн	с/п (400)		9	9		9	
Башкіровець	® 04004012	2006	355 /	С	9	зерн	с/п/420/		8,5	9		7-9	
Бергксон	06004105	2010	1194 /	С	8	зерн	сп		8	9		9	
Дніпровський 425 МВ	92004008	1996	311 /	С	5	зерн	сп (420)		5	5		5	
ДКС 5143	05004006	2008	437 /	С	7-8	зерновий	сп (430)		8-9	8-9		9	
Дніпровський 453 СВ	00004024	2003	311 /	Сзр	7	зерн	сп (450)		7	7		7	
ДКС 4860	® 07004086	2010	437 /	С	9,3	зерн	сп		8,4	9		9	
ДКС 4490	® 07004081	2010	437 /	С	8,9	зерн	сп		8,2	9		9	
ДКС 5170	07004084	2010	437 /	С	9	зерн	сп		8	9		9	
ДКС 5276	® 07004090	2010	437 /	С	9	зерн	сп		8,2	9		9	
ДКС4983	07004087	2010	437 /	С	8,6	зерн	сп		8,2	9		9	
СВРО 401 СВ	® 99004029	2003	962 / 962	С	9	зерн	сп (400)		7	7		7	
Кодацький 442 СВ	® 02004039	2005	311 /	С	8	зерн	с/с (430)		9	9		9	
Леоніс	02004009	2004	806 /	С	7-9	зерн	сп (430)		8,5	9		9	
Легіон 400	® 04004078	2008	378 /	С	6-7	зерновий	сп (400)		8-9	9		9	
ЛГ3475	06004057	2010	793 /	С	8	зерн	сп		8	9		9	
ЛГ3395	® 07004128	2010	793 /	С	8	зерн	сп		8	9		9	
МАС 44А	06004110	2010	924 /	С	8	зерн	сп		8	9		9	
НК Нако	06004012	2009	1079 /	С	9	зерновий	сп (400)		7,8	9		9	
НС 444	93004120	1997	879 / 879	С	7	сил	сп (440)		>5	7		7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
НС 4015	® 07004101	2010	879 /	С	9,4	зерн	сп (400)		8,3	9		9	
НС 444 Ультра	® 07004092	2010	879 /	С	8,7	зерн	сп (400)		8,2	9		9	
НК Фортіус	06004119	2010	1079 /	С	8	зерн	сп		8	9		9	
НС 4010	® 03004017	2005	879 / 879	С	9	зерн	с/п (420)		9	9		9	
Одеський 480 МВ	97004023	2001	378 / 378	С	5	зерн	сп (480)		5	5		5	
ПР37Ф73	® 05004107	2009	767 /	С	8	зерновий	сп (430)		8,8	9		9	
ПР38А24	00004041	2003	767 /	Сзр	9	зерн	сп (400)		7	7		7	
ПР37К85	® 02004034	2005	767 /	С	9	зерн	с/п (410)		9	9		9	
ПР36Ь08	02004035	2006	767 /	С	7-9	зерн	сп/420/		7-9	9		9	
ПР36Д79	07004044	2010	1055 /	С	8,5	зерн	сп		8	9		9	
ПР35Т06	07004054	2010	1055 /	С	9	зерн	сп		8	9		9	
Пульс МС 402	® 04004091	2007	962 /	С	9,0	зерн	с/п/400/		8,5	8,7		9,0	
ПР37В05	04004023	2006	767 / 767	С	9	зерн	сп/420/		8,5	9		9	
Ріксер	05004097	2008	1194 /	С	6-7	зерновий	сп (400)		8	9		9	
Світ 400 МВ	® 01004008	2004	962 / 962	С зр	7-9	зерн	сп (400)			9		9	
Соколов 407 МВ	01004031	2004	311 /	С зр	7	зерн	сп (400)		9,0	9		9	
Стіра	94004102	1999	767 /	СЛ	5	зерн	сп (420)		5	7		5	
Сіско	02004084	2005	1079 /	С	8	зерн	с/п (420)		9	9		9	
Фуріо	91004126	1993	1079 /	С	7	зерн	сп (450)		5	7		7	
Аметист	01004009	2004	355 /	С	7-9	зерн	пс/520/		8,8	9		9	
Борисфен 600 СВ	® 99004032	2003	311 /	Сзр	9	зерн	пс (550)		7	7		7	
Бора (МС 02)	® 04004014	2006	273 /	С	9	зерн	п/с/500/		9	9		7-9	
Квартал	03004010	2006	806 /	С	9	зерн	пс/510/		8,6	9		7-9	
НК Тімік	06004002	2009	1079 /	С	11-12	зерновий	сп (500)		8,8	8,2		9,0	
НК Галактік	06004005	2009	1079 /	С	12	зерновий	сп (500)		9	9		9	
НС 640	93004045	1997	879 / 879	С	7	зерн	пс (600)		7	7		7	
Наддніпрянська 50	78004038	1982	411 /	С	5	зерн,сил	пс (570)		5	5		5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Пшениця шарозерна			-	1									
Шарада	05466001	2008	25 /										
Сільськогосподарські: бобові													
Горох посівний			-	43									
Берсек	04001015	2009	500 /	СЛП	5 -7	зерн	сп		7 -8	5 -7	7 -9	7 -9	фж
Беркут	94001001	1999	520 /	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Баритон	® 07001008	2010	926 /	СЛП	5 -7	зерн	сс		7 -9	7 -9	7 -8	7 -9	фж
Готівський	02001003	2006	946 /	СЛ	7-9	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	7	фж
Гарде	® 05001010	2009	934 /	ЛП	7 -9	зерн	сп		5 -7	7 -9	7 -9	7 -9	фж
Глянс	® 04001010	2008	404 /	СЛ	7-8	зерн	сс		5-7	5-8	5-8	5-7	зерн
Девіз	® 03001007	2007	404 / 404	СП	7-8	зерн	сс		7-8	5-7	7-9	5-7	фж
Ефектний	® 02001001	2006	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5	5-7	5-7	фж
Елегант	98001002	2002	305 /	Л	5-7	зерн	рс		5-7	5	5-7	5-7	фж
Зіньківський	03001005	2008	386 /	Л	7-8	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Йезеро	03001001	2005	879 / 879	Л	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	7-9	фж
Кео	96001003	2004	1153 /	СЛ	7	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Камертон	® 01001004	2005	404 / 404	ЛП	7	зерно	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Комбайновий 1	99001003	2003	1121 /	Л	7	цін	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Красноградський 8	92001003	1996	399 /	П	5	зерн	сс		5	5	5-7	5	фж
Кардіфф	96001004	2004	1153 /	СЛ	7-9	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Камелот	® 04001004	2006	888 /	ЛП	5-7	зерн	сс		5	7	7	5-7	фж
Конто	® 03001011	2006	912 /	Л	5-7	зерн	сс		5	7	7	5-7	фж
Клеопатра	® 07001005	2010	926 /	СЛП	5 -7	зерн	сс		5 -7	6 -8	6 -8	7 -9	фж
Лавр	05001004	2009	25 /	СЛП	5-7	зерн	сс		5 -7	5-6	7 -9	7 -9	фж
Мадонна	® 00001004	2003	912 / 912	СЛП	9	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Модус	® 01001003	2004	404 / 404	Л	7	зерн	сс		5-7	7-9	5-7	5-7	фж

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Маскара	® 05001006	2009	824 /	СЛП	7 -9	зерн	сс		7 -9	7-9	7 -9	7 -9	фж
Намисто	02001002	2006	334 /	П	5	зерн	сс		5	5	5-7	5	фж
Оплот	07001004	2010	404 /	СЛП	5 -7	зерн	сс		7 -8	7 -9	8	7 -9	фж
Отаман	07001003	2010	404 /	СЛП	5 -7	зерн	сс		7 -8	7 -8	8	7 -9	фж
Петроніум	® 04001008	2008	376 /	ЛП	7-9	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Степовик	01001006	2004	309 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Схід	98001005	2001	520 /	ЛС	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5-7	фж
Стартер	® 06001003	2010	912 /	ЛП	7-8	зерн	сс		7-8	7-8	7-8	7-9	фж
Стабіл	06001009	2009	1034 /	СЛП	7-8	зерн	сс		7-8	8-9	7-8	7-8	фж
Світ	03001003	2006	378 /	П	5-7	зерн	сс		7	7	5-7	5-7	фж
Терно	® 07001001	2009	880 /	СЛП	7-9	зерн	сс		7-8	6-8	7-8	7-9	фж
Улус	® 05001011	2009	334 /	ЛП	5 -7	зерн	сп		7-9	7-9	7 -9	7 -9	фж
Факел	06001008	2010	376 /	СЛП	5-7	зерн	ср		7-8	5	7-8	7-8	фж
Фаргус	® 04001007	2007	376 /	ЛП	7-8	зерн	сс		7-8	7-8	7-9	5-7	фж
Харді	® 00001003	2004	912 / 912	СЛП	7-9	зерн	сп		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Харківський сталонний	® 97001008	2002	404 / 404	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Царевич	® 04001009	2008	404 /	ЛП	5-7	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	цін
ЧБЛ-5	® 05001008	2009	404 /	СЛП	5 -7	зерн	сс		5 -7	5 -7	5 -7	7 -9	фж
Чекбек	® 05001007	2009	404 /	СЛП	5-7	зерн	сс		7 -8	7 -9	7 -9	7-9	фж
Явор	03001002	2005	879 / 879	ЛП	7-9	зерно	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Сочевиця харчова			- 4										
Любава	03089001	2005	309 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цінн
Луганчанка	89089001	1997	520 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5-7	цін
Ліцза	05089001	2008	311 /	С	7-8	зерн	сс		7-8	7-8	7-9	5-7	цін
Світанок	01089001	2002	520 /	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Нут звичайний			-	7									
Буджак	® 05088001	2008	378 /	С	5-7	зерн	сс		9	9	9	9	цін
Пам'ять	99088001	2002	378 / 378	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Пегас	® 03088002	2005	378 / 378	С	7	зерно	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Слобожанський	02088001	2004	399 /	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Тріумф	® 03088001	2005	378 / 378	С	7	зерно	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Чина посівна			-	1									
Сподіванка	04090001	2006	311 /	Л	7	зерн	сс		5	5	5	5	цін
Квасоля звичайна			-	13									
Буковинка	02087003	2004	432 /	ЛС	7	зерно	сс		7	7	7	7	
Двадесятица	® 07087002	2009	879 /	ЛП	7	зерн	р		7 -9	9	9	7 -8	цінн
Докучаєвська	94087004	2000	405 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5-7	цін
Дніпрянка	03087001	2005	311 / 399, 311	С	7	зерно	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Златко	® 07087001	2009	879 /	ЛП	7	зерн	сс		9	9	9	7 -8	цін
Мавка	98087004	2001	345 / 345	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Надія	99087001	2001	432 /	Л	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	цін
Первомайська	89087001	1994	406 /	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Перлина	® 04087003	2006	345 /	Л	5	зерн	сс		5	5	5	5	цін
Сільськогосподарські: круп'яні													
Гречка їстивна			-	22									
Антарія	99002001	2002	1117 / 345	СЛП	7	зерн	ср	7	7	7	7	5	х
Амазонка	® 05002001	2008	1192 /	Л	5	зерн	ср	7	7	7	7	8	х
Вікторія	64002001	1969	371 /	ЛП	5	зерн	сп	5	5	5	5	5	х
Дикуль	07002002	2010	201 /	П	5	зерно	сс		7,0	8,0	8,0	7	харч
Дев'ятка	07002001	2010	201 /	С,Л	7	зерно	сс		8,0	8,0	8,0	5	ціння

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Слена	00002004	2005	417/	ЛП	7	зерн	сс	7	7-8	7-8	7-8	8	х
Зеленоквіткова 90	90002002	1995	417/417	П	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	х
Іванна	92002001	1997	392/	С	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Крупинка	86002002	1990	392/	СЛ	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Кара-Даг	91002001	1996	417/417	С	5	цін	сс	5	5	5	5	5	цін
Крупнозелена	® 04002003	2008	483/	Л	7	зерн			7	8	7	8	х
Лілея	83002003	1987	345/	ЛП	5	зерн	ср	5	5	7	7	5	цін
Оранта	® 05002002	2007	345/	СЛП	5	зерн	ср	7	7	7	7	7	х
Роксолана	94002004	2000	417/417	П	7	зерн	ср	7	7	7	7	5	х
Рубра	01002001	2004	417/417	ЛП	5	зерно	сс	7	7	7	7	7	х
Степова	92002005	1999	417/417	С	5	зерн	сс	5	5	7	7	5	х
Сумчанка	80002003	1985	392/	СЛ	7	зерн	рс	5	5	7	7	5	цін
Слобожанка	00002002	2004	392/	СЛП	8	зерно	сс	7	8,.2	7,9	7,8	8	цін
Син-3/02	® 07002003	2010	345/	С Л П	7-9	зерн	сс		8,0	8,0	8,0	7	харч
Українка	92002007	1997	345/345	СЛП	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Ювілейна 100	® 05002003	2008	392/	П	5	зерн	сс	7	7	7	7	8	х
Ярославна	® 06002003	2009	392/	С	8	зерн	рс	9	7	9	8	9	х
Просо посівне			- 20										
Веселоподільське 16	97006001	2000	388/	СЛП	7	зерн	сп	5	5	7	7	5	х
Вітрило	® 05006002	2008	404/	С	7	зерн			8	8	8	8	х
Денвікське	® 02006002	2006	334/	П	5	зерн	сп	5	7	7	5	7	х
Золотисте	00006001	2003	388/	Л	7	зерн	ср	7	7	7	7	7	цін
Золушка	® 01006002	2006	386/	ЛП	7	зерн	рс	7	7	7	7	7	цін
Київське 96	96006002	1999	345/345	Л	7	зерн	рс	7	5	7	7	5	цін
Київське 87	87006002	1991	345/345	СЛП	7	зерн	ср	7	7	5	7	5	цін
Козацьке	07006003	2010	404/	С Л П	8	зерн	сс		8,0	8,0	8,0	9	харч
Константинівське	® 02006001	2006	404/	С	7	зерн	ср	5	7	5	7	7	цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Лана ®	04006001	2006	334 /	Л	7	зерн	сс	5	5	7	7	7	х
Миронівське 51	69006002	1978	341 / 341	СЛП	7	зерн	сп	7	7	7	7	5	цін
Новокиївське 01	00006003	2004	345 / 345	ЛП	8	зерно	сс	7	8	8	7	8	зерно
Омріяне ®	02006003	2005	345 / 345	СЛП	7	зерн	ср	7	8	8	7	8	цін
Олітан ®	05006001	2008	388 /	СП	8	зерн	сс	5	8	7	8	8	х
Полтавське золотисте ®	01006001	2005	386 /	ЛП	7	зерн	ср	7	8	7	8	7	цін
Слобожанське	98006004	2001	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Таврійське ®	04006002	2006	1192 /	С	7	зерн	ср	5	7	7	7	7	х
Харківське 31	93006002	1996	404 / 404	СЛ	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Харківське 57	84006003	1987	404 / 404	СЛП	7	зерн	сп	7	7	7	7	5	цін
Ювілейне ®	05006003	2009	404 /	П	7	зерн	сс		9	7	7	9	х
Сорго звичайне двокольорове			- 26										
Бургго ®	05064003	2008	1194 /	Л	7	зерн	рс		8	7	8	8	х
Даш Е	03064001	2005	29 /	С	8	зерн	ср	7	7	8	8	8	х,фж
Дніпровський 39	94064006	2000	340 /	С	7	х	сс	7	7	7	7	7	х,фж
Кримдар 10	87064005	1992	361 /	С	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	х,фр
Кримбел	87064004	1992	361 /	С	5	зерн	сс	5	7	5	7	5	х,фр
Кейрас F1	00064001	2003	806 /	С	7,5	зерно	ср	7,8	8	8	7,6	8	х,фж
Ковчег ®	04064003	2007	414 /	СЛ	7	зерн	рн		7	7	7	8	х,фр
Максим ®	01064002	2005	309 /	Л	7	зерн	ср	7	7	7	7	7	х,фж
Одеський 205	91064001	1995	378 / 378	С	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	х,фр
Прайм	04064001	2006	29 /	СЛ	7	зерн	рс		7	7	7	8	х,фр
Анна ®	01064003	2004	309 / 361	С	7	зерно	ср	7	7,4	7,5	7,4	7	х,фж
Аракан	07064011	2010	1237 /	С,Л	7	зерно	ср	-	8	8	8	7	х,фж
Арліс	07064010	2010	1237 /	С,Л	8	зерно	ср	-	8	9	9	7	х,фр
Дніпрельстан	02064005	2006	311 /	СЛ	7	зерн	ср		7	7	7	8	х,фр
Космосол	03064004	2006	767 /	С	7	зерн	сс		7	7	7	7	х,фр

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Краєвид	01064001	2004	311/	С	7	зерно	ср	7	8	7,5	7,4	7,4	х,фж
Лан 59	02064004	2007	311/	СЛ	7	зерн	рн		8	7	7	8	х,фр
ПР88У20	06064008	2009	767/	Л	9	зерн	ср		9	9	9	9	х,фж
Спринт W 341/22	03064003	2005	29/	С	8	зерн	ср	7	7	8	8	8	х,фж
Спринт 2	03064002	2005	29/	С	8	зерн	ср	7	7	8	8	8	х,фж
Сонцедар	06064006	2010	800/	С	7	зерно	ср	-	8	9	9		х,фж
Свіфт 380/79	04064002	2006	29/	СЛ	7	зерн	рс		8	8	7	7	х,фр
Алба F1	® 07064002	2010	879/	С	9	зерн	сс		8	9	9	9	х
НС-1	® 07064001	2010	879/	С	8	зерн	сс		7	9	9	9	х
Соларіус	07064008	2010	1237/	С	8	зерно	пс	-	8	9	9	7	х,фж
Фулгус	07064009	2010	1237/	С,Л	8	зерно	пс	-	8	8	8	7	х,фж
Сориз			- 14										
Атлант	® 08330001	2010	378/	С	8	х	ср		9	9	9	9	х
Дарунок	00330002	2003	378/378	С	7	х	ср	5	5	7	7	7	х
Дружний	® 01330001	2005	378/378	С	7	х	рс	7	7	8	8	7	х
Ізумруд	00330001	2003	378/378	С	7	х	ср	5	7	7	7	7	х
Крупинка 10	00330003	2003	361/361	С	7	х	ср	5	7	7	7	7	х
Коричневе 11	00330005	2003	361/361	С	7	х	ср	7	5	7	7	7	х
Кварц	® 05330001	2008	378/	С	8	х	рс		8	8	8	8	х
Одеський 302	95330002	1999	378/378	С	7	х	ср	7	5	7	7	7	х
Прогрес F1	00330004	2002	361/361	С	7	х	ср	5	5	7	7	7	х
Самаран 6	® 04330002	2006	311/	С	7	х	рс		7	7	7	7	х
Титан	® 06330002	2008	378/	С	7	х	рс		7	8	8	7	х
Наш	® 06330001	2009	361/	С	6	х	сс		8	8	8	8	х
Салют	® 04330001	2008	378/	С	8	х	рс		8	8	8	8	х
Тразерко	06330003	2009	311/	С	8	х	сс		8	8	8	7	х

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Рис посівний ярий			- 16										
Антей	® 02009009	2005	412 /	С	8	зерн	сп	7		7	7	8	цін
Агат	® 04009001	2007	412 /	С	7	цін	рс	7		7	7	7	зерн
Пам'яті Гічкіна	® 02009008	2005	412 /	С	7	зерн	сс	7		7	7	8	харчовий
Престиж	® 05009003	2008	412 /	С	6	зерн	рс		8	8	8	8	х
Серпневий	® 05009004	2009	412 /	С	7	зерн	рс		8	6	8	7	х
Україна 96	96009003	2001	412 / 412	С	7	зерн	ср	7		7	7	5	х
Янтарний	® 02009010	2005	412 /	С	7	зерн	рс	7		7	7	8	цін
Аметист	05009002	2008	15 /	С	8	зерн	сс		8	7	8	8	х
Віконт	® 07009001	2009	412 /	С	9	зерн	сс		8	8	8	7	х
Вікторія	® 09009002	2009	15 /	С	6	харч	сс		7	9	9	7	зерн
Гарант	® 09009004	2009	15 /	С	7	харч	сс		7	6	8	7	зерн
Онтаріо	08009001	2010	412 /	С	9	харч	сс		8	6	6	9	зерн
Преміум	06009001	2009	412 /	С	8	зерн	сс		8	7	8	6	х
Ренар	® 09009001	2009	15 /	С	7	харч	сс		8	6	8	7	зерн
Флагман	® 09009003	2009	15 /	С	8	харч	сс		8	9	9	7	зерн
Янтар	05009001	2008	15 /	С	7	зерн	сс		7	7	7	8	цін
Сільськогосподарські: олійні та прядивні													
Соняшник однорічний			- 337										
8Х449ДМ	07017031	2010	918 /	СЛ	7 -9	вол	скс		9	9	9	9	вл
Аліенор	98017003	2001	806 /	Л	8	олн	скс		5	7-9	8	5	вл
Байда	98017039	2003	329 / 329	СЛ	5	олн	скс		6	8	8	5	вл
Байзер КЛ	07017032	2010	918 /	СЛ	8	вол	скс		8	9	9	8	вл
Блейзер	® 06017016	2008	684 /	СЛ	8	вол	скс		8,5	8	8	9	вл
Візит	97017021	2000	879 /	С	5	олн	скс		5	7-9	7-9	5	вл
Деркул	® 99017012	2004	1083 /	СЛ	7	олн	скс		7	8	8	7	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Донбас	® 01017015	2004	1083 /	СЛ	7	олн	скс		7	8	8	7	вл
Єнсй	® 99017021	2002	404 / 404	СЛ	8	вол	скс		6	7-9	8	7	вл
Злива	® 99017008	2002	378 /	С	7	олн	скс		7	8	7-9	7	вл
Зубр	® 01017029	2004	378 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	8	8	вл
Заклик	® 01017040	2004	1114 /	Л	7	олн	скс		8	9	8	7	вл
Захват	® 02017038	2006	378 /	СЛ	7	олн	скс		9	8	8	8	вл
Завіт	® 02017040	2005	378 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	9	8	вл
Заграва	04017010	2007	736 /	Л	8	олн	скс		8	8	9	8	вл
Ілона КЛ	07017034	2010	918 /	СЛ	8	вол	скс		8	9	9	8	вл
Кий	97017022	2000	404 / 404	С	7-9	олн	скс		5	8	8	7-9	вл
Каліда	® 05017098	2009	924 /	СЛ	8	олн.	скс		8,5	8,8	9	8	вл
Курсор	07017057	2010	404 /	СЛ	7	пал	скс		8	9	9	8	вл
Мараска	® 05017096	2009	924 /	СЛ	7-9	олн.	скс		8,5	8,8	8	8,5	вл
МАС 92В	® 05017097	2009	924 /	СЛ	7-9	олн.	скс		8	8,8	9	8,5	вл
МН6320	07017026	2010	1219 /	СЛ	8	олн.	скс		8	9	9	8	вл
МАС 91ІР	07017097	2010	924 /	СЛ	7-9	олн	скс		8	9	9	8	вл
МАС 94С	® 05017099	2008	924 /	СЛ	9	олн	скс		9	9	8,5	8,5	вл
Мілонга	® 05017016	2008	924 /	СЛ	8	олн	скс		8	9	8	8,3	вл
МАС 97А	® 05017024	2008	924 /	СЛ	8	олн	скс		8,5	9	8	9	вл
Монарх	® 05017004	2007	879 /	СЛ	8	вол	скс		9	8,5	9	8	вл
МАС 96А	® 05017017	2008	924 /	СЛ	8	олн	скс		8,5	8	8	8,5	вл
Міраж	® 03017009	2007	216 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	8	7	вл
Мірослав	® 04017034	2007	1141 /	СЛ	7	олн	скс		8	9	8	8	вл
НС-Х-6044	07017049	2010	879 /	СЛ	8	олн	скс		8	9	9	8	вл
НС-Х-6059	07017047	2010	879 /	СЛ	9	олн	скс		8	9	9	8	вл
Онікс	® 04017067	2007	919 /	СЛ	7	конд	скс		8	8	8	8	сл
Оливер	06017076	2010	879 /	СЛ	8	вол	скс		8	9	9	9	вл
ПР62А91	00017017	2003	767 /	СЛ	8	олн	скс		6	8	8	7	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Прометей	97017033	2001	329 / 329	С	5	олн	скс		5	7-9	7-9	5	вл
Принц	05017050	2009	1034 /	СЛ	7	олн.	скс		8,5	9	9	8,5	вл
ПСФ 4639	® 06017015	2008	684 /	СЛ	8	вол	скс		8,5	9	8,5	9	вл
Партнер	03017018	2005	126 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	9	7	вл
ПР64Г34	07017017	2010	1055 /	СЛ	8	олн	скс		7	9	9	8	вл
ПАЛ - 035	07017076	2010	1227 /	СЛ	8	олн	скс		8	9	9	8	вл
Політ 2	® 07017003	2010	329 /	СЛ	7-9	олн	скс		8	9	9	8	вл
ПАЛ - 175	07017075	2010	1227 /	С	8	олн	скс		8	9	8	8	вл
Прімі	07017010	2010	879 /	СЛ	8	олн	скс		9	9	9	9	вл
Ранок	99017023	2003	1110 /	Л	5	конд	скс		5	7	8	6	сл
Рейна	® 06017012	2008	273 /	СЛ	8	олн	скс		8,5	9	8	8,2	вл
РІМІ 2	® 07017009	2010	879 /	СЛ	8	олн	скс		9	9	9	9	вл
Рябота	® 05017014	2008	329 /	С	7	олн	скс		8	8	8	8,5	вл
Регіон	® 07017004	2010	329 /	СЛ	7-9	олн	скс		8	9	9	8	вл
Сонячний настрій	04017011	2007	736 /	Л	7	олн	скс		8	8	9	8	вл
Сотник	® 05017066	2008	1121 /	Л	7	олн	скс		8	8,5	8	8	вл
Спіру	® 05017023	2008	924 /	СЛ	8	олн	скс		8	9	8	8,5	вл
Степок	® 04017071	2008	1059 /	Л	7	олн	скс		8,3	9	8	8,5	вл
Сілует	® 08017009	2010	989 /	СЛ	7-9	олн	скс		8	9	9	8	вл
Сувенир	02017007	2005	329 /	Л	7	олн	скс		8	8	7	7	вл
Тіса	95017005	2000	879 / 879	С	7-9	олн	скс		5	7-9	7-9	5	вл
Трубіж	07017058	2010	404 /	СЛ	8	олн	скс		8	9	9	8	вл
Титанік-ПР	07017051	2010	879 /	С	7-9	олн	скс		8	9	9	8	вл
Тріумф	03017025	2007	16 / 1112	Л	7	олн	скс		8	8	8	7	вл
Українське сонечко	00017008	2004	736 /	Л	7	олн	скс		8	7	8	7	вл
Український скоростиглий	98017052	2001	736 /	СЛ	5	олн	скс		5	8	8	5	вл
Флокс	® 02017037	2005	1114 /	СЛ	7	олн	скс		7	8	9	8	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Федот	06017073	2010	126 /	СЛ	7 -9	олн	скс		8	9	9	9	вл
Харківський 49	88017007	1992	404 / 404	СЛ	5	олн	скс		5	5	7-9	5	вл
Ясон (к)	04017042	2007	404 /	СЛ	9	олн	скс		8	8,5	9	8	вл
Альянс	95017025	1999	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Альтес РМ	98017005	2002	806 /	Л	8	олн	рс		6	7	8	5	вл
Альманзор	98017054	2002	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	8	8	5	вл
Ант (к)	01017025	2004	404 / 404	СЛ	7	вол	рс		8	8	8	7,5	вл
Атланта	01017001	2004	806 /	Л	7	олн	рс		7	8	8	7	вл
Альзан	98017004	2001	806 /	Л	8	олн	рс		6	7-9	7-9	5	вл
Айтана	00017002	2003	806 /	СЛ	8	олн	рс		6	8	8	6	вл
Армада КЛ (к)	06017013	2009	273 /	СЛ	8	олн	рс		8,5	9	9	8,5	вл
Антрацит (к)	05017062	2009	378 /	СЛ	7	вол	рс		8,6	8,8	8	8,5	вл
Алісон	02017001	2006	806 /	С	8	олн	рс		8	9	8	8	вл
Аріадна Сваліс	05017078	2008	806 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
Айдар (к)	04017070	2008	1059 /	СЛ	7	олн	рс		8,5	8,5	8	8,7	вл
Анонс (к)	02017028	2005	378 /	С	8	олн	рс		7	8	7	7	вл
Алмаз (к)	03017008	2005	1192 /	СЛ	8	конд	рс		8	8	7	7	вл
Балкан	00017013	2004	879 / 879	Л	8	олн	рс		7	7	8	7,5	вл
Богун (к)	04017047	2008	404 /	Л	8	вол	рс		8,5	8,5	8	8,5	вл
Боєць (к)	04017044	2008	404 /	Л	8	олн	рс		8	8	8	8,5	вл
Віталія	01017016	2003	886 /	СЛ	7-9	олн	рс		7	8	8	7	вл
Відок (к)	03017020	2005	924 /	СЛ	9	олн	рс		9	8	8	8	вл
Віста	05017009	2007	485 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,7	9	8	вл
Джазі	01017038	2004	1079 /	Л	9	олн	рс		8	9	8	7,5	вл
Дунай	92017043	1996	879 / 879	С	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Донський 60	82017010	1987	216 /	С	8	олн	рс		7	7	8	8	вл
Драган (к)	02017011	2004	1141 /	Л	8	олн	рс		8	9	8	7,5	вл
Дарій (к)	02017024	2005	404 / 404	СЛ	8	вол	рс		7	8	9	8	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Доріана	04017041	2008	938 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	8	8	вл
Дрофа	06017040	2010	886 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	9	9	вл
Ендуро	05017068	2009	938 /	С	7-9	олн	рс		8,7	9	9	8,5	вл
ЕС Прімс Свраліс	04017012	2009	806 /	С	8	олн.	рс		8,5	8,8	9	8,5	вл
ЕС Лоліта	05017080	2009	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		8,8	8,8	9	8,5	вл
ЕС Віскі	07017081	2010	806 /	СЛ	9	олн	рс		9	9	9	8	вл
ЕС Веніція	07017082	2010	806 /	С	9	олн	рс		8	9	9	9	вл
Ес Карамба	03017012	2006	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		8	9	8	8	вл
ЕС Ізабелла	05017079	2008	806 /	СЛ	8	олн	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
ЕГХ786	® 07017083	2010	806 /	СЛ	8	вол	рс		8	9	9	8	вл
Евіта	06017031	2010	843 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	9	8	вл
ЕС Біба	04017014	2009	806 /	С	7	олн.	рс		8,5	8,8	9	8,5	вл
ЕС Флоріміс	06017052	2010	806 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8	вл
ЕС Петунія	® 07017084	2010	806 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8	вл
Етюд	01017026	2005	404 /	СЛ	8	олн	рс		9	8	9	7	вл
Свропа	® 06017032	2010	1107 /	СЛ	7-9	олн	рс		8	8	9	8	олн
Жалон	06017021	2009	806 /	СЛ	8	олн	рс		8,5	9	9	8,5	вл
Знахідка	® 99017011	2002	1114 / 1114	С	8	олн	рс		6	8	8	6	вл
Запорізький 32	98017038	2003	329 / 329	СЛ	5	олн	рс		5	8	8	5	вл
Захист	® 99017010	2003	1114 / 1114	С	8	олн	рс		6	8	8	6	вл
Запорізький 28	97017035	2001	329 / 329	Л	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Запорізький 26	97017024	2000	329 / 329	С	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Запорізький кондитерський	94017001	1998	329 / 329	Л	5	конд	рс		5	5	7-9	5	сл
Зевс	04017006	2007	879 /	Л	8	олн	рс		8	8,8	9	8,5	вл
Зоренад	® 05017054	2009	404 /	СЛ	7	вол	рс		8,5	8,9	9	8,5	вл
Златибор	® 04017021	2006	879 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	9	7	вл
Застава	01017041	2005	1114 /	СЛ	8	олн	рс		7	8	9	8	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Злата	01017039	2005	1114 /	Л	8	олн	рс		7	8	9	8	вл
Залік	® 01017030	2005	378 /	СЛ	7	олн	рс		7	8	9	7	вл
Ізард	01017003	2003	793 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	8	8	7	вл
Іберіко	04017028	2007	793 /	Л	8	вол	рс		8	8,5	9	8	вл
Імператор	® 04017031	2006	1141 /	С	7-9	олн	рс		8	8	8	7	вл
Красотка РМ	98017028	1997	806 /	СЛ	5	олн	рс		5	8	8	5	вл
Ковчег	® 00017007	2003	404 / 404	Л	8	олн	рс		6	7-9	8	7	вл
Красотка	91017023	1997	806 /	СЛ	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
КВС Гелія 06	® 03017050	2006	938 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8	вл
Капрал	® 05017052	2008	404 /	СЛ	7,5	пальм	рс		8	9	8,5	8,5	вл
Каньон	® 04017032	2006	1141 /	СЛ	7-9	олн	рс		9	8	9	8	вл
Квін	® 04017045	2008	404 /	СЛ	7	олн	рс		8,5	9	8	9	вл
Каменяр	® 07017001	2010	329 /	СЛ	8	олн	рс		7	9	9	8	вл
Ксенія	06017042	2010	886 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	8	8	вл
Кодіфлю	05017085	2009	485 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	9	9	8,5	вл
КВС Гелія 04 РО	03017051	2007	938 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,6	9	8	вл
Косово	® 05017003	2007	879 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	8,5	9	8	вл
Лейла	® 05017007	2007	806 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,5	9	8	вл
Лиман	® 04017072	2008	1059 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	8,5	8	8	вл
Лайка	05017010	2007	485 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,8	9	8	вл
Лакомка	03017022	2006	16 / 1112	Л	8	конд	рс		8	8	8	7	сл
Латіно	04017029	2007	793 /	Л	8	вол	рс		7	8	9	8	вл
Ларісса	07017008	2010	883 /	СЛ	7 -9	олн	рс		8	9	9	9	вл
Мегасан	98017001	2001	719 /	СЛ	7	олн	рс		6	8	8	5	вл
Морава	® 05017002	2007	879 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8,5	вл
МН 5319	05017093	2008	1219 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
МН 7268	06017071	2010	1219 /	Л	8	олн	рс		8	9	9	8	вл
МН 4318	05017094	2009	1219 /	СЛ	7-9	олн	рс		8,5	8,8	8	8,5	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
МН 6219	07017006	2010	1219 /	СЛ	9	олн	рс		9	9	9	9	вл
МАС 960Л	07017098	2010	924 /	СЛ	8	олн	рс		7	9	9	8	вл
Меридиан	04017007	2006	879 /	СЛ	8	олн	рс		8	8	9	8	вл
Максимус	07017056	2010	404 /	СЛ	8	вол	рс		8	9	9	8	вл
Мастер	03017023	2006	16 / 1112	Л	8	олн	рс		7	7	8	7	вл
Маріца	07017062	2010	1221 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	9	8	вл
МН 5203	05017095	2009	1219 /	СЛ	7-9	вол	рс		8,5	8,8	9	8,5	вл
МАС 98М	07017095	2010	924 /	Л	9	олн	рс		8	9	9	8	вл
Надійний	02017008	2004	329 / 329	Л	9	олн	рс		7,5	8	8	7	вл
НС Сумо 2017	® 06017074	2010	879 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	9	9	вл
НС-Х-2063	® 07017043	2010	879 /	С	9	олн	рс		8	9	9	9	вл
Наллімі	05017081	2009	1194 /	СЛ	8	олн	рс		8,5	8,8	9	8,5	вл
НС-Х-6043	07017048	2010	879 /	СЛ	8	олн	рс		7	9	9	8	вл
НС Сумо 2018	® 06017078	2010	879 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	9	9	вл
НС Сумо 2019	® 06017077	2010	879 /	Л	9	олн	рс		8	9	9	9	вл
НС-Х-6042	07017044	2010	879 /	Л	7-9	олн	рс		8	9	9	8	вл
НС-Х-6046	07017045	2010	879 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8	вл
НПК 1207	06017007	2008	679 /	Л	8	олн	рс		8,5	9	8,5	8	вл
Олстар РМ	98017057	2002	806 /	Л	8	олн	рс		6	8	7-9	6	вл
Одеський 249	92017055	1998	378 / 378	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Оллімі	05017089	2010	1194 /	СЛ	8	вол.	рс		8	9	9	8	вл
Орасол	03017005	2008	1219 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	9	8	8,5	вл
Олівер 90	® 02017031	2006	378 /	С	7	вол	рс		8	8	8	7	вл
Оскіл	® 04017050	2007	404 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	8,7	9	8,5	вл
Одор	® 00017014	2005	378 /	С	7	вол	рс		7	8	7	7	вл
ПР64Г51	00017019	2004	767 /	СЛ	8	вол	рс		8	9	8	8	вл
ПР63А90	98017044	2001	767 /	Л	8	олн	рс		6	7-9	8	7	вл
ПР64А63	00017020	2004	767 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	8	8	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
ПАЛ - 093	07017079	2010	1227 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	9	вл
ПР64Г45	04017027	2006	767 /	СЛ	8	вол	рс		8	9	9	8	вл
ПСФ - 03	® 06017017	2009	690 /	С	7	олн	рс		8,4	9	9	8,5	вл
Президент	® 04017033	2006	1141 /	С	8	олн	рс		8	9	9	7	вл
ПАЛ - 0117	07017080	2010	1227 /	С	8	олн	рс		8	9	9	8	вл
ПСФ - 02	® 06017018	2008	690 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	9	8,5	8	вл
ПР63А40	® 04017024	2007	767 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	9	9	8	вл
ПР64Ф66	06017026	2010	767 /	СЛ	9	олн	рс		9	9	9	8	вл
ПАЛ - 083	07017077	2010	1227 /	СЛ	8	вол	рс		8	9	9	8	вл
ПР64Г46	07017018	2010	1055 /	С	9	олн	рс		8	9	9	8	вл
ПР63Г40	07017016	2010	1055 /	Л	8	олн	рс		8	9	9	8	вл
Помар РМ	03017013	2009	806 /	СЛ	8	олн.	рс		8,5	8,8	9	8,7	вл
Пасіфік	05017086	2008	806 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
ПР63А86	® 05017075	2008	767 /	СЛ	8	олн	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
Рюрик	® 06017039	2010	404 /	Л	8	олн	рс		8	9	9	9	вл
Рімісол	® 02017043	2006	879 /	СЛ	7	олн	рс		8	9	8	8	вл
Родник	03017024	2006	16 / 1112	С	7	олн	рс		7	7	8	7	вл
Раут	07017055	2010	404 /	СЛ	8	вол	рс		8	9	9	8	9
Рими	® 02017044	2005	879 / 879	СЛ	8	олн	рс		7	8	8	8	вл
Романс	® 06017038	2010	404 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	9	9	вл
Румбасол ОР	06017060	2008	1219 /	С	8	олн	рс		8	9	8	8,5	вл
Ригасол ОР	03017029	2008	1219 /	СЛ	7	олн	рс		8	9	8	8,5	вл
Сюжет	® 05017063	2009	378 /	С	8	олн	рс		8,5	8,5	8	8,8	вл
Світоч	92017004	1996	404 / 404	СЛ	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Савінка	94017009	1999	1079 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Слав'янин	94017042	1999	329 / 329	СЛ	5	вол	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Сирена (МС)	® 04017022	2006	273 /	Л	7	олн	рс		8	8	9	8	вл
Символ	® 02017029	2006	378 /	СЛ	8	олн	рс		7	8	8	7	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Селянин	® 05017064	2009	378 /	С	7	олн	рс		8,5	8,5	8	8,5	вл
Сержан	04017008	2006	879 /	Л	8	олн	рс		8	9	9	8	вл
Сальза РМ	® 05017006	2008	806 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	9	8,5	8	вл
С 70165	03017011	2005	719 /	СЛ	9	олн	рс		8	8	9	8	вл
Сумчанин	01017024	2005	919 /	С	7	олн	рс		7	8	7	7	вл
Сан Лука	07017063	2010	1221 /	СЛ	7-9	олн	рс		8	9	8	8	вл
Сорока	06017041	2010	886 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	9	8	вл
Старобільський	02017004	2005	1083 /	Л	8	олн	рс		7	7	8	7	вл
Тітанік	® 02017009	2004	1141 /	Л	9	олн	рс		8	9	8	7,5	вл
Теіде	98017055	2002	806 /	Л	8	вол	рс		6	8	8	7	вл
Терра	® 05017005	2007	806 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8,5	вл
Тайфун	® 03017010	2006	216 /	С	7	олн	рс		8	8	9	8	вл
Український F1	97017018	2001	736 /	СЛ	5	олн	рс		5	8	8	5	вл
Ультрасол	05017092	2009	1219 /	СЛ	7-9	вол	рс		8,7	9	9	8,5	вл
Франкасол	® 94017027	1999	1219 / 437	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Флексісол КЛ	05017091	2009	1219 /	СЛ	9	олн	рс		8,8	9	9	8,5	вл
Філліа	® 05017084	2008	1194 /	СЛ	8	олн	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
Форте ОР	06017059	2008	1219 /	С	8	олн	рс		9	9	8,5	8	вл
Флагман	03017026	2006	16 / 1112	Л	8	олн	рс		7	8	8	8	вл
Фрагмент	® 02017034	2005	1114 /	СЛ	7	олн	рс		8	8	9	8	вл
Форвард	® 05017053	2008	404 /	СЛ	8	олн	рс		8,5	9	8,5	9	вл
Фабіола КС	06017010	2008	485 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	8,5	8,5	вл
Хорс	04017009	2006	879 /	Л	8	олн	рс		8	9	8	8	вл
ЧаС	® 03017047	2007	919 /	Л	7	олн	рс		8	8	9	7	вл
Шанс	® 04017038	2008	922 /	СЛ	7	олн	рс		8,5	8	8	8,5	вл
Ягуар	94017021	1999	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Яніна	® 06017075	2010	879 /	СЛ	9	олн	рс		9	9	9	8	вл
Арена ПР	01017012	2003	1079 /	СЛ	8	олн	ср		6	7-9	8	7	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Аламо	94017019	1999	806 /	СЛ	7-9	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
Альбатр	06017058	2010	806 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	9	9	вл
Альліум РМ	04017013	2006	806 /	С	7	олн	ср		8	8	9	7	вл
Белград (к)	02017012	2004	1141 / 879	Л	8	олн	ср		8	8,5	8	7,8	вл
Базальт (к)	05017065	2008	378 /	СЛ	9	олн	ср		8,5	8,5	9	8,5	вл
Болліл	06017053	2010	1194 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	9	8	вл
В 306	92017046	2000	901 /	С	5	олн	ср		5	5	7-9	5	вл
Вранац (к)	03017016	2006	879 /	Л	8	конд	ср		8	9	8	8	сл
Гена	00017011	2003	879 / 879	СЛ	7	олн	ср		5	8	8	6	вл
Геліабест	06017056	2010	1194 /	С	8	вол	ср		8	9	9	8	вл
Дніпр	92017042	1997	879 / 879	СЛ	5	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
ЕС Діагора	06017054	2010	806 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	9	8	вл
ЕС Артіміс	06017055	2010	806 /	СЛ	8	вол	ср		8	9	9	8	вл
Згода	92017005	1996	378 / 378	С	5	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
Іоллна (РА1001735)	07017065	2010	1194 /	СЛ	7 - 9	олн	ср		8	9	9	8	вл
Іоллін	05017083	2010	1194 /	СЛ	8	вол	ср		8	9	9	8	вл
Іоллюр	06017049	2010	1194 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	9	8	вл
Казіо	79017016	1998	1079 /	СЛ	7-9	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
Конгрес	05017042	2007	1141 /	СЛ	9	олн	ср		8,5	9	9	8,5	вл
Лан 26	98017053	2001	1096 / 1083	С	5	олн	ср		6	8	8	7	вл
ЛГ 5415	01017035	2006	793 /	СЛ	7-9	олн	ср		8	9	9	7	вл
ЛГ 5590	01017034	2006	793 /	Л	7-9	олн	ср		8	9	9	8	вл
Летізія	06017047	2010	924 /	СЛ	7-9	олн	ср		8	9	9	8	вл
Мілутін (к)	02017010	2005	1141 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	9	7	вл
МАС 95ІР	06017051	2010	924 /	С	8	олн	ср		8	9	9	8	вл
МАС 92ОЛ	06017050	2010	924 /	СЛ	8	вол	ср		8	9	9	8	вл
МАС 91А	06017048	2010	924 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	9	9	вл
Матеол РО	05017067	2008	938 /	Л	8	олн	ср		8	9	8,5	9	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
НК Долбі	04017059	2007	1079 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	9	8,5	вл
НК Делфі	04017060	2008	1079 /	СЛ	9	олн	ср		9	9	9	8	вл
НК Ферті	04017061	2007	1079 /	С	9	вол	ср		9	9	9	8	вл
НС-Х-6045	07017050	2010	879 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	9	8	вл
Оріон	89017004	1993	216 / 1192, 1059	СЛ	5	олн	ср		5	5	5	5	вл
Одеський 123	85017007	1990	378 / 378	СЛ	5	олн	ср		5	5	7-9	5	вл
Оллєан ®	05017090	2008	1194 /	СЛ	8	олн	ср		9	9	8,5	8,5	вл
Погляд	94017002	1999	404 / 404	С	7-9	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
Перформер	01017019	2003	886 /	СЛ	7-9	олн	ср		6	8	8	7	вл
ПР64А44	01017046	2004	767 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	8	7	вл
ПР64А10 (Синонім: Міхаіл)	98017043	2001	767 /	С	8	олн	ср		7	7-9	8	7	вл
ПР63К83	07017019	2010	1055 /	С	9	олн	ср		8	9	9	8	вл
ПР64Е83	05017073	2008	767 /	СЛ	8	олн	ср		8,5	9	8,5	8,5	вл
Параізо 102 CL ®	07017025	2010	1090 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	9	8	вл
ПР64А71 ®	02017014	2005	767 /	Л	9	олн	ср		9	8	9	8	вл
ПР64А15	06017027	2010	767 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	9	8	вл
ПР64Е71	06017029	2010	767 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	9	9	вл
ПАН 901	05017008	2007	558 /	С	9	олн	ср		8	8,5	8	8	вл
ПР64Г47	06017023	2010	767 /	СЛ	8	вол	ср		8	9	9	8	вл
ПАЛ - 255	07017074	2010	1227 /	С	8	олн	ср		8	9	9	9	вл
ПР63А62 ®	05017076	2009	767 /	СЛ	9	олн	ср		8,5	9	9	8,5	вл
ПР64Г32 ®	05017074	2009	767 /	СЛ	8	вол	ср		8,5	9	9	8,5	вл
ПАЛ - 0917	07017078	2010	1227 /	С	8	олн	ср		8	9	9	9	вл
ПР64Г91 ®	04017023	2007	767 /	СЛ	8	вол	ср		8	8	9	8	вл
ПР64А58	02017013	2006	767 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	9	8	вл.
Сапфир ®	03017039	2006	378 /	Л	8	олн	ср		8	8	9	8	вл
Селлор	06017057	2010	1194 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	9	8	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Термінатор	05017041	2007	1141 /	СЛ	9	олн	ср		8,5	8,5	9	8,5	вл
Телліа ®	05017082	2009	1194 /	СЛ	7-9	олн	ср		8,5	8,8	8	8,5	вл
АК 0324 ®	01017045	2005	938 /	СЛ	9	олн	сс		8	8	9	7	вл
Голдсан ®	07017091	2010	793 /	СЛ	9	олн	сс		8	9	9	8	вл
Дністр	95017003	2000	879 / 879	СЛ	7-9	олн	сс		5	7-9	7-9	5	вл
Донський крупнонасінний	89017003	1993	216 / 1059, 1192	СЛ	5	конд	сс		5	5	5	5	сл
Далія КС	06017037	2010	485 /	СЛ	8	олн	сс		8	9	9	8	вл
Свропфлор	93017003	1998	806 /	Л	7-9	олн	сс		5	7-9	7-9	5	вл
Імерія КС	07017087	2010	485 /	СЛ	7 - 9	олн	сс		8	9	9	8	вл
Ідальго	05017070	2008	793 /	СЛ	9	олн	сс		8	9	9	9	вл
Коралія КС	06017011	2008	485 /	СЛ	8	олн	сс		8,5	9	8,5	9	вл
ЛГ 5663 КЛ	07017090	2010	793 /	С	9	олн	сс		9	9	9	9	вл
ЛГ 5654 КЛ	06017033	2010	793 /	Л	8	олн	сс		8	9	9	8	вл
ЛГ 5660	02017022	2005	793 /	СЛ	8	олн	сс		8	8	9	7	вл
ЛГ 5669КЛ	05017069	2008	793 /	СЛ	8	олн	сс		8,5	9	8,5	9	вл
ЛГ 5370 ®	07017094	2010	793 /	СЛ	7	олн	сс		7	9	9	8	вл
ЛГ 5412	04017017	2008	793 /	С	8	олн	сс		8	8	8	8,5	
ЛГ 5380	04017016	2006	793 /	С	7-9	олн	сс		7	8	8	7	вл
ЛГ 5665	02017021	2005	793 /	СЛ	9	олн	сс		8	9	9	8	вл
ЛГ 5658 КЛ ®	07017092	2010	793 /	С	8	олн	сс		8	9	9	8	вл
ЛГ 5635	04017068	2007	793 /	СЛ	9	олн	сс		8	9	9	8	вл
ЛГ 5451ХО КЛ ®	07017089	2010	793 /	Л	7	олн	сс		7	9	9	8	вл
ЛГ 5450	05017071	2008	793 /	СЛ	8	олн	сс		8	9	8	8	вл
ЛГ 5550 ®	07017093	2010	793 /	СЛ	8	олн	сс		8	9	9	8	вл
Макао ®	03017019	2006	924 /	С	9	олн	сс		7	9	9	7	вл
НК Бріо	01017037	2004	1079 /	СЛ	9	олн	сс		8	8,8	8	8	вл
НК Октава	06017062	2010	1079 /	Л	9	олн	сс		9	9	9	9	вл
НК Неома	06017065	2010	1079 /	СЛ	9	олн	сс		8	9	9	9	вл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
НК Армоні	06017067	2010	1079 /	СЛ	9	олн	сс		9	9	9	9	вл
НК Дуета	06017064	2010	1079 /	Л	9	олн	сс		8	9	9	9	вл
НК Кантрі	06017001	2008	1079 /	СЛ	8	вол	сс		9	9	9	8	вл
НК Камеи	06017006	2008	1079 /	СЛ	9	олн	сс		8,5	9	9	8,5	вл
НК Роккі	03017046	2006	1079 /	СЛ	8	олн	сс		8	9	9	8	вл
НК Сінгл	06017003	2009	1079 /	СЛ	7-9	олн	сс		8,5	8,8	9	8,5	вл
НК Конді	06017002	2009	1079 /	СЛ	9	олн	сс		8,8	9	9	8,5	вл
НК Мелдімі	04017058	2007	1079 /	СЛ	9	олн	сс		9	9	9	8	вл
Оксана	01017017	2003	886 /	СЛ	8	олн	сс		6	8	8	7	вл
Опера ПР	02017005	2005	1079 /	Л	9	олн	сс		9	9	9	8	вл
Обрая КС	07017088	2010	485 /	С	7 - 9	олн	сс		8	9	9	8	вл
ПР64А83	00017001	2002	767 /	Л	8	олн	сс		5	7-9	8	7	вл
ПР64А89	® 05017001	2008	767 /	СЛ	9	олн	сс		8,5	9	8,5	9	вл
ПР64А78	® 04017025	2007	767 /	СЛ	9	олн	сс		7,5	9	9	8	вл
ПР64Ф50	07017020	2010	1055 /	СЛ	9	олн	сс		8	9	9	8	вл
Ригасол	98017026	2001	1219 /	Л	8	олн	сс		6	8	8	5	вл
Робія КС	06017036	2010	485 /	СЛ	9	олн	сс		9	9	9	8	вл
Санай	03017001	2006	1079 /	С	7	олн	сс		8	8	9	8	вл
Санлука РМ	06017005	2009	1079 /	СЛ	9	олн	сс		8,5	8,8	9	8,5	вл
Тунка	06017035	2010	793 /	С	8	вол	сс		8	9	9	9	вл
Трегор	02017023	2005	793 /	С	8	олн	сс		7	8	9	7	вл
Флай	99017003	2001	1219 /	СЛ	8	олн	сс		5	7-9	8	7	вл
Фушія КЛ	07017085	2010	485 /	С	9	олн	сс		8	9	9	9	вл
Хортица	92017045	1996	879 / 879	СЛ	7-9	олн	сс		5	7-9	7-9	5	вл
ЦОДТ5210	07017054	2010	983 /	СЛ	8	олн	сс		8	9	9	8	вл
Соя			- **110**										
Аннушка	® 04018007	2007	416 /	СЛП	7-8	зерн	скс		8	9	9	9	сл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Анастасія	® 06018009	2010	416 /	СЛП	9	зерн	скс		8-9	9	8-9	9	
Ворскла	® 05018012	2008	345 /	СЛ	8	зерн	скс		8	8,5	8,5	9	сл
Слена	® 01018003	2004	345 / 345	СЛП	7-9	зерн	скс		7	7,5	7	8	сл
Знахідка	® 02018001	2005	356 /	СЛП	7-9	зерн	скс		8	7	8	9	сл
Ксеня	01018002	2004	432 /	СЛП	7	зерн	скс		7	7,5	7,5	8	сл
Легенда	® 05018013	2009	345 /	СЛП	5-7	зерн	скс		8	9	8	9	сл
Либідь	07018016	2010	663 /	СЛП	9	зерн	скс		9	9	9		сл
Лариса	07018017	2010	879 /	СЛП	8	зерн	скс		8	9	9		сл
Устя	® 98018003	2002	345 / 345	П	7-9	зерн	скс		6	6	6	5	сл
Фея	® 01018001	2004	404 / 404	СЛП	7-9	зерн	скс		7	6,5	8	8	сл
Фортуна	07018018	2010	879 /	СЛП	9	зерн	скс		8	9	9		сл
Хуторяночка	07018006	2010	305 /	СЛП	9	зерн	скс		8	9	9		сл
Аполон	99018002	2003	411 /	СЛП	7-9	зерн	рс		7	6	6	5	сл
Аметист	94018009	1998	399 / 540	СЛ	6	зерн	рс		5	6	6	5	сл
Алмаз	® 04018013	2007	462 /	Л	7-8	зерн	рс		8	9	9	9	сл
Анжеліка	® 04018010	2007	345 /	ЛП	7-8	зерн	рс		8	9	8	9	сл
Білосніжка	75018001	1981	349 /	СЛ	5	зк	рс		5	5	5	5	сл
Бояна	03018004	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс		8	7	8	9	сл
Говерла	® 05018010	2009	330 /	СЛ	7	зерн	рс		8	9	7	9	сл
Донька	® 99018005	2003	378 /	СЛ	7-9	зерн	рс		7	6	6	5	сл
Десна	07018015	2010	663 /	СЛП	9	зерн	рс		8	9	9		сл
Діона	® 03018016	2007	411 /	ЛП	7-8	зерн	рс		8	9	9	9	сл
Київська 98	® 97018008	2001	345 / 345	ЛП	7	зерн	рс		5	6	6	5	сл
КиВін	® 04018009	2007	305 /	Л	7	зерн	рс		8	8	9	9	сл
Лара	03018001	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс		8	8	8	9	сл
Мрія	95018001	1999	404 / 404	СЛ	7	зерн	рс		6	6	6	5	сл
Медея	94018005	1998	356 /	СЛ	6	зерн	рс		6	5	5	5	сл
Мерлін	05018006	2008	1034 /	Л	8	зерн	рс		8	9	8,5	9	сл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Монада	® 05018004	2008	305 /	Л	8	зерн	рс		8	8	9	9	сл
Протеїнка	03018003	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс		8	8	8	9	сл
ПВС 008	07018001	2011	862 /	СЛП	9	зерн	рс		8	9	8		сл
Романтика	94018008	1998	404 / 404	СЛ	7	зерн	рс		6	6	6	5	сл
Спонсор	07018003	2010	806 /	СЛП	9	зерн	рс		8	9	8		сл
Святкова	02018004	2005	736 /	СЛП	7-9	зерн	рс		8	8	7	9	сл
Седміца	03018002	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс		8	7	8	9	сл
Смоляика	® 05018005	2008	305 /	ЛП	7	зерн	рс		8	8	9	9	сл
Срібна Рута	® 07018009	2010	416 /	СЛ	8	зерн	рс		8	7	8		сл
Сузір'я	® 07018012	2010	345 /	СЛП	8	зерн	рс		8	9	9		сл
Фаетон	95018002	2000	411 /	СЛП	7	зерн	рс		6	6	5	5	сл
Черемош	07018014	2010	663 /	СЛП	9	зерн	рс		9	9	9		сл
Юг 30	87018007	1990	411 /	СЛП	5	зк	рс		6	5	5	5	сл
Ювілейна	® 02018002	2005	356 /	СЛП	9	зерн	рс		8	7	8	9	сл
Аркадія одеська	83018001	1986	378 / 378	С	5	зерн	ср		7-9	5	5	5	сл
Артеміда	97018003	2001	399 /	С	7	зерн	ср		6	6	6	5	сл
Антарес	07018008	2010	378 /	СЛП	5	зерн	ср		8	7	9		сл
Берегиня	® 99018001	2002	378 /	С	7	зерн	ср		7	6	6	5	сл
Богеміанс	07018005	2010	142 /	С	9	зерн	ср		8	9	8	9	сл
Валюта	97018002	2001	356 /	С	7	зерн	ср		5	6	6	5	сл
Васильківська	00018007	2003	378 / 345, 378	СЛП	7-9	зерн	ср		7	6	6	5	сл
Величава	® 04018014	2007	404 /	ЛП	7-8	зерн	ср		8	9	9	9	сл
Вілана	04018005	2007	16 / 1112	СЛ	7-9	зерн	ср		9	8	9	9	сл
Вежа	® 06018013	2010	305 /	С	8	зерн	ср		8	9	8	9	
Версія	® 04018015	2007	404 /	ЛП	7-9	зерн	ср		8	7	9	9	сл
Горизонт	® 98018002	2002	404 / 404	С	7-9	зерн	ср		6	7	6	5	сл
Горлиця	® 03018012	2006	950 /	СЛП	7-9	зерн	ср		8	8	8	9	сл
Георгіна	06018007	2010	432 /	С	7	зерн	ср		8	8	8	9	сл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Даная	® 05018011	2009	411 /	СЛ	8	зерн	ср		8	9	9	9	сл
Данко	® 06018010	2010	378 /	С	9	зерн	ср		9	8	9	9	
Дельта	04018004	2007	16 / 1112	Л	9	зерн	ср		8	7	9	9	сл
Інтерпрайс	06018004	2008	749 /	Л	9	зерн	ср		8	8,5	9	9	сл
Ельдорадо	® 02018003	2005	378 /	СЛП	9	зерн	ср		8	7	8	9	сл
Золотиста	00018005	2004	305 /	СЛП	7-9	зерн	ср		7	8	8	8	сл
Іванка	91018001	1996	345 /	Л	5	зерн	ср		5	6	6	5	сл
Ізумрудна	90018004	1995	356 /	С	5	зерн	ср		6	5	5	5	сл
Київська 27	86018003	1990	345 / 345	ЛП	5	зк	ср		5	5	5	5	сл
Медісон	06018006	2008	749 /	ЛП	9	зерн	ср		8,5	9	8	9	сл
Оксана	97018004	2001	411 /	С	7	зерн	ср		6	6	6	5	сл
Оріана	98018001	2002	305 /	С	7	зерн	ср		6	6	6	5	сл
Офелія	00018001	2003	329 / 329	С	7	зерн	ср		7	6	6	5	сл
Особлива	® 03018010	2006	950 /	ЛП	7-9	зерн	ср		8	8	8	9	сл
Омега вінницька	® 04018008	2007	305 /	Л	7	зерн	ср		8	8	8	9	сл
Подільська 416	® 96018003	2001	950 /	Л	7	зерн	ср		5	6	6	5	сл
Прикарпатська 96	97018005	2001	330 /	С	6	зерн	ср		5	6	6	5	сл
Равніца	03018005	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	ср		8	8	8	9	сл
Спринт	99018003	2003	329 / 329	СЛ	7	зерн	ср		6	6	6	5	сл
Стратегія	® 00018003	2004	950 /	СЛП	7-9	зерн.	ср		7	8	8	7	сл
Сонячна	92018005	1997	329 / 329	СЛ	5	зерн	ср		6	6	5	5	сл
Східна	00018002	2004	404 / 404	СЛП	7-9	зерн	ср		7	8	7	8	сл
Скеля	® 03018014	2007	404 /	Л	7-8	з/к	ср		8	8	9	9	сл
Сяйво	® 06018011	2010	378 /	С	8	зерн	ср		9	8	9	9	
Супра	® 03018008	2006	142 /	СЛП	9	харч/корм	ср		9	9	8	9	сл
Смуглянка	® 07018010	2010	416 /	СЛП	8	зерн	ср		8	8	9		сл
Таврія	® 05018016	2008	879 /	СЛ	8	зерн	ср		8	9	9	9	сл
Фарватер	® 05018003	2008	378 /	Л	8	зерн	ср		8	7	9	9	сл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Харківська зернокормова	90018003	1994	404 / 404	СЛП	5	зк	ср		6	6	5	5	сл
Чернівецька 9	96018002	2000	432 /	СЛ	7	зерн	ср		5	6	6	5	сл
Шарм ®	05018009	2008	329 /	Л	8	зерн	ср		8	8	9	9	сл
Юг 40	83018013	1987	411 /	С	5	зк	ср		6	5	5	5	сл
Ятрань ®	03018009	2006	378 /	СЛП	7-9	зерн	ср		9	8	9	9	сл
Агат	94018017	2000	399 /	СЛ	7	зерн	сс		5	6	6	5	сл
Анатоліївка	97018007	2001	305 /	С	7	зерн	сс		6	5	6	5	сл
Антошка ®	06018008	2010	416 /	С	8	зерн	сс		8	9	8	9	
Витязь 50	88018009	1992	411 /	С	5	зерн	сс		5	5	5	5	сл
Вінні ®	06018012	2010	305 /	СЛ	7	зерн	сс		8	8-9	8	9	
Вінничанка ®	03018011	2006	869 /	ЛП	7-9	зерн	сс		9	8	8	8	сл
Галина ®	05018020	2009	879 /	С	7	зерн	сс		9	9	9	9	сл
Деймос	94018002	1998	411 /	С	7	зерн	сс		6	6	5	5	сл
Ірина ®	05018017	2009	879 /	С	7	зерн	сс		8	9	9	9	сл
Іна ®	05018021	2008	879 /	С	8	зерн	сс		8	9	9	9	сл
Колбі	06018003	2008	749 /	Л	8	зерн	сс		8	8	9	9	сл
КСБ 938	06018001	2008	485 /	СЛ	8	зерн	сс		8	8	9	9	сл
Мельпомена ®	04018012	2007	378 /	Л	9	зерн	сс		8	7	9	9	сл
Маша ®	03018013	2006	329 /	ЛП	7-9	зерн	сс		9	9	8	8	сл
Одеська 150А	97018011	2001	378 / 378	ЛС	7	зерн	сс		6	6	6	5	сл
Подолянка	94018004	1999	950 /	П	7	зерн	сс		5	6	6	5	сл
Подільська 1	92018017	1997	417 /	СЛ	5	зерн	сс		6	5	5	5	сл
Полтава ®	05018018	2009	879 /	СЛ	7	зерн	сс		8	8-9	9	9	сл
Срібна	99018004	2003	329 / 329	СЛ	7	зерн	сс		6	6	6	6	сл
Феміда	00018004	2004	305 /	СЛ	5	зерн	сс		7	8	8	7,5	сл
Ріпак озимий			- 93										
Ексел	07016030	2010	437 /	СЛП	9	олн		8	9	9	7		00

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Аплаус	07016020	2010	880 /	П	5	олн		9	9	9	7		00
Антарія	03016002	2006	306 /	СЛП	5	олн		9	9	8	8	6	00
Аліот	® 04016003	2007	350 /	СЛП	7-9-	олн		8-8,5	7,9-8,7	8,3-9,0	8,0-8,9	8,9	00
Анна	02016011	2007	329 /	Л,П	8-9	олн		8,0	8,5	8,6	7,5-8,4	8,4-9,0	00
Абакус	07016017	2010	912 /	СЛП	9	олн		8	8	9	7		00
Астрала	06016025	2010	1213 /	Л	9	олн		8	9	9	8	9	00
Артус	® 03016004	2006	912 / 912	СЛП	5	олн		8	8	9	8	8	00
Белана	® 07016041	2010	1213 /	ЛП	9	олн		8	9	9	7		00
Брентано	® 07016035	2010	1213 /	СЛП	9	олн		8	9	9	7		00
Багіра	® 07016039	2010	1213 /	ЛП	9	олн		8	8	9	7		00
Вектра	® 04016004	2007	1213 /	Л,П	8-9	олн		7,8-8,3	8,5-8,8	8,7-8,8	7,8-8,0	9,0	00
Вієбі	07016018	2010	912 /	СЛП	9	олн		9	9	9	7		00
Геркулес	06016027	2010	1213 /	Л	9	олн		8	9	9	8	9	00
Геліо	01016002	2005	423 /	СЛП	9	олн		8,7	8,5	9	9	9	00
Декатлон	05016019	2008	934 /	Л	8	олн		8	9	9	7	9	00
Джеспер	® 04016006	2008	934 /	Л	8	олн		8	9	9	8	9	00
ДК Секюр	06016020	2010	437 /	СЛ	9	олн		7-8	8	9	7	9	00
ДК Екстрейн	07016034	2010	437 /	СЛП	8	олн		8	9	9	7		00
Дембо	01016001	2005	332 /	СЛП	9	олн		8,5	8	8,7	9	8,7	00
ДК Серенада	06016019	2010	437 /	СЛ	9	олн		7-8	8	8	7	9	00
ДК Ексепт	07016033	2010	437 /	СЛП	9	олн		8	9	9	7		00
ДК Секвоя	07016031	2010	437 /	Л	9	олн		9	8	9	7		00
Дема	® 04016002	2008	332 /	Л	6	олн		8	8	9	8	9	00
Екзотік	06016018	2010	437 /	СЛ	8	олн		7	8	8	7	9	00
ЕС Артіст	06016023	2010	806 /	СЛ	9	олн		7	8	8	7	9	00
Ексагон	08016040	2008	437 /	Л	8	олн		7	9	9	7		00
Екстенд	06016021	2011	437 /	ЛП	9	олн		8-9	8	9	7	9	00
Ексоцет	® 07016015	2010	807 /	СЛП	9	олн		8	8	9	8		00

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Емблем	06016022	2010	806 /	СЛ	9	олн		7-8	8	9	7	9	00
Екзекютів	® 05016011	2008	437 /	Л	7	олн		8	9	9	7	9	00
ЕС Нептун	07016009	2010	806 /	ЛП	8	олн		8	9	9	7		00
ЕС Аліас	07016008	2010	806 /	П	9	олн		9	9	9	7		00
ЕС Астрід	03016008	2006	806 /	СЛП	5	олн		8	9	8	8	6	00
ЕС Гідромель	05016006	2008	806 /	Л	7	олн		8	9	9	7	9	00
Клеопатра	06016038	2010	350 /	СЛП	9	олн		8	9	9	7		00
Київський 18	75016001	1982	348 /										
Ландар	01016003	2005	350 /	СЛП	9	олн		8,5	8,7	8,6	8,7	9	00
Ладога	06016043	2010	793 /	СЛП	9	олн		8	8	9	7		00
Мерано	® 07016043	2010	1213 /	СЛП	9	олн		8	8	9	8		00
Манітоба	06016044	2010	793 /	ЛП	9	олн		9	9	9	7		00
Нельсон	05016018	2008	1079 /	ЛП	9	олн		8-9	9	9	8	9	00
НПЦ 9800	® 00016004	2005	912 / 912	СЛП	9	олн		9	9	9	9	9	00
Оксана	05016010	2008	519 /	Л	7	олн		8	9	8	8	9	00
ОП 02	07016022	2010	519 /	Л	9	олн		9	9	9	8		00
Опус	® 04016005	2008	519 /	Л	7	олн		8	8,5	9	8	9	00
Опава	05016009	2008	519 /	Л	8	олн		8	9	9	8	9	00
ОПБН13	® 06016032	2010	519 /	Л	8	олн		9	9	8	7	9	00
ПР46В10	05016008	2008	767 /	СЛ	7	олн		8	8	9	7-8	9	00
ПР45Д01	05016007	2008	767 /	Л	7	олн		8	9	9	7	9	00
ПР46В31	® 05016005	2008	767 /	Л	9	олн		8	9	9	7	9	00
Рохан	07016019	2010	912 /	СЛП	9	олн		9	8	9	7		00
Релли	® 07016014	2010	807 /	СЛП	9	олн		8	8	8	7		00
Смарт	05016017	2008	1079 /	С	7	олн		7	8	9	7	9	00
Синтетік	06016001	2009	350 /	СЛП	8	олн		7-8	8	9	7	9	00
Соло	® 04016010	2008	329 /	ЛП	5	олн		7-8	9	9	7	8	00
Снігова королева	06016037	2011	350 /	ЛП	9	олн		8	9	9	7		00

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Стіро ®	07016013	2010	807 /	СЛП	9	олн		9	8	8	7		00
Сенатор Люкс	02016008	2006	345 /	П	5	олн		8	8	8	8	8	00
Стілуца ®	04016011	2008	329 /	СЛ	5	олн		8	8	8-9	7-8	8	00
Триангель	04016014	2008	938 /	СЛ	7-9	олн		7	8	9	8	9	00
Тітан ®	03016005	2006	912 / 912	СЛП	5	олн		9	8	9	8	7	00
Таурус ®	04016007	2007	912 / 912	Л,П	8-9	олн		7,8-8,3	8,5-8,8	8,8-9,0	7,8-8,0	8,5-9,0	00
Токата	05016016	2008	1079 /	ЛП	9	олн		8-9	8	9	8	9	00
Труді	07016048	2010	983 /	СЛП	9	олн		8	9	9	7		00
Тассіло	06016040	2010	938 /	ЛП	9	олн		8	8	9	7		00
Трабант ®	03016006	2006	912 / 912	СЛП	5	олн		9	8	9	9	9	00
Франкі	06016033	2010	1034 /	Л	8	олн		8	8	9	8	9	00
Фінесс	06016029	2010	1213 /	СЛП	9	олн		8-9	8-9	8-9	7	9	00
Флеш ®	07016046	2010	807 /	СЛП	9	олн		8	8	8	8		00
Харді	07016049	2010	983 /	СЛП	9	олн		8	8	8	7		00
Хенрі	06016015	2010	1034 /	СЛ	8	олн		7-8	8	8	7	9	00
Хорнет ®	05016003	2010	807 /	СЛП	9	олн		9	9	8-9	7-8	8-9	00
Чемпіон України	02016009	2006	345 /	ЛП	5	олн		8	8	8	8	8	00
Атлант	97016010	2001	329 / 329	Л	7	олн		7	>5	>5	5	7	00
Валєска	94016002	2001	926 /	Л	7	олн		7	7	5	7	7	00
Вотан	92016008	1995	912 /	П	7	олн		7	>5	7	7	>5	00
Гібрид соколівський	97016009	2001	350 /	Л	5	олн		5	5	5	5	5	0
Галицький	92016004	1997	332 /	СЛ	7	олн		7	5	7	5	5	0
Данґал	97016013	2001	332 /	ЛП	7	олн		>5	>5	5	5	7	00
Демерка ®	06016009	2009	332 /	СЛП	8	тхн		8	8	9	7	9	++
Еліт	98016013	2002	806 /	СЛП	7	олн		7	7	7	7	7	00
Елвіс	98016012	2001	806 /	ЛП	7	олн		7-9	7	7	>5	7	00
Ксаверівський	90016006	1995	350 /	ЛП	5	олн		5	>5	5	>5	5	0
Кронос ®	99016019	2003	912 /	СЛП	9	олн		9	7	7	7	7	00

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Ліраджет	92016011	2001	807/	П	7	олн		7	7	>5	>5	7	00
Оділа	99016012	2002	946/	Л	7	олн		7-9	7	>5	>5	7	00
Ранок Поділля	97016023	2002	306/791	ЛП	7	олн		7-9	>5	>5	7	7	00
Свєта	88016008	1995	332/	ЛП	5	олн		5	>5	>5	5	>5	00
Світоч	90016017	1995	306/791	ЛП	5	олн		5	5	7	>5	5	00
Тисменицький	84016001	1989	332/	СЛП	7	олн		7	>5	>5	>5	>5	00
Федорівський поліпшений	92016015	1998	350/	СЛ	5	олн		>5	7	>5	>5	5	0
Чорний велетень	97016022	2002	306/791	ЛП	7	олн		7	>5	7	7	7	00
Ріпак ярий			- 48										
71 20 КЛ	06016039	2010	844/	ЛП	8	олн			8	8	7	9	00
Аріон	91016002	1996	332/	Л	7-9	олн		7	7	7	7	7	00
Абіліті ®	05016027	2006	807/	ЛП	6	олн		9	8	9	9	9	00
Айдар	02016006	2006	736/	ЛП	5	олн		7	8	9	8	9	00
Аіра	03016003	2005	306/	СЛП	9	олія		9	9	9	9	9	00
Болеро	97016004	2001	926/	П	7-9	олн		7-9	7	9	9	7	00
Байкал ®	98016002	2001	912/912	ЛП	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Белінда ®	08016004	2010	1213/	СЛП	9	олн			7-8	9	7-8	9	00
ВНІС 100	01016004	2004	736/	ПЛ	7	олн		7	7-9	9	9	9	00
Герос ®	04016009	2006	1213/	ЛП	5	олн		9	9	9	8	9	00
Грифін	05016025	2008	1034/	Л	7	олн		7	8	8,5	7,5	9	00
Гайдн ®	03016013	2006	912/912	ЛП	5	олн		9	9	9	8	9	00
Добробут	01016005	2004	736/	ПЛ	7	олн		7	9	9	7-9	9	00
Делайт	06016046	2010	1213/	СЛП	9	олн			8	9	8	9	00
ЕС Катя ®	07016059	2010	806/	СЛП	9	олн			7	9	7		00
Ерлібьорд	07016099	2010	924/	СЛП	9	олн			8	9	7		00
Зоня КЛ ®	06016041	2010	912/	СЛП	9	олн			8	8-9	8	9	00

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Калинівський	90016015	1994	350 /	СЛП	5-7	олн		5	5	7	5-7	7	00
Кліфф	® 00016005	2003	912 / 912	СЛП	9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Клітинний 8	95016001	2000	350 /	ЛП	5-7	олн		5	5	5-7	7	7	00
Клітинний 1	91016009	1996	350 /	СЛП	5	олн		5-7	5	7	5	7	00
Калібр	07016055	2010	912 /	СЛП	5	олн			8	9	7		00
Кріс	05016002	2007	16 / 1112	Л,П	8,5-9,0	олійн			7-8	8,0-8,4	8,5	8,5-9,0	00
Ліга	97016014	2001	332 /	П	5-7	олн		5	5	7	7	7	00
Ліколли	95016002	2000	807 /	П	7-9	олн		7-9	7-9	9	9	9	00
Лужок	98016005	2003	332 /	СЛП	5-7	олн		5-7-	7	7	9	9	00
Ларісса	06016047	2010	1213 /	СЛП	9	олн			7-8	9	8	9	00
Марія	99016018	2003	1106 /	СП	7-9	олн		7-9	7-9	7-9	9	9	00
Микитинецький	92016017	1997	332 /	СП	6,5	олн		5	5	5	5-7	7	00
Маринс	05016022	2009	332 /	С	5	олн			8	9	8	8-9	00
Мірко КЛ	® 08016006	2010	1213 /	ЛП	9	олн			8	8	7	9	00
Магнат	02016007	2005	345 / 345	СЛП	8,6	олн		9	8,7	8,6	9	9	00
Отаман	94016026	1999	329 / 329	С	7-9	олн		7	7	7-9	7	7-9	00
Ольга	® 97016005	2001	912 / 912	П	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Оксамит	99016017	2003	1106 /	СП	5-7	олн		7	7	9	9	9	00
Обрій	03016012	2006	329 /	ЛП	5	олн		7	8	9	8	9	00
ПР45Г72	06016050	2010	767 /	СЛП	8	олн			8	8	7		00
ПР45Г73	06016045	2010	767 /	СЛП	9	олн			8	8	7		00
Сієста F1	® 99016009	2002	912 / 912	СЛП	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Сріблястий 1	® 03016011	2007	350 /	С,Л,П	8-9	олн		8	8,5	8,5	8,5	9,0	00
Сальса КЛ	® 06016042	2010	912 /	СЛП	9	олн			7-8	9	8	9	00
Сіріус	® 03016009	2006	350 /	ЛП	5	олн		7,5	8	9	9	8-9	00
Терра	® 99016010	2002	912 / 912	СЛП	9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Хантер	® 05016029	2009	1213 /	СЛ	7-9	олн			8	8-9	8	9	00
Хідалго	® 06016006	2008	912 /	ЛП	8	олн		7	8	8	9	8	00

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Хузар	® 06016008	2009	694 /	С	9	олн			8	9	9	9	00
Юра	® 05016028	2008	806 /	Л	6	олн		7	8	8	8	9	00
Янтарь	79016003	1984	348 /										
Льон низький, кудряш			-	**15**									
Айсберг	00094001	2001	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	7	7	
Блакитно помаранчевий	® 06094002	2007	345 /	СЛП	8	олн			7	8	8	9	
ВНІІМК 620	05094002	2007	16 / 1112	СЛП	8	олн			7	8	8	7	
Дебют	99094002	2001	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	8	7	
Еврика	03094001	2004	345 / 345	СЛП	7	олн			8	9	8	7-9	
Золотистий	03094002	2005	329 /	СЛ	8	олн			7	5	7	8	
Ківіка	® 05094003	2007	329 /	С	8	олн			7	7	8	8	
Лірина	00094002	2002	807 /	СЛ	7-9	олн			7	8	8	7	
Надійний	® 06094001	2007	216 /	СЛ	8	олн			8	8	8	9	
Орфей	00094004	2002	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	8	7	
Південна ніч	99094001	2001	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	8	7	
Славний	® 05094001	2006	329 /	С	8	олн			7	7	8	8	
Симпатик	® 06094003	2007	345 /	СЛП	8	олн			8	8	8	9	
Рижій посівний			-	**7**									
Гірський	97097001	2000	332 /	СЛ	7	олн			6	8	8	6	
Клондайк	03097001	2004	345 / 345	СЛ	7	олн			8	9	9	7	
Міраж	94097001	2000	329 / 329	СЛП	7	олн			6	8	8	6	
Престиж	® 05097001	2006	329 /	СЛП	7	олн			8	7	7	8	
Степовий 1	92097001	1996	329 / 329	СЛП	5	олн			5	7	7	5	
Гірчиця сарептська			-	**10**									
Дижонка	® 05144003	2008	329 /	СЛ	7	олн			8	8	8,5	7,5	
Мрія	94144003	2000	329 / 329	СЛ	7	олн			6	8	8	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Росава	94144001	1999	348/	С	5	олн			6	7	7	5	
Роксолана	94144002	1999	332/	С	5	олн			6	7	7	5	
Ретро (к)	05144004	2008	329/	СЛ	8	олн			8	8	8	7,5	
Світлана	03144003	2005	329/	СЛ	7	олн			7	7	5	7	
Тавричанка	92144001	1996	329/329	СЛ	5	олн			5	7	7	5	
Гірчиця біла			- 9										
Еталон	03092001	2004	345/345	СЛП	7	олн,сд			7	9	8	8	
Каролина	90092002	1994	305/	СЛП	5	олн			6	7	8	5	
Підпечерецька	94092001	2000	332/	Л	8	олн			5	7	8	6	
Талісман	94092002	2000	329/329	ЛП	7	олн			6	8	7	5	
Рицина звичайна			- 4										
Олеся	00098002	2001	329/329	СЛ	7	олн			6	8	8	6	
Хортицька 1	92098002	1996	329/329	С	5	олн			6	7	8	6	
Хортицька 3	98098001	2001	329/329	СЛ	7	олн			6	7	8	6	
Хортичанка	00098001	2001	329/329	СЛ	7	олн			6	7	8	6	
Мак снотворний			- 13										
Альмадін	05095001	2010	711/	П		олн			4	4,5	4	8	
Беркут	92095001	1996	332/	СЛ	5	олн			5	6	7	5	бол
Грей (к)	05095004	2006	583/	Л	7	олн			7	7	9	8	бол.
Європейський (к)	05095002	2007	711/	ЛП	8	олн			8	8	7	8	бол
Жар (к)	05095008	2006	329/	С	7	озл.			7	8	9	9	
Кристал	99095002	2002	389/389, 329	СЛ	5	олн			6	7	7	5	бол
Корал	97095001	2001	329/389, 329	СЛ	6	олн			5	7	8	5	бол
Колорит (к)	05095009	2006	329/	СЛ	7	олн			7	8	9	8	бол
Корунд	05095005	2010	711/	Л		олн			3,8	3,5	4	8	
Камея (к)	05095007	2007	711/	ЛП	8	олн			7	8	7	8	бол

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Нефрит	05095006	2010	711/	С		олн			4,2	4,5	4,3		
Поділля	® 05095003	2006	583/	Л	8	олн			7	7	9	7	боп.
Ямгорів	01095001	2006	332/	ЛП	8	олн.конд.			7	8	8	7	боп.
Арахіс підземний			- 1										
Клинський	97091001	2002	410/	С	5	олн,конд			7	7	7-9	5	
Кунжут індійський			- 5										
Боярин	® 05093002	2006	329/	С	8	олн			7	9	8	7	
Гусар	® 05093001	2006	329/	С	8	олн			7	9	8	8	
Ілона	® 05093003	2006	329/	С	8	олн			7	9	8	7	
Кадет	® 05093004	2006	329/	С	7	олн			7	9	6	7	
Надія	98093001	2001	329 / 329	ЛС	7	олн			7	8	7	5	
Суріпиця озима			- 1										
Оріана	02145001	2003	348/	СЛП	7	олн		>5	7	7		7	
Суріпиця яра			- 2										
Горянка	98145002	2001	332/	П	7	олн			6	7	8	5	
Льон звичайний, довгунець			- 12										
Батист	® 05015001	2007	345/	П	7	пряд			7	8	8	8	
Вручий	03015001	2007	345/	П	8	пряд			7	8	8	8	
Гладіатор	® 05015004	2008	393/	П	7	пряд	рс		8	8	8	8	
Журавка	® 05015002	2008	320/	П	7	пряд	рс		8	8	9	8	
Зоря 87	82015001	1988	371/	Л	5	пряд	пс		5	6	6	5	
Каменяр	99015001	2003	371/	П	7	пряд	ср		6	7	7	5	
Рушничок	97015001	2000	345 / 345	ЛП	7	пряд	рс		5	7	7	5	
Український 3	92015001	1997	345/	ЛП	5	пряд	сс		5	6	6	5	
Чарівний	92015002	1996	393 / 393	ЛП	5	пряд	сс		6	6	7	5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Глінум ®	00015002	2004	393 / 393	ЛП	7-9	пряд.	ср		7	8	8	7-9	
Світанок	00015001	2004	320 /	ЛП	7-9	пряд.	ср		7	8	8	7-9	
Коноплі посівні			-	6									
Глера ®	01014001	2004	393 / 393	ЛП	7-9	пряд.			8	7	7	7	
Гляна ®	05014001	2007	393 /	ЛП	8	пряд			9	9	7	8	
Золотоніські 15	94014002	1998	393 / 393	Л	5	пряд			7	7	7	5	
Зоряна ®	05014002	2007	393 /	Л	9	пряд			9	9	8	8	
ЮСО 31	82014002	1987	393 / 393	Л	5	пряд			7	7	7	5	
Бавовник звичайний			-	2									
Дніпровський 5	97366001	2001	411 /	С	5	пряд			7	7-9	7	7	
Підозерський 4 ®	03366001	2007	411 /	С	7	пряд			9	9		8	
Гірчиця сарептська озима			-	5									
Аннушка ®	04144002	2006	329 /	СЛП	8	олн		7	8	8	8	9	
Венера ®	04144003	2006	329 /	СЛП	8	олн		7	8	6	8	8	
Деметра ®	04144001	2005	329 / 329	СЛ	8	олн		7	7	7	5	8	
Новинка	02144001	2004	329 / 329	ЛСП	9	олн		7	8	9	9	7	
Романтика	03144002	2005	345 / 345	СЛП	8	олн		7	7	9	7	9	
Гірчиця чорна			-	1									
Софія	05428001	2006	332 /	ЛП	8	олн			8	7	6	6	
Смикавець їстівний (Чуфа)			-	2									
Новинка	05436001	2006	329 /	С	8	олн., х			8	9		8	
Сільськогосподарські: буряк													
Буряк цукровий			-	141									
Ірис	06013007	2009	743 /	ЛП	9	уц						6-8	сц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Аратта	94013096	2001	736/	ЛП	8	уц						5-7	сц
Аббатіса	00013030	2003	736/	СЛП	9	уц						5-7	сц
Ардан	05013027	2009	796/	ЛП	9	уц						6-8	сц
Арій 1	98013056	2002	736/	Л	8	уц						5-7	сц
Авторитетний	02013030	2006	736/	СЛП	9	уц						6-9	сц
Аватар	94013095	1999	736/	ЛП	8	уц						5-7	сц
Анічка	00013019	2003	334/	ЛП	8	уц						7	сц
Акку	04013015	2008	829/	Л	8	уц						7	сц
Атаманша	04013026	2008	1086/	СП	9	уц						6	сц
Ахат	02013034	2006	829/	СЛП	9	ц						6-9	сц
Альона КВС	05013021	2009	938/	ЛП	9	уц						5-7	сц
Бакара	04013012	2007	743/	СЛП	8	уц						5-7	ср
Булава ®	07013014	2010	334/	П	8	уц						7-8	вц
Балтіка	06013032	2009	788/	СЛ	9	уц						5-7	сц
Берні	06013039	2010	829/	СЛП	7	уц						7-8	вц
Беліно	07013045	2010	796/	СЛП	8-9	уц						8	вц
Борута	03013022	2007	1086/	СЛП	9	у						6-7	сц
Ворскла	00013013	2003	334/	ЛП	9	уц						7	сц
Волга	05013025	2009	1050/	Л	8	уц						5-7	сц
Венера	07013001	2010	866/	П	8	уц						8	вц
Венчац ®	05013016	2008	879/	П	9	уц						5-6	сц
Вінцент	03013012	2007	829/	СЛП	8	уц						6	сц
Ворсар	07013008	2010	879/	С	8	уц						7	вц
Віктор	05013017	2009	829/	ЛП	8	уц						6-8	сц
Галина	92013006	1998	334/	ЛП	8	уц						5-7	сц
Газета	03013016	2007	1086/	СЛП	6	у						6-7	сц
Геліос	07013043	2010	796/	СЛ	7-8	уц						7	вц
Гезіна	04013021	2008	938/	СЛ	8	уц						6	сц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Галактік	05013014	2008	539 /	СЛП	8	уц						5-7	сц
Гранате	05013003	2008	504 /	ЛП	9	уц						6-7	сц
Джорджина	00013037	2004	938 /	СЛП	9	уц						7-8	вц
Дана	92013097	1997	879 / 879	Л	7	уц						5-7	сц
Двіна	97013002	2001	743 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Делеіта	03013023	2007	1086 /	СЛП	7	уц						6-7	сц
Доброслава	03013024	2006	230 /	СЛП	9	цу						6-9	сц
Дарія КВС	07013024	2010	938 /	СЛП	9	уц						8	вц
Дануб ®	05013029	2008	796 /	ЛП	9	уц						5-8	сц
Елоді	99013034	2002	796 /	П	8	цукр						5-7	вц
Етюд	02013026	2006	334 /	С	8	уц						6-9	сц
Ельдорадо	07013040	2010	743 /	СЛП	8-9	уц						7-8	вц
Євгенія	01013024	2005	938 /	СЛП	9	уц						7-9	сц
Золеа	04013019	2008	829 /	СЛП	8	уц						6-8	сц
Зорипа	05013013	2008	539 /	СЛП	8	уц						6-8	сц
Зум	07013035	2010	504 /	СП	8	уц						8	вц
Зоряний	03013025	2007	230 /	СЛП	8	уц						6-7	сц
Злука ®	07013015	2010	334 /	П	8	уц						8	вц
Імпакт	04013011	2008	743 /	Л	8	ц						8	вц
ІЦБ 0503 ®	06013026	2010	334 /										
Імперіал ®	05013001	2008	788 /	СЛ	8	уц						6-8	сц
Константа	01013015	2004	334 /	СЛП	9	уц						8	вц
Кубанський ЧС 36	88013002	1995	736 /	СЛ	8	уц						5-7	сц
Кобра	94013024	1999	829 /	П	8	уц						5-7	сц
Казино	01013030	2007	788 /	СЛП	8	у						8	сц
Коала	07013039	2010	743 /	СЛП	9	уц						8	вц
Каньйон	05013002	2007	743 /	СЛП	9	уц						7-8	вц
Койот	06013045	2010	743 /	Л	7	уц						8	вц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Кварта	® 07013013	2010	334/	П	8	уц						8	вц
Кармеліта	04013020	2007	938/	СЛП	9	уц						6-7	вц
Компроміс	07013009	2010	879/	С	7	уц						7	вц
Континенталь	07013042	2010	743/	СЛП	8-9	уц						7-8	вц
Крокодил	02013016	2005	743/	СЛП	9	ур						7-9	сц
Класика	03013010	2007	938/	ЛП	7	уц						6	сц
Лєнора	98013064	2002	938/	СЛП	9	уц						5-7	сц
Ліворно	06013006	2009	743/	П	8	уц						5-7	сц
Люміна	03013003	2006	796/	СЛ	9	уц						5-9	сц
Лавінія	02013037	2006	938/	СЛП	9	уц						6-9	сц
Ліберо	03013015	2007	829/	СЛП	8	уц						6-7	сц
Лангуста	04013023	2008	1086/	СЛП	9	ц						6-8	вц
Леонарда	04013022	2008	938/	СЛП	9	уц						6-7	сц
Леопард	06013001	2009	743/	Л	9	уц						7	сц
Максим	01013004	2004	334/	СЛП	8-9	уц						7-8	вц
Муррей	05013008	2009	504/	Л	9	уц						7-8	вц
Модус	04013017	2008	829/	Л	7	уц						8	сц
Мілорд	07013044	2010	796/	СП	8	уц						8	вц
Мозаік	03013014	2007	829/	СЛП	7	уц						6	сц
Мілан	02013033	2006	829/	СЛ	9	уц						5-9	сц
Мелюзін	05013028	2009	796/	Л	8	уц						6-7	сц
Марішка КВС	07013023	2010	938/	СЛП	8-9	уц						7	вц
Мерак	02013035	2006	829/	ЛП	9	уц						6-9	сц
Мішель	07013033	2010	866/	СЛП	8	уц						7-8	вц
Ненсі	06013031	2009	788/	СЛ	9	уц						7-8	сц
НМ 7163 Рз	04013025	2008	1086/	ЛП	8	уц						6-7	сц
НС-Х-082 РЦ	07013037	2010	879/	СП	8	уц						6	вц
НС-Х-081 РЦ	07013036	2010	879/	СП	8	уц						6	вц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
НІ 0450	06013043	2010	1086/	СЛ	8	уц						7	вц
Настя	03013009	2007	938/	ЛП	7-8	уц						6-7	сц
Орікс	88013012	1993	743/	ЛП	8	уц						5-7	сц
Олеся КВС	05013019	2009	938/	СЛ	9	уц						6-8	сц
Ольжич	02013027	2006	334/	СЛ	8	уц						6-9	сц
Олімпіада	05013026	2009	1050/	Л	9	уц						8	сц
Пірат	99013049	2003	829/	ЛП	8	уц						5-7	сц
Плутон	06013002	2009	743/	Л	9	уц						8-9	сц
Приз	® 06013019	2009	334/	Л	5	уц						6-8	сц
Прометей	® 06013024	2008	334/	П	8	уц						5-6	сц
Пітон	06013044	2010	743/	ЛП	7-8	уц						7	вц
Портланд	05013007	2007	504/	СЛП	9	уц						6-8	вц
Роберта	95013017	2000	938/	ЛП	8	уц						5-7	сц
Рамзес	® 06013015	2009	334/	Л	8	уц						5-7	сц
Ромул	02013009	2005	334/	СЛП	8	уц						5-9	сц
Ризольт	® 04013010	2007	334/	С	6	уц						5	сц
Резімакс	® 04013030	2008	796/	СП	8	уц						5-6	сц
Ремос	04013018	2008	829/	СЛ	8	уц						6-8	сц
Родос	07013034	2010	866/	СЛП	8-9	уц						8	вц
Резидент	® 06013020	2009	334/	Л	5	уц						6-8	сц
Свіфт	98013060	2002	743/	ЛП	8	уц						5-7	сц
Свєтлана КВС	05013020	2009	938/	Л	9	уц						6-7	сц
Сара	00013033	2004	879 / 879	СЛП	9	цукр						8	вц
Сілента	07013038	2010	1219/	ЛП	9	уц						7-8	вц
Софія	01013011	2004	421/	СЛ	8	уц						7-8	сц
Стабіла	03013006	2006	796/	СЛ	9	уц						6-9	сц
Севастьянівський	02013010	2005	421/	СЛП	8	уц						5-9	сц
Сідерал	06013038	2010	796/	П	7	уц						7	вц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Сніжана	03013011	2007	938 /	ЛП	8	уц						6-7	сц
Слатка КВС	07013022	2010	938 /	СЛ	7-9	уц						7-8	вц
Тарим	05013030	2009	796 /	Л	8	уц						7	вц
Тібор	05013018	2009	829 /	Л	8	уц						7-8	сц
Травіата	03013021	2007	1086 /	СЛП	7	цукр						6	сц
Тінкер	07013003	2010	788 /	СЛП	9	уц						5-7	вц
Туніка	07013004	2010	788 /	ЛП	7	уц						7	вц
Уманський ЧС 97	99013044	2003	421 /	ЛП	8	цукр						5-7	вц
Уманський ЧС 90	99013045	2003	421 /	СЛП	9	цукр						5-7	вц
Український ЧС 72	99013030	2002	421 / 334	Л	8	уц						5-7	сц
Уладівський ЧС 35	98013058	2002	736 /	Л	8	уц						5-7	сц
Урал	06013037	2010	796 /	СЛП	7	уц						8	вц
Фертіла	03013004	2006	796 /	СЛ	9	уц						5-9	сц
Федеріка	06013005	2009	743 /	Л	8	уц						8	сц
Феррара	07013002	2010	866 /	СП	7-8	уц						7	вц
Хорол ®	06013012	2009	334 /	Л	8	уц						6-7	сц
Хамбер	05013005	2007	504 /	СЛП	9	уц						6-7	вц
Хеліта	04013024	2008	1086 /	СЛП	9	уц						6-8	сц
Шевченківський	99013023	2002	334 / 334	СЛ	8	ур						5-7	сц
Шаннон	05013004	2008	504 /	СЛП	9	уц						6-7	сц
Шейен	07013041	2010	743 /	СЛП	8	уц						8	вц
Юстіна	02013036	2006	938 /	ЛП	9	уц						6-9	сц
Яміра	92013098	1997	884 /	СЛ	8	уц						5-7	сц
Яриса	04013027	2007	884 /	СЛ	7	ур						6-8	ср
Яносік	07013020	2010	884 /	СЛП	8	уц						7	вц
Япола	04013028	2007	884 /	СЛ	7	ур						6-7	ср
Янова	06013033	2010	884 /	СЛП	7	уц						8	вц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Буряк кормовий			- 20										
Адра	97046004	2001	736/	Л	7	корм						8	
Агро-Полі	05046007	2010	598/	СЛП	6	корм						7	
Веселка	99046002	2002	421/	Л	7	корм						8	
Галицький	00046002	2004	371/	СЛП	8	корм						7-8	
Дарина	99046001	2003	345/345	Л	7	корм						7	
Дністер	® 05046003	2008	330/	П	7							5	
Кракус	95046008	1999	991/	С	8	корм						7-8	
Кацпер	02046001	2005	991/	СЛП	8	корм						7-9	
Львівський жовтий	72046002	1977	371/	СЛП	9	корм						8	
Полтавський білий	58046001	1959	387/	СЛП	8-9	корм						7	
Переможець	40046001	1947	387/	СЛП	9	корм						7	
Полтавський напівцукровий	82046001	1985	387/	ЛП	8	нц						7-8	
Полтавський 71	90046010	1995	387/	СЛП	9	корм						6-8	
Рекорд-Полі	95046007	2000	991/	СЛП	8	корм						8	
Солідар	02046002	2004	991/	СЛП	8	корм						7-9	
Сонет	00046001	2004	334/345	СЛП	8	корм						7-8	
Уманський кормовий 7	00046003	2003	421/	СЛП	9	корм						8	
Урсус Полі	95046009	1999	991/	С	8-9	корм						7-8	
Центаур Полі	95046010	1999	991/	СЛ	9	нц						8-9	
Юнітек	07046001	2010	866/	СП	9	корм						7	
Сільськогосподарські: картопля													
Картопля			- 135										
Сильвана	08031001	2010	738/	ЛП	5-7	стл	ср		5			7	нкр
Сіфра	08031006	2010	738/	ЛП	5-7	стл	сс		7			8	скр

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Агаве	® 02031015	2004	1011/	П	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Ароза	05031002	2009	927/	ПС	7	стл	сс	7	7			9	скр
Альвара	96031015	2001	1006/	П	9	стл	ср	5	5			9	вкр
Астерікс	91031009	1996	738/	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Альбатрос	07031018	2010	1011/	П	5	стл	сп		5			9	вкр
Аграрна	01031013	2006	919/	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	скр
Аріелль	02031005	2007	741/	СЛП	7	стл.ран.	ср	7	5			7	скр
Бородянська рожева	89031011	1993	347/347	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	вкр
Белларoза	® 00031013	2003	1046/	ЛП	9	стл	рс	7	7			9	вкр
Бернадетте	02031010	2005	1006/	СЛ	7-9	стл	пс	5	7			9	скр
Бонус	07031001	2009	1011/	П	7	тхст	рс	9	7			7	вкр
Билина	® 01031010	2006	347/	СЛП	7	стл	сс	7	7			7	скр
Воля	00031006	2004	369/	ЛП	7	стл	сс	7	7			7-9	вкр
Велокс	97031001	2001	938/	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	скр
Віра	97031011	2001	371/	П	7	стл	сс	7	5			9	вкр
Вінета	® 97031003	2001	1046/	СЛП	9	стл	рс	7	5			9	вкр
Водограй	91031004	1995	347/347	ЛП	5	стл	ср	5	5			5	скр
Вернісаж	® 05031011	2009	347/	ЛП	5	стл	сс	7	5			5	скр
Віена	® 07031019	2010	1011/	ЛП	5	тех.пер	ср		5			7	скр
Вікторія	08031004	2010	738/	ЛП	5-7	пер.стл	ср		5			8	скр
Верді	05031001	2008	927/	П	7	пер	сп	7	7			7	вкр
Гірська	01031008	2004	323/	СЛП	7-9	стл	сс	7-9	7			9	вкр
Глазурна	® 06031014	2010	347/	П	5	стл	рс	5	5			7	скр
Гала	® 07031016	2010	1011/	Л.П.	7	стл	ср	7	3			7	скр
Дужа	06031002	2010	369/	Л.П.	5	тхст	ср	5	5			7	скр
Джаерла	94031012	1998	738/	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Дніпрянка	® 98031009	2002	347/347	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	скр
Делікат	® 02031014	2004	1011/	П	9	стл	ср	9	9			9	вкр

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Дербі	08031002	2010	738 /	Л.П.	5	стол.	рс		5			7	скр
Довіра ®	03031008	2007	347 /	П	5	стл	ср	7	5			7	вкр
Дублянська ювілейна	06031001	2010	369 /	Л.П.	7	стл	ср	5	5			7	нкр
Джеллі	08031012	2010	1046 /	ЛП	7	стл	сс		7			8	скр
Евеліна	08031013	2010	1046 /	П	5	пер	ср		5			7	скр
Ероу	06031017	2009	741 /	П	7	стл.ран	рс	5	7			7	скр
Євростарч ®	08031010	2010	1046 /	Л.П.	7	тех	сс	5	5			7	вкр
Забава ®	01031011	2004	347 /	СЛП	7-9	стл	ср	9	9			9	вкр
Західний	92031002	1998	369 /	П	5	стл	сс	>5	>5			5	скр
Зелений гай ®	06031015	2009	347 /	ЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Зоряна ®	00031005	2004	428 /	СЛП	7-9	стл	сс	7-9	7			7-9	вкр
Загадка ®	01031009	2006	347 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	скр
Інноватор	98031012	2002	738 /	СЛП	9	ун	сс	5	5			9	вкр
Імпала	95031001	2000	741 /	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вср
Кобза	91031003	1995	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	вкр
Каратоп ®	02031012	2004	1011 /	П	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Космос	94031006	1999	741 /	СЛП	7	стл	ср	5	5			5	скр
Кондор	83031001	1999	741 /	СЛП	9	стл	сс	5	5			5	вкр
Коллетта ®	97031004	2001	1046 /	СЛП	9	стл	рс	7	5			9	вкр
Карлена	92031020	1997	1011 /	СЛ	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Курода ®	04031002	2008	741 /	Л.П.	7	пер.стл	сс	7	7			7-9	скр
Красень ®	04031003	2008	320 /	П	5	крх.пер	сс	5	5			5	вкр
Каррера	08031008	2010	738 /	ЛП	7	стл	рс	7	5			7	скр
Курас	06031013	2010	741 /	Л.	5	тхст	сп	5	5			7	вкр
Кураж	02031001	2005	738 /	ЛП	7-9	стл	сс	7	7			7	скр
Латона	92031044	1997	738 /	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Лілея ®	00031003	2003	347 /	ЛП	9	стл	сс	7	5			9	вкр
Ластівка ®	99031001	2002	919 / 919	Л	7	стл	рс	5	5			9	вкр

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляганння	осипання	хвороб	
Леді Клер	® 05031020	2009	939 /	П	5	тхн	ср	5	5			7	вкр
Луговська	82031003	1987	347 / 347	ЛП	5	стл	сс	5	5			9	скр
Леді Розетта	® 98031004	2001	995 / 995	П	9	тхст	сс	7	7			9	вкр
Легенда	® 04031005	2007	371 /	СЛП	7	тхст	сс	7	7			7	скр
Лаура	® 05031008	2008	1046 /	П.	7	стл	ср	5	5			7	скр
Ліщина	02031011	2006	369 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	вкр
Левада	® 03031004	2007	347 /	П	5	стл	ср	7	5			7	вкр
Моллі	® 02031013	2004	1011 /	П	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Мінєрва	92031021	1994	801 /	СЛ	7	стл	рс	7	7			7	скр
Марфона	88031002	1999	741 /	П	7	стл	сс	5	5			5	вкр
Молодіжна	® 92031018	1996	919 / 919	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Міранда	05031005	2009	927 /	П	5	стл	ср	5	5			7	скр
Мавка	77031002	1982	371 /	ЛП	5	стл	ср	5	5			5	скр
Мелоді	05031018	2008	939 /	П.	5	стл	сс	5	5			5	скр
Марлен	02031003	2007	741 /	ЛП	7	стл	сс	7	5			5	скр
Мандрівниця	® 06031009	2010	347 /	Л.П.	5	стл	сс	5	5			7	скр
Моцарт	08031005	2010	738 /	ЛП	5-7	стл	ср		5			8	скр
Мелодія	® 02031007	2005	347 /	СЛП	7-9	стл	рс	7	7			7	вкр
Нагорода	® 04031009	2007	428 /	Л П	7	стл	ран.	7	7			7	скр
Надійна	® 02031009	2006	347 /	СЛП	9	стл	сс	7	7			7	скр
Опал	05031004	2009	927 /	П	7	тхн	ср	7	5			7	вкр
Ольвія	94031018	1999	347 / 347	СЛП	5	стл	сс	5	5			5	скр
Овація	07031008	2009	599 /	ЛП	7	стл	рс	5	7			7	скр
Оберіг	® 05031013	2008	347 /	Л.П.	7	стл	ср	5	7			7	скр
Обрій	® 92031013	1997	347 / 347	СЛП	7	стл	ср	5	5			5	вкр
Оксамит 99	99031002	2002	371 /	СЛП	9	стл	сп	7	7			9	вкр
Престо	® 00031014	2004	1046 /	СЛП	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Пікассо	94031008	1998	741 /	СЛП	7	стл	сп	5	5			5	скр

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Повінь	® 96031001	2000	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	7	5			9	вкр
Придеснянська	92031017	1996	428 /	СЛП	5	тхст	сс	5	5			5	скр
Поляна	® 99031006	2002	347 / 347	СЛП	7	стл	ср	5	5			5	скр
Провенто	92031043	1997	741 /	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Піроль	® 07031004	2008	1011 /	П.	7	пер	ср	9	7			9	вкр
ПомКвін	® 07031017	2010	1011 /	Л.П.	5	стл	сп	5	5			7	скр
Подолянка	® 03031003	2006	347 /	ЛП	9	стл	рс	7	7			7-9	скр
Поліське джерело	® 05031012	2008	347 /	П	7	стл	сп	5	7			7	скр
Промінь	® 02031008	2006	347 /	СЛ	7	стл	сп	7	7			9	вкр
Плюшка	08031017	2010	919 /	П	5	пер	ср		5			7	вкр
Романо	79031001	1980	741 /	Л.П.	7	стл	сс	7	7			7	скр
Розалінд	® 00031010	2004	1046 /	ЛП	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Рая	92031037	1997	741 /	П	7	стл	ср	5	5			9	вкр
Розара	92031023	1997	927 /	Л	9	стл	рс	7	7			9	вкр
Рампель	® 05031007	2009	599 /	ЛС	5	тхн	сс	5	5			9	вкр
Рікеа	96031017	2001	1006 /	ПС	7	стл	рс	5	5			5	скр
Ред Леді	05031003	2008	927 /	П.	7-9	стл	ср	7	7			7	скр
Роксана	08031011	2010	1046 /	ЛП	5-7	тхст	ср		5			8	скр
Родео	08031007	2010	738 /	ЛП	5-7	стл	сп		5			8	скр
Рів'єра	® 04031001	2007	741 /	СЛП	9	стл.ран.	др	7	7			7	скр
Романце	® 07031002	2010	1011 /	Л.П.	5	тхст	ср	5	5			7	вкр
Роко	® 02031004	2006	741 /	П	7-9	стр	сс	7	7			7	скр
Ред Скарлет	08031009	2010	738 /	Л.П.	5	пер	рс		5			6	нкр
Санте	95031003	2000	741 /	СЛП	9	стл	ср	5	5			9	вкр
Слов'янка	® 94031017	1999	347 / 347	СЛП	7	стл	сс	5	5			5	вкр
Свалявська	97031012	2001	323 /	П	5	стл	ср	5	5			5	скр
Серпанок	® 97031014	2001	347 / 347	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Солара	® 97031005	2001	1046 /	СЛП	9	стл	ср	7	5			5	вкр

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Сатурна	98031010	2001	1087/	П	7	тхст	сп	5	5			9	вкр
Секура	01031006	2003	927/	ЛП	7	стл	ср	5	5			9	вкр
Сувенір чернігівський	® 04031008	2009	428/	П	5	стл	рс	7	7			7	скр
Світанок київський	82031002	1987	347/347	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Сатіна	97031002	2001	938/	П	5	стл	ср	5	5			5	скр
Слава	88031017	1992	371/	П	5	стл	сс	5	5			5	скр
Скарбниця	® 05031010	2008	347/	Л.П.	5	стл	рс	5	5			5	скр
Селянська	08031016	2010	919/	Л	5	пер	рс		5			8	скр
Слобожанка-2	08031015	2010	919/	ЛП	5	пер	рс		5			7	скр
Тайфун	® 05031006	2008	599/	П	7	стл	сс	7	7			7	вкр
Талент	® 07031003	2010	1011/	Л.П.	7	тхст	ср	5	5			7	вкр
Ужгородська	® 03031001	2006	323/	П	7	стл	сп	7	7			7	скр
Фінка	05031009	2009	1046/	П	7	стл	рс	7	7			9	скр
Фантазія	® 98031007	2001	347/347	СЛП	7	тхст	ср	5	5			9	вкр
Фабула	08031003	2010	738/	Л.П.	5	стл	ср	7	5			7	нкр
Фермерська	01031014	2006	919/	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	скр
Фазан	07031005	2010	1011/	Л.П.	5	тех	ср	7	5			7	вкр
Чернігівська рання	94031020	1999	428/	ЛП	7	стл	рс	7	5			9	скр
Червона рута	01031012	2005	347/	СЛ	7-9	стл	сп	7	7			9	вкр
Явір	® 96031002	2000	347/347	СЛП	7	стл	сс	5	5			9	вкр
Сільськогосподарські: кормові													
Пайза (плоскуха хлібна)			- 1										
Надія	98126001	2000	371/	ЛП	7	корм	сс		7	7	5	7	скліт
Сорго віникове			- 6										
Карликове 45	94135001	1999	311/	ЛП	7	він	рс	-	5	7	7	5	-
Красень	® 04135001	2007	311/	СЛП	7-9	він	рс	-	7-9	7	7	7-9	-

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Любиме 80	00135001	2003	361 / 361	СЛ	7	він	ср	-	7-9	7	7	7	-
НО-5 ®	07010002	2008	879 /	С	9	він	рс	-	8	9	9	9	-
САВА ®	07010001	2008	879 /	С	8	він	ср	-	8	9	9	9	-
Українське 20	90135001	1995	361 / 361	С	7	він	ср	-	7-9	5	5	7	-
Сорго цукрове			- 12										
Сс 506	06010001	2007	1079 /	С	7-9	корм	пс	-	7-9	7-9	7	7	сбіл, скліт
Аграрний 5F	00010001	2004	361 / 361	СЛ	7-9	корм	пс	-	7-9	7-9	7	7	вкліт, сбіл
Г 1990	06010002	2007	1079 /	С	7-9	корм	сп	-	7-9	7	7-9	7	сбіл, скліт
Довіста ®	07472001	2008	311 /	СЛ	9	корм	сп	-	5	5	5	9	сбіл, вкліт
Кримське 15	98010001	2001	361 / 361	С	7	корм	сс	-	7-9	7	7	7	скліт, сбіл
Медовий F1	95010001	1998	378 / 378	С	7-9	корм	ср	-	7-9	7	7	7	вкліт, сбіл
Пам"яті Шепеля ®	06472001	2008	361 /	СЛ	9	корм	сс	-	9	9	9	9	сбіл, вкліт
Рона 1	08472001	2009	1280 /	С	8-9	корм	рс	-	9	7	9	9	вкліт
Силосне 42	99010002	2003	311 /	Л	7	корм	сс	-	7-9	7-9	7	7	вкліт, сбіл
Сило 700Д	04010001	2007	29 /	СЛ	7-9	корм	сс	-	7	7-9	7	7-9	сбіл, вкліт
Троїстий	03010001	2007	311 /	СЛ	7	корм	сс	-	7-9	7	7	7	сбіл, вкліт
Фаворит	99010001	2003	378 / 378	Л	5	корм	сс	-	5	7	7	7	скліт, сбіл
Сорго суданське			- 7										
Білявка ®	06067001	2008	414 /	СЛП	7	корм	сс	-	9	9	9	9	вбіл, скліт
Голубівська 25	97067002	2002	311 /	СП	7	корм	ср		7	7		7	вкліт, сбіл
Дніпровська 54	00067001	2004	340 /	СЛ	7	корм	сс		7-9	7		>5	вкліт, сбіл
Донецька 5	78067001	1984	315 /	Л	5	корм	сс		5	5		5	скліт, сбіл
Миронівська 36	78067002	1983	341 / 341	СЛ	5	корм	сс		5	5		5	скліт, сбіл
Одеська 221	86067003	1991	378 / 378	С	7	корм	сс		7	7		7	вкліт, сбіл
Фіолета	90067002	1996	361 / 361	СЛ	7	корм	сс		7	7		5	скліт, сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Сорго-суданковий гібрид			-	8									
Арабат	® 04063002	2007	414 /	Л	7-9	корм	сс	-	7-9	7-9	-	7	сбіл,вклт
Кадан 19	03063001	2007	311 /	Л	7	корм	сс	-	7-9	7	-	7-9	сбіл,вклт
Сократор 87	90063003	1992	361 /	-	7	корм	сс	-	7-9	7	-	7	склт, сбіл
Чудовий ВМР	04063001	2007	29 /	СЛ	7-9	корм	сс	-	7-9	7-9	-	7	сбіл, вклт
Ювілей 50	94063001	1998	361 / 361	СЛП	7	корм	сс	-	7	7	-	7	склт, сбіл
Ювілейний 75	98063001	2001	361 / 361	Л	7	корм	рс	-	5	7	-	7	склт, сбіл
Елевсина (Дагуса)			-	2									
Троніканка	99344001	2001	348 /	СЛ	7-9	корм	сс		7	7	7	7	склт
Пажитниця однорічна (Вестервольдська)			-	6									
Еней	87397005	1991	371 /	П	7	ск,лп	сс		7	7	7	7	склт
Елюнаріа	® 08397001	2009	600 /	Л	7	ск, лп	сс		6	6	7	7	вклт
Ореол	97397001	2000	305 /	ЛП	7	ск,лп	сс		7	7	7	7	вклт
Полланум	® 08397002	2009	600 /	Л	7	ск,лп	сс		6	6	7	7	вклт
Росавій	92397004	1997	371 /	ЛП	7	ск,лп	сс		7	7	7	7	склт
Тиверський	91397001	1996	305 /	ЛП	7	ск, лп	сс		7	7	7	7	вклт
Грястиця збірна			-	10									
Дрогобичанка	73049001	1979	370 /	СП	5	лп	сс	5	5	5		5	склт
Інгулка 17	® 05049003	2009	411 /	П	7-9	ск	сс	5	8	9		8	вклт
Київська рання 1	71049002	1979	337 /	СЛП	5	ск, лп	рс	5	5	5		5	склт
Лідакта	94049004	2000	600 / 807	ЛП	9	ск, лп	сп	5	7	7		7	вклт
Муравка	95049001	2001	337 /	ЛП	7-9	лп, ск	сп	7	9	7		7	вклт
Наталка	00049001	2005	337 /	ЛП	7	ск	сс	7	5	7	7	5	вклт
Олешка 14	94049001	2001	411 /	СЛП	7	ск	сс	7	7	7		5	вклт
Українка	05049002	2009	337 /	П	7	ск,лп	сп	7	8	9		9	вклт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
ФРКЛ-1	94049002	2000	971 /	Л	7	ск, лп	ср	5	7	7		7	вклін
Херсонська рання 1	84049002	1994	411 /	С	7	ск, лп	сс	5	7	7		7	склін
Житняк			-	**2**									
Кімбурн	® 05103002	2008	411 /	С	9	корм	сс	9	9	9	7	9	вклін
Петрівський	® 05103001	2008	305 /	СЛ	8	ск, лп	сс	9	9	7	8	8-9	вклін
Костриця Регеля			-	**1**									
Лиманська	® 06110001	2007	317 /	С	7	ск	ср	7	7	8		7	сбіл
Костриця лучна			-	**11**									
Веселоподолянська 1883	50054001	1961	388 /	СЛП	5	ск, лп	рс	5	5	5	5	5	склін
Венера	00054001	2005	392 /	ЛП	5	ск	сс	7-9	7	7-9	7	5	вклін
Діброва	03054001	2007	305 /	ЛП	7-9	ск,лп	сс	7	7-8	7	-	7-9	вклін
Катріна	05054002	2009	337 /	Л	7	ск,лп	сс	5	8	9		9	вклін
Літава	95054001	2001	337 /	ЛП	7	ск, лп	рс	5	7	7	7	7	склін
Ліфара	97054001	2002	600 / 807	ЛП	7	ск	рс	5	7	7	7	7	вклін
Маріца	® 07054001	2010	388 /	ЛП	7	ск,лп	сс	8	8	9	-	9	вклін
Росинка	92054001	1998	392 /	ЛП	7	ск, лп	рс	7	8	8	5	7	склін
Сену	98054001	2002	724 /	ЛП	5	ск	рс	5	7	7	7	7	склін
Сіверянка	00054002	2005	337 /	ЛП	7-9	ск	сс	7	5	7-9	7	7	вклін
Фіола	94054001	2000	971 /	Л	8	ск, лп	сс	5	7	7	7	7	вклін
Костриця очеретяна			-	**12**									
Домініка	00109001	2001	337 /	СЛП		озл	сс	7-9	7-9			7	дек,вщі
Данка	® 08109001	2009	1306 /	Л	7-9	ск,лп	сс	8	8	9	9	5	вклін
Кора	98109001	2002	724 /	ЛП	7	ск	ср	5	5	7	5	5	вклін
Кочиз	98109002	2001	724 /	СЛП		озл	сс	7	7-9			7	дек,вщі
Людмила	97109001	2001	305 /	Л	7	ск, лп	рс	5	5	7	7	7	вклін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Міро	98109003	2000	740 /	СЛ		озл	сс	7	7			7	дек,ещі
Мустанг	99109002	2001	971 /	СЛП		озл	сс	5	7			7	дек,ещі
Меандре	05109001	2006	600 /	СЛП		озл	сс	7	7			8	дек,ещі
Садівничанка	92109001	1998	392 /	ЛП	9	ск, лп	сс	7	7	7	7	7	вклт
Смерічка	99109003	2003	370 /	ЛП	7-9	ск	сс	7	7	7	7	7	вклт
ФРРСЦ 1	94109001	2000	971 /	ЛП	7	ск, лп	сс	5	7	7	7	7	склт
Чабанська	01109001	2003	345 / 345	ЛП	9	ск,лп	сс	7	7-9	7	7	7	вклт
Мітлиця велетенська			- 1										
Галичанка	91123001	1997	370 /	П	7	лп	сс	7	7	5	7	7	склт
Очеретянка звичайна			- 1										
Київська	69125001	1977	337 /	ЛП	7	лп	сс	5	7	7-9	7	7	склт
Пирій видовжений			- 1										
Сарматський ®	04345001	2006	317 /	С	7-9	ск	пс	7	7	7-9		7-9	сбіл,склт
Райграс високий			- 2										
Дронго	03060001	2004	305 /	ЛП	7	лп	сс	7-9	7	7	5	7	вклт
Полтавський 521	65060001	1982	387 /	С	5	лп, зак	сс	5	5	5	5	5	склт
Пажитниця багаторічна			- 33										
Андріана- 80	02062001	2003	337 /	СЛП	7	лп,озл	сс	7-9	7	7	7	7	склт,вдек
Арсенал ®	08062003	2009	600 /	Л	7	ск,лп	сс	6	6	6	7	8	вклт
Вінницька	90062004	1982	348 /	ЛП	-	озл	сс	5	5	-	-	5	дек,ещі
Везувіус ®	08062001	2009	600 /	Л		озл	сп	7	7			8	дек, ещі
Галліус ®	08062002	2009	600 /	Л		озл	сп	6	6			7	вдек, ещі
Гатор	98062006	2001	740 /	ЛП	-	озл		5	7	-	-	7	дек
Геркулес	94062003	2000	971 /	П	7	ск, лп	сп	5	5	5	5	7	склт
Генрієтта	99062004	2001	971 /	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	вдек

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Данило	98062003	2001	724 /	СЛП	-	озл	сс	5	7	-	-	7	дек
Дрогобицький 2	67062001	1974	370 /	ЛП	5	лп	сс	5	5	5	5	5	скл
Дрогобицький 16	91062001	1997	370 /	П	7	лп	сс	5	7	>5	7	5	скл
Довбушанка	® 06062001	2011	330 /	ЛП	7	ск,лп	ср	5	7	7	-	7	скл
Ексел	99062003	2001	971 /	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	дек
Інка	98062005	2001	991 /	СЛП	-	озл		>5	7	-	-	7	вдек
Київська 101	90062005	1978	348 /	ЛП	-	озл	сс	5	5	-	-	5	дек,спп
Лібропко	05062006	2006	600 /	СЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,спц
Ліфранс	05062005	2006	600 /	СЛП	-	озл		7	7	-	-	7	дек,спц
Лєта	99062008	2002	337 /	ЛП	7	лп, озл	рс	>5	9	7	>5	7	вклп,дек
Литвинівський 1	79062001	1986	337 /	Л	7	лп, озл	сс	7	7	7	7	7	вклп
Мрія	® 05062010	2010	345 /	Л	7	ск	сс	8	9	9	-	9	скл
Нуман	98062010	2001	740 /	ЛП	-	озл		5	7	-	-	7	дек
Ніга	® 06062002	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек
Оріон	00062002	2001	337 /	ЛП	-	озл		7	7-9	-	-	5	вдек
Обрій	97062001	2001	305 /	Л	7	ск, лп	сс	5	7	7	7	7	скл
Осин	® 07062001	2010	370 /	ЛП	7	ск,лп	сс	7	7	7	-	7	скл
Плезір	99062005	2001	600 / 807	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	дек
Руслана	04062001	2005	305 /	СЛП	-	озл	сс	7-9	7	-	-	7	дек
Святошинський	89062002	1995	345 / 345	ЛП	7	ск, лп	сс	5	7	5	>5	7	скл
Сакіні	94062008	1999	724 /	ЛП	-	озл	сс	5	7	-	-	7	вдек
Тайя	94062009	1999	724 /	ЛП	-	озл		7	7	-	-	7	дек
Талго	99062007	2001	971 /	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	вдек
Фієста 3	® 04062002	2006	914 /	СЛП	-	озл	сс	>5	5	-	-	7	дек, спц
Форнідо	® 08062004	2009	600 /	Л	8	ск,лп	сп	6	6	6	7	7	вклп
Гребінник звичайний декоративний			- 1										
Деснянський 126	90254001	1982	348 /	ЛП		озл		7	7			7	дек

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Костриця червона мінлива			- 4										
Аіда	99186001	2001	971 /	СЛП		озл		7	7-9			7	вдек,сщі
Дарвін	98186001	2000	740 /	СЛ		озл		7	7			7	вдек,сщі
Лівіста ®	08186001	2009	600 /	Л		озл	рс	7	7			8	вдек, вщі
Луцинда	05186001	2006	600 /	СЛП		озл	сс	7	8			7	вдек,вщі
Костриця жорстка			- 1										
Ріду	95333002	1999	724 /	ЛП		озл	сс	7	7			7	вдек
Костриця овеча			- 6										
Боріто	99331002	2001	600 / 807	СЛП	-	озл	сс	5	7-9	-	-	7	дек,сщі
Дєва	05331002	2006	337 /	СЛП	-	озл	сс	8	8		-	7	дек,сщі
Забава	94331001	1998	305 /	СЛП	5	озл, лп	сс	5	7	7	7	7	склі,дек
Ментор	05331001	2006	600 /	СЛП	-	озл	сс	8	8	-	-	7	дек,сщі
Ноні ®	06331001	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7-9	7-9	-	-	7	вдек,вщі
Спартан	99331001	2001	971 /	СЛП	-	озл	сс	5	7	-	-	7	дек,сщі
Костриця різнолиста			- 1										
Ізумрудна	90255001	1980	348 /	ЛП		озл		5	5			5	дек
Костриця червона			- 24										
Агата	94111001	1999	305 /	ЛП	5	лп, озл	ср	7	8	7	7	7	вклі, дек,сщ
Адіо ®	06111001	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,вщі
Богданка	00111001	2001	337 /	ЛП	-	озл	ср	7-9	7	-	-	7-9	вдек,вщі
Видубецька славна	90111003	1977	348 /	ЛП	-	озл	сс	7	5	-	-	5	дек,сщі
Геральд	98111006	2000	740 /	СЛ	-	озл	сс	7	5	-	-	5	вдек,сщі
Говерла ®	05111006	2008	370 /	ЛП	8	лп, ск	сс	9	8	8	8	9	вбіл
Джевелін ®	08111003	2009	600 /	Л		озл	пс	7	7			8	дек, сщі
Древлянська	97111001	2001	320 /	ЛП	7	лп	ср	7	7	7	5	7	склі

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Дніпровська	90111004	1982	348/	ЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,сщі
Джаспер II ю	04111001	2006	914/	СЛП	-	озл	сс	7	8	-	-	7-9	дек,сщі
Київлянка	90111005	1980	348/	ЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	5	дек,сщі
Ліпроза	97111003	2000	600/ 807	СЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	вдек,вщі
Лайт ю	08111004	2009	600/	Л	7	ск,лп	рс	7	8	7	6	7	вклт
Лєо ю	06111002	2007	991/	СЛ	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,вщі
Літанго ю	08111001	2009	600/	Л		озл	пс	7	7			8	дек, сщі
Лівізіон	05111005	2006	600/	СЛП	-	озл	сс	7	8	-	-	8	вдек,вщі
Оленка	02111001	2003	337/	СЛП	-	озл	сс	7-9	7	-	-	7-9	вдек,сщі
Роланд	99111008	2001	971/	СЛП	-	озл	пс	7-9	7	-	-	7	дек,сщі
Руфілла	99111007	2001	971/	СЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7-9	дек,сщі
Райдер ю	08111002	2009	600/	Л		озл	сс	7	7			7	дек, сщі
Сирецька	90111006	1987	348/	ЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,сщі
Сава ю	06111003	2007	991/	СЛ	-	озл	сс	7	7-9	-	-	7	дек,вщі
Янка	94111002	1999	305/	ЛП	5	лп, озл	скс	7	7-9	7	7	7	склт, дек
Костриця тонколиста			- 1										
Барва	04295001	2005	305/	СЛП	-	озл	сс	7	7			5	дек
Костриця шорстколиста			- 2										
Борнадо	99364001	2001	971/	СЛП		озл		5	7			7	вдек
Саманта	98364002	2000	740/	СЛ		озл		7	5			5	вдек
Мітлиця повзуча			- 3										
Клонова	90352001	1977	348/	ЛП		озл		7-9	7-9			7	вдек
Кромі	98352001	2001	724/	СЛП		озл		7	7			7	вдек
Като	99352001	2001	971/	СЛП		озл		7	7			5	дек

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Мітлиця тонка			- 1										
Деснянська 51	90294002	1980	348/	ЛП		озл		5	5			5	дек
Тонконіг звичайний			- 1										
Дасас	98358001	2001	724/	СЛП		озл		7	5			7-9	вдек
Тонконіг лісовий			- 1										
Шадоу	99343001	2001	971/	СЛП		озл		5	7-9			7	вдек
Тонконіг лучний			- 17										
Альпіна ®	04069002	2006	914/	СЛП		озл	сс	7	7			7	дек,сщі
Балін	92069003	1999	724/	сс		озл		>5	5			5	дек,сщі
Еска	98069005	2000	991/	СЛ		озл	сс	>5	7			7	дек,сщі
Компакт	98069001	2001	724/	СЛП		озл	сс	5	7			7	вдек,сщі
Конні	94069003	1999	724/	СЛ		озл	ср	5	7-9			7	дек,сщі
Лімаги ®	08069003	2009	600/	Л	7	ск,лп	сс	7	6	6	7	7	вкліт
Лімерік	05069002	2006	600/	СЛП		озл	сс	5	7			7	дек,сщі
Лімузине	97069002	2000	600/ 807	СЛ		озл	сс	7	7-9			7	вдек,сщі
Лінкольншір ®	08069001	2009	600/	Л		озл	ср	7	7			6	дек, сщі
Макс-1	00069001	2001	337/	ЛП		озл	рс	7-9	7			7	вдек,сщі
Міракле	98069006	2000	740/	СЛ		озл	ср	5	7			7	дек,сщі
Меркурій ®	04069004	2006	914/	СЛП		озл	сс	7	5			7	дек,сщі
Парсіфал ®	08069002	2009	600/	Л		озл	пс	7	7			7	вдек, вщі
Сирецький 27	90069002	1980	348/	ЛП		озл	ср	5	5			5	дек,сщі
Собра	98069002	2001	724/	СЛП	-	озл	сс	>5	7			7	вдек,сщі
Тачдаун ®	04069003	2006	914/	СЛП		озл	сс	7	5			7	вдек,сщі
Удич	04069001	2005	305/	СЛП	-	озл	сс	7	7	7	-	5	дек,сщі

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Белардіохлоа фіолетова			-	1									
Алекс	02402001	2003	337/	СЛП		озл		7-9	7			7	вдек
Стоколос безостий			-	13									
Арсен	05065002	2009	337/	П	7-9	ск, лп	рс	7	8	9	7	8-9	вкліт, сбіл
Борозенський 7	® 05065003	2009	411/	СЛП	7-9	ск.лп	сс	7	7	9	7	8-9	скліт, вбіл
Всеслав	97065001	2002	305/	СЛП	7	ск	ср	7	7	7	7	7	вкліт, сбіл
Вишгородський	90065001	1997	337/	ЛП	7-9	ск, лп	сс	7	7	7	7	7	вкліт,сбіл
Геліус	00065001	2004	337/	СЛ	9	ск	сс	7-9	7-9	7		>5	вкліт,сбіл
Марс	97065002	2001	305/	Л	7	ск, лп	скс	7	5	7	7	5	вкліт,вбіл
Полтавський 30	60065003	1967	387/	Л	5	ск, лп	сс	5	5	5	5	5	скліт, сбіл
Полтавський 52	81065004	1987	387/	ЛП	7	лп	сс	7	5	5	5	5	скліт,сбіл
Полтавський 5	98065001	2002	387/	СЛП	7-9	ск	ср	7	7	7	7	7	вкліт,сбіл
Скіф	00065003	2004	873/	С	7-9	ск	сс	7	9	9		7	скліт,вбіл
Сиваш	® 05065001	2008	411/	СЛ	7	корм	сс	9	6	9	-	8-9	скліт, вбіл
Топаз	00065002	2004	337/	СЛП	7	ск	сс	9	7	9		7	вкліт,сбіл
Таврійський	95065001	2000	411/	С	7	ск, лп	рс	5	7	7	7	7	скліт,сбіл
Тимофіївка лучна			-	8									
Аргента	91068001	1996	337/	ЛП	7	ск,лп	сс	7	7	7	7	7	вкліт, сбіл
Вишгородська	94068003	2001	337/	ЛП	7-9	ск, лп	сс	7	7	7	7	7	вкліт, сбіл
Витава	02068001	2006	305/	П	7	ск,лп	сс	7-9	7	7-9		7	вкліт
Каріна	00068001	2005	337/	ЛП	7	ск	сс	7-9	7-9	7-9	7	5	вкліт,вбіл
Лішка	97068001	2001	600 / 807	ЛП	7-9	ск, лп	ср	5	7	7	7	7	вкліт, сбіл
Пірнівчанка	05068003	2009	337/	П	7-9	ск,лп	ср	7	7	8	7	9	вкліт, сбіл
Підгірянка	99068002	2004	370/	ЛП	7	ск лп	сс	7	7-9	9		7-9	вкліт, сбіл
ФРВЛ-1	94068001	1999	971/	ЛП	7	ск, лп	ср	5	7	5	7	7	вкліт, сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Сорго багаторічне (Трава Колумба)			-	2									
Колумбо	® 08139001	2009	348/	С Л П	7	сил	сс	5	7	5	5	5	вкліт
Парана	98139002	2000	348/	ЛП	9	сил	сс	7	7	7	7	7	вкліт
Пажитниця багатоквіткова			-	4									
Гібридний (Ярослав)	87061002	1992	345/	Л	7-9	лп	сс	7	7	5	7	7	вкліт, сбіл
Жайвір	98061001	2003	371/	П	7	ск	сс	7	7	7		7	скліт, сбіл
Коломийська	® 05061002	2009	330/	П	7	ск.лп	сс	5	8	8	7	9	вкліт,сбіл
Лагідна	® 05061001	2009	345/	П	7	ск,лп	сс	7	8	8	7	9	вкліт,сбіл
Боби кормові			-	7									
Білун	98043001	2000	330/	ЛП	7	корм	скс		5	7	7	7	вбіл
Візир	03043001	2005	305/	ЛП	7-9	корм	сс	-	7	7	7	7	вбіл
Карсон	01043001	2002	1050/	СЛП		ун	рс						
Пікуловицькі 1	58043003	1962	371/	П	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Форум	01043002	2002	1050/	СЛП		ун	рс						
Хоростківські	58043005	1962	395/	Л	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Янкель білий	02043001	2003	1081/	СЛП		ун	рс						
Горошок (Вика озима)			-	8									
Вусата	94047006	1999	371/	С	7	корм	сс	7	7	5	7	>5	сбіл
Лебедина пісня	00133001	2003	387/	СЛ	9	корм	сс	7	7	5	7	7	вбіл
Львів'янка	92047001	1997	371/	СП	7	корм	сс	7	7	5	5	7	сбіл
Полтавська 77	80047005	1987	387/	СЛ	9	корм	сс	7	7	5	5	5	сбіл
Приморка	98047001	2001	305/	Л	7	корм	сс	7	7	5	7	>5	сбіл
Полтавська 25	63047001	1976	387/	СЛ	5	корм	сс	7	7	5	5	7	сбіл
Степна	90047005	1996	387/	П	7	корм	сс	7	7	5	7	7	сбіл
Ювілейна	97047004	2001	387/	СЛ	9	корм	сс	7	7	5	6	7	вбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Горошок (Вика яра)			- 21										
Аріадна	99047001	2003	306 /	ЛП	9	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Білоцерківська 10	00047002	2003	335 /	ЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Білоцерківська 7	97047002	2000	335 /	СЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	вбіл
Багатоплідна	94047004	1999	395 /	П	7	корм	сс		5	5	5	7	сбіл
Білоцерківська 96	98047004	2001	335 /	ЛП	9	корм	сс		5	5	5	7	вбіл
Віаріка	01047001	2005	306 / 791	ЛП	7	корм	сс	-	7-9	5	7	7	вбіл
Владіслава ®	06047001	2010	306 /	Л	7-9	корм	сс	-	7	7	7	9	вбіл
Гібридна 97	92047002	1999	387 /	СЛП	9	корм	сс		5	5	5	7	сбіл
Свгена ®	05047002	2008	335 /	СЛП	8	корм	сс	-	7	5	8	8	вбіл
Знахідка	00047003	2004	399 /	П	7	корм	сс		>5	>5	8	7	вбіл
Ізида	01047002	2005	335 /	ЛП	7-9	корм	сс	-	7-9	5	7	7	вбіл
Ірина ®	03047002	2007	306 /	СЛП	7-9	корм	сс		>5	5	7-9	7-9	вбіл
Ліла ®	06047002	2010	335 /	ЛП	7-9	корм	сс	-	8	7	8	9	вбіл
Ларія	01047003	2005	395 /	ЛП	7-9	корм	сс	-	7-9	5	7-9	7	вбіл
Ліліана ®	05047001	2008	306 /	СЛП	8	корм	сс	-	7	6	7	8	вбіл
Маргарита	94047003	1999	306 /	ЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Подільська 9	94047002	2000	306 /	СЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Прибузька 19	92047004	1997	306 / 791	СЛ	9	корм	сс		7	5	5	7	сбіл
Подільська 2	92047005	1998	395 /	П	7	корм	сс		5	5	7	7	сбіл
Світлана	02047001	2006	306 /	ЛП	7-9	корм	сс		7-9	5	7	7	вбіл
Ярослава ®	03047001	2006	335 /	ЛП	7-9	корм	сс		7	5	7	7	вбіл
Конюшина відкритозіва			- 1										
Діана	97361001	1999	305 /	ЛП	7	ск	сс	7	7	5	7	7	сбіл
Конюшина олександрійська			- 1										
Оріана	92143001	1996	305 /	ЛП	7	корм	сс	5	7	5	7	7	вбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Люпин білий			- 11										
Борки	97055002	2000	345 / 345	ЛП	7-9	х,корм	скс		5	7	7	7	сбіл
Володимир	94055001	1998	345 / 345	ЛП	7	х,корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Вересневий	99055001	2003	345 / 345	ЛП	7-9	корм	сс		7	7	9	7	вбіл
Гарант	94055002	1998	429 /	ЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Дієта	94055003	2004	345 / 345	ЛП	7-8	корм	скс		7-9	9	7-9	7	вбіл
Козелецький	87055008	1993	429 /	ЛП	7	х,корм	пс		7	5	7	7	сбіл
Либідь	00055001	2002	429 /	ЛП	7-9	корм	сс		7	7	7	7	сбіл
Макарівський	® 05055001	2008	345 /	ЛП	7	корм	сс	-	8	9	9	8	вбіл
Серпневий	® 03055001	2006	345 /	ЛП	7	корм	скс		7	7-9	7	5	вбіл
Туман	99055002	2002	345 / 345	ЛП	7	корм	сс		7	7-9	9	>5	сбіл
Щедрий 50	® 05055002	2009	429 /	П	7	корм	рс		8	8-9	9	7	вбіл
Люпин жовтий			- 7										
Бурштин	01057001	2004	345 / 345	ЛП	7	корм	скс		7	9	7-9	7	вбіл
Волинський 1	82057001	1985	307 /	ЛП	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Круглик	01057002	2005	345 / 345	ЛП	7-9	корм	скс	-	7	7-9	7-9	7	вбіл
Обрій	98057002	2002	345 / 345	ЛП	>5	корм	сс		9	7	9	7	вбіл
Прогресивний	® 05057002	2009	429 /	П	5	корм	рс		8	8-9	8	8-9	вбіл
Прип'ятський	86057001	1990	307 /	ЛП	5	корм	рс		5	5	5	5	сбіл
Чернігівець	97057001	2001	429 /	ЛП	5	корм	скс		7-9	7	7	7	сбіл
Люпин вузьколистий			- 3										
Зірковий	® 04056001	2005	345 / 345	ЛП	7-9	сд	скс	-	7	7-9	7	7	сбіл
Пелікан	® 05056002	2008	345 /	ЛП	7	корм	рс	-	8	9	8	7	сбіл, мал
Фламінго	® 05056001	2008	585 /	ЛП	6	корм	рс	-	8	7	9	9	сбіл, мал

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Серадела посівна			-	2									
Іскорость	02132001	2003	320/	ЛП	5	корм	рс		5	5	5	5	сбіл
Ольгінська ®	06132001	2008	320/	П	8	корм	сс	-	9	5	5	7	сбіл
Горох польовий (пелюшка)			-	4									
Древлянська ®	05048001	2008	320/	П	8	корм	сс	-	7	6	7	7	сбіл
Зв'ягельська	01048001	2003	320/	ЛП	5	корм	пс		7	5	7	8	сбіл
Резонатор	92048004	1997	404/404	СЛ	9	корм	сс		7	5	7	7	вбіл
Фундатор	03048001	2005	376/	СЛП	7-9	корм	сс	-	7-9	7	7-9	7	вбіл
Буркун білий			-	2									
Донецький однорічний	89044001	1995	520/	ЛП	7	ск, лп	сс	7	9	5	5	7	сбіл
Еней	87044003	1992	305/	СЛ	7	ск, лп	сс	7	7	5	7	7	сбіл
Еспарцет			-	9									
Аметист донецький ®	99050001	2004	315/	С	7	корм	сс	>5	7-9	7	-	7	вкліт, сбіл
Інгульський	71050001	1978	356/	С	5	корм	ср	7	9	7	5	5	сбіл,вкліт
Кіровоградський 22	98050001	2002	356/	СЛ	9	корм	сс	5	7-9	7	5	7	сбіл,вкліт
Кіровоградський 27	87050002	1994	356/	С	9	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл,вкліт
Костянтин	90050003	1996	356/	С	7	корм	ср	5	7	7	7	7	сбіл,вкліт
Кримський	97050001	2002	358/	СЛ	7	корм	сс	5	9	7	7	5	сбіл,вкліт
Медіно ®	07050001	2010	388/	ЛП	7	ск	сс	7-9	7	9	-	8	сбіл
Піщаний 1251	40050001	1948	388/388	СЛП	7	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл, вкліт
Смарагд	04050001	2007	356/	СЛ	7	ск	сс	7-9	7-9	7	-	7	вбіл
Люцерна мінлива			-	9									
Вавіловка 2	90392001	1996	411/	СЛ	7-9	ск	сс	7	7-9	7	7	7	вбіл
Веселка	92392001	1998	411/	С	7	ск	сс	5	7	7	7	7	вбіл
Лідія	00392001	2005	387/	СЛП	7	ск	сс	7-9	7	7	7-9	7	вбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Люба	® 04392001	2007	378 /	СЛП	7	ск	ср	9,0	9,0	7,0	-	7	сбіл,вкліт
Ласка	® 06392001	2007	378 /	СЛ	7-9	ск	сс	7-9	7	7	-	7	вбіл,вкліт
Росинка	03392001	2007	378 /	СЛ	5	ск	рс	7-9	7-9	7	-	7	сбіл,вкліт
Синська	80392001	1986	411 /	СЛ	7-9	ск	рс	5	7	7	7	7	вбіл
Унітро	89392001	1995	411 /	ЛП	9	ск	сс	7	7	7	7	7	вбіл
Херсонська 9	74392001	1979	411 /	С	5	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Козлятник лікарський			- 2										
Гарант	01107002	2003	348 /	СЛП	8	ск,корм	сс	7	8	5	5	5	вбіл
Лідія	01107001	2004	365 /	С	8	прм, лік	пс	9	7	8	8	9	
Козлятник східний			- 3										
Кавказький бранець	90321002	1996	348 /	Л	7	ск	сс	7	7-9	5	5	5	сбіл
НБС-75	® 08321001	2009	348 /	С Л П	7	ск	сс	5	7-9	5	5	5	
Салют	00321001	2001	348 /	ЛП	7	ск	сс	7	7-9	5	5	5	сбіл
Конюшина лучна			- 22										
Агрос 12	87052001	1993	429 /	СЛП	7	корм	сс	>5	7	7	5	7	сбіл
Анітра	94052001	1999	305 /	ЛП	5	корм	ср	>5	>5	7	7	>5	сбіл
Атлас	75052001	1983	429 /	ЛП	7	корм	сс	>5	5	5	>5	5	сбіл
Атлантіс	® 06052001	2010	912 /	П	9	корм	сс	7	7	8	-	7	сбіл
Красуня	02052001	2006	334 /	ЛП	7-9	ск	рс	7	7	8		8	вбіл
Кварта	94052004	2000	971 /	ЛП	8	корм	сп	>5	7	7	7	7	сбіл
Миронівська 5	94052003	2000	341 / 341	ЛП	7	корм	рс	>5	>5	7	7	5	сбіл
Мільвус	97052002	2002	807 / 807	ЛП	7	корм	рс	>5	>5	7	7	7	сбіл
Маруся	92052002	1998	345 / 345	ЛП	7-9	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл
Миронівська 45	68052001	1975	341 / 341	СЛ	5	корм	рс	5	>5	7	7	>5	сбіл
Носівська 4	64052001	1971	429 /	ЛП	5	корм	рс	5	>5	7	7	7	сбіл
Носівська 5	51052002	1961	429 /	ЛП	>5	корм	рс	7	7	7	7	>5	сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Передкарпатська 6	92052003	1997	370/	Л	7	корм	сс	7	5	7	7	>5	сбіл
Полянка	98052001	2003	345/345	П	7-9	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл
Полтавська 75	60052003	1968	387/	Л	7	корм	рс	>5	7	7	7	7	сбіл
Поліс	92052001	1996	345/345	ЛП	7-9	корм	рс	7	7	7	7	7	вбіл
Полісянка ®	05052001	2010	345/	П	7-9	корм	сп	7	7	7	-	7	сбіл
Спарта	99052001	2002	305/	ЛП	7	корм	рс	7	>5	7	7	7	вбіл
Тернопільська 4	97052001	2001	395/	ЛП	7	корм	сс	7	5	7	7	>5	сбіл
Тернопільська 3	91052005	1997	395/	ЛП	7	корм	сс	>5	5	7	7	7	сбіл
Уна ®	07052001	2010	879/	П	7-9	корм	сс	9	8	8	-	8	сбіл
Фалкон	03052001	2006	430/	ЛП	7-9	ск	рс	7	8	7		7	вбіл
Конюшина гібридна			- 2										
Левада	94051001	2000	305/	П	7	корм	рс	7	5	8	7	7	сбіл
Придністровська	01051001	2002	370/	ЛП	9	корм	сс	7	7-9	7	7	7	вбіл
Конюшина біла (повзуча)			- 5										
Даная	94053004	2000	305/	ЛП	7	корм	рс	7	5	7	7	7	вбіл
Лишнянська	91053001	1997	370/	П	7	корм	рс	7	5	7	7	7	вбіл
Ліфлекс	05053001	2006	600/	СЛП		озл	рс	7	8			7	вдек
Рівендел	98053002	2001	724/	СЛП		озл	сс	5	7-9			7	вдек
Юра	04053001	2008	971/	ЛП	7	корм	рснд	9	4	5	5	9	вбіл
Люцерна посівна			- 25										
Анді	88058001	1996	429/	П	5	ск	сп	5	5	5	5	7	сбіл
Алія ®	05058001	2010	430/										
Банат ВС ®	07058001	2010	879/	С	7-9	ск	сс	8	9	9	5	7	вбіл
Верко	81058002	1986	971/	ЛП	5	ск	ср	5	5	5	5	5	сбіл
Власта	00058001	2004	912/	С	7-9	ск	сс	7	7-9	7-9	7	7	сбіл
Веселоподолянська 11	57058001	1960	388/	СЛП	7	ск, лп	сс	7	7	7	7	7	вбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Віра	92058001	1999	387/	СЛ	7	ск	ср	5	5	5	5	5	сбіл
Владислава	94058002	2001	430/	СЛП	7-9	ск	сп	7	7	7	7	>5	вбіл
Сва	98058001	2002	378/378	ЛП	7	ск	сс	7	7	7	7	>5	сбіл
Зарниця	78058001	1982	378/378	С	5	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Зайкевича	25058001	1931	387/	СЛП	5	ск, лп	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Зоряна ®	05058002	2010	411/	Л	8-9	ск	сс	9	9	7	-	9	вбіл
Мрія одеська	90058023	1996	378/378	Л	5	ск	сс	5	5	7	5	5	сбіл
Надєжда	78058003	1982	411/	СЛП	5	ск	сп	7	7	7	7	7	вбіл
Ольга	94058001	2000	345/345	П	5	ск	сс	5	5	7	7	7	сбіл
Плато	94058004	2000	971/	ЛП	7-9	ск	сп	5	7	7	7	7	вбіл
Планет	94058003	1999	600/807	СЛ	7-9	ск	сп	5	7	7	7	7	сбіл
Полтавчанка	83058004	1987	387/	СЛП	7-9	ск	рс	7	7	7	7	7	вбіл
Регіна	92058004	1997	305/	СЛ	5	ск	сс	5	7	5	7	7	сбіл
Роксолана	89058004	1997	345/345	ЛП	7	ск	сс	5	5	7	7	7	сбіл
Радуга	75058002	1979	378/378	С	5	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Серафіма	99058001	2004	411/	СЛП	7-9	ск	сс	7-9	9	7	7	7-9	біл
Світоч	92058002	1999	378/378	С	7	ск	ср	5	7	7	5	7	сбіл
Синюха ®	06058001	2010	305/	СП	7-9	ск	сс,рс	7	8	8	-	8	сбіл
Ярославна	82058002	1987	345/345	СЛП	7-9	ск	рс	7	7	7	7	7	вбіл
Лядвенець рогатий			- 3										
Ант	99119001	2001	305/	СЛП	7	лп	сс	7	7	5	>5	7	вбіл
Аякс	97119001	2000	305/	ЛП	7	лп	рс	7	7	5	5	7	сбіл
Динамо	01119001	2002	320/	ПЛ	7	лп	сс	7	7	7	>5	7	вбіл
Чина лісова (гібридна)			- 1										
Попелюшка	97356001	1998	348/	ЛП	7-9	ск, сил	сс	7	7-9	5	7	7	сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Щириця			- 17										
Ацтек	94099001	1998	305 /	СЛП	5	зерн	сс		7	7	7	5	вкліт
Атлант	90099001	1994	305 /	ЛП	7	сил	сс		7	7	7	7-9	вкліт
Галицька	99099001	2002	371 /	ЛП	5	зерн	рс		7	5	5	7	скліт
Жайвір	98099003	2000	348 /	СЛ	7	зерн	рс		7	7	5	>5	вкліт
Кремовий ранній	94099003	1998	348 /	П	7	сил	рс		7	7-9	7	7	скліт
Кармін	98099002	2000	348 /	ЛП	7	сил	рс		7-9	>5	7	7	вкліт
Лєра	02099002	2003	405 /	СЛП	7	зерн	сс		7	7	7	7	вкліт
Надія	97099002	2000	405 /	СЛП		озл, зріз	сс		7	7	7	7	дек
Орхідея	94099005	1999	305 /	СЛ	5	зерн	сс		5	7	7	7	скліт
Роганський	98099001	2001	405 /	СЛП		озл, зріз	сс		7	7	5	7	дек
Стерх	88099001	1994	348 /	ЛП	7	сил	сс		7	9	7	7-9	скліт
Сем	02099001	2003	405 /	СЛП	7	зерн	сс		7	7	5	7	вкліт
Скіф	92099002	1998	371 /	П	7-9	сил	сс		7	7-9	7	7-9	скліт
Студентський	® 08099001	2009	405 /	Л	7-9	зерно	сп	-	9	9	9	7	вкліт
Ультра	93099001	1998	405 /	СЛП	7-9	зерн	рс		7	7	7	7	скліт
Харківський 1	97099001	2001	405 /	СЛП		лік	сс		7	7	5	7	
Мальва кучерява (калачики)			- 2										
Рада	02322001	2003	348 /	СЛП	7-9	сил,корм	сп		7	7	5	7	вкліт
Унава	97322001	1999	348 /	СЛП	7-9	сил	сс		7	7	5	7	вкліт
Мальва пульхела			- 2										
Рюзана	98120001	2000	348 /	ЛП	7-9	корм,сил	ср		7-9	7	5	7	вкліт
Сильва	97120001	1998	348 /	СЛП	7-9	корм,сил	сс		7-9	7	5	7	вкліт
Мальва Мелюка			- 1										
Кормела	97318001	1998	348 /	СЛП	7-9	корм,сил	сс		7-9	7	5	7	вкліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Топінамбур			- 4										
Дієтичний	85138001	1990	348/	СЛ	5	корм,овоч	сс	5	5	5		5	скліт
Львівський	95138001	1999	369/	П	7	корм	сс	7	7	7		7	вкліт
Подільський 94	94138001	1999	417/	ЛП	7	корм	сп	7	7	7		7	вкліт
Фіолет київський	98138001	2000	348/	ЛП	7-9	корм	сс	7	7	7		7	вкліт
Топінсоняшник			- 1										
Старт	98334001	2000	348/	ЛП	7-9	корм	пс	7	7	7		7	вкліт
Хатьма тюрінгська (Лаватера)			- 1										
Стугна-1	97170001	1999	348/	СЛП	7-9	сил	ср	7	7	7	5	7	скліт
Щавель тяншанський			- 2										
Румекс К-1	82142001	1988	348/	ЛП									
Румекс ОК-2	00142001	2001	348/	СЛП	9	корм	сс	7	7-9	7	7	7	вкліт
Сильфій пронизанолистий			- 3										
Канадчанка	90134001	1996	348/	СЛ	7	сил	рс		7	7	5	7	скліт
Переможець ®	08134001	2009	348/	С Л П	7	сил	рс	7	7	7	5	7	
Свербига східна			- 2										
Золотінка	89131001	1996	348/	Л	7	сил	сс		7-9	7	5	7	скліт
Олімпійська ®	08131001	2009	348/	Л	7	сил	сс		7-9	7	5	7	
Тіфон			- 2										
Оракам	97282001	1998	348/	Л	7	сил, корм	сс		7	5	5	7	скліт
Фітопал ®	08282001	2009	348/	Л	7	сил, корм	сс	7	5	5	7	7	
Фацелія пижмолиста			- 2										
Аліна	91199004	1995	302/	ЛП	9	мед,корм	сс		7	5	7	7	скліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Бало	07199001	2009	971 /	Л	9	мед, корм	сс		7	5	7	7	
Мальва гібридна			- 1										
Ніка	00299001	2001	348 /	СЛП	7-9	корм, сил	сс		7-9	7	5	7	вкліт
Сіда багаторічна			- 2										
Вірджінія	00283001	2001	348 /	СЛП	7-9	корм	сс	7	7	7	5	7	вкліт
Фітоенергія	® 08283001	2009	348 /	Л П	7-9	корм	сс	7	7	5	5	7	
Турнепс			- 1										
Сонячний ранок	® 06140001	2008	1163 /	ЛП	9	корм	сс	-	7	-	-	9	-
Гарбуз кормовий			- 3										
Валок	88102002	1993	310 /	С	7	корм	сс		7			7	вкліт
Гібрид 72	55102001	1959	387 /	СЛ	5	корм	сс		5			5	скліт
Кавбуз Здоров'яга	99102002	2003	808 /	ЛП	9	корм	пс		7			7	вкліт
Пирій середній			- 2										
Вітас	04423001	2005	337 /	СЛП	7-9	ск,лп	сс	7-9	7-9	7	7	7	сбіл, вкліт
Хорс	® 07423001	2009	305 /	Л,С	7-9	ск,лп	сс	9	9	7	8	7-9	вкліт
Костриця-райграсовий гібрид			- 1										
Ліфема	® 08410001	2009	600 /	Л	7	ск,лп	сс	6	7	6	7	7	вкліт
Люцерна жовта (серповидна)			- 1										
Наречена Півночі	® 05462001	2007	345 /	ЛП	7-9	ск,лп	сс	7-9	7	7-9		7	вбіл,вкліт
Еспарцет закавказький			- 2										
Адам	02050001	2008	378 /	СЛП	8	корм	сс	8	8	8	-	9	вбіл
Блиск	® 01050001	2006	378 /	С	5-9	корм	сс	7	7	7	-	7	вбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Стоколос прибережний			-	1									
Боян	® 07479001	2009	305 /	СЛ	7-9	ск,лп	рс	9	9	6	8	7	вкліт, сбіл
Сільськогосподарські: овочеві													
Баклажан їстивний			-	33									
Адоніс F1	98022004	2002	402 /	С	7-9	ун	рс	7-9	7-9			7	
Алмаз	79022001	1983	313 /	СЛП	5	конс	сс	5	5			5	
Адона F1	99022001	2001	1102 /	СЛП,ЗГр	7-9	пер	сс	7-9	7			7	
Анет F1	05022005	2006	753 /	СЛ	9	салат	рс	7	7			7-9	
Вагомий	02022001	2004	1054 / 1054	ЗГр(ПТ)	7	салат	рн	7	7			7	
Єпик F1	98022001	2005	744 /	С	7-9	ун	рс	7	7			7	
Коломбо	® 05022012	2008	1163 /	Сл	7	ун	рс	7	7			7	
Калігула	® 05022001	2008	635 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Ліловий ранок	02022003	2005	736 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Лонг Поп	® 04022001	2006	1163 /	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	
Міледа F1	05022008	2008	1050 /	СЛ	7	стл	сс	7	7			7	
Оріон	05022003	2006	1197 /	Зг	9	ун	рс	7	7			7	ун
Прем'єр	® 05022002	2008	402 /	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	
Пущанський-60	® 04022002	2007	1054 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			9	
Сауран	® 03022001	2006	313 /	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	ун
Тірренія F1	05022004	2006	753 /	СЛ	9	ун	рс	7	7			7-9	ун
Ультраранній F1	98022003	2001	402 /	СЛП	7	пер	рс	7	7			7	пер
Фабіна F1	95022001	2000	900 /	СЛП	7	конс	ср	7-9	7-9			7	конс
Фарама F1	® 04022004	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Боби кінські			-	1									
Переможець	® 05043001	2008	330 /	ЛП	9	корм	сс	-	8	9	9	8	вбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Буряк столовий			- 50										
Січовий	® 05023004	2008	635 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Атоман	® 04023004	2006	293 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Астар F1	02023006	2006	1072 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Болівар	81023002	1999	753 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			7-9	
Болтарді	96023001	1999	1050 /	СЛП	9	ун	сс	7-9	7-9			7-9	
Бона	97023001	2001	969 /	ЛП	7-9	ун	сс	7-9	7-9			7	
Буллет	98023002	2002	1013 /	ЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Бордо харківський	96023002	2000	402 /	СЛП	9	ун	сс	9	9			9	
Багряний	96023003	2000	402 /	СЛП	7	ун	сс	7-9	7-9			7	
Бікорес	07023002	2008	751 /	Зг,Ст	7-9	ун	сс	7	7			7	
Бастард	® 05023003	2008	635 /	СОП	пс	ун	7	7				7	
Бордо київський	® 04023005	2007	343 /	СЛП	7	стл	сс	7	7				
Боро F1	® 02023005	2006	751 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			9	
Ворріор F1	97023005	2001	900 /	СП	9	ун	сс	9	9			9	
Водан F1	03023003	2006	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Дій	81023001	1997	402 /	СЛП	7		сс	9	7			7	
Ефіоп	® 03023005	2008	647 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Єгіпос	® 02023002	2005	1163 /	СП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Кармазин	® 06023001	2008	1084 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Кадет	® 04023003	2006	293 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Кардинал	® 05023006	2008	1163 /	СОП	7	ун	пс	7	7			7	
Кедрі	® 02023003	2006	1163 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Ліберо	00023001	2002	1102 /	С	9	ун	рс	9	9			9	
Ларка	® 04023001	2007	1102 /	СЛП	7-9	стл	ср	7	7				7-9
Лома	® 04023002	2007	1102 /	СЛП	9	стл	рс	7	7			7	
Моніка	® 05023001	2006	888 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Носівський плоский	34023001	1937	430/	СЛП	5	ун	сс	5	5			7	
Нобол ®	06023004	2008	900/	СЛП	7-9	ун	сс	7	7			9	
Опольський ®	02023004	2005	1084/	СЛП	7-9	стл	ср	7	7			7	
Регульський циліндр	03023002	2006	1081/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Ривал F1	06023005	2007	707/	СЛП	7	стл	сс	7	7			7	
Торпедо	06023003	2009	647/										
Цітадела ®	05023002	2007	888/	СЛП	7-9	стл	сс	7	7				
Червона куля	65023001	1991	712/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Чорномор	06023002	2009	647/										
Гірчиця салатна			- 2										
Зорянка	03144001	2005	984/	СЛП	7	унів	рс	7	7			7	
Гарбуз звичайний			- 16										
Альтаїр	02102003	2004	410/	С,Л	7	овоч	рс	7	7			7	
Гілея	92102001	1996	410/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Гамлет	02102001	2004	310/	С,Л	7	овоч	рс	7	7			7	
Диво	01102001	2004	410/	С	7	овоч	ср	7	7			7	
Ждана	94102002	2000	310/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Лель	94102001	1998	310/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Мозоліївський 15	49102003	1950	402/	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Новинка	84102001	1993	410/	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Польовичка	97102002	2001	410/	Л	7	ун	сс	7	7			7	
Піза	03102001	2004	1081/	С,Л	7-9	овоч	рс	7	7			7	
Південний	99102003	2003	410/	С	7-9	ун	рс	7	7			7	
Світень	99102001	2003	310/	С	7	ун	сс	7	7			7	
Славута	80102005	1987	310/	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Український багатоплідний	49102004	1950	310/	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Херсонський	73102001	1982	410 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Юнона ®	05102002	2008	1081 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Горох овочевий			- 40										
Арфа	04024004	2009	506 /										
Ария	04024005	2009	506 /										
Бастіон ®	05024001	2008	753 /	СЛП	9	ун	ср	7	7			7	
Вада ®	05024002	2008	753 /	СЛП	9	ун	ср	7	7			7	
Дінга	92024004	1995	721 /	СЛП	5	конс	рс	5	5			5	
Женева ®	05024004	2008	753 /	СЛП	9	ун	ср	7	7			7	
Каскад	92024001	1997	313 /	СЛП	7	конс	сс	7	7			7	
Каріна ®	05024003	2008	753 /	СЛП	9	ун	рс	7	7			7	
Лея	04024003	2009	506 /										
Овочеве диво	99024002	2003	1121 /	СЛП	7-9	конс	сс	7	7			7	
Ода ®	04024007	2008	506 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Рада	04024001	2009	506 /										
Уладовський харчовик ов	98024001	2001	304 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Фея	04024002	2009	506 /										
Фора	04024006	2009	506 /										
Диня посівна (звичайна)			- 55										
Сега F1	06025002	2007	273 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Анзер F1	06025003	2007	273 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Альтанка ®	03025003	2006	313 /										
Амал F1 ®	04025002	2007	900 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Берегиня	91025002	1995	310 /	Л	5	свж	сс	5	5			5	
Борівчанка ®	05025005	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Грідоу F1	00025002	2003	900 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7-9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Гопрінка	86025001	1991	410 /	С	5	свж	ср	5	5			5	
Голді ТЗ F1	06025001	2008	900 /										
Грідоу F1	00025002	2003	900 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
Голянка	85025003	1990	410 /	С	5	свж	рс	5	5			5	
Дідона	03025002	2007	410 /	Сл	7	свж	рс	7	7			7	
Думка	® 02025004	2007	310 /	Сл	7	свж	рс	7	7			7	
Злата	99025001	2003	310 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
Забавка	® 02025005	2007	310 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Інея	88025001	1992	310 /	СЛ	5	свж	сс	5	5			5	
Інгулка	99025003	2003	410 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7	
Криничанка	80025002	1985	402 /	СЛ	5	свж	рс	5	5			5	
Лишнева	90025001	1995	310 /	СЛП	5	свж	рс	5	5			5	
Лада	92025001	1998	410 /	СЛП	5	свж	сс	5	5			5	
Монарх	05025013	2007	840 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Малага F1	® 05025004	2008	1081 /										
Мельба	® 05025002	2006	1081 /										
Ольвія	02025007	2007	410 /	Сл	7	ун	рс	7	7			7	
Олівін	® 05025001	2008	1081 /										
Самарська	82025001	1983	310 /	С	5	свж	сс	5	5			5	
Супер Стар F1	97025002	2001	900 /	С	7-9	свж	рс	7	9			7-9	
Селедин F1	® 05025003	2008	1081 /										
Серпянка	89025003	1997	410 /	СЛП	5	свж	рс	5	5			5	
Тітовка	94025003	2000	310 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Кабачок			- 34										
Алія F1	03026001	2006	900 /	СЛ	7-9	ун	рс	7	7			7-9	
Аспірант	® 03026005	2010	313 /										
Акробат	® 05026008	2008	410 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Барбі	® 05026002	2008	635 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Грибовський 37	42026001	1955	149 /	СЛП	5	конс, стл	рс	5	5			5	
Гайдамака	03026004	2007	410 /	СЛП	5	ун	сс	7	7			5	
Езра F1	06026001	2008	887 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Золотінка	87026001	1993	410 /	СЛП	5	конс, стл	рс	5	5			5	
Искандер F1	00026001	2001	744 /	СЛП	7-9	ун	рс	7-9	7-9			7-9	
Кавілі F1	00026003	2003	753 /	СЛ	7-9	ун	рс	7-9	7-9			9	
Кларнет F1	® 05026007	2008	1163 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Лебідь	® 05026003	2008	635 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Мостра F1	® 06026004	2008	900 /	ЗГр,Ст	7	ун	рс	7	7			7	
Медуза F1	05026001	2007	273 /	СЛП	5	ун	сс	7	7			5	
Нефріт F1	03026003	2004	1081 /	С,Л	7	стл	рн	7	7			7	
Одеський 52	49026002	1950	381 /	СЛП	5	конс, стл	рс	5	5			5	
Опал F1	03026002	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Престиж F1	® 05026005	2008	313 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Сорая	98026001	2001	1081 /	С	7	пер	рс	7	7			7	
Світозар	99026001	2003	313 /	Л	7-9	ун	рс	7	7			7	
Садко F1	00026004	2006	1044 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Таміно F1	00026002	2003	900 /	С	7-9	ун	сс	7	7			9	
Чаклун	99026002	2002	402 /	ЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Кавун звичайний			- 88										
АУ-Продюсер, ПВП	01027008	2004	890 /	С,Л	7	стл	рн	7	7			7	
Атлант	01027004	2004	410 /	С,Л	7	стл	рс	7	7			7	
Альянс	02027002	2007	410 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Борчанський	79027002	1983	402 /	СЛП	5	свж, зс	рс	5	5			5	
Восход	78027001	1987	410 /	СЛ	5	свж, зс	сс	5	5			5	
Васко F1	05027001	2006	887 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Голопристаньський	85027009	1990	410 /	СЛ	5	свж, зс	рс	5	5			5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Гарний	95027001	1999	402 /	СЛП	7	свж, зс	рс	7	7			7	
Долбі F1	99027003	2002	753 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Думара F1	80027001	1999	753 /	СЛ	5	свж, зс	рс	5	5			5	
Дарунок	01027002	2004	410 /	С	7	стл	рс	7	7			7	
Дебют F1	01027010	2005	410 /	СЛ	7	всж	рс	7	7			7	
Єврика F1	99027005	2001	744 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Зоряний	97027016	2001	310 /	С	7	свж	сс	7	7			7	
Каховський	97027013	2001	410 /	С	7	свж	сс	7	7			7	
Кримсон Глори F1	03027001	2004	744 /	С,Л	7-9	стл	рн	7	7			7-9	
Княжич	99027006	2003	410 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Крімсон Світ ХМ	96027001	1999	1012 /	С	7-9	свж, зс	ср	7	7			7	
Крісбі F1	94027002	1997	753 /	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5			5	
Красень	85027003	1991	410 /	С	5	свж, зс	сс	5	5			5	
Крімсон Делайт F1	01027009	2005	890 /	С	7	унів	рс	7	7			7	
Леді F1	98027002	2001	753 /	С	7-9	свж	рс	7	7			9	
Легінь	97027004	2001	410 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Мелітопольський 60	50027001	1953	310 /	СЛ	5	свж, зс	сп	5	5			5	
Новорічний	01027001	2004	410 /	С,Л	7	стл	сс	7	7			7	
Нікопольський	97027011	2001	310 /	С	7	свж	сс	7	7			7	
Орфей	92027001	1997	410 /	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5			7	
Огоньок	55027004	1960	402 /	СЛ	5	свж, зс	рс	5	5			5	
Обрій F1	94027001	1998	310 /	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5			5	
Північне Сяйво	97027012	2001	310 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Порційний	03027003	2006	410 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Ройал Кримсон Свит	03027002	2004	744 /	С	7-9	стл	рн	7	7			9	
Рясний	91027003	1997	410 /	СЛП	5	свж, зс	сп	5	5			5	
Сотник	01027006	2003	410 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Січеслав	91027006	1995	310 /	П	5	свж, зс	сс	5	5			5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Серьоженька	91027004	1997	410/	СЛП	5	свж, зс	рс	5	5			5	
Сніжок	81027003	1987	410/	С	5	свж, зс	сп	5	5			5	
Скарб	94027003	2000	310/	С	7	свж	рс	7	7			7	
Стетсон F1	® 04027002	2007	900/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Трофі F1	84027004	1999	753/	С	5	свж, зс	ср	5	5			5	
Таврійський	78027005	1982	410/	СЛ	5	свж, зс	сс	5	5			5	
Фаворит	02027001	2006	310/	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Херсонський	01027007	2005	410/	С	7	свж	рс	7	7			7	
Чорногорець	91027005	1997	402/	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5			7	
Широнінський	86027002	1990	402/	Л	5	свж, зс	сс	5	5			5	
Кенді МС F1	05027002	2007	273/	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Спаський	03027004	2007	410/	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Фарао F1	01027011	2006	1050/	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Капуста білоголова			- 174										
Арос F1	97028001	2001	969/	СЛП	9	ун	пс	7	7			9	
Адема F1	03028011	2004	1102/	С,Л,П	9	ун	сс	9	9			9	
Амагер 611	37028001	1950	149/	СЛП	5	зс	пс	7	7			5	
Адмірал F1	95028002	2000	900/	ЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Амтрак F1	92028010	2001	751/	СЛ	9	ун	пс	7	7			9	
Агрессор F1	01028001	2003	1050/	СЛ	9	ун	сп	9	7			9	
Атрия F1	94028003	1997	744/	СЛП	9	ун	пс	7	7			7	
Анкома F1	99028002	2001	1102/	П	9	ун	пс	7	7			9	
Аррівист F1	98028010	2001	744/	СЛ	7-9	сал	рс	7	7			9	
Аммон F1	03028009	2004	744/	С	9	ун	пс	9	9			9	
Аніта F1	02028009	2006	1072/	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Бородін F1	06028003	2008	887/	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Бригадир F1	99028006	2003	900/	ЛП	9	пер	сп	7	7			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Балбро F1	01028002	2003	887/	Л	7	ун	сс	7	7			9	
Бронко F1	94028010	1997	751/	СЛП	7	зс	пс	7	7			7	
Брага F1	98028004	2002	1013/	ЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Білосніжка	68028002	1974	402/	СЛП	5-7	зс	пс	7	5			7	
Блоктор F1	® 05028004	2006	1050/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Бірюза	® 04028013	2006	293/	СЛП	7	ун	сп	7	7			9	
Белтис F1	03028016	2005	744/	С	7-9	унів	сс	7	7			7	
Віоланта	® 91028002	1995	343/343	СЛП	5-7	ун	пс	7	7			7	
Вестри F1	97028005	2001	744/	П	9	сал	рс	7	7			9	
Гермес F1	97028006	2001	744/	П	9	ун	сп	7	7			9	
Галакси F1	95028005	1998	744/	СЛП	9	ун	пс	9	7			7	
Гранада F1	® 04028012	2006	293/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Герда	® 05028012	2008	1163/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Дитмаршер фрюер	57028001	1966	721/	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Дидон F1	03028013	2005	744/	СЛ	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
Експрес F1	00028003	2003	1044/	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Ердено F1	84028002	1996	1050/	СЛП	9	ун	пс	7	7			9	
Еліза	® 03028006	2006	33/	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Ельвіра F1	® 04028015	2006	293/	СЛП	7	ун	ср	7	7			9	
Єтма F1	99028003	2001	1102/	СЛ	9	сал	рс	7	7			9	
Жозефіна	® 92028001	1997	343/343	СЛП	7	ун	сп	7	7			7	
Золотий Акр	® 02028005	2006	1163/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Иксион F1	03028014	2005	744/	СЛ	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
Краутман F1	92028015	1997	751/	СЛП	7	зс	пс	7	7			7	
Коронет F1	96028001	1999	753/	СЛП	7	ун	сп	7	7			7-9	
Княгиня	94028016	2001	343/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Колорит F1	® 04028002	2008	888/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Камінна голова	02028001	2004	1081/	С,Л,П	9	ун	сс	7	7			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Камбрія F1	07028007	2008	751/	Зг,Ст	7	ун	сс	7	7			7	
Кандіша	® 04028007	2006	33/	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Кастелло F1	06028004	2008	887/	СЛП	7-9	ун	ср	7	7			7	
Кріптон F1	05028001	2006	887/	СЛП	7	ун	пс	7	7			9	
Каунт F1	® 03028003	2006	900/	СЛП	9	ун	пс	7	7			9	
Каунтер F1	03028012	2006	751/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Колобок F1	® 03028008	2006	964/	СЛП	7	ун	сп	7	7			7	
Капорал F1	® 03028002	2006	900/	СЛП	7	свж	сс	7	7			9	
Каліна F1	02028008	2005	1072/	Л	7	унів	пс	7-9	7			7	
Куізор F1	05028005	2006	1050/	СЛП	7	ун	сс	7	7			9	
Калібро F1	01028006	2005	888/	ЛП	7	унів	сс	7	7			7	
Лангедейкер децема	72028005	1989	999/	СЛП	7	зс	пс	7	7			7	
Ліка	80028001	1985	402/	СЛП	5	зс	пс	5	5			7	
Лснінокс F1	92028014	1999	751/	Л	9	ун	пс	7	7			9	
Леся	95028001	1999	402/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Леопольд F1	07028006	2008	751/	Зг,Ст	7	ун	сс	7	7			7	
Ліон F1	02028003	2005	887/	СП	7	унів	пс	7	7			7	
Лангесвит Бевар	® 02028004	2006	1163/	СЛП	7	ун	сп	7	7			9	
Менді F1	07028005	2008	751/	Зг, Ст	9	ун	сс	7	7			7	
Меджик F1	® 06028009	2008	900/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Мегатон F1	92028021	1997	751/	СЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Мандарин F1	94028005	1997	900/	СЛП	7-9	зс	пс	7-9	7			7-9	
Мідор F1	94028007	1999	969/	СЛП	9	зс	сп	7	7			7	
Марселло F1	99028005	2002	1102/	СЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Марабу F1	® 03028001	2006	900/	СЛП	7	ун	пс	9	7			9	
Новатор F1	05028003	2006	1050/	СЛП	7	ун	пс	9	7			9	
Нозомі	® 03028005	2006	33/	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Ольга	® 00028002	2003	343/	СЛ	7	ун	пс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Олімп	97028002	2001	969 /	СЛП	9	ун	пс	7	7			9	
Орион F1	03028010	2004	744 /	С	9	сал	рс	9	9			9	
Оракл F1	(К) 06028008	2008	900 /	СЛП	9	ун	рс	7	7			7	
Парел F1	90028012	1997	751 /	СЛП	7-9	сал	рс	7	7			7-9	
Пандион F1	02028002	2003	744 /	СЛ	9	сал	рс	7	7			9	
Ринда F1	97028007	1999	744 /	П	9	сал	ср	7	7			9	
Росава	94028017	1999	343 /	СЛП	7	сал	ср	7	7			7	
Руссо F1	06028001	2008	887 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Ріспект F1	(К) 04028014	2006	293 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			9	
Столична	(К) 79028005	1983	343 / 343	СЛП	5	зс	сп	5	5			5	
Супер казачок F1	00028001	2003	1044 /	СЛ	9	ун	пс	7	7			7	
Супер екстра F1	97028003	2001	1044 /	СЛП	9	ун	пс	7-9	7-9			7	
Саратога F1	92028009	2001	751 /	ЛП	9	ун	пс	7	7			9	
Структон F1	06028002	2008	887 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Славія	(К) 04028001	2006	1163 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			9	
Сюрприз F1	02028006	2005	751 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Сілема F1	(К) 04028010	2007	1102 /	СЛн	7	ун	сп	7	7			7	
Тетянка	94028015	2000	343 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			7	
Трансам F1	94028012	1999	751 /	Л	7	ун	пс	7	7			7	
Томас F1	06028006	2008	751 /	СЛП	9	ун	ср	7	7			9	
Тарас F1	(К) 03028004	2006	647 /	СЛП	7	ун	сс	7-9	7			9	
Українська осінь	83028003	1987	402 /	СЛП	7	зс	пс	7	7			7	
Увертюра	(К) 04028006	2006	1163 /	СЛП	7	7	рс	7	7			7	
Фарао F1	91028003	2001	751 /	СЛ	9	сал	рс	7-9	7-9			9	
Футошки	98028008	2001	879 /	СЛП	9	сал	рс	7	7			9	
Харківська зимова	71028002	1976	402 /	СЛП	7	зс	пс	7	7			7	
Харіксйн F1	02028007	2006	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Чіз F1	94028004	1997	900 /	СЛП	7-9	ун	пс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Чесма F1	99028004	2001	1102 /	СЛ	9	сал	рс	9	9			9	
Яна ®	99028008	2002	402 / 402	П	9	ун	пс	9	7			7	
Ярославна	90028006	1993	402 /	СЛП	7	зс	пс	5	5			7	
Авак F1 ®	05028009	2008	888 /	СЛП	7	ун	пс	9	9			9	
Геліос F1 ®	04028005	2008	888 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Гігант F1 ®	06028011	2008	900 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Кубок F1 ®	06028010	2008	900 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Мерідор F1 ®	04028004	2008	888 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Селма F1 ®	04028008	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	сп	7	7			7	
Талєма F1 ®	04028009	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	сс	7	7			7	
Центуріон F1 ®	06028007	2008	900 /	СЛП	9	ун	пс	7	7			7	
Віват F1 ®	05028007	2008	964 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Калорама F1 ®	04028011	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	пс	7	7			7	
Мостар F1	05028008	2007	273 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Парадокс F1	06028005	2008	751 /	СЛП	7-9	ун	пс	7	7			7	
Перлина F1	05028006	2007	647 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Скіф F1 ®	06028012	2008	900 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Капуста броколі			- 15										
В'ярус	02148001	2003	1081 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			9	
Ледніцка	04148001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Миледи F1	82148001	2005	744 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Трубадур ®	06148001	2007	647 /										
Цезар	03148001	2007	1081 /										
Капуста червоноголова			- 27										
Антрацит ®	06030002	2008	699 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Ауторо F1	92030004	1997	751 /	СЛП	7	сал	сс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Лангесвит Ред	® 04030001	2006	1163 /	СЛП1	7	ун	пс	9	7			7	
Палета	® 06030003	2008	402 /	СЛП1	ун	7	сс	7	7			7	
Рокси F1	03030001	2004	744 /	С	9	стл	рн	9	9			9	
Редма F1	® 04030003	2007	1102 /	СЛП1	7-9	ун	сс	7	7			7	
Родон F1	06030001	2008	887 /	СЛП1	7	ун	сс	7	7			7	
Топаран	® 04030002	2006	293 /	СЛП1	7	ун	сс	7	7			7	
Фусто F1	99030002	2002	900 /	С	9	ун	ср	7	7			9	
Капуста кольрабі			- 5										
Глобус	04105003	2005	888 / 888	СЛП1	7-9	свж	рс	7	7			7	
Наталка	04105002	2005	888 / 888	СЛП1	7-9	свж	рс	7	7			7	
Пурпурова	® 04105001	2005	1163 /	С ЛП1	7-9	свж	рс	7	7			7	
Сніжана	® 06105002	2007	647 /										
Фея	® 06105001	2007	647 /										
Капуста пекінська			- 18										
Білко F1	03152002	2005	751 /	СЛП1	7-9	свж	рс	7	7			7	
Гілтон	04152005	2006	888 /	СЛП	7	ун.	рс	7	7			7	
Маноко F1	02152001	2004	751 /	С,Л,П	7-9	стл	рн	7	7			7	
Мішель	® 04152001	2005	1163 / 1013, 1163	СЛП1	7-9	свж	рс	7	7			7	
Піонер F1	00152001	2002	157 /	СЛП1	7-9	сал	рс	7	7			7	
Юкі	® 04152003	2005	33 /	СЛП1	7-9	свж	рс	7	7			7	
Капуста цвітна			- 53										
Авізо	94029001	1997	900 /	СЛП1	9	ун	сс	7	7			9	
Америго F1	01029001	2006	1050 /	СЛП1	9	ун	рс	7	7			9	
Алабастра F1	® 06029005	2008	1163 /	СЛП1	7	ун	сс	7	7			7	
Акварель	® 06029003	2008	647 /	СЛП1	7	ун	рс	7	7			7	
Балдо F1	03029006	2004	744 /	С,Л	9	ун	рс	9	9			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Барселона F1	02029002	2005	887 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7	
Винсон F1	02029001	2003	744 /	СЛ	9	ун	рс	9	9			9	
Віткі F1	06029010	2008	1102 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Гудмен	92029004	1999	751 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Дельта ®	04029005	2008	888 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Зефір ®	06029008	2008	635 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Кортес	84029001	1997	1050 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Каспер F1	06029009	2008	1102 /	СЛП	7-9	ун	пс	7	7			7	
Кашмір ®	03029004	2006	33 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Лекану F1	97029002	1999	1050 /	Л	9	ун	сс	7	7			7	
Ливингстон F1	05029003	2007	1050 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Локріс	05029004	2009	215 /										
Лейла F1	06029007	2007	273 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Матін F1 ®	06029004	2008	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Миньйон F1 ®	03029001	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Мобі дик F1 ®	03029002	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Мейфлауер F1 ®	04029006	2007	900 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Наутілус F1	00029001	2003	900 /	СЛ	9	ун	сс	9	9			9	
Немо F1 ®	04029007	2007	900 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Опал ®	04029002	2007	1102 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Пролісок F1 ®	04029003	2006	293 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Профіл	99029002	2001	1102 /	С	9	ун	рс	7	7			9	
Планита F1	97029005	2005	744 /	С	7-9	свж	рс	7	7			7	
Поранек ®	02029003	2005	1084 /	С	7-9	свж	рс	7	7			7	
Робер	98029002	2001	1081 /	СП	9	ун	рс	7	7			7	
Сірія F1	95029001	1999	900 /	СЛП	9	ун	сс	9	9			9	
Скайвокер F1	02029004	2005	751 /	С	7-9	свж	пс	7	7			7	
Сновхед ®	04029001	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Тофар F1	06029001	2008	751/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Уніботра	® 04029004	2006	293/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Уайт Ексель	® 03029005	2006	33/	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Фремонт F1	97029001	1999	744/	Л	9	ун	сс	9	9			9	
Фламінго	® 06029002	2008	647/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Фарго F1	92029007	1997	751/	СЛП	9	ун	сс	9	7			9	
Фаті F1	06029006	2007	273/	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Шамбор F1	06029011	2008	1102/	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Квасоля овочева			- 34										
Артеміс	® 04087001	2005	1013/ 1013	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Вид	98087003	2001	879/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Галопка	02087001	2003	1081/	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Голубка	® 05087004	2008	1163/	СЛП	5-7	зерн	рн		7	7	7	7	цін
Даяна	02087008	2004	888/	СЛП	9	унів	рс	7	7			7	
Еурека	02087006	2004	1084/	СЛП	7	стл	рн	7	7			7	
Загадка	02087004	2004	1163/	СЛП	7	стл	рн	7	7			7	
Зіронька	96087001	2000	405/	ЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Киліан	04087002	2005	1013/	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Ляура	97087002	2001	1072/	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Лібра	97087003	2001	1072/	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Ольга	92087002	1997	721/	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Пітра	02087007	2004	888/	СЛП	9	стл	рс	7	7			9	
Поп Топ	02087005	2004	1163/	СЛП	7	стл	рн	7	7			7	
Полька	02087002	2003	1081/	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Пантера	® 03087002	2005	1084/	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Сонеста F1	95087001	1999	1013/	С	7	ун	рс	5	5			5	
Скуба	98087001	2002	1013/	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Сюїта	03087003	2005	313 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Тосик	® 05087002	2008	339 /	СЛП	5	зерн	сс		7-9	7	7	5	цінн
Царівна	® 05087006	2008	1163 /	СЛП	5-7	зерн	рн		7	7	7	7	цін
Крес-салат			-	3									
Вість	84157002	1990	402 /	СП	5	свж	рс	5	5			5	
Холодок	® 04157001	2006	984 /	СЛП	7	свж.	рс	7	7			7	
Кукурудза розлусна			-	3									
Ірида F1	® 04033001	2006	404 /	ПЛС	7	ун	рс	7	7			7	
Люкс	® 02033001	2006	378 /	ПЛС	7	зерн.	рс	7	7			7	
Гостинець	® 05004067	2008	340 /										
Кукурудза цукрова			-	45									
Андріївський F1	00032003	2003	736 /	П	7	стл,конс	ср	7	7			7	
Ароматна	79032001	1982	340 /	С	5	стл, конс	сс	5	5			5	
Андріа F1	02032003	2008	888 /										
Бостон F1	01032001	2003	1050 /	Л	7-9	стл,конс	рс	7	7			9	
Веге 1	00032002	2003	736 /	С	7	стл,конс	ср	7	7			7	
Вєнілія	® 04032005	2007	311 /	СЛП	7-9	ун	ср	7	7			7	
Делікатесна	89032001	1992	340 /	С	5	стл, конс	рс	5	5			5	
Джубілі F1	98032001	2001	1050 /	СЛ	7-9	стл, конс	рс	7	7			7	
Дімакс	05032001	2008	273 /										
Дмитрик	® 03032001	2007	404 / 404	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Кєндл F1	03032004	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Леженд F1	97032002	2001	900 /	С	7	стл, конс	ср	5	5			5	
Ласуня одеська	94032002	2004	378 /	СЛ	7	стл	рн	7	7			7	
Людмила СВ	® 03032003	2008	311 /										
Мамалижний	® 98032005	2001	1028 / 336, 1028	СЛП	7	стл, пер	ср	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Мадонна F1	® 04032001	2007	1013/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Перфекта F1	® 04034004	2008	888/										
Роялті F1	01032003	2003	1013/	Л	7	стл,конс	ср	7	7			7	
Спокуса	02032001	2007	311/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Санданс F1	® 06032002	2008	900/										
Спіріт	04032003	2006	1050/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Трофи F1	03032002	2004	744/	С	7-9	стл	рн	7	7			7	
Тронка F1	® 06032001	2008	647/										
Мангольд			- 1										
Зимній	83159001	1991	348/	С	5	свж	рс	5	5			5	
Морква посівна			- 102										
Абако F1	03034005	2004	744/	С	7-9	ун	рн	7	7			9	
Ассоль	03034009	2006	647/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Берлікумер 2	02034001	2004	1081/	СЛП	7-9	ун	рн	7	7			7	
Балтімор F1	07034002	2008	751/	Зг,Ст	7	уе	сс	7	7			7	
Бангор F1	94034004	1997	751/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Болтекс	® 06034007	2008	900/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Бастія F1	07034001	2008	751/	Зг, Ст	9	ун	сс	7	7			7	
Болєро	04034001	2006	215/	СЛП	9	свж	ср	7	7			7	
Билбо F1	97034004	2005	744/	С	7-9	унів	сс	7	7			7-9	
Байон F1	® 04034010	2007	1102/	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Віта-Лонга F1	95034001	1997	751/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Вереснева	® 05034008	2008	402/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Веста F1	03034002	2006	900/	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Велес F1	® 04034013	2006	293/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Виктория F1	82034004	2005	744/	С	7-9	унів	пс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Гіганта	06034002	2008	887/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Голландка	® 04034008	2006	1163/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Дордонь F1	97034007	1999	1050/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Долянка	® 05034009	2008	1072/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Длінная красная	® 04034011	2006	293/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Дарина	® 05034002	2006	888/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Карлена	91034002	1995	721/	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Канада F1	06034005	2008	751/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Каскад F1	07034004	2008	751/	Зг,Ст	7	ун	сс	7	7			7	
Кораль	97034011	2001	1072/	СП	7	ун	сс	7	7			7	
Купар F1	07034003	2008	751/	Зг,Ст	7	ун	сс	7	7			7	
Камаран F1	92034006	1997	751/	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Корріда	® 05034004	2008	635/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Кампіно	® 06034011	2008	1163/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Купало F1	® 04034014	2006	293/	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Кармен	03034011	2006	647/	СЛП	7	ун	сс	7	7			9	
Карнавал	03034010	2006	647/	СЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Красний велікан	® 04034015	2006	293/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Кортіна F1	® 05034001	2008	888/	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Колтан F1	® 05034007	2006	753/	СЛП	9	ун	сс	7	7			7	
Колгоспниця	® 04034016	2007	984/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Каротан	® 04034009	2007	1102/	СЛП	7	ун	пс	7-9	7			9	
Кадріль	® 03034004	2007	647/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Лагуна F1	® 05034003	2008	753/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Ласуня	01034003	2004	343/	СЛ	7	рн	рн	7	7			7	
Лангесвит Фрютфул	® 02034003	2005	1163 / 1013, 1163	С	7	унів	сп	7	7			7	
Монанта	03034007	2004	1102/	СЛП	7-9	ун	рн	7	7			7	
Магно F1	99034001	2001	1102/	СП	7-9	ун	сс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг ання	осипання	хвороб	
Мазурка	® 06034004	2008	647/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Майя F1	03034003	2006	900/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Нантська харківська	49034001	1952	402/	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Нанда F1	01034001	2003	887/	П	7	ун	рс	7	7			7	
Наполі F1	92034010	1997	751/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Нарбоне F1	92034002	1997	751/	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Наюва	® 06034009	2008	1163/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Натофі	® 04034006	2006	1163/	СЛП	9	ун	рс	7	7			7	
Олімпус	94034003	1999	969/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Оленка	92034001	1995	402/	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Осіння королева	® 04034005	2006	1163/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Памелла	® 06034010	2008	1163/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Перший збір	03034006	2006	1081/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Перун F1	® 04034012	2006	293/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Ройал Шансон	97034003	1999	744/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Ройал Форто	94034002	1999	744/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Розал	06034003	2008	887/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Ред Кор	54034001	1997	753/	СЛП		ун	сс						
Регульська	03034008	2006	1084/	СЛП	7	ун	сс	9	7			9	
Скарла	® 06034008	2008	900/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Свитшан	04034003	2006	1163/	СЛП	9	ун	сс	7	7			7	
Сіркана F1	® 05034006	2006	753/	СЛП	9	ун	ср	7	7			7	
Тінга	97034001	2001	969/	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	
Талісман	® 04034004	2007	888/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Фатіма	® 05034005	2008	712/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Флаккенарія	® 02034002	2005	1163/ 1013, 1163	СП	7-9	унів	пс	7	7			7	
Флайові	® 04034007	2006	1163/	СЛП	7	ун	сп	9	7			9	
Шантане червоне серце	04034002	2006	215/	СЛП	9	ун	сс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Яскрава	96034001	2000	402/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Огірок посівний			- 164										
/Бейо 2640 F1/	05035001	2007	751/	СЛП	7	конс	рс	7	7			9	
Акорд F1	00035007	2003	751/	Л	7	конс,свж	рс	7	7			7	
Атлантіс F1	97035002	2001	751/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Аякс F1	74035001	1996	753/	СЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Астерікс F1	95035005	1999	751/	СЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Атлет F1	06035020	2007	898/	ЗРг	7	сал	рс	7	7			7	
Анніка F1	® 04035005	2006	293/	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Анжеліна F1	05035019	2006	753/	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			9	
Андрус F1	® 06035002	2007	1072/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Анулька F1	® 05035040	2007	1072/	СЛП	7	ун	рс	7	5			7	
Афіна F1	05035018	2006	753/	СЛП	9	ун	рс	7	7			9	
Аладін F1	® 02035002	2005	1178/	С	7	унів	рс	7	7			7	
Амур F1	02035004	2005	751/	Л	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Бобрик F1	06035021	2007	898/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Борис F1	® 05035006	2007	541/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Бріз F1	® 03035010	2008	647/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Вентура F1	99035007	2001	1102/	Згр, гідроп	7	свж,сал	рс	7	7			7	
Вокал F1	99035006	2001	1102/	СЛП	7-9	конс, свж	рс	7	7			7	
Владко F1	97035011	2001	1072/	СЛП	7	конс, свж	рс	7	7			7	
Водограй F1	97035009	2001	313/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Веласко F1	06035025	2007	273/	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Весна F1	® 05035011	2007	541/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Внучок F1	® 05035020	2007	1054/	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Весєлая Компанія F1	® 05035008	2007	541/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Гейм	92035004	1997	402/	СЛП	5	зс	сп	5	5			5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Гінга F1	99035003	2004	721/	ЗГр	7-9	конс	рн	7	7			7	
Голопристанський ®	05035039	2008	410/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Гермес Скерневіцький F1	00035001	2001	1081/	СЛП	7	конс, свж	пс	7	7			7	
Гектор F1	99035013	2002	753/	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Гармонія F1	04035004	2006	1102/	СЛП	9	ун	рс	7	7			9	
Діва	93035003	1997	955/	СЛП	5	конс	ср	5	5			5	
Делпіна F1	00035002	2003	753/	Л	7-9	конс,свж	рс	7	7			7	
Джерело	94035008	1999	402/	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Даліла F1	00035008	2003	888/	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Дездемона F1	01035002	2003	888/	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Дружная сємєйка F1 ®	05035013	2008	541/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Дельтастар F1	99035008	2001	1102/	ЗГр, гідроп	7-9	свж, сал	рс	7	7			7	
Джин F1 ®	05035005	2007	541/	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Денек F1 ®	05035012	2007	541/	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Естафета F1	79035016	1983	157/964	ЗГр	5	сал	ср	5	5			5	
Ера	90035005	1997	429/	СЛП	5	зс	сс	5	5			5	
Ексельсіор	05035038	2007	840/	Згр	7	свж	рс	7	7			7	
Еліза F1 ®	04035002	2006	1163/	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Етап ®	05035033	2008	430/	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Зубрьонок F1 ®	98035010	2001	1044/	СЛП, ПТ	7	конс, свж	рс	7	7			7	
Зефір F1 ®	03035012	2006	647/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Іра	92035006	1997	721/	СЛП	5	зс	ср	5	5			5	
Ізід	98035001	2003	1081/	П	7	ун	рс	7	7			7	
Каспер F1 ®	06035001	2008	1084/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Крак F1	97035010	2001	1072/	СЛП	7	конс, свж	рс	7	7			7	
Конні F1	99035002	2004	721/	ЗГр	7-9	ун	рн	7	7			9	
Компоніст F1	03035006	2004	1102/	СЛП	7-9	конс	рн	7	7			7	
Кріспіна F1	94035018	1997	753/	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Ксана F1 ®	99035011	2003	402 /	ЗГр(СТ,ПТ)	7	свж	сс	7	7			7	
Кронос Скерневіцький F1 ®	03035004	2006	1081 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			9	
Кадет F1	06035019	2007	898 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Казанова F1	06035024	2007	898 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Кураж F1	06035018	2007	898 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Квартет F1 ®	05035016	2007	541 /	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Лєон	96035005	2000	1013 /	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Лялюк	91035001	1995	402 /	СЛП	5	конс	сс	5	5			5	
Левина	94035001	1998	744 /	СЛП	7	конс	сс	7	7			7	
Льоша F1	00035006	2003	313 /	П	7	ун	рс	7	7			7	
Мирабелл F1	02035001	2004	744 /	С	7	ун	рн	7	7			7	
Морінга F1	99035004	2004	721 /	СЛП	7	конс	рн	7	7			7	
Маринда F1	94035002	1998	744 /	СЛП	7	конс	пс	7	7			7	
Маша F1	00035003	2001	744 /	СЛ	7-9	ун	рс	9	9			9	
Медіа F1	99035010	2001	1102 /	ЗГр, гідроп	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Мамай F1 ®	03035011	2008	647 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Мотіва F1	99035009	2001	1102 /	СП	7-9	ун	ср	7	7			7	
Мона	93035001	1997	955 /	СЛП	7	конс	ср	7	7			7	
Мотильок F1 ®	05035014	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Мудрець F1 ®	04035006	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Носівський	00035005	2004	429 /	Л	7	ун	рн	7	7			7	
Наташа F1	98035004	2001	744 /	СП	7-9	конс	рс	7	7			7	
Октопус F1	96035004	1999	1050 /	СЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Опера F1	99035005	2001	1102 /	СЛП	7	конс, свж	рс	7	7			7	
Отелло F1	05035003	2006	1050 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Одис F1 ®	03035005	2006	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Пасадена F1	97035006	1999	1050 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Пасамонте F1	98035006	2002	1050 /	СЛ	7-9	конс	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Наркер F1	75035001	1996	753 /	СШІ	7	конс	ср	7	7			7	
Насалімо F1	® 05035002	2006	1050 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Пареіфал F1	01035001	2006	887 /	СШІ	9	ун	рс	7	7			7	
Потомак F1	03035009	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Патріот F1	® 04035001	2008	888 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Полина F1	® 05035015	2007	541 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Пікобелло	04035009	2006	1197 /										
Прессто F1	04035003	2006	1102 /										
Реталь F1	95035002	1999	900 /	СШІ	7	конс	рс	7	7			7	
Рся	® 05035035	2008	50 /	СШІ	7	ун	сс	7	7			7	
Роял F1	66035001	1997	900 /	СШІ	5	конс	ср	5	5			5	
Ретія F1	94035006	1999	969 /	СШІ	7	конс	рс	7	7			7	
Русскій стиль F1	® 05035010	2008	541 /	СШІ	7	ун	пс	7	7			7	
Родос F1	® 05035004	2007	1081 /	СШІ	7	стл	рс	7	7			7	
Спікер F1	® 05035021	2008	635 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Смак F1	® 99035017	2002	402 /	ЛШ	7	ун	сс	7	7			7	
Сремський F1	01035005	2003	712 /	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Слобожанський F1	® 99035012	2002	402 /	СШІ	7-9	конс	рс	7	7			7	
Самородок F1	® 99035016	2002	402 /	С	7	ун	сс	7	7			7	
Син Полка F1	® 05035007	2007	541 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Сувенір F1	® 03035008	2007	402 /	СШІ	7	ун	сп	7	7			7	
Сандер F1	® 06035003	2007	1072 /	СШІ	7	ун	сс	7	7			7	
Старекс F1	05035017	2007	273 /	СШІ	7	ун	сс	7	7			7	
Трембіта F1	06035022	2007	898 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Тітус F1	02035005	2005	1072 /	СІІ	7-9	унів	рс	7	7			7	
Тристан	05035037	2007	840 /	ЗГр	9	свж	рс	7	7			7	
Трой F1	® 05035034	2008	313 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Філіпок F1	® 05035009	2007	541 /	СШІ	7	зс	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Хеля F1	97035013	2001	1071 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Хробри F1 в	06035004	2007	1072 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Цезар в	98035002	2004	1084 /	СШІ	7-9	стл	рн	7	7			7	
Цетріолівo в	05035022	2008	635 /	СШІ	7	ун	сс	7	7			7	
Шремянин F1	05035024	2008	712 /	СШІ	7	ун	сс	7	7			7	
Щедрик F1	06035017	2007	898 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Юліан F1	02035006	2006	1072 /	СЛи	7	ун	рс	7	7			7	
Язер F1	95035004	2000	751 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5			5	
Настерчак посівний			- 3										
Петрик	92161001	1995	402 /	СШІ	5	спц	сс	5	5			5	
Патисон			- 5										
Оранжевий	92162001	2000	410 /	СШІ	5	ун	сс	5	5			5	
Поло F1	00162001	2001	1081 /	СШІ	7-9	пер	сс	7	7			7	
Перлинка	01162001	2002	402 /	СШІ	7	пер	рс	7	7			7	
Сашенька	03162001	2005	313 /	СШІ	7-9	універ	рс	7	7			7	
Перець гіркий			- 9										
Український гіркий	46036001	1947	402 /	СШІ	5	спц	сс	5	5			5	
Харківський	79036001	1983	402 /	СШІ	5	спц	сс	5	5			5	
Букет Востока F1	05036004	2009	541 /										
Золотой рог F1	05036003	2009	541 /										
Молния красная F1	05036001	2009	541 /										
Рог буйвола F1	05036002	2009	541 /										
Перець солодкий			- 92										
Атлант	00037007	2004	1044 /	СЛ	7	стл	рн	7	7			7	
Аквенто	98037008	2001	1044 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Антей	98037007	2001	1044 /	СШІ	7	ун	се	7	7			7	
Аніка F1	® 06037008	2008	1054 /	Згр,Ст	7	ун	ре	7	7			7	
Арамис F1	05037018	2007	541 /	СШІ	7	ун	ре	5	5			5	
Блонді F1	99037001	2002	1050 /	СШІ	7-9	ун	се	7	7			7	
Бактянець	® 04037003	2007	323 /	СШІ	7	свж	ре	7	7			7	
Біанка	04037002	2006	840 /	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	
Бонета	05037002	2006	888 /	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	
Віккон	00037006	2004	313 /	П	7	стл	се	7	7			7	
Велетень	® 05037025	2008	402 /	СШІ	7	ун	се	7	7			7	
Валюша	® 03037006	2006	402 /	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	
Голубок	91037002	1997	402 /	СШІ	5	ун	ср	5	5			5	
Геркулес F1	® 04037004	2007	900 /	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	
Галатея	05037006	2009	541 /										
Геліос	® 03037008	2006	647 /										
Дружок	92037013	1990	402 /	ЗГр	5	ун	се	5	5			5	
Добірний	05037021	2007	1054 /	ЗГр	7	ун	ср	7	7			7	
Етюда	® 03037004	2005	1081 / 50, 1081	СШІ	7	ун	ср	7	7			7	
Еней	® 03037010	2006	647 /	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	
Жовтий дивосвіт	® 02037005	2005	1163 / 1013, 1163	Л	7-9	унів	ре	7	7			7	
Звєзда Востока красная F1	® 05037015	2008	541 /	СШІ	7	ун	пе	7	7			7	
Злато скіфів	® 05037037	2008	410 /	СШІ	7	ун	се	7	7			7	
Злагода F1	01037001	2004	402 /	С	7	ун	рн	7	7			7	
Зорька	05037011	2007	541 /	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	
Звєзда Востока жовтая F1	05037007	2007	541 /										
Звєзда Востока золотистая F1	05037004	2007	541 /	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Звезда Востока шоколадная F1	05037012	2007	541 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Звезда Востока фіолетовая	05037013	2007	541 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Звезда Востока оранжевая F1	05037014	2007	541 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Звезда Востока F1	05037005	2007	541 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Звезда Востока біла F1	05037016	2007	541 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Звезда Востока мандариновая F1	05037008	2009	541 /										
Золоте руно в	03037002	2006	647 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Ігрок в	05037019	2008	541 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Клаудіо F1	94037005	1997	753 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Ковбой F1	05037009	2007	541 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Калипсо в	02037007	2005	1084 /	С	7-9	унів	сс	7	7			7	
Лиско в	06037009	2008	1054 /	ЗГр,Ст	7	ун	сс	7	7			7	
Лада в	05037024	2008	402 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Миролюбівський F1	99037003	2003	343 /	П	7	ун	рс	7	7			7	
Монтекристо F1	06037002	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Мадонна F1 в	03037001	2006	900 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Мерцедес в	02037006	2005	1084 /	С	7	унів	сс	7	7			7	
Мираж	05037017	2007	541 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Надія	95037001	1998	402 /	СШІ	7	ун	сс	7	7			7	
Никта F1	06037001	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Ноктюрн в	03037005	2005	1081 /	Л	7-9	унв	сп	7	7			7	
Ожарівський	00037002	2001	1081 /	СЛ	7-9	ун	рс	7	7			7	
Оленка	05037003	2007	1081 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Пионер	82037006	1990	402 /	ЗГр	5	ун	рс	5	5			5	
Полька F1	99037002	2001	1102 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Полтавський	90037002	1995	402/	СЛІ	5	ун	ср	5	5			5	
Полстолина	00037001	2001	1081/	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Паланська Бабура	06037013	2008	860/	ЗГр,Ст	9	ун	рс	9	9			9	
Пігмаліон F1	05037010	2007	541/	СЛІ	7	ун	рс	7	7			7	
Снігур	97037006	2001	402/	ЛІІ	5	ун	рс	5	5			5	
Світлячок	® 98037010	2002	402/	П	7	ун	сс	7	7			7	
Сандра	® 05037001	2008	888/	СЛІ	7	ун	пс	7	7			7	
Самоцвіт	97037005	2001	313/	СЛІ	5	ун	рс	5	5			5	
Сонячний	02037001	2004	1054/ 1054	ЗГр(ПГ)	7	ун	рн	7	7			7	
Сонар F1	95037002	1999	900/	П	7	ун	сс	7	7			7	
Тетяна	05037020	2007	541/	СЛІ	7	ун	рс	5	5			7	
Фламінго F1	97037007	2001	900/	СЛІ	7	ун	рс	7	7			7	
Цинтія F1	® 05037036	2008	888/	СЛІ	7	ун	рс	7	7			7	
Центурі F1	04037001	2005	1102/	Зг/Ст	7-9	унів	рс	7	7			7	
Червоний дивосвіт	® 02037004	2005	1163/ 1013, 1163	Л	7-9	унів	рс	7	7			7	
Юпітер F1	97037002	2002	1050/	ЛР	7	ун	сс	7	7			7	
Петрушка городня			- 28										
Астра	97163001	1999	969/	СЛІ	7	спц	рс	7	7			7	
Ароматна	02163004	2004	1163/	СЛІ	7	ун	рн	7	7			7	
Берлінія	02163002	2004	1163/	СКG	7-9	ун	рн	7	7			7	
Господиня	98163002	2000	357/ 357	СЛІ	7	спц	рс	7	7			7	
Ігл	95163001	1999	751/	СЛІ	7-9	спц	рс	7	7			7	
Мосспон	02163003	2004	1163/	СЛІ	7	ун	рн	7	7			7	
Наталка	03163003	2005	1084/	СЛІ	7-9	свж	рс	7	7			7	
Оломуньска	02163001	2003	1081/	СЛІ	7	ун	рс	7	7			7	
Росава	04163001	2005	888/ 888	СЛІ	7-9	свж	рс	7	7			7	
Стихія	® 04163002	2006	984/	СЛІ	7	свж, спц	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Урожайна	58163001	1959	348/	СЛП	5	спц	рс	5	5			5	
Фреска ®	06163002	2007	647/										
Харків'янка	92163001	1995	402/	СЛП	5	спц	рс	5	5			5	
Челеста ®	06163001	2007	647/										
Помідор їстивний			- 345										
Атласний	94040021	2000	343/	СЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Аламбра F1	98040018	2001	900/	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Аврелий F1	97040019	2001	744/	С	7	ун	ср	7	7			7	
Астерікс F1	00040001	2002	1050/	С	7	ун	рс	7	7			7	
Анабел F1	99040014	2001	1102/	ЗГр	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Атоль	98040004	2001	1081/	ЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Астероїд ®	04040035	2007	402/	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Арфа F1 ®	03040035	2006	647/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Бусинка F1	01040004	2003	725/	ЗГр,СТ/ ІІТ	7	свж	рс	7	7			7	
Бачка	98040009	2001	879/	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Барвінок F1	96040006	2000	343/	ЗГр	5	сал	рс	5	5			5	
Баллада ®	99040009	2001	606/	СЛ	7	ун	ес	7	7			7	
Бумеранг F1	00040015	2004	725/	ЗГр,ІІТ	7	ун	ри	7	7			7	
Богун F1 ®	99040017	2003	402/	ЗГр,ІІТ	7	сал	рс	7	7			7	
Биг Биф F1	97040018	2001	744/	С	7	ун	ср	7	7			7	
Буран	05040102	2007	840/	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Бармалей F1 ®	04040026	2008	343/										
Белле	04040011	2005	840/	ЗГр,СТ/ ІІТ	7-9	унів	рс	7	7			7	
Болдвін	05040103	2007	840/	ЗГр	7-9	ун	рс	7	7			7	
Беріл F1	04040013	2005	1102/	ЗГр,СТ	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Беллавіза F1	04040012	2005	1102/	ЗГр,СТ	7-9	унів	рс	7	7			7	
Василівна F1	00040018	2003	725/	ЗГр,СТ/ ІІТ	7	свж	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Волюм F1	98040016	2001	753/	ЗГр	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Грейс F1	03040005	2004	1197/	ЗГр,СТ	7	ун	рн	7	7			7	
Господар	92040001	1997	402/	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Голда	93040004	1997	955/	СЛП	7	ун	рс	5	7			5	
Гектор F1	(в) 03040004	2005	900/	СЛ	7-9	унів	рс	7	7			7	
Гожий F1	(в) 05040039	2007	1054/	ЗГр	7	ун	ср	7	7			7	
Гапя	05040116	2007	215/	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Дуся Плас F1	03040008	2004	744/	С	7-9	ун	рн	7	7			7	
Доля F1	01040012	2004	343/	ЗГр,ПТ	7	салат	рн	7	7			7	
Данило F1	00040004	2004	343/	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Діво F1	00040011	2003	725/	ЗГр,СТ/ ПТ	7	свж	сс	7	7			7	
Дуся Срлн F1	97040002	2001	744/	С	7-9	ун	ср	7	7			7	
Дораль	93040002	1997	955/	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Денар	99040012	2004	721/	СЛ	7	ун	пс	7	7			7	
Джина	03040032	2005	744/	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Джадело	05040114	2007	215/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Елкоу F1	99040030	2003	900/	С	7	ун	рс	7	7			7	
Ейджен	05040104	2007	840/	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Женарос F1	03040006	2004	1197/	ЗГр,СТ	7	ун	рн	7	7			7	
Жаворонок F1	99040010	2002	606/	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Іришка	(в) 99040035	2003	402/	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Інкас F1	83040009	1997	753/	СЛП	7	конс	ср	7	7			7	
Іранда	95040002	2000	721/	СЛ	7	конс	рс	7	7			7	
Івет F1	05040076	2007	1050/	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Кронос F1	99040020	2001	753/	ЗГр,СТ/ ПТ	7	свж	рс	7	7			7	
Класік F1	93040010	1997	753/	СЛП	5	конс	ср	5	5			5	
Красна стріла F1	00040025	2002	725/	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
КДС-5 F1	94040027	2000	402/	ЗГр	7	сал	рс	7	5			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляганння	осипання	хвороб	
Кременчуцький	90040017	1993	402/	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Княжич F1	в 99040016	2003	402/	ЗГр,ПТ	7	сал	рс	7	7			7	
Красунчик	01040014	2004	736/	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Карась	в 01040010	2004	402/	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Кміцит	98040002	2001	1081/	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Кібіц	в 02040018	2006	1084/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Кравіс	в 03040034	2007	313/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Кіммеріець	в 99040019	2007	411/	СЛП	7	свж	рс	7	7			5	
Клондайк	в 04040032	2007	402/	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Лагідний	89040009	1992	343/	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Ласунчик	01040013	2004	736/	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Любимий	82040008	1987	402/	СЛ	5	ун	ср	5	5			5	
Ліра F1	в 00040027	2008	1044/										
Масва F1	99040013	2001	1102/	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Мисеури Оригинал	03040011	2004	744/	С	7-9	салат	рн	7	7			7	
Марисса F1	03040013	2004	744/	С	7	свж	рн	7	7			7	
Марфа F1	94040012	2001	744/	ЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Миколка F1	00040005	2005	343/	ЛП	7	унів	ср	7	7			7	
Мондіал	04040010	2005	840/	ЗГр,СТ/ПТ	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Малинове Вікаптс	в 04040033	2007	402/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Малик F1	в 03040001	2005	900/	СЛП	7-9	унів	рс	7	7			7	
Маківський	в 02040008	2007	402/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Муза F1	в 03040036	2006	647/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Паско-2000	в 00040028	2003	1044/	СЛ	7	ун	ср	7	7			7	
Незабудка F1	02040012	2006	402/	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Наддніпрянський 1	в 03040037	2007	411/	СЛП	7	свж	сс	5	7			7	
Орко F1	97040022	2000	753/	СЛ	7	ун	сс	5	5			5	
Одета	97040023	2001	969/	С	7	ун	сс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Оля F1	00040013	2003	725/	ЗГр,СТ/ПТ	7	свж	рс	7	7			7	
Опера	05040115	2007	215/	СЦП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Обрн	00040008	2005	343/	ЛП	7	унів	ср	7	7			7	
Олена	03040020	2005	122/	С	7	унів	сс	7	7			7	
Перфектний F1	03040018	2004	744/	С	7	всж	рн	7	7			7	
Президент II F1	03040010	2004	744/	С	7-9	салат	рн	7	7			7	
Пінкн Леди F1	03040014	2004	744/	С	7	свж	рн	7	7			7	
Побратим F1	00040006	2004	343/	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Прекрасна Леди F1	00040021	2004	725/	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Нето 86 Оригинал	79040001	1999	744/	С	7	ун	ср	7	7			7	
Прима F1	® 03040002	2006	900/	СЦП	7	ун	рс	7	7			7	
Перлина	® 03040030	2006	1163/	СЦП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Платус F1	04040008	2005	1197/	ЗГр,СТ/ПТ	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Пивденна Надежда	® 04040024	2007	381/	СЦП	7	ун	сс	7	7			7	
Попільнянський	99040018	2005	343/	С	7	унів	сс	7	7			7	
Рио Гранде Оригинал	03040017	2004	744/	С	7-9	свж	рн	7	7			7	
Румба Ожаровська	02040002	2004	1081/	СЦП	7	ун	рн	7	7			7	
Рио Фуего Оригинал	98040011	2001	744/	С	7-9	ун	ср	7	7			9	
Раіса F1	97040016	1999	1050/	ЗГр	7-9	сал	рс	9	7			9	
Ріо Гранo	® 02040017	2006	1163/	СЦП	7	ун	рс	7	7			7	
Радісний	® 03040028	2006	1109/	СЦП	7	ун	рс	7	7			7	
Ралн	04040023	2006	840/	Зг	7	ун	рс	7	7			7	
Регіон	® 03040033	2006	313/	СЦП	7	ун	рс	7	7			7	
Святослав F1	99040038	2003	402/	Л	5	ун	рс	5	5			5	
Скіф F1	94040016	1997	753/	СЦП	7	конс	ср	7	7			7	
Сріневий	90040022	1996	402/	СЦП	5	ун	сс	5	5			5	
Скарб F1	96040004	2000	343/	ЗГр	7	сал	рс	7	5			5	
Санпайн F1	03040007	2004	744/	С	7-9	ун	рн	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
СХ-2	91040005	1997	1109 /	СЛП	5	конс	рс	5	5			5	
Сапрайз F1	03040012	2004	744 /	С	7-9	прм	рн	7	7			7	
Сяйво ®	02040009	2006	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
СХД 219	04040003	2007	213 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Серж F1	04040002	2007	213 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
СХД 187	04040004	2007	213 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Солероссо F1	05040014	2006	753 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Сілует F1	05040077	2007	1050 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Титанік F1	00040019	2004	725 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Топкан	04040005	2006	215 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			9	
Толстой F1	02040019	2005	751 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Тесп F1	02040020	2005	751 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Тамаріс F1 ®	03040003	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Флора	92040006	1996	343 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			5	
Фаворит F1	00040014	2003	725 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7	свж	сс	7	7			7	
Фастівський 1 ®	03040026	2006	343 /										
Флорида 47 Р F1	03040031	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Хайпил 108 F1	03040009	2004	744 /	С	7-9	конс	рн	7	7			7	
Хорів ®	04040039	2007	343 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Хиларио F1	94040014	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Церасо F1	03040015	2004	744 /	С	7-9	салат	рн	7	7			7	
Цвстік F1 ®	04040034	2007	402 /	СЛП/ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Цілао F1 ®	06040007	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Целсус F1	04040009	2005	1197 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7-9	унів	рс	7	7			7	
Чарльстон F1	05040078	2007	1050 /	Згр	7	ун	рс	7	7			7	
Чайка ®	02040011	2007	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Шевальє F1 ®	04040031	2007	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Шаста	04040001	2007	213 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Шафер F1	® 05040037	2007	1054/	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Яки F1	03040016	2004	744/	С	7-9	конс	ри	7	7			7	
Ягуар F1	98040014	2005	744/	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Багіра F1	® 04040028	2008	900/										
Донхосе F1	® 04040042	2007	900/	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Джокер	04040007	2006	215/	СШІ	7	ун	рс	7	7			7-9	
Жар птиця F1	® 05040004	2008	541/										
Колібрі F1	04040043	2007	900/	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Красотка	® 05040007	2008	541/										
Моя Радость	® 05040008	2008	541/										
Орфей F1	® 00040026	2008	1044/										
Ольга	04040006	2006	215/	СШІ	7-9	ун	рс	7	7			7	
Роксолана F1	05040009	2008	273/										
Сіта F1	® 04040041	2007	900/	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Форсаж F1	® 06040005	2007	900/	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Хілма F1	® 06040006	2007	900/	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Щедрик F1	® 04040020	2006	293/	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Яна	® 04040019	2008	647/										
Магнус	04040044	2006	1197/	ЗгШп	7-9	ун	рс	7	7			7	
Пабло F1	04040018	2006	33/	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Полбін F1	® 06040003	2008	751/										
Самсон	® 04040014	2008	888/										
Сабала	® 05040002	2008	1081/										
Український	® 05040011	2008	596/										
Хубала	® 05040003	2008	1081/										
Айша F1	05040010	2007	273/	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Ріпа			- 3										
Богема	® 06130003	2008	647/										
Золота куля	02130001	2004	1163/	СШІ	9	свж	ре	7	7			9	
Нурнурленон	02130002	2004	1163/	СШІ	9	свж	ре	7	7			7	
Редиска			- 54										
18 Карат	02038002	2006	1163/	СШІ	7	свж	ре	7	7			7	
Арсенал	® 06038001	2008	647/	СШІ	7	свж	се	7	7			7	
Базис	85038003	1989	402/	СШІ	7	свж, сал	ре	7	7			7	
Богиня	90038003	1994	402/	СШІ	5	свж, сал	ре	5	5			5	
Білоснижка	03038002	2006	1163/	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	
Вайт Брекфаст	99038002	2002	721/	С	7	свж	ре	7	7			7	
Герда	® 06038006	2008	647/	СШІ	7	свж	се	7	7			7	
Дует	99038001	2002	721/	С	7	свж,сал	ре	7	7			7	
Джолі	® 06038008	2008	900/	СШІ	7	свж	ре	7	7			7	
Дабел F1	05038004	2006	753/	СШІ	7	свж	ре	7	7			7	
Ера	05038006	2008	712/	СШІ	7	свж	ре	7	7			7	
Еспресо F1	® 04038005	2006	293/	СШІ	7	свж	ре	7	7			7	
Ілка	92038003	1995	721/	СШІ	5	свж, сал	ср	5	5			5	
Ксенія	90038004	1994	402/	СШІ	7	свж, сал	ре	5	5			5	
Кларія	® 06038009	2008	721/	СШІ	7	свж	ре	7	7			7	
Краковянка	® 06038007	2008	1072/	СШІ	7	свж	ре	7	7			7	
Катруся	95038001	2000	402/	СШІ	5	свж, сал	ре	5	5			5	
Карбона	® 06038005	2008	647/	СШІ	7	свж	пс	7	7			7	
Кампус	® 04038004	2007	1102/	СШІ	7	свж	ре	7	7			7	
Крімсон	® 04038002	2006	1163/	СШІ	7	свж	ре	7	7			7	
Линда	® 06038004	2008	647/	СШІ	7	свж	пс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Лада	00038001	2003	888/	ЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Люцинка	02038001	2004	1081/	СЛ	7	салат	рн	7	7			7	
Льодяна бурулька	50038002	1955	381/	СЛП	5	свж, сал	ср	5	5			5	
Мила	98038002	2004	1084/	СЛ	7	салат	рн	7	7			7	
Марта ®	05038003	2008	647/	СЛП	7	свж	сс	7	7			7	
Опус ®	06038003	2008	647/	СЛП	7	свж	пс	7	7			7	
Покер	98038003	2000	751/	СЛП	7	свж,сал	рс	7	7			7	
Пікник ®	06038002	2008	647/	СЛП	7	свж	пс	7	7			7	
Рова	97038002	2001	1072/	СЛП	5	свж	рс	5	5			5	
Рондел	99038004	2001	1102/	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Рубін	55038005	1947	402/	СЛП	5	свж, сал	ср	5	5			5	
Рудольф	02038005	2005	751/	С	7-9	всж	рс	7	7			7	
Рондар F1	05038008	2007	1050/	СЛП	9	свж	рс	7	7			7	
Сора	96038001	1999	753/	СЛП	7-9	свж, сал	рс	9	7			9	
Спарта ®	04038003	2007	888/	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Сніжка ®	03038001	2006	1081/	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Саксонія ®	04038001	2006	1163/	СЛП	7	свж	7	7	7			7	
Селеста	05038007	2006	840/	Зг	9	свж	рс	7	7			7	
Тарзан	04038006	2006	840/	Зг	9	свж	рс	7	7			9	
Франчпон	02038003	2005	1163/	СЛ	7-9	свж	рс	7	7			7	
Фараон	05038001	2006	888/	СЛП	9	свж	рс	7	7			7	
Хельро	99038003	2001	1102/	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Червоний гігант ®	05038005	2008	635/	СЛП	7	свж	сс	7	7			7	
Червона з білим кінчиком	46038001	1949	313/	СЛП	7	свж, сал	рс	7	5			5	
Ясочка ®	04038007	2007	343/	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Редька посівна			- 10										
Агата	00039001	2001	1081/	СЛП	7	свж	сс,лт,зим	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Гулівер	® 06039001	2008	647/	СШІ	7	ун	сс	7	7			7	
Дуєнья	® 06039002	2008	647/	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Лебідка	97039001	1999	402/	СШІ	7	свж, сал	сс,літ	7	7			7	
Одеська 5	51039001	1960	381/	СШІ	5	свж	сс,літ	5	5			5	
Сударушка	84039001	1993	402/	СШІ	7	свж, сал	сс,літ	7	7			7	
Тефі	® 06039003	2008	647/	СШІ	7	ун	пс	7	7			7	
Трояндова	97039002	1999	402/	СШІ	7	свж, сал	сс,літ	7	7			7	
Редька олійна			- 5										
Журавка	97096001	2000	332/	СІ	7	олн, корм			6	7	8	6	
Либідь	91096001	1995	348/	ЛІІ	5	корм			5	7	7	5	
Райдуга	79096001	1984	348/										
Салат головчастий			- 15										
Годар	97165004	1999	984/	СШІ	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Етті	01165001	2002	888/	СШІ	7	сал	сс	7	7			7	
Ленто	01165002	2002	888/	СШІ	7	сал	сс	7	7			7	
Ларавера	® 04165001	2005	1163/ 1163	СШІ	7	свж	рс	7	7			7	
Марина	® 06165003	2008	1072/	СШІ	7	сал	пс	7	7			7	
Мажор	® 06165001	2008	647/	СШІ	7	сал	рс	7	7			7	
Ольжич	00165002	2001	984/	СШІ	7	сал	рс	7	7			7	
Пижон	® 06165002	2008	647/	СШі	7	сал	пс	7	7			7	
Сенатор	® 05165001	2008	1163/	СШІ	7	сал	пс	7	7			7	
Стоік	® 06165005	2008	635/	СШІ	7	сал	сс	7	7			7	
Фортунас 421	00165001	2001	1102/	СШІ	7	сал	ср	7	7			7	
Цуд Воорбурту	® 06165004	2008	1072/	СШІ	7	сал	рс	7	7			7	
Салат латук			- 64										
Афіцион	06291014	2008	1102/	СШІ	9	сал	сс	7	7			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Амадеус	06291003	2008	1102 /	СШІ	9	сал	се	7	7	7		7	
Бона	02291003	2004	1084 /	СШІ	7	ун	ри	7	7			7	
Грін Корал (к)	05291012	2008	1163 /	СШІ	7	сал	пс	7	7			7	
Гренада Ожаровська	98291001	2000	1081 /	СШІ	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Думка	03291001	2004	1081 /	СШІ	7	ун	ри	7	7			7	
Дивограй	01291003	2006	984 /	СШІ	7	ун.	рс	7	7			7	
Евеліна	02291002	2003	1081 /	СШІ	7	ун	rs	7	7			7	
Ентоні	06291015	2008	1102 /	СШІ	9	сал	пс	7	7			9	
Золотий шар	00291002	2001	984 /	СШІ	7	сал	рс	7	7			7	
Заграва (к)	05291005	2008	635 /	СШІ	7	сал	рс	7	7			7	
Конетанс	06291006	2008	1102 /	СШІ	9	сал	се	7	7			9	
Картагенас	06291004	2008	1102 /	СШІ	9	сал	пс	7	7			9	
Кучерявець одеський	53291001	1987	381 /	СЛ	5	свж, сал	се	5	5			5	
Королева літа	02291001	2003	1081 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Кітаре	06291005	2008	1102 /	СШІ	9	сал	се	7	7			7	
Конкорд	06291017	2008	1102 /	СШІ	9	сал	пс	7	7			9	
Лагунас	06291011	2008	1102 /	СШІ	9	сал	пс	7	7			9	
Левістро	06291002	2008	1102 /	СШІ	9	сал	пс	7	7			9	
Локарно	06291013	2008	1102 /	СШІ	9	сал	се	7	7			9	
Міретт	06291010	2008	1102 /	СШІ	9	сал	пс	7	7			9	
Модесто	98291003	2000	1013 /	СШІ	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Нанетт	06291008	2008	1102 /	СШІ	9	сал	пс	7	7			9	
Оксамит (к)	05291004	2008	635 /	СШІ	7	сал	се	7	7			7	
Платінас	06291007	2008	1102 /	СШІ	9	сал	пс	7	7			9	
Ремус	06291012	2008	1102 /	СШІ	9	сал	пс	7	7			9	
Росела	01291002	2002	888 /	СШІ	7	сал	rs	7	7			7	
Ред Корал (к)	05291013	2008	1163 /	СШІ	7	сал	пс	7	7			7	
Рубетт	06291018	2008	1102 /	СШІ	9	сал	пс	7	7			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали) посухи	поляглання	осипання	хвороб	Якість
Рішельє ®	05291001	2008	635/	СШІ	7	сал	ре	7	7			7	
Совєський	86291003	1991	348/	СШІ	5	свж, сал	се	5	5			5	
Сніжинка	97291003	1999	984/	СШІ	5	свж, сал	ре	5	5			5	
Сірмай	06291016	2008	1102/	СШІ	9	сал	пе	7	7			9	
Фіоретті	06291009	2008	1102/	СШІ	9	сал	пе	7	7			9	
Червоний змій ®	05291003	2008	635/	СШІ	7	сал	ре	7	7			7	
Шар малиновий	00291001	2001	984/	СШІ	7	сал	ре	7	7			7	
Юстина	98291002	2000	1081/	СШІ	7	свж, сал	ре	7	7			7	
Селера листкова			- 9										
Анїта	95167001	1999	721/	СШІ	7	спц	се	7	7			7	
Діамант	02167003	2004	751/	СШІ	7	спц	ри	7	7			7	
Едвард	02167001	2003	1081/	СШІ	7	ун	се	7	7			7	
Іванко	97167001	1999	402/	СШІ	7	спц	се	7	7			7	
Красилівська	88167003	1993	348/	СШІ	5	спц	се	7	7			7	
Монарх	86167001	1999	753/	СШІ	5	спц	се	5	5			5	
Рома ®	04167001	2006	984/	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	
Фізаліс клейконлідний			- 2										
Жаринка	02171001	2003	348/	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	
Ліхтарик	02171002	2003	348/	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	
Цибуля батун			- 8										
Байа Верде	05174001	2006	744/	ПІС	7	ун.	ре	7	7			7	
Перо	01174001	2003	402/	СШІ	7	ун	ре	7	7			7	
Параде	06174001	2007	751/										
Цибуля городня			- 138										
Сабросео F1 ®	05041020	2008	753/	СШІ	7	ун	пе	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Сібір (BGS 204)	07041006	2008	751/	ЗГр,Ст	7	ун	се	7	7			7	
Альтіз	00041005	2004	313/	СЛП	7	свж,гост	ри	7	7			7	
Амфора	01041002	2004	402/	ЛП	7	ун,гост	ри	7	7			7	
Антоніна	02041001	2009	310/										
Буран	91041002	1998	430/	СЛП	7	ун,ш	се	7	7			7	
Банко F1	92041018	1999	1050/	СЛП	7	ун,ш	се	7	7			7	
Булат	ж 05041008	2010	647/										
Браво F1	05041003	2006	887/	СЛП	7	гостра	се	7	7			7	
Веселка	91041001	1994	402/	СЛП	7	ун,ш	се	7	7			7	
Вікторія	00041006	2003	888/	СЛ	7	ун,г	ре	7	7			7	
Вама	05041026	2008	712/	СЛП	7	ун	пе	7	7			7	
Вольська	97041009	2001	1071/	СЛП	7	ун,г	пе	7	7			7	
Вольф F1	05041010	2007	887/	СЛП	7	стл	озимий	7-9	7			7	
Вікторія Скоригвиц	05041006	2007	1081/	СЛП	7	стл	се	7	7			7	
Господиня	ж 05041033	2008	430/	СЛП	7	ун	пе	7	7			7	
Голубка	ж 05041032	2008	350/	СЛП	7	ун	пе	7	7			7	
Гранднна	87041001	1992	429/	П	5	ун,ш	се	5	5			5	
Глобус	94041001	1997	402/	СЛП	7	ун,ш	се	7	7			7	
Гірей	06041007	2009	647/										
Гледстоун	06041013	2009	751/										
Дербі F1	07041005	2008	751/	ЗГр,Ст	7	ун	се	7	7			7	
Дайтона F1	92041014	1997	751/	СЛП	7	ун,ш	се	7	7			7	
Дакано F1	05041005	2006	887/	СЛП	7	гостра	сп	7	7			7	
Емір	06041009	2009	647/										
Золотиста	66041001	1972	402/	ЛП	5	ун,г	се	5	5			5	
Заграва	ж 05041028	2008	984/	СЛП	7	ун	пе	7	7			7	
Крістіне	ж 06041003	2008	1084/	СЛП	7	ун	пе	7	7			7	
Кенди F1	97041005	2001	744/	СЛ	7-9	ун,г	пе	7	7			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Краса	® 04041001	2008	888 /	СЛП	7	ун	се	7	7			7	
Комета F1	99041003	2002	753 /	СП	7	ун	ре	7	7			7	
Кампіло F1	05041027	2006	753 /	СЛП	7	солодка	ср	7	7			7	
Луганська	60041001	1965	520 /	С	5	ун,г	се	5	5			5	
Леоне	07041008	2008	751 /	Зр,Ст	7	ун	се	7	7			7	
Любчик	® 03041001	2006	402 /	СЛ	7	гостра	ре	7	7			7	
Маяк	97041011	2001	984 /	ЛП	7	ун,г	пс	7	7			7	
Мавка	00041003	2003	402 /	С	5	ун,г	ре	5	5			5	
Монолит 4	® 05041022	2008	635 /	СЛП	7	ун	се	7	7			7	
Манас F1	05041001	2007	751 /	СЛП	7	стл	се	7	7			7	
Нерато F1	05041004	2006	887 /	СЛП	7	гостра	пс	7	7			7	
Одіна	94041004	2001	969 /	Л	7	ун,г	се	7	7			7	
Позолочений Глобус	® 05041023	2008	635 /	СЛП	7	ун	се	7	7			7	
Поляновська	® 06041014	2008	1072 /	СЛп	7	ун	пс	7	7			7	
Пінакл F1	00041002	2002	744 /	С	7	ун,нг	ре	7	7			7	
Робот (Райнсбургер 5)	06041004	2008	887 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Роккаде F1	98041009	2002	1013 /	П	7	ун,г	се	7	7			7	
Ред Булл F1	07041007	2008	751 /	Зр,Ст	7	ун	се	7	7			7	
Радар	06041012	2009	751 /										
Ред Барон	02041003	2005	751 /	П	7	унів	се	7	7			7	
Стерлінг F1	00041001	2002	744 /	С	7-9	ун,со	ре	7	7			7	
Стригунівська посівська	37041007	1940	429 /	СЛП	5	ун,г	сп	5	5			5	
Супра	98041001	2003	1081 /	ЛП	7	ун,г	ре	7	7			7	
Сервієва	® 05041024	2008	635 /	СЛП	7	ун	се	7	7			7	
Славний	00041004	2004	313 /	П	7	ун,гост	рн	7	7			7	
Скарлет	® 06041001	2008	1084 /	СЛП	7	ун	се	7	7			7	
Соловій F1	05041030	2007	1050 /	СЛП	7	стл	ср	7	7			7	
Спірт F1	02041002	2006	751 /	ЛП	7	гостра	ре	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Стакато F1	01041001	2005	887/	II	7-9	універ	ре	7	7			7	
Сьерра Бланка F1	03041004	2005	744/	С	7-9	універ	се	7	7			7	
Слава Ожарова	05041007	2007	1081/	СЛІІ	7	стл	ре	7	7			7	
Ткаченківська	85041004	1991	402/	Л	5	ун,г	се	5	5			5	
Тополівська	03041005	2006	1072/	Л	7	гостра	ре	7	7			7	
Тареско F1	05041002	2006	887/	СЛІІ	7	гостра	се	7	7	7		7	
Тимур	06041008	2009	647/										
Тамара F1	03041003	2006	751/	СЛІІ	7	гостра	ср	7	7			7	
Універсо F1	99041002	2002	753/	СП	7-9	ун	ре	7	7			9	
Форум	ж 05041009	2008	647/	СЛІІ	7	ун	се	7	7			7	
Факір	06041010	2009	647/										
Халцедон	89041002	1999	606/	СЛІІ	7	ун,иг	се	7	7			7	
Харківська 82	90041005	1994	402/	СЛІІ	5	ун,г	се	5	5			5	
Халіф	06041011	2009	647/										
Червоний Глобус	ж 05041025	2008	635/	СЛІІ	7	ун	се	7	7			7	
Черняковська	98041003	2001	1081/	ЛІІ	7	ун,г	сп	7	7			7	
Штутті	ж 05041040	2008	1163/	СЛІІ	7	ун	пс	7	7			7	
Яліско F1	06041002	2008	887/	СЛІІ	7	ун	ре	7	7			7	
Цибуля порей			- 11										
Голіас	99175001	2001	1102/	СЛІІ	7	сал	се	7	7			7	
Голет	01175001	2002	888/	СЛІІ	7	свж	ре	7	7			7	
Йолант	82175001	1997	751/	СЛІІ	5	сал	се	5	5			5	
Казімір	95175001	1999	721/	СЛІІ	5	сал	се	5	5			5	
Мацек	ж 03175001	2005	1084/	СЛІІ	7-9	свж	ре	7	7			7	
Цибуля скородa (шніт)			- 4										
Ельвіра	04177001	2005	888 / 888	СЛІІ	7-9	свж	ре	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Прилипський	03177001	2005	402 /	СШІ	7-9	свж	рс	7	7			7	
Цибуля слизун			- 2										
Лілейна	91309001	1995	348 /	СШІ	7	сал	сс	7	7			7	
Цибуля шалот			- 7										
Забава	00176001	2002	402 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Кущівка місцева	90176002	1950	402 /	СШІ	7	сал	рс	7	7			7	
Лира	02176001	2004	402 /	СШІ	7	ун	рн	7	7			7	
Сюрприз	00176002	2002	402 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	
Цикорій коренеплідний			- 1										
Уманський 99	99202001	2001	421 /	Л									
Часник (цибуля посівна)			- 9										
Дюшес	01042002	2004	402 /	СШІ	9	свж	рс	7	7			7	влеж
Лідер	94042001	2000	369 /	ЛП	7	спц	зим	5	5			9	влеж
Мерефʼянський озимий (в	01042001	2006	402 /	СШІ	7	ун.	зим	7	7			7	влеж
Промінь	92042001	1999	343 /	СШІ	7	спц	зим	7	5			5	влеж
Спас	93042001	1999	369 /	СШІ	7	спц	зим	9	5			5	слеж
Чорнушка посівна (Нігела)			- 2										
Іволга	96280001	1999	984 /	СШІ	7	сал, спц	сс	7	7			7	
Шпинат городній			- 11										
Красень Полісся	01179001	2006	984 /	СШІ	7	стол.	рс	7	7			7	
Лазіо F1	02179002	2004	1163 /	СШІ	7	ун	рн	7	7			7	
Матадор	02179001	2003	1081 /	СШІ	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт			Код		Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач							посухи	полягання	осипання	хвороб	
Щавель кислий			-	3										
Одеський 17	63180001	1969	381 /		СШІ	7	свж, стл	рс	7	7			7	
Широколистий	60180003	1963	313 /		СШІ	5	свж, стл	рс	5	5			5	
Цибуля запашна			-	2										
Етюд	03416001	2005	313 /		СШІ	7-9	свж	рс	7	7			7	
Цибуля галузиста			-	2										
Донецький малахіт	в 04419001	2007	317 /											
Свген	в 04419002	2007	317 /											
Гібіск їстівний (Бамія)			-	2										
Діброва	в 04426001	2006	984 /		СШІ	7	харч.	рс	7	7			7	
Сопілка	в 04426002	2007	984 /											
Гарбуз мускусний			-	5										
Янина	03228001	2005	410 /		СШІ	7	універ	рс	7	7			7	
Гарбуз крупноплідний			-	4										
Данка Полька	в 05102001	2008	1081 /		СШІ	7	ун	сс	7	7			7	
Селера коренеплідна			-	5										
Албін	01167001	2002	888 /		СШІ	7	свж	ср	7	7			7	
Максим	06167001	2007	888 /											
Сільськогосподарські: інші														
Аніс звичайний			-	1										
Артек	94370001	1999	366 / 366		II		х, лік	сс						

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Волошки справжні			- 14										
Аметист	в 05340001	2007	635 /	СШ	5	ун	пс		4,3	4,7		9	
Бадьорий	98340001	2000	357 / 357	СШ		свж, сал	рс						
Гіруєк	в 06340001	2007	647 /	СШ	7	свж сал	дп	5	5	5	5	9	
Ніжний аромат	в 04340001	2005	317 /	С		спц	рс		9	9	9	9	
Перекотиполе	01340001	2004	984 /	СШ		спц, зс	рс	9	9			9	
Пурпурова зоря	в 04340002	2005	317 /	С		спц	пс		9	9	9	9	
Рутан	01340002	2004	984 /	СШ		спц, зс	рс	9				9	
Сяйво	01340003	2004	984 /	СШ		спц, зс	рс	9				8	
Філософ	06340002	2007	898 /	СЛ	5	ун	рс					8	
Юнга	00340001	2003	402 /	ЛП		х	сс						
Гісоп лікарський			- 5										
Атлант	97376001	1999	348 /	СШ		сал, спц	сс						
Водограй	в 08376001	2010	348 /	ЛП		еф олн		9	стійкий	9		9	
Маркіз	02376001	2003	348 /	Л		х	сс						
Нікітський олний	99376001	2002	365 /	Кр		фарм,х	сс						
Ельшольція Стаунтона			- 1										
Розове облако	98256001	2002	365 /	Кр		фарм							
Змієголовник			- 2										
Медоніс	00336002	2003	402 /	ЛП		х	сс						
Змієголовник молдавський			- 1										
Перлинка	00336001	2001	348 /	Л		спц	сс						
Кмин звичайний			- 3										
Подільський 9	77156001	1983	418 /	Л		тхн, х	сс						

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Случ	90156001	1997	418 /	П		тхн, х	се						
Коріандр посівний (кінза)			- 9										
Американо ®	05185001	2007	635 /	СЛП	5	ун	пе		4,2	4,6	5	4,8	
Медун	98185001	2003	366 / 366	С		х	се						
Міус	05185002	2007	366 /	СЛ	5	тхн, х, лік	се		5	5	5	8	
Нектар	90185002	1999	366 / 366	ЛП		тхн, х	се						
Оксанит	90185003	1997	356 /	С		тхн, х	се						
Ранній	71185001	1980	366 / 366	С		тхн, х	се						
Янтар	72185001	1980	366 / 366	СП		тхн, х	се						
Котяча м'ята лимонна			- 3										
Мелодія	97112001	1999	348 /	СЛП		сал, спц	се						
Первенець	82112001	1983	366 / 366	С		тхн, х	се						
Ювілей Вавилова	88112001	1991	366 / 366	С		тхн	се						
Кріп запашний			- 12										
Атлант	02158001	2004	1163 /	СЛП	9	спц	ре	7	7			7	
Амброзія	98158002	2000	1084 /	СЛП		спц	ре						
Скіф	02158002	2004	366 / 366	СЛ	9	спц	се	9	7			7	
Татран	04158001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	ре	7	7			7	
Туркус в	05158002	2006	1081 /	СЛП		свж, спц							
Харківський 85	82158001	1986	402 /	СЛП		спц	ре						
Шмаранд	98158001	2000	1081 /	СЛП		спц	ре						
Лаванда вузьколиста			- 5										
Ізіда	92187001	2000	366 / 366	С		парф	се						
Рання	73187002	1983	366 / 366	С		тхн, х	ре						
Степова	57187002	1962	366 / 366	С		тхн, х	се						

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Синева	86187002	1997	366 / 366	С		тхн, х	пс						
Лавандин			- 1										
Теми	92188001	2002	365 /	Кр		фарм ,парф							
Лофант ганусовий			- 4										
Лелека	97281002	1999	348 /	СШ		сал, спц	сс						
Нам'ять Капелєва	99281001	2002	365 /	С		сал,спц	сс						
Синій велетень	97281001	1999	348 /	СШ		сал, спц	сс						
Майоран садовий			- 2										
Дзвіночок	97190001	1999	348 /	СШ		сал, спц	сс						
Меліса лікарська			- 1										
Цитронелла	00356002	2002	402 /	ЛШ		лік							
Меліса лимонна			- 1										
Соборна	00356001	2003	402 /	ЛШ		х							
Молочай чиновий			- 1										
Запорізький	00101001	2001	329 / 329	С	7	олш			8	8	7-9	7	
М'ята			- 10										
Заграва	90116001	1995	427 /	СШ		тхн, х	сс						
Краснодарська 2	61116001	1967	366 / 366	ЛШ		тхн, х	сс						
Лидия	91116001	1999	385 /	Л		лік	пс						
Лубенчанка	83116001	1989	385 /	Л		тхн, х	сс						
Мама	98116002	2001	385 /	Л		лік	сс						
Прилуцька 6	49116001	1956	366 / 366	ЛШ		тхн, х	сн						
Прилуцька карвонна	97116002	2001	427 /	Ш		х	сс						

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Українська перцева	92116001	1998	366 / 366	П		лік, х	сс						
Удайчанка	97116001	2001	427 /	СП		х	сс						
Чорнолиста	78116002	1985	385 /	Л		лік	сс						
Полин лимонний			- 1										
Еллада	92196001	2001	365 / 365	С		лік, х	сс						
Розмарин лікарський			- 1										
Горізонт	98339001	2002	365 /	Кр		парф,х							
Сафлор красильний			- 4										
Сонячний	99323001	2001	329 / 329	С	5	олн			6	7	7	5	
Степовий ®	05323001	2006	1192 /	С	7	олн			8	8	9	8	
Троянда дамаська			- 4										
Аура	97238001	2001	366 / 366	С		тхн, х	сс						
Лань	86238001	1990	366 / 366	С		тхн, х	рс						
Лада ®	06246008	2009	366 /	С		еф.-ол.		9	5			7	
Радуга	90238001	1984	366 / 366	С		тхн, х	рс						
Фенхель звичайний			- 2										
Мерцишор	86200001	1999	366 / 366	П		тхн, х	сс						
Оксамит Криму	99200001	2003	366 / 366	С		х	сс						
Хміль звичайний			- 20										
Ксанта ®	05021007	2008	320 /	ЛП		пв,пер	сс	5				5	
Промінь	92021002	2001	318 /	П	7-9	пв,пер	сс	7	8			7-9	
Чаклун ®	05021006	2008	320 /	П		пв,пер	сс	5				5	
283 ®	03021003	2004	191 / 192, 191	П	7	аром.	сс	8	7			7	
Альта	90021004	1997	318 /	П	7	пв,пер	рс	>5	7			7-9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Житомирський 75	03021002	2006	320/	П	8	пв.	сс	6	7			8	т.аром.
Заграва	92021001	1999	318/	П	7-9	пв,пер	сс	7	7			7	
Пивовар	03021001	2006	320/	ЛП	7-9	пив.	сс	6	7			8	т. аром
Славянка	88021001	1995	318/	ЛП	5	пв,пер	сс	7	7			7	
Хмелеслав	98021001	2004	320/	П	7	аром.	сс	7	7			7,5	
Видибор	05021001	2006	320/	П	8	пв.фарм.	сс	7	7			8	т.аром.
Зміна	90021003	2001	318/	П	7-9	пв,пер	сс	7	7			7-9	
Злато Полісся	99021003	2002	1100/	П	7-9	пв	сс	7	7			7-9	
Кумир	90021005	1995	318/	ЛП	5	пв,пер	сс	5	7			5	
Оскар	05021002	2006	320/	П	8	пв.фарм.	сс	7	7			8	т.аром.
Тріумф ®	05021005	2006	1100/	П	8	пв.фарм.	сс	7	7				т.аром.
Гайдамацький	94021003	1999	318/	П	7-9	пв,пер	пс	7-9	7			7-9	
Руслан	99021002	2003	1100/	П	7-9	пв	сс	7-9	8			7-9	
Чабер садовий			- 1										
Остер	96279001	1999	984/	СЛП		сал, спц	сс						
Чебрець			- 1										
Фантазія	01390001	2004	365/	С		фарм	пс	9	4			9	
Шавлія мускатна			- 6										
Ай-Тодор	98204001	2003	366/366	С		х	ср						
Кримська пізня	81204001	1991	366/366	С		тхн, х	пс						
Мрія	96204001	2001	366/366	С		тхн	ср						
С 785	61204001	1967	366/366	С		тхн, х	сс						
М'ята довголиста			- 1										
Посульська ліналоольна	03430001	2008	385/										

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Плодові та ягідні													
Яблуня домашня			- 80										
54-118	73086025	1984	237 /	СЛП		підщ.		9	9			9	
Аскольда	88086001	1999	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	7		7	9	влеж
Аврора кримська	73086019	1977	359 / 359	С		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Алі паруси	82086007	1994	359 / 359, 359	С		свж	літ	9	7			7	
Айдаред	73086026	1986	1010 / 344	СЛ		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Антонівка звичайна	90086015	1928	1010 / 344	ЛП		ун	осін	9	9		7	7	
Амулет ®	94086020	2006	344 /	СЛП		ун	рзим	9	9			9	9
Балаклавське	85086004	2001	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Благодать ®	02086003	2006	424 /	СЛ		ун	зим	9	9			9	7
Голден Делішес	66086002	1969	1010 / 344	СЛ		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Гала	78086013	1993	1010 / 344	СЛ		свж	осін	7	7		7	7	
Городищенське ®	97086008	2008	424 /	СЛ	85	дес.	зим.	9	8			7	8
Гарант ®	01086004	2006	344 /	СЛП		ун	пзим	9	9			9	
Даринка ®	02086004	2006	424 /	СЛ		ун	зим	9	9			9	7
Едера	97086007	2001	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	9		7	9	влеж
Зимове лимонне	55086001	1969	403 /	ЛП		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Каразинське	97086002	1999	403 /	Л		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Кимерія	92086003	1997	359 / 359	С		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Кримське зимове	69086006	1984	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Кримське	75086004	1999	359 / 359	Кр		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Краснокутське солодке	86086003	2003	403 /	Л		свж	осін	7	9		7	7	
Катерина	94086013	2001	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Любава ®	02086005	2006	424 /	Л		ун	зим	9	9			9	
Мінкар	90086006	2002	325 /	СЛ		свж	зим	7	7		7	7	влеж
Орнамент ®	92086009	2005	344 / 344	СЛП	7	свж	зим	9	9			9	9

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Прима	76086023	1991	1010 / 344	СЛ		свж	осін	9	7		7	7	
Предгорне	75086026	1999	359 / 359	Кр		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Пепінка золотиста	55086002	1971	424 /	СЛП		свж	осін	9	9		7	7	
Перлина Києва	94086021	2001	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Папіровка	38086003	1950	1010 / 344	СЛП		свж	літ	9	9		7	7	
Росавка	80086003	1992	424 /	СЛ		свж	зим	9	9		7	7	влеж
Ренет Симиренка	47086006	1957	424 /	СЛП		свж	зим	9	9		9	7	влеж
Радогость	92086018	2000	344 / 344	ЛП		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Ровесник	78086006	2000	424 /	СЛ		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Рум'яний альпініст	87086002	1997	365 / 365	С		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Рубінове Дуки	74086003	1983	344 / 344	Л		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Салгірське	73086021	1981	359 / 359	С		свж	осін	7	7		7	7	
Слава переможцям	47086008	1954	424 /	СЛП		ун	осін	9	9		7	7	
Сапфір	82086011	2001	424 /	ЛП		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Симиренківець	80086004	1997	424 /	Л		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Сентябрське красне	69086010	1989	359 / 359	С		свж	осін	9	7		7	7	
Скіфське золото	® 92086010	2006	344 /	СЛ		ун	рзим	9	9			9	
Теремок	90086002	1999	344 / 344	ЛП		ун	осін	9	7		7	7	
Таврія	75086008	1984	359 / 359	С		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Флоріна	94086011	2003	1010 / 424	СЛ		свж	зим	9	7		9	9	слеж
Хорнголд	09086009	2010	1290 /	С					7			5	
Ювілейне Міс	® 04086003	2006	424 /	Л		ун	зим	9	9			9	9
Власта	® 02086002	2006	424 /	Л		ун	осін	9	9			9	7
Мліївчанка осіння	® 92086020	2008	424 /	Л	98	дес.	посін.	9	9			8	8
Скіфянка	92086001	2006	325 /	С		свж.	літ	9	9			9	7
Груша звичайна			- 66										
Буковинка	87076007	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Бере київська	72076001	1991	344 / 344	Л		свж	зим	9	9		7	7	влеж
Бере Боск	40076005	1950	1010 / 344	СЛ		свж	осін	9	9		9	7	
Васса	66076001	1979	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Вільямс	40076009	1950	1010 / 344	СЛ		ун	літ	9	7		7	7	
Вижниця	87076012	1999	344 / 344	ЛП		свж	осін	9	7		7	7	
Вітчизняна	57076002	1969	359 / 359	СЛ		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Вікторія	73076001	1988	325 /	СЛ		ун	осін	7	7		7	7	
Десертна	57076001	1969	359 / 359	С		свж	осін	7	7		7	7	
Етюд	87076013	1999	372 / 344	ЛП		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Золотоворітська	81076004	1995	372 / 344	Л		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Зимова мліївська	68076001	1989	424 /	Л		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Золотиста	58076001	1975	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Золотава	® 05076004	2007	403 /	Л		свж	осін	7	7-8			8-9	7-8
ІС 4-6	98076002	2000	344 / 344	СЛП		підщ.		9	9			9	
ІС 2-10	98076001	2000	344 / 344	СЛП		підщ.		9	9			9	
Ізумрудна	82076009	1994	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Ізюминка Криму	83076003	1995	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Конференція	54076001	1975	1010 / 344	ЛП		свж	осін	9	9		7	9	
Корсунська	49076001	1972	424 /	Л		свж	літ	9	7		7	7	
Крупноплідна	87076011	1997	433 /	Л		ун	осін	9	7		7	7	
Кучерянка	88076003	1997	433 /	Л		ун	зим	9	9		9	9	влеж
Марія	92076011	2001	359 / 359	Кр		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Мрія	® 97076002	2008	359 /	СЛ	92	техн.	зим.	9	9			8	9
Ноябрська Молдавії	95076002	2000	365 / 365	Кр		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Надсжда степу	87076003	2000	365 / 365	С		свж	осін	7	7		7	7	
Основ'янська	69076001	1987	403 /	СЛ		свж	осін	9	9		7	7	
Осінь Буковини	88076001	1997	433 /	Л		ун	осін	9	7		7	7	
Платонівська	® 06076001	2007	424 /	Л		свж	осін	8	9			8-9	9

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Роксолана	81076005	1995	372 / 344	СЛ		свж	зим	9	9		9	9	слеж
Стрійська	86076002	1999	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Смерічка	83076002	1995	372 / 344	Л		свж	осін	7	7		9	7	
Сторожинецька	92076005	1997	433 /	Л		ун	зим	9	9		9	9	слеж
Таврійська	74076003	1976	359 / 359	СЛ		свж	осін	9	7		9	7	
Улюблена осіння	82076006	1987	403 /	Л		свж	осін	7	7		7	7	
Улюблена Клаппа	40076015	1950	1010 / 344	СЛП		свж	літ	9	7		7	7	
Чернівчанка	87076006	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	
Черемшина	82076002	2000	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	9		7	7	влеж
Яблунівська	87076009	1997	433 /	Л		ун	зим						влеж
Янтарна	74076004	1989	325 /	СЛП		свж	осін	7	7		7	7	
Яніс	® 06076002	2007	433 /	Л		ун	посін	8-9	8-9			9	8-9
Весільна	03076003	2006	325 /	С		ун	осін	9	9			9	7
Вересневе Дево	® 05076001	2006	344 /	ЛП		ун	осін	9	9			9	9
Оксамит	® 01076002	2006	424 /	Л		ун	осін	9	9			9	7
Посмішка	04076005	2006	325 /	С		ун	росін	9	9			9	9
Чистенька	04076006	2006	325 /	С		ун	росін	9	9			9	7
Якимівська	86076003	2000	359 / 359	С		свж	осін	9	7		9	7	
Провінціалка	03076002	2006	325 /	С		ун	посін	9	9			9	7
Бере Десятова	® 04076001	2006	344 /	СЛ		свж	рс	9	9			9	9
Уманська ювілейна	® 04076002	2006	344 /	СЛ		свж	рс	9	9			9	9
Дитяча	04076007	2006	325 /	С		ун	посін	9	9			7	7
Райдуга	® 01076001	2006	424 /	Л		ун	пс	9	9			9	7
Катюша	04076003	2006	325 /			ун	посін	9	9			9	7
Пектораль	03076001	2006	325 /	С		ун	осін	9	9			9	7
Кандидатка	04076004	2006	325 /	С		ун	зим	9	9			9	7

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Айва довгаста			- 11										
Академічна	97207004	1999	348/	СЛП		ун	сс	7	7		5	5	
Дарунок онуку	97207002	1999	348/	СЛП		ун	ср	7	7		5	7	
Кащенка №18	97207001	1999	348/	ЛП		ун	рс	9	7		7	5	
Кримська ароматна	72207001	1981	365/365	СЛ		ун	сс	9	7		7	7	
Кримська рання	68207004	1982	365/365	С		ун	рс	7	7		7	5	
Марія	97207003	1999	348/	СЛП		ун	сс	7	7		5	5	
С'єдобна	98207001	2001	365/365	С		ун	сс	9	7		7	5	
Студентка	87207001	1999	348/	СЛП		ун	сс	7	7		7	7	
Сказочна	98207002	2001	365/365	С		ун	сс	9	7		5	5	
Хеномелес японська			- 4										
Вітамінний	99362001	2001	348/	ЛП		ун	рс	9	7		7	5	
Караваєвський	99362003	2001	348/	ЛП		ун	пс	9	7		7	5	
Помаранчевий	99362002	2001	348/	ЛП		ун	сс	9	7		7	5	
Цитриновий	99362004	2001	348/	ЛП		ун	сс	9	7		7	5	
Абрикос звичайний			- 26										
Авіатор ®	83070001	1995	365/365	С		ун	пс	7	7		5	5	
Ананасний Цюрупінський	40070001	1962	365/365	С		ун	сс	9	7		7	7	
Ботсадівський	83070006	2001	348/	СЛ		ун	ср	7	5		7	5	
Буревісник	78070001	1991	365/365	С		стл	рс	7	7		5	5	
Зоряний	84070001	2000	325/	С		ун	ср	7	5		7	7	
Кримський Амур ®	83070002	1994	365/365	С		ун	сп	7	7		5	7	
Кумір	03070003	2006	325/	С		ун	надранній.	9	7			9	
Мелітопольський пізній	70070002	1988	325/	СЛ		ун	пс	9	9		7	7	
Мелітопольський ранній	56070001	1980	325/	С		стл	рс	7	7		7	5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Мелітопольський лучистий	80070004	1990	325 /	С		стл	сс	7	5		5	7	
Пам'ять Кащенка	78070003	2001	348 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	7	
Поліський крупноплідний	74070001	1985	344 / 344	С		ун	сс	7	7		5	5	
Тащенакський	03070002	2006	325 /	С		ун	ср	7	9			9	
Дар Мелітополя	04070002	2006	325 /	С		ун	сп		9			9	
Садовий	04070001	2006	325 /	С		ун	сп						
Алича (слива розлога)			- 8										
Генерал ®	06072002	2007	314 /	ЛС		ун	сп	9	9			9	7-8
Київська гібридна	84072002	2001	348 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	7	
Обільна	57072001	1969	365 / 365	С		ун	рс	9	9		7	7	
Оленька	86072001	1995	365 / 365	СЛ		ун	сс	9	9		7	7	
Тетяна ®	06072001	2007	344 /	ЛС		ун	сп	8	8			9	7-8
Вишня звичайна			- 20										
Альфа	79074001	2000	424 /	Л		ун	сп	9	9		5	5	
Встрєча	82074001	1995	325 /	С		ун	сп	9	9		5	5	
Воспомінанією	92074001	2005	325 /	СЛП	7	ун	сс	9	9			7	
Взгляди	92074002	2005	325 /	СЛ	7	ун	сс	9	9			7	
Гріот мелітопольський	80074001	2002	325 /	С		ун	сс	9	9		7	7	
Ігрушка	80074004	1992	325 /	С		ун	сс	9	9		5	5	
Мелітопольська десертна	47074005	1954	325 /	СЛ		ун	сс	9	7		5	7	
Норд Стар	84074005	1995	1010 / 344	П		ун	пс	9	9		9	9	
Ожиданіє	83074002	1993	325 /	С		ун	сс	9	7		7	7	
Примітна	81074004	1991	325 /	С		ун	сс	9	7		5	7	
Ранній десерт	94074003	2005	325 /	СЛ	7	ун	рс	9	9			9	
Спутниця	94074005	2005	325 /	СЛП	7	ун	сс	9	9			9	
Шалунья	80074002	1990	325 /	С		ун	сс	9	7		5	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Любительська	02074001	2006	325 /	С		ун	пс	9	9			9	
Відродження	® 04074002	2006	325 /	С		ун	пс	9	9			9	
Ерудитка	89074002	2006	325 /	С		ун	пс	9	9			7	
Солідарність	92074012	2005	325 /										
Змінщиця	® 04074001	2006	325 /	С		ун	пс	9	7			9	
Згода	® 04074003	2006	325 /	С		ун	пс	9	7			9	
Нотка	89074003	2006	325 /	С		ун	пс	7	9			7	
Черешня			- 61										
Анонс	76085005	1990	325 /	С		ун	сп	9	7		7	7	
Винка	48085001	1981	325 /	С		ун	сс	9	9		7	7	
Дружба	76085001	2001	325 /	С		ун	сс	9	7		7	5	
Дачниця	83085001	2001	325 /	С		ун	сс	9	7		7	7	
Ділема	74085004	1987	325 /	С		ун	сс	9	7		7	7	
Дніпровка	47085002	1954	325 /	С		ун	сс	7	7		5	7	
Електра	82085009	2001	325 /	С		ун	ср	9	9		7	7	
Заря Востока	72085002	1996	365 / 365	Л		ун	сс	9	7		5	5	
Зоряна (Возвращеніс)	99085006	2002	424 /	Л		ун	пс	9	7		7	7	
Забута	86085008	2002	325 /	П		ун	пс	7	9		7	5	
Зодіак	94085002	2005	325 /	СЛП	9	ун	сп	9	9			9	
Іскра	79085001	1998	325 /	С		ун	сп	7	7		7	7	
Ізюмна	71085002	1991	325 /	Л		ун	пс	7	7		5	7	
Космічна	70085002	1984	325 /	СЛ		ун	сс	9	7		7	7	
Китаївська чорна	50085003	1962	344 / 344	ЛП		ун	сс	7	5		5	5	
Казка	86085007	2002	325 /	С		ун	рс	7	7		5	7	
Крупноплідна	72085003	1983	325 /	С		ун	сс	9	7		9	5	
Легенда Мліїва	® 06085001	2007	424 /	Л		ун	сс	7	7			8	9
Любава	® 06085002	2007	314 /	СЛП		ун	сп	7	7			8	8

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Мелітопольська чорна	57085002	1969	325/	СЛ		ун	сс	9	7		5	5	
Мелітопольська рання	47085004	1976	325/	С		свж	рс	7	7		7	5	
Міраж	88085002	2003	325/	Л		ун	рс	9	7		7	7	
Мелітопольська красна	71085004	1996	325/	СЛ		ун	сс	9	9		7	7	
Меотіда	02085001	2003	325/	Л		ун	сс	9	7		7	7	
Нектарна	49085003	1954	424/	СЛ		ун	пс	9	7		7	7	
Оріон	81085001	1998	325/	Л		ун	сс	7	7		5	5	
Престижна	74085003	1990	325/	С		ун	сп	9	7		7	7	
Присадибна	47085006	1954	325/	СЛ		свж	рс	9	9		7	7	
Рання Дуки	49085002	1972	344/344	Л		свж	рс	7	7		5	5	
Романтика	79085002	1998	325/	ЛП		ун	пс	9	7		7	7	
Рубінова рання	71085006	1983	325/	СЛ		свж	рс	9	9		7	7	
Сюрприз	70085004	1982	325/	С		ун	сп	9	7		5	5	
Таврічанка	47085012	1969	325/	С		ун	ср	9	9		5	5	
Талісман	93085001	1995	325/	С		ун	сс	9	9		7	7	
Тотем	94085004	2005	325/	СЛП	9	ун	ср	9	9			9	
Удівітсльна	77085002	1991	325/	СЛ		ун	сс	7	7		5	5	
Червнева рання	50085001	1969	325/	СП		свж	рс	9	7		7	7	
Чорнокримка	86085006	2003	365/	С		ун	рс	9	7		7	5	
Визнання	02085002	2007	325/	ЛС		свж	ран	9	9			7	8
Ера	89085003	2007	325/	ЛС		ун	ран	9	9			7-8	9
Дебют	02085004	2007	325/	СЛ		ун	сер	7	7			8	8-9
Аншлаг	® 04085003	2007	325/	ЛС		ун	сс	9	7			8	9
Ласуня	® 04085005	2007	325/	ЛС		ун	сс	9	7			8	9
Ніжність	® 05085001	2006	344/	ЛП		ун	сс	9	9			9	
Простір	02085006	2007	325/	СЛ		ун	сс	9	7			7	8-9
Шанс	® 04085004	2007	325/	ЛС		ун	сс	9	7			8	9
Епос	89085002	2007	325/	СЛ		ун	сер	9	9			7	9

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Супернниця	02085003	2007	325/	СЛ		ун	сп	9	7			8	9
Віха	02085005	2007	325/	ЛС		ун	пізн	9	7			8	8
Дивна	® 04085001	2007	325/	ЛС		ун	пізн	9	7			8	8-9
Любимиця Туровцева	® 04085002	2007	325/	ЛС		ун	пізн	9	7			8	8
Темпоріон	89085001	2007	325/	СЛ		ун	пізн	9	9			7	9
Слива домашня			-	**12**									
Анна Шпет	39080001	1949	1010/344	СЛП		ун	пс	9	9		7	5	
Волошка	76080001	1980	424/	СЛП		ун	пс	9	9		5	5	
Ненька	® 06080001	2007	424/	Л		ун	ран	8	8			8-9	9
Ода	79080003	1986	424/	Л		свж	рс	9	9		5	5	
Сентябрська	48080002	2003	424/	Л		ун	сп	9	9		7	7	
Стенлей	76080006	1988	1010/344	СЛ		ун	пс	9	9		7	7	
Чачакська найкраща	90080005	1999	363/363	С		ун	пс	9	7		5	5	
Персик звичайний			-	**64**									
Віренея	94079001	2003	325/	С		ун	сс	7	7		7	7	
Дружба	70079001	1972	348/	Л		стл	сс	7	5		5	5	
Дніпровський	67079001	1979	348/	СЛ		ун	рс	7	5		5	5	
Золота Москва	72079004	1982	365/365	С		стл	сп	7	7		7	7	
Золотистий	76079001	1988	325/	С		ун	пс	7	7		7	7	
Іван Тупіцин	94079002	2005	325/	СЛП	7	ун	сс	9	9			7	
Київський ранній	50079001	1954	344/344	СЛ		стл	рс	5	7		7	5	
Красна дівиця	63079002	1977	365/365	С		стл	сп	7	7		7	7	
Кримський фейєрверк	84079009	1995	365/365	С		ун	рс	7	7		5	7	
Кримська осінь	83079003	1999	365/365	С		ун	пс	7	7		7	7	
Кремлівський	47079002	1954	365/365	С		стл	рс	7	7		7	7	
Любимець II	97079005	2001	348/	СЛ		ун	сс	7	7		7	5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Лісостеповий	78079001	1993	348/	С		стл	рс	7	7		7	7	
Мелітопольський ясний	80079002	1991	325/	С		стл	рс	7	7		7	7	
Мрія	94079003	2005	325/	СЛП	7	ун	пс	9	9			9	
Оксамитовий	92079014	2001	348/	Л		ун	ср	7	5		5	5	
Пушистий ранній	47079004	1954	365 / 365	СЛ		стл	рс	5	5		5	5	
Пам'ять Гришко	92079005	2001	348/	СЛ		ун	пс	5	5		5	5	
Посол миру	92079001	2002	365/	С		ун	рс	7	7		7	7	
Підщепний 1	75079004	1990	348/	С				9	9		-	9	
Пам'ять Шевченка	71079002	1978	348/	С		ун	сс	7	7		7	7	
Подарок Києва	78079003	1993	348/	С		стл	сс	7	7		7	7	
Редхавен	68079012	1985	1010 / 344	С		стл	сс	7	7		7	7	
Рум'яний	68079006	1972	348/	СЛ		стл	рс	5	5		5	5	
Славутич	71079004	1984	348/	СЛ		стл	сс	7	5		7	7	
Сказка	79079002	1993	365 / 365	С		стл	сс	7	7		7	7	
Совєтський	48079002	1954	365 / 365	С		стл	ср	7	7		7	7	
Сочний	47079005	1954	365 / 365	СЛ		стл	рс	7	7		7	7	
Стартовий	94079005	2000	365 / 365	С		ун	рс	7	7		7	7	
Сяйво	92079009	2005	325/	СЛП	9	ун	сс	9	9			7	
Франт	68079007	1974	365 / 365	С		стл	рс	7	7		7	7	
Щедрий	92079004	2001	348/	Л		ун	пс	7	5		5	5	
Ювілейний Сидоренка	90079002	2003	325/	С		ун	сп	7	7		7	7	
Згода	04079002	2006	325/	С		ун	рс	9	7	9		7	9
Чарівник	03079006	2006	325/	С		ун	рс	9	9			9	9
Златодар	04079001	2006	325/	С		ун	рс	9	9			9	9
Спокуса	03079005	2006	325/	С		ун	пс	9	9			9	9
Нектарин		-	4										
Рубіновий 8	84396001	2001	365 / 365	С		ун	пс	7	7		5	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Дерен (кизил) звичайний			-	**15**									
Вавіловець	92212007	2000	348 /	СЛ		ун	рс	7	5		5	7	
Видубецький	87212004	2000	348 /	СЛ		ун	сс	7	7		5	7	
Володимирський	97212002	1999	348 /	СЛП		ун	сс	9	5		5	7	
Гренадер	92212001	2000	348 /	СЛ		ун	нр	7	5		5	7	
Елегантний	92212006	1999	348 /	СЛП		ун	рс	9	5		5	7	
Екзотичний	00212001	2001	348 /	СЛП		ун	пс	9	5		5	7	
Євгенія	97212003	1999	348 /	СЛП		ун	сс	9	5		5	7	
Кораловий Марка	00212002	2001	348 /	СЛП		ун	рс	9	5		5	7	
Лук'янівський	87212003	1999	348 /	СЛП		ун	сс	7	7		5	7	
Миколка	92212002	2000	348 /	СЛ		ун	рс	7	5		5	7	
Олена	92212004	1999	348 /	СЛП		ун	рс	9	5		5	7	
Радість	92212005	2000	348 /	СЛ		ун	рс	7	5		5	7	
Семен	97212001	1999	348 /	СЛП		ун	пс	9	5		5	7	
Світлячок	92212003	1999	348 /	СЛП		ун	пс	9	5		5	5	
Михайлівський	® 04212001	2008	424 /	СЛП	93	ун.	ран.	9	7			9	9
Агрус відхилений			-	**13**									
Високий замок	85071001	1995	372 / 344	П		ун	сс	9	7		5	5	
Карпати	84071001	1995	372 / 344	Л		ун	сс	9	7		5	5	
Красень	75071001	1986	424 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	
Каменяр	85071002	1994	372 / 344	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	
Легінь	® 06071001	2007	424 /	Л		ун	сс	7-8	7-8			7-8	7
Мліївський жовтий	51071001	1969	424 /	ЛП		ун	рс	9	7		5	7	
Неслухівський	84071002	1990	372 / 344	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	
Карат	® 04071002	2006	344 /	ЛП		ун	рс	9	9			9	
Елегант	® 04071003	2006	424 /	Л		ун	сс	9	9			9	9

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Златогор ®	04071001	2006	344/	ЛП		ун	рс	9	9			9	
Оксамит ®	05071001	2006	344/	СЛП		ун	сс	9	9			9	7
Славута ®	05071002	2006	344/	ЛП		ун	сс	9	9			9	
Княжич ®	05071003	2006	344/	ЛП		ун	сп	9	9			9	
Актинідія			- 14										
Загадкова	00208004	2001	348/	СЛ		ун	сс	>5	5		5	7	
Київська крупноплідна	84208004	1992	348/	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Київська гібридна	84208003	1992	348/	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Караваївська урожайна	92208002	2001	348/	СЛ		ун	пс	>5	5		5	7	
Надія	00208003	2001	348/	СЛ		ун	сп	>5	5		5	7	
Оригінальна	92208003	2001	348/	СЛ		ун	сс	>5	5		5	7	
Пурпурна садова	84208006	1992	348/	слп		ун	сс	>5	5		5	7	
Перлина саду	00208002	2001	348/	СЛ		ун	рс	>5	5		5	7	
Ріма	00208001	2001	348/	СЛ		ун	сс	>5	5		5	7	
Рубінова	92208001	2001	348/	СЛ		ун	рс	>5	5		5	7	
Сентябрська	84208002	1992	348/	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Фігурна	84208005	1992	348/	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Жимолость синя			- 5										
Богдана	98341001	2000	403/	Л		ун	сс	7	7		7	5	
Фіалка	98341002	2000	403/	Л		ун	сс	7	7		7	5	
Калина звичайна			- 3										
Великоплідна	97211002	2001	424/	ЛП		ун	сс	9	9		7	7	
Коралова	97211001	200'	424/	ЛП		ун	рс	9	9		7	7	
Лимонник китайський			- 1										
Садовий 1	96213001	1998	348/	ЛП		ун	сс	7	7		7	9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Малина			-	**16**									
Зєва	90077004	1995	1010 / 344	СЛ		ун	рм	9	7		7	7	
Космічна	Ⓡ 05077002	2007	350 /	ЛП		ун	рем	7	7			8	8-9
Мар'янушка	81077001	1993	403 /	СЛ		ун	сс	9	7		7	7	
Новокитаївська	51077001	1969	344 / 344	СЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Одарка	80077002	1988	403 /	СЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Персея	Ⓡ 06077002	2007	344 /	ЛП		ун	ран	8	9			8	8-9
Рось	86077001	1999	424 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	7	
Саня	Ⓡ 06077001	2007	344 /	ЛП		ун	ран	8	9			7-8	8-9
Осіння	Ⓡ 03077002	2006	350 /	ЛП		ун	рем	9	9			9	9
Феномен	Ⓡ 99077002	2007	403 /	Л		ун	сс	8	8			7-8	8-9
Обліпиха крушиновидна			-	**2**									
Київський янтар	98078001	2000	1085 /	Л		ун	рс	9	5		7	7	
Либідь	98078002	2000	1085 /	Л		ун	сс	9	5		7	7	
Порічки звичайні			-	**11**									
Любава	94082003	2000	372 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	7	
Ласуня	Ⓡ 06082001	2007	344 /	ЛП		свж	рс	9	8			8-9	9
Святомихайлівська	98082001	2001	344 / 344	СЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Святкова	94082004	2000	372 /	ЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Троїцька	94082008	2001	344 / 344	СЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Чародійка	94082006	2000	372 /	ЛП		ун	пс	9	7		5	7	
Ярославна	97082002	2001	372 /	ЛП		ун	сп	9	7		5	7	
Дарниця	Ⓡ 94082010	2006	344 /	ЛП		ун	сс	9	9			9	9
Самбурська	Ⓡ 94082011	2006	344 /	ЛП		ун	рс	9	9			9	9

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Смородина - 24													
Аметист	92083005	2002	344 / 344	П		ун	сс	9	7		7	7	
Вернісаж	94083007	2003	344 / 344	СЛП		ун	сс	9	9		7	7	
Вербна	97083007	2004	372 /	ЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Козацька	92083003	2001	344 / 344	ЛП		ун	ср	9	7		7	7	
Краса Львова	94083004	2000	372 /	ЛП		ун	сп	9	9		7	7	
Консул	® 06083001	2007	424 /	Л		ун	ран	9	9			8-9	9
Либідь	94083005	2001	372 /	ЛП		ун	сп	9	5		5	7	
Надбужанська	97083006	2004	372 /	ЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Оріана	® 06083003	2007	344 /	ЛП		ун	рс	9	8			8-9	7
Пам'ять Правику	90083002	1994	424 /	Л		ун	сс	9	7		7	7	
Санюта	87083007	1995	344 / 344	СЛ		ун	сп	9	9		7	7	
Софіївська	97083010	2001	344 / 344	СЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Софія	97083005	2001	372 /	ЛП		ун	сс	9	7		7	7	
Сюїта київська	87083006	1995	344 / 344	СЛ		ун	ср	9	7		7	7	
Українка	94083006	2000	372 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	
Чернеча	88083003	2000	344 / 344	ЛП		ун	сс	9	9		7	7	
Черешнева	91083007	1999	344 / 344	ЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Ювілейна Копаня	97083001	2001	344 / 344	СЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Ластівка	01083002	2006	344 /	СЛП		ун	рс	9	9			9	9
Мелодія	® 04083002	2006	424 /	Л		ун	рс	9	9			9	9
Казкова	® 01083003	2006	344 /	СЛП		ун	сс	9	9			9	9
Муза	® 04083001	2006	424 /	Л		ун	сс	9	9			9	9
Радужна	® 01083001	2006	344 /	СЛП		ун	ср	9	9			9	9
Володимирська	® 97083002	2006	344 /	СЛП		ун	сп	9	9			9	9

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Суниця		-	**38**										
Симфонія	® 05084008	2007	670/	ЛП		ун	сп	9	9			9	8
Багряна	90084005	1999	344/344	СЛП		ун	рс	7	7			7	
Берегиня	03084003	2005	350/	СЛП	9	ун	рс	9	9			9	
Веселка	® 06084001	2007	344/	СЛП		свж	ран	9	8			9	
Дарунок вчителю	85084001	1993	344/344	СЛП		свж	рс	7	7			7	
Десна	78084001	1987	344/344	СЛП		свж	рс	9	7			7	
Ерос	® 05084009	2007	672/	СЛ		ун	сп	7	9			8	8-9
Історник	80084005	1989	344/344	СЛП		ун	сс	7	7			5	
Кримська рання	77084002	1985	359/359	С		свж	рс	7	7			5	
Кримська ремонтантна	81084001	1985	359/359	С		свж	рс	7	7			5	
Кримчанка 87	80084008	1987	359/359	С		ун	сс	7	7			5	
Корона	® 05084010	2007	601/	ЛП		ун	ран	9	7			7	8
Ольвія	97084002	2001	344/344	СЛП		ун	рс	7	7			7	
Присвята	86084001	1992	344/344	СЛП		ун	сп	7	7			7	
Русанівка	78084003	1986	344/344	СП		ун	рс	7	7			7	
Фестивальна ромашка	85084002	1992	344/344	СЛП		ун	сс	7	7			7	
Факел	03084002	2005	350/	СЛП	7	ун	сп	9	9			7	
Розана київська	® 03084004	2006	344/	СЛП		ун	рс	9	9			9	9
Хонейо	05084001	2006	557/	Л		ун	рс	9	9			9	9
Презент	® 05084004	2006	344/	СЛП		ун	сп	9	7			9	9
Полка	® 05084003	2007	601/	Л		ун	сп	9	7			9	8-9
Горіх грецький		-	**22**										
Буковинський 2	87075003	1995	433/	Л		ун	сс	5	7			7	
Буковинська бомба	87075007	1995	433/	Л		ун	сс	5	7			7	
Клішківський	91075009	1995	433/	Л		ун	рс	5	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Прикарпатський	91075010	1995	433/	Л		ун	рс	5	5			7	
Рудківський	® 97075002	2007	433/	Л		ун	ран	7				7	9
Топорівський	91075014	1995	433/	Л		ун	сп	7	5			7	
Чернівецький 1	95075001	1997	433/	Л		ун	сс	5	7			5	
Ярівський	91075012	1995	433/	Л		ун	сс	5	5			7	
Мигдаль звичайний			- 7										
Десертний	49215001	1976	365/365	С		ун	сс	7	7		7	7	
Мілас	97215004	2000	365/365	С		ун	рс	7	7		7	7	
Нікітський 2240	65215002	1986	365/365	С		ун	сс	7	7		7	7	
Нікітський 62	49215002	1954	365/365	С		ун	сс	7	7		7	7	
Прибрежний	72215002	1986	365/365	С		ун	пс	7	7		7	7	
Хурма східна			- 10										
Гора Говерла	® 05442002	2006	1067/	С		ун	сс	7	9			9	9
Гора Роман Кош	® 05442003	2006	1067/	С		ун	сс	9	9			9	9
Актинідія пурпурових актинідія гостра			- 3										
Ласунка	® 05444001	2006	348/	Л		ун	сс	9	9			9	9
Помаранчева	® 05444003	2006	348/	Л		ун	сс	9	9			9	9
Яблуня (підщепа)			- 7										
КД 5	® 05086007	2007	403/	ЛП		підщ		8-9	7			9	9
КД 4	® 05086006	2007	403/	ЛП		підщ		8-9	7-9			9	9
ММ-106	75086014	1984	1010/344	СЛП		підщ.		9	9			9	
М 9	75086010	1976	1010/344	СЛ		підщ.		9	9			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Виноград													
Виноград справжній			-	**120**									
Алеатіко	54073004	1958	1010 / 488	5,6		тхн	пс	9	7			7	
Антей магарацький	® 80073001	1988	364 / 364	1-4, 7		тхст	пс	9	7			7	
Аліготе	48073001	1956	1010 / 488, 379	1-6, 8-15		тхн	рс	7	7			7	
Аврора Магарача	® 82073012	1995	364 /	8-10		тхн	сс	9	7			7	
Альбіньо кримський	57073008	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	9	9			7	
Аркадія	® 90073004	1995	379 /	7,8-10		стл	др	7	7			5	
Ароматний	® 07073010	2009	379 /	С	139,6 ц/га	тхст	ср	8				8	
Асма	80073010	1986	1010 / 488	5-6		стл	дп	7	7			5	
Ассоль	® 00073003	2005	364 /	1 - 6	5	стл	рс	9	9			7	
Буковинка	® 92073004	2006	1068 /	5,6-8,9,11,12,1	5	тхн	сс	7	7			7	
Берландієрі х Рипарія СО4	76073011	1978	1010 / 241	1-15		підщ,		9	9			9	
Берландієрі х Рипарія Кобера 5 ББ	76073010	1978	1010 / 226	1-15		підщ,		9	9			9	
Бордо	® 01073008	2006	364 /	С	7	тхн	дп	7	6			7	
Бастардо магарацький	69073001	1969	364 / 364	2-10,14		тхн	пс	9	9			9	
Восток	® 68073001	1978	379 /	11-14		стл	сс	7	7			7	
Вердельо	52073003	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	7	7			7	
Восторг	90073019	1992	211 /	1-6,13,14		стл	др	7	7			7	
Голубок	® 70073001	1981	379 /	7-12,15		тхн, всш	рс	7	7			7	
Гарс Левелю	49073005	1958	1010 / 379	4-7		тхн	дп	9	7			7	
Гурзуфський розовий	® 97073008	2006	1068 /	5,6-8,9,11,12,1	5	тхст	сс	7	7			7	
Гранатовий Магарача	07073009	2008	364 /	С		тхст	рс	7	7			7	
Гвісне	07073008	2008	364 /	С		тхн	пс	5	7			5	
Дністровський рожевий	® 65073001	1972	379 /	8-10		тхст	дп	9	9			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Данко ®	81073004	2003	364 / 364	1-6		тхн	сс	7	7			7	
Джеват кара	01073002	2002	917 / 517	5		тхн	пс	9	7			7	
Екім кара	59073010	1969	364 / 517	5,6		тхн	дп	9	7			7	
Загрей ®	00073008	2006	379 /	;,6,8,9,11,13,1	7	тхн	пс	8	6			6	
Золотистий устойчивий ®	70073002	1990	379 /	10		тхст, всш	пс	7	7			7	
Загадка ®	00073007	2006	379 /	;,6,8,9,11,13,1	5	стл	сс	6	5			7	
Іршаї Олівер	57073009	1958	1010 / 379	7-10		стл	др	9	7			7	
Італія	51073002	1969	1010 / 379	2-6,8-10,13,14		стл	дп	9	7			7	
Інтервітіс Магарача ®	94073012	2006	364 /	С	7	стл	пс	7	5			8	
Королева виноградників	49073001	1959	1010 / 379	2,4-6,8-12,15		стл	рс	7	7			7	
Каберне Совіньйон	52073004	1962	1010 / 379	1-12,13-15		тхн, всш	дп	9	9			7	
Кобзар ®	90073011	2006	379 /	,2,6-9,11,13,1	5	стл	рс	5	6			6	
Кардинал	65073005	1969	1010 / 364	1-6,8,14		стл	др	7	7			7	
Київський золотистий	67073004	1983	348 /	10		стл	др	7	7			7	
Крона	92073013	1995	917 / 517	5,6		тхн	пс	7	7			7	
Кокур білий	57073001	1958	364 /	2,4-6		тхн	дп	7	7			7	
Красень	07073007	2008	364 /	С		тхст	сс	7	7			7	
Кефесія	79073006	1995	917 / 517	5,6		тхн	дп	7	7			7	
Капсельський білий	92073012	1995	917 / 517	5,6		тхн	пс	9	9			7	
Комета ®	07073011	2009	379 /	С		тхст	сс	9	9			7	
Леся ®	74073008	1985	379 /	8-10,13-15		стл	рс	7	7			7	
Любительський ®	00073002	2006	1068 /	,6,7,8,9,11,12,	7	стл	сс	7	7			7	
Лапка ®	79073002	1990	379 /	8-10,15		стл	сс	9	7			7	
Ліваділйський чорний ®	97073007	2006	1068 /	;,6-8,9,11,12,1	7	тхн	рс	7	7			7	
Марсельський чорний ранній	50073003	1969	1010 / 379	8,9		тхст	рс	7	7			7	
Мускат янтарний	69073002	1986	614 / 488	1-6,13-15		стл	др	7	7			7	
Мускат таїровський ®	68073004	1976	379 /	7-14		стл	др	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Мускат Оттонель	50073004	1952	1010 / 379	1-4,7-9,11-14		тхст	рс	7	7			7	
Мускат одеський ®	82073003	1993	379 /	8-14		тхн	рс	7	7			7	
Мускат жемчужний ®	79073003	1988	379 /	8-10,15		стл	др	7	7			7	
Мускат гамбургський	49073009	1958	1010 / 379	1-15		стл	пс	9	9			7	
Мускат білий	49073003	1959	1010 / 364	2,4-6,13,14		тхн	рс	7	7			7	
Морастель	57073010	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	дп	7	7			7	
Мерло	59073011	1983	1010 / 379	1,2,4,7-14		тхн	сс	7	7			7	
Мурведр	00073011	2001	364 /	2,5,6		тхн	дп	7	7			7	
Мускат рожевий	52073006	1958	1010 / 488, 517	2,4,6		тхн	рс	7	7			7	
Молдова	74073004	1987	614 /	1-14		стл, всш	дп	9	9			9	
Мускат чорний	52073007	1958	1010 / 364	2,5,6		тхн	рс	7	7			7	
Мускат Лівадія ®	04073002	2006	1068 /	5,6,8,7,9-12,1	7	стл	др	7	7			7	
Мускат Голодриги ®	97073006	2006	1068 /	5,6-8,9,11,12,1	7	тхн	др	7	7			7	
Олег ®	00073001	2006	1068 /	5,6-8,9,11,12,1	5	тхн	рс	9	7			7	
Одеський ранній ®	61073004	1978	379 /	10		стл	др	7	7			7	
Овідіопольський ®	72073001	1986	379 /	8-15		тхн, всш	сс	7	7			7	
Одеський сувенір ®	74073001	1985	379 /	7-12		стл	пс	9	9			7	
Одеський чорний ®	57073002	1972	379 /	1-6,8-14		тхн, всш	дп	7	7			7	
Оригінал ®	87073003	2002	379 /	8		стл	пс	9	9			9	
Первенець Магарача ®	76073014	1994	364 / 364	1-14		тхн	пс	7	9			7	
Піно чорний	57073011	1959	1010 / 379	2,4,8-14		тхн	рс	7	7			7	
Подарок Магарача ®	77073014	1987	364 / 364	1-3,12-14		тхст	рс	7	7			7	
Пам'яті Голодриги	07073006	2008	364 /	C		тхн	пс	5	7			5	
Ранній Магарача	52073002	1969	364 / 364	1-6,8-15		стл	др	7	7			7	
Рубіновий Магарача	59073007	1969	364 / 364	4-6,11,12,15		тхн, всш	пс	9	9			7	
Рипарія х Рупестрис 101-14	76073007	1978	1010 / 241	1-15		підщ.		9	9			9	
Рубін таїровський ®	79073005	1990	379 /	8-10,14		тхн	дп	9	9			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг ання	осипання	хвороб	
Рислінг рейнський	39073001	1949	1010 / 379	1-5,7-15		тхн, всш	пс	9	7			7	
Рісус	® 92073016	2006	1068 /	5,6-8,9,11,12,1	7	тхн	сс	7	7			9	
Ркацителі	49073004	1958	1010 / 379	1-5,7-15		тхн	дп	9	9			9	
Рубін Голодриги	® 92073005	2006	1068 /	5,6-8,9,11,12,1	5	тхн	пс	9	9			9	
Роднічок	90073018	2006	379 /	,2,6-9,11,13,1	7	тхн	дп	8	6			7	
Сурученський білий	75073007	1992	607 /	2,4-6,11,12		стл	пс	9	9			7	
Солдайя	01073003	2002	917 / 517	5,6		тхн	пс	7	7			7	
Саперавi	50073001	1958	1010 / 379	1-15		тхн	пс	9	9			7	
Сари пандас	79073007	1995	917 / 517	5,6		тхн	пс	9	9			7	
Серсіаль	49073015	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	9	9			7	
Сонячнодолинський	92073007	1995	364 / 517	5,6		тхн	пс	7	7			7	
Совіньйон зелений	49073017	1969	1010 / 379	1,2,4-6,8-14		тхн	сс	9	7			7	
Сухолиманський білий	® 58073001	1969	379 /	2,8-14		тхн	сс	7	7			7	
Смена	® 90073020	2006	379 /	,2,6-9,11,13,1	5	стл	сс	6	6			7	
Трамінер рожевий	49073018	1958	1010 / 379	1-5,7-11,13-15		тхн	рс	7	7			7	
Тельті курук	50073002	1969	1010 / 379	9,10		тхн	пс	7	7			7	
Тавквері Магарача	® 85073004	2006	364 /	2	7	тхн	дп	9	9			9	
Український 85	® 68073002	1985	379 /	10		стл	др	7	7			7	
Фурмінт	49073019	1958	1010 / 379	6,7		тхн	дп	9	7			7	
Фетяска біла	52073008	1958	1010 / 379	1-4,7-15		тхн, всш	рс	7	7			7	
Флора	® 07073001	2008	379 /	С		ст	рс	9	6			7	
Цитронний Магарача	® 94073006	2002	364 / 364	1-6		тхн	рс	7	7			7	
Цимлянський чорний	60073003	2002	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	7	7			7	
Шардоне	49073020	1958	1010 / 379	1-5,8-14		тхн	сс	7	7			7	
Шабаш	57073007	1958	1010 / 488	2-6		стл	дп	9	9			7	
Шасла біла	48073002	1958	1010 / 379	1-15		стл	рс	7	7			7	
Шоколадний	® 05073001	2006	1068 /	,6,7,8,9,11,12,	7	стл	сс	7	7			7	
Кок пандас	01073001	2002	917 / 517	5,6		тхн	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Біанка	94073015	2007	379/	9,10,11,12,13,	5	тхн	сс	7				7	
Альмінський ®	97073003	2007	364/	2	5	тхн	пс	8	8			7	
Рисліng Магарача ®	83073001	2007	364/	4	7	тхн	пс	8	8			7	
Спартанець Магарача ®	82073001	2007	364/	2	5	тхн	пс	5	7			7	
Анателікон ®	00073006	2007	364/	6	5	тхн	дп	7	7			7	
Чорна оніана ®	00073005	2007	364/	6	7	тхн	дп	7	7			7	
Огоньок таїровський ®	90073015	2007	379/	,2,6-9,11,13,1	5	стл	др		6			7	
Ялтинський безнасінний ®	97073010	2007	364/	6	5	стл	сс	5	6			7	
Етюд ®	05073002	2007	379/	?,6,8,911,13,1	5	стл	сс	7	7			8	
Кишмиш таїровський ®	05073007	2007	379/	,2,6-9,11,13,1	‹5	стл	пс		5			6	
Таїр ®	84073003	2007	379/	;,6,8,9,11,13,1	5	стл	рс		7			7,6	
Геркулес ®	97073001	2007	364/	6	5	стл	дп	5	6			7	
Добриня ®	05073004	2007	379/	8-12		підщ		8	9			6-7	
Декоративні та лікарські													
Азалія			-	15									
Алєнькій цвсточек	87219002	1999	348/	СЛП		дкр					7	7	
Героям Війни	87219003	1999	348/	СЛП		дкр					7	7	
Київський вальс	95219002	1999	348/	СЛП		дкр					7	7	
Огоньок	95219001	1999	348/	СЛП		дкр					7	7	
Сузір'я	87219001	1999	348/	СЛП		дкр					7	7	
Алтея лікарська			-	1									
Мальвіна	97081001	2001	385/	ЛП		лік	сс	7	7	7		7	
Бузок			-	5									
Богдан Хмельницький	74223006	1985	348/	ЛП		дкр,озл,зрі:		9	9			7	
Вогні Донбасу	74223003	1985	348/	ЛП		дкр,озл,зрі:		9	9			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Леся Українка	82223001	1996	348 /	ЛП		дкр,озл,зріз		9	9			7	
Тарас Бульба	74223005	1985	348 /	ЛП		дкр,озл,зріз		9	9			7	
Чарівність ®	04223002	2009	317 /	ЛС		озел.							
Валеріана лікарська			- 1										
Україна	92182001	1997	385 /	Л		лік	сс		7			7	
Гладіолус			- 11										
Амфора	96228001	2001	348 /	ЛП		зріз, озл			7	5		5	
Вій	94228001	2001	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	
Дебют	94228006	2000	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	
Леда	98228001	2001	348 /	ЛП		зріз, озл			7	5		5	
Мереживо	94228002	2001	348 /	ЛП		зріз, озл			7	5		5	
Міраж	96228002	2001	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	
Пам'яті Івана Миколайчука	94228007	2000	348 /	СЛП		озл, зріз			7	5		5	
Софія	96228004	2001	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	
Сільва	94228005	2000	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	
Сувенір	94228003	2000	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	
Талісман	94228004	2001	348 /	ЛП		зріз, озл			7	5		5	
Головатень круглоголовий			- 1										
Глобус	02405001	2008	385 /										
Ехінацея пурпурова			- 3										
Поліська красуня ®	05303002	2007	596 /	СЛП	5	фарм, мед	сс	5	5			5	
Чарівниця ®	05303001	2007	385 /	СЛП	7	лік	сс	5	5	5	5	4	
Юзівська ®	04303002	2007	317 /	С	7	корм	сс	7-9	7-9	7-9	-	7	сбіл,скліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Жовтушник лакфіолевидний			- 1										
Сонячний	99379001	2001	385/	Л		лік	сс	7	7			7	
Жоржина садова			- 24										
Астероїд	90230001	1991	348/	ЛП		дкр,озл,зріз			7			7	
Бабин Яр	94230001	1999	348/	ЛП		озл, зріз			7			7	
Вечірні дзвони	94230009	2000	348/	СЛП		озл			7			7	
Веселі Терни	92230003	1997	348/	СЛП		озл			7			7	
Видубецькі купола	97230006	2000	348/	ЛП		озл, зріз			7			7	
Вічний вогонь	72230001	1977	348/	СЛП		дкр,озл,зріз			7			7	
Валерія	97230003	2002	348/	ЛП		озл., зріз			7			7	
Журавушка	73230001	1981	348/	С		дкр,озл,зріз			7			7	
Зали Аврори	78230001	1984	348/	ЛП		дкр,озл,зріз			7			7	
Золоті ворота	94230005	1999	348/	ЛП		озл, зріз			7			7	
Київ вечірній	94230012	1999	348/	ЛП		озл, зріз			7			7	
Луганчанка	94230010	2000	348/	СЛП		озл			7			7	
Лунохід	88230002	1994	348/	ЛП		дкр,озл,зріз			7			7	
Ламбада	94230011	1999	348/	СЛП		озл, зріз			7			7	
Ніна	94230013	1999	348/	ЛП		озл, зріз			7			7	
Осіннє золото	97230005	2001	348/	СЛП		озл			7			7	
Осінь в Софіївці	94230008	2000	348/	ЛП		озл, зріз			7			7	
Рудана	90230006	1996	348/	ЛП		озл			7			7	
Свічадо	97230002	2002	348/	ЛП		озл., зріз			7			7	
Сполох	90230005	1996	348/	ЛП		озл			7			7	
Спокуса	97230001	2002	348/	ЛП		озл., зріз			7			7	
Смуглянка	94230004	1998	348/	ЛП		озл			7			7	
Серце Данко	75230006	1980	348/	С		дкр,озл,зріз			7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Флагман революції	88230001	1998	348/	ЛП		озл			7			7	
Звіробій козячий			- 1										
Антос	97373001	2002	1073/	ЛП		фарм			5	7	7	7	
Калістефус китайський			- 36										
Аннточка	97285002	2000	348/	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Вереснева	90285001	1991	348/	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Варя	97285009	2001	348/	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7	
Голубий павучок	97285003	2001	348/	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Жемчуг	76285003	1985	348/	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Звєзда Полєсья	90285006	1995	344/344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Київський вальс	83285002	1988	348/										
Лелека	87285003	1991	348/	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Либідь	00285001	2004	344/344						5	7	7	7	
Лебедине озеро	76285001	2001	344/344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Малиновий блєск	92285001	1994	348/	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Наречена	97285004	2001	348/	ЛП		зріз,озл			7	7	7	7	
Нєжность	79285005	1999	344/344	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7	
Осінній вечір	90285007	1996	344/344	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7	
Одарка	97285001	1999	344/344	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7	
Оксана	90285005	1996	344/344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Павліна	91285003	1996	344/344	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Празднична	74285002	1978	348/	СЛП		зріз,озл			7	7	7	7	
Поліна	76285009	1996	344/344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Рубінові звьозди	79285003	1985	344/344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Ранкова зоря	83285001	1989	348/	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Сапфірове пламʼя	90285004	1991	348/	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	

Сорт			Код		Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач							посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Юлія	79285001	1997	344 / 344		ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Яблунева	92285004	1994	344 / 344		ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Канна індійська			-	3										
Лівадія	69234004	1970	365 / 365		С		озл				5		7	
Маестро	87234001	1992	365 /		С		озл				5		7	
Пламя Криму	65234003	1970	365 / 365		С		озл				5		7	
Люминіс			-	1										
Спутник	83237007	1988	348 /											
Мачок жовтий			-	1										
Геліос	02304001	2008	385 /											
Наперстянка пурпурова			-	1										
Зірочка	90192001	1999	385 /		П		лік	сс	5	5	5	7	7	
Наперстянка перестиста			-	1										
Сульчанка	90193002	1996	385 /		ЛП		лік	сс	5	5	5	7	7	
Оман високий			-	1										
Гулівер	98332001	2001	385 /		Л		лік	сс	9	9	7	7	7	
Півонія			-	32										
Антей	94242002	2000	348 /		ЛП		зріз, озл		9	9	7	7	7	
Бенефіс	03242003	2004	348 /						9	9	7	7	7	
Берегиня	92242003	1998	348 /		ЛП		озл		9	9	7	7	7	
Весільна	92242005	1998	348 /		ЛП		зріз, озл		9	9		7	7	
Дукат	92242007	1998	348 /		ЛП		зріз, озл		9	9		7	7	
Жемчужна розсип	84242004	1995	348 /		ЛП		озл, зріз		9	9	7	7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Корифей	03242004	2004	348/					9	9		7	7	
Любідь	92242002	1998	348/	ЛП		зріз, озл		9	9	7	7	7	
Мрія	92242004	1998	348/	ЛП		зріз, озл		9	9	7	5	7	
Офелія	98242001	2001	348/	ЛП		озл, зріз		9	9	7	5	7	
Світоч	85242001	1995	348/	ЛП		озл, зріз		9	9	7	5	7	
Скарбниця	94242001	1999	348/	ЛП		зріз, озл		9	9	7	7	7	
Хохлома	86242001	1994	348/	ЛП		озл, зріз		9	9	7	7	7	
Червоні вітрила	98242002	2001	348/	ЛП		озл, зріз		9	9	7	7	7	
Чаклунка	03242001	2004	348/					9	9	7	5	7	
Червоний оксамит	85242002	1994	348/	ЛП		озл, зріз		9	9	7	7	7	
Ювілей Києва	03242002	2004	348/					9	9	7	7	7	
Ясочка	92242006	1998	348/	ЛП		зріз, озл		9	9	7	7	7	
Подорожник блошиний			- 1										
Березотіцький	97377001	2001	385/	Л		лік	сс	9	9			7	
Подорожник великий			- 1										
Полтавський	84195001	1989	385/	ЛП		лік	сп	9	9			7	
Розторопша плямиста			- 1										
Бойківчанка ®	05194001	2007	332/	СЛ	5	лік, х	сс		7	8	5	7	
Ромашка аптечна			- 1										
Перлина Лісостепу	92197001	1999	385/	Л		лік	сс						
Троянда			- 38										
Джим	97246005	2002	365/	С		озл		7	7		5	5	
Еммі	97246004	2003	365/	С		зріз		7	7		7	7	
Красний маяк	97246006	2000	365/365	С		озл, зріз		5	7		5	7	
Коралловий сюрприз	77246003	1981	365/365	СЛП		цкр,озл,зрі		5	7		7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Мальчик-с-Пальчик	98246004	2003	365/	С		зріз		5	7		7	7	
Сєда дама	98246002	2001	365/365	С		озл		5	7		7	5	
Тан01693	® 05246010	2006	484/	ЗГ	9	зріз						9	9
Танкальєн	® 05246001	2006	484/	ЗГ	9	зріз						9	9
Тан00163	® 05246004	2006	484/	ЗГ	9	зріз						9	9
Таналедєв	® 05246005	2006	484/	ЗГ	9	зріз						9	9
Танотіка	® 05246008	2006	484/	ЗГ	9	зріз						9	9
Тан01549	® 05246009	2009	484/	ЗГ	9	зріз						7	9
Танавл	® 05246003	2006	484/	ЗГ	9	зріз						9	9
Херсонес	90246006	1999	365/365	С		озл		5	5		7	5	
Тюльпан			- 4										
Галіна Уланова	84247001	1997	365/365	С		озл, зріз		7	7	7	5	7	
Міраж	96247002	2001	365/365	ЛП		зріз, озл		7	7	7	7	7	
Скіф	96247012	2000	365/365	СЛП		озл, зріз		5	7	7	5	7	
Тоня	85247002	1997	365/365	С		озл, зріз		5	7	7	7	7	
Флокс волотистий			- 7										
Микола Щорс	63248001	1970	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	5	5	
Новінка	61248033	1970	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	5	5	
Снежний шар	68248001	1981	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	5	5	
Тарас Шевченко	74248001	1981	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	5	5	
Ювілейний	73248002	1981	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	5	5	
Хризантема			- 26										
Бархан	83250002	1988	348/	ЛП		озл, зріз		7	7	7	9	7	
Біла ромашка	75250006	1983	348/										
Вродлива	96250001	2001	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	7	7	
Журавлинка	94250001	2000	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Зірниця	92250001	1994	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	7	7	
Звездонад	86250001	1990	348/	ЛП		озл, зріз		7	7	7	7	7	
Зоряночка	98250001	2001	348/	ЛП		озл, зріз		7	7	7	7	7	
Золоте руно	98250005	2001	348/	ЛП		озл, зріз		7	7	7	9	7	
Колобок	94250013	2000	348/	ЛП		озл		7	7	7	9	7	
Космічна	94250014	2000	348/	ЛП		озл		7	5	7	9	7	
Кіона	85250005	1989	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	7	7	
Крижинка	94250015	2000	348/	ЛП		озл		5	7	7	9	7	
Колискова	94250016	2000	348/	ЛП		озл		5	7	7	5	7	
Лелія	92250002	1994	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	9	7	
Метеорит	98250002	2001	348/	ЛП		озл, зріз		7	7	7	7	7	
Оксамитка	98250004	2001	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	7	7	
Промениста	94250002	2001	348/	ЛП		озл, зріз		5	7	7	9	7	
Привітна	94250012	2000	348/	ЛП		озл		5	7	7	9	7	
Пекторалъ	98250003	2001	348/	ЛП		озл, зріз		5	7	7	9	7	
Перлинка	96250002	2001	348/	ЛП		озл, зріз		7	7	7	9	7	
Сонечко	94250003	1999	348/	ЛП		озл, зріз		5	7	7	9	7	
Смуглява красуня	83250001	1989	348/										
Умка	92250003	1994	348/	ЛП		озл, зріз		5	7	7	9	7	
Хрустальна	85250006	1989	348/	ЛП		озл, зріз		5	7	7	9	7	
Чураївна	92250017	1997	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	9	7	
Чарівна флейта	83250004	1988	348/	ЛП		озл, зріз		7	5	7	9	7	
Целозія гребінчаста			- 1										
Гребінець	00347001	2002	405/	ЛП		озл., зріз					7	7	
Цмин піщовий			- 1										
Золотистий	92315001	1999	385/	Л		лік	ее	7	7	7	7	7	

Сорт			Код		Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач							посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Шавлія лікарська			-	1										
Таврійська	90203001	1981	362 /		С		лік	ее	7	7	7	7	7	
Щириця Мантегацца			-	1										
Вогняна кулька	00393001	2002	405 /		ЛП		озл			7	7	7	7	
Щириця хвостата			-	1										
Рушничок	02403001	2003	348 /		Л		зрз			7	7	7	7	
Череда трироздільна			-	1										
Монастирська	03414001	2005	385 /		С		лік	пс		9	9	9	9	
Деревій майже звичайний			-	1										
Еней	06468001	2009	366 /		С		лік.		9	9	9		9	
Інші														
Глива звичайна			-	1										
Сільван НК-35	® 04408001	2005	286 / 286											
Печериця двоспорова			-	2										
Сільван 512	® 04375002	2005	286 / 286											
Сільван А-15	® 04375001	2005	286 / 286											

Характеристики сортів рослин, занесених до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2011 році (частина II)

Характеристики сортів рослин, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні у 2011 році

Сільськогосподарські: злаки

Пшениця м'яка озима

07007044 Астрон — Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий, із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, середньої ширини, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — середній, вушка — гострі.

Рослини заввишки 96 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала.
Середньопізня, достигає за 292 дні.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 55,6 ц/га. Гарантована різниця 3,1 ц/га. Маса 1000 зерен 38,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,8% білка, клейковини 28,2%, сила борошна 360 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100 мл. Цінна пшениця.

07007045 Акратос — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий, із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — середній, вушка — гострі.

Рослини заввишки 94-98 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 7,8-8,2 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,7 бала. Середньопізня, достигає за 271-291 день. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 60,3 ц/га, в зоні Лісостепу 71,8 ц/га, Полісся 60,5 ц/га. Гарантована різниця 7,9-8,0 ц/га. Маса 1000 зерен 43,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,3-14,5% білка, клейковини 27,2-30,8%, сила борошна 258-335 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1000-1110 мл. Цінна пшениця.

® 07007004 Ареал ювілейний — Лісостеп, Полісся

Заявник: Приватне підприємство " Сорт"

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, довгий, із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору,

середньої ширини та довжини, крупна. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 87 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування сорту становила 8,5 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,2-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала.. Середньостигла, достигає за 276-290 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 67,3 ц/га, Полісся 58,1 ц/га. Гарантована різниця – 3,4-5,6 ц/га. Маса 1000 зерен 40,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та задовільні. Зерно містить 13,6-13,8 % білка, клейковини 27,9-28,7%, сила борошна 160-260 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 930-980 мл. Цінна пшениця.

® 07007015 Борвій — Степ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності такороткий за довжиною, із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 77 -83 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 9,0 бала.
Середньорання, достигає за 270 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 67,3 ц/га. Гарантована різниця 3,3 ц/га. Маса 1000 зерен 38,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту відмінні. Зерно містить 14,3% білка, клейковини 29,7%, сила борошна 429 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1115 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 07007028 Богемія — Лісостеп, Полісся

Заявник: Селген, а.с.

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з дуже сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний та довгий, з дуже сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, середньої ширини, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 95-98 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,4 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,3 бала. Середньостигла, достигає за 274-290 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 70,4 ц/га, Полісся 59,1 ц/га. Гарантована різниця 6,5-6,6 ц/га. Маса 1000 зерен 43,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі . Зерно містить 14,4-14,5% білка, клейковини 29,7-30,0%, сила борошна 280-307о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100-1130 мл. Сильна пшениця.

07007012 Вільшана — Лісостеп

Заявник: Полтавська державна аграрна академія

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та короткий за довжиною, із сильним восковим

нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 98 см. Зимостійкість у польових умовах за роки випробування сорту становила 8,6-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,3-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,6 бала.
Середньостигла, достигає за 281-289 доби.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 66,1 ц/га, Гарантована різниця 2,2 ц/га. Маса 1000 зерен 41,8-42,4 г.
Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,9-14,0 % білка, клейковини 28,4-28,8 %, сила борошна 281-317 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1000-1050 мл. Сильна пшениця.

® 07007034 Відрада

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець дуже зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, крупна. Язичок — середній, вушка — гострі.

Рослини заввишки 101-105 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,4-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,7-8,0 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,7 бала.
Середньорання, достигає за 270-286 днів.
Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 58,0 ц/га, в зоні Лісостепу 63,4 ц/га, Полісся 52,0 ц/га. Маса 1000 зерен 43,0 г.
Борошномельні та хлібопекарські показники сорту відмінні. Зерно містить 14,5-15,4% білка, клейковини 28,5-32,7%, сила борошна 324-466 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1120-1250 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 06007048 Гордовита

Полісся

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та короткий за довжиною, із дуже сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець дуже зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 82-90 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9 бала. Стійкість до осипання 8,6 бала. Стійкість до посухи 8,6
бала. Середньостигла, достигає за 285 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 52,1 ц/га. Гарантована різниця – 0,4 ц/га. Маса 1000 зерен 39,4г.
Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,7% білка, клейковини 29,3%, сила борошна 323 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1110 мл. Цінна пшениця.

07007046 Дромос

Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє

або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — середній, вушка — гострі.

Рослини заввишки 99-102 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,3-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,0-8,4бала. Середньостигла, достигає за 281-287 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 68,0 ц/га, Полісся 68,1 ц/га. Гарантована різниця 4,1-15,6 ц/га. Маса 1000 зерен 39,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та задовільні. Зерно містить 12,8-13,0% білка, клейковини 26,1-26,6%, сила борошна 252-262 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 980-1080 мл. Філер.

® 07007048 Емеріно — Полісся

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — середній, вушка — гострі.

Рослини заввишки 107 см.
Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,7 бала.
Середньостигла, достигає за 286 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 57,1 ц/га. Гарантована різниця 4,6 ц/га. Маса 1000 зерен 41,9г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,4% білка, клейковини 27,5%, сила борошна 268 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1030 мл. Цінна пшениця.

® 07007022 Еміт — Лісостеп, Полісся

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овальна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 93 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,5-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,5 бала.
Середньостигла, достигає за 276-288 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 67,7 ц/га, Полісся 55,3 ц/га. Гарантована різниця – 2,8-3,8 ц/га. Маса 1000 зерен 41,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та задовільні. Зерно містить 12,9-13,3% білка, клейковини 26,8-27,5%, сила борошна 216-260 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 880-1060 мл. Цінна пшениця.

® 07007006 Епоха одеська — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, крупна. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 90-94 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,5-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,0-8,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,3-8,8 бала. Середньорання, достигає за 269-288 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 64,0 ц/га, в зоні Лісостепу 66,2 ц/га, Полісся 53,0 ц/га. Гарантована різниця 0,5-2,3 ц/га. Маса 1000 зерен 39,5-40,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-15,2% білка, клейковини 28,2-31,4%, сила борошна 450-500 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100-1200 мл. Сильна пшениця, поліпшувач від доброго до відмінного.

® 07007049 Єврофіт — Лісостеп, Полісся

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий, із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, крупна. Язичок — середній, вушка — гострі.

Рослини заввишки 94- 96 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,3-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,8 бала. Середньостигла, достигає за 276-288 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 64,3 ц/га, Полісся 58,8 ц/га. Гарантована різниця 0,4-6,3 ц/га. Маса 1000 зерен 41,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,3% білка, клейковини 27,8-28,9%, сила борошна 313-324 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1000-1100 мл. Цінна пшениця.

07007014 Жайвір — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та та короткий за довжиною, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече округле, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 92-94 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,6-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,1-7,9 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,5-8,8 бала. Середньорання, достигає за 269-287 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 64,0 ц/га, в зоні Лісостепу 68,4 ц/га, Полісся 54,6 ц/га. Гарантована різниця 2,1-4,5 ц/га. Маса 1000 зерен 38,0-40,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-14,8 % білка, клейковини 28,8-30,2 %, сила борошна 396-485 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100-1260 мл. Сильна пшениця, поліпшувач від доброго до відмінного.

® 07007007 Заграва одеська

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок.
Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — шилоподібні.

Рослини заввишки 88-92 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,7-8,4 бала. Стійкість до осипання 8,3-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,3-9,0 бала. Середньорання, достигає за 269-285 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 63,1 ц/га, в зоні Лісостепу 66,9 ц/га, Полісся 53,8 ц/га. Гарантована різниця 1,3-3,0 ц/га. Маса 1000 зерен 38,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-15,3% білка, клейковини 29,5-30,8%, сила борошна 322-416 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1200-1300 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 07007031 Златоглава

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овальна-ланцетна, плече скошене, вузьке, зубецьсередньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, широка, довга та крупна. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 90-97 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,5-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,2-8,6 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,7 бала. Стійкість до посухи 8,6 бала. Середньорання, достигає за 268-281день. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 62,8 ц/га, в зоні Лісостепу 70,7 ц/га, Полісся 54,9 ц/га. Гарантована різниця 1,1-6,8 ц/га. Маса 1000 зерен 40,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,8-14,0% білка, клейковини 28,6-30,3%, сила борошна 309-400 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100-1180 мл. Сильна пшениця.

® 07007039 Іришка

Степ, Полісся

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із дуже сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із дуже сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече округле, середньої ширини, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 79-83 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,7-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,6-9,0 бала.
Середньорання, достигає за 270-286 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 63,5 ц/га, в зоні Полісся 56,0 ц/га. Гарантована різниця 0,1-4,0 ц/га. Маса 1000 зерен 39,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту відмінні. Зерно містить 14,1-15,4% білка, клейковини 29,6-33,8%, сила

борошна 304-427 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1050-1300 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 07007005 Істина одеська — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, короткий, із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, середньої ширини, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 86-89 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування сорту становила 8,5-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,4-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,7-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,6 бала.
Середньорання, достигає за 268-288 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 64,8 ц/га, в зоні Лісостепу 65,3 ц/га, Полісся 53,5 ц/га. Гарантована різниця – 1,0-3,1 ц/га. Маса 1000 зерен 38,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,0-14,5 % білка, клейковини 26,5-30,0 %, сила борошна 329-415 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1260-1290 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 07007032 Кірена — Степ, Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд"

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска:ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець дуже зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 80-87 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,3-8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,9-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,9бала. Стійкість до посухи 8,3 бала.
Середньорання, достигає за 268-275 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 65,2 ц/га, в зоні Лісостепу 63,4 ц/га. Гарантована різниця 3,5 ц/га. Маса 1000 зерен 39,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9-14,8% білка, клейковини 27,5-30,6%, сила борошна 316-424 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1210-1240 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 07007017 Нива Київщини — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

ослини заввишки 95-104 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,2-8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,4-7,5 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,7-9,0 бала. Середньорання, достигає за 270-287 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 59,0 ц/га, в зоні Лісостепу 64,3 ц/га, Полісся 54,9 ц/га. Гарантована різниця 0,4-

2,4 ц/га. Маса 1000 зерен 42,8-45,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9-14,6% білка, клейковини 28,6-30,1%, сила борошна 356-426 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100-1200 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 07007027 Поверна — Полісся

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска:ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець дуже зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 92 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,9-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,6 бала. Середньостигла, достигає за 276-286 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 52,8 ц/га. Гарантована різниця 0,3 ц/га. Маса 1000 зерен 40,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі . Зерно містить 13,8% білка, клейковини 29,8%, сила борошна 332 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1180 мл. Цінна пшениця.

07007011 Сагайдак — Лісостеп, Полісся

Заявник: Полтавська державна аграрна академія

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини за висотою — високі . Прапорцевий листок має відсутній або дуже слабкий восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з відсутнім або дуже слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, крупна. Язичок — середній, вушка — гострі.

Рослини заввишки 99-104 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,6-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,1-8,6 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,1-9,0 бала. Середньостигла, достигає за 279-288 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 65,2 ц/га, Полісся 54,6 ц/га. Гарантована різниця 1,3-2,1 ц/га. Маса 1000 зерен 40,9-43,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,2-15,0% білка, клейковини 28,8-31,4%, сила борошна 371-438 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1200 -1300 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 07007029 Самурай — Лісостеп, Полісся

Заявник: Дойче Заатфеределунг АГ

Тип розвитку — озимий. Кущ — від напіврозлогого до розлогого, рослини середньорослі. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві проявляється від помірного до сильного, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке. Соломина виповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, за щільністю — від середнього до щільного, за довжиною — від короткого до середнього та від помірного до сильного восковим нальотом, наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече піднесене, зубець середньо - зігнутий. Зернівка червоного кольору.

Рослини заввишки 72-78 см. Зимостійкість сорту за роки випробування становила 8,4 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,7 бала.
Середньоостигла, достигає за 281-288 днів.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 70,3 ц/га, Полісся 61,8 ц/га. Гарантована різниця 6,4-9,3 ц/га. Маса 1000 зерен 41,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту задовільні. Зерно містить 13,3% білка, клейковини 26,6-28,3%, сила борошна 164-208 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 980-1000 мл. Філер.

® 07007019 Славна — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності та довжини, із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець дуже зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, крупна. Язичок — середній, вушка — гострі.

Рослини заввишки 85-88 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,5-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,7 бала. Середньорання, достигає за 269-287 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 69,5 ц/га, в зоні Лісостепу 73,9 ц/га, Полісся 58,6 ц/га. Гарантована різниця 6,1-10,0 ц/га. Маса 1000 зерен 42,1-43,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,5-14,3% білка, клейковини 27,6-29,6%, сила борошна 280-311 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1000-1070 мл. Сильна пшениця.

06007046 СО 207 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини та крупності, коротка. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 83 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування сорту становила 8,1 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,6-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,3-8,4 бала. Середньостигла, достигає за 270-289 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 63,2 ц/га, в зоні Лісостепу 62,7 ц/га, Полісся 59,8 ц/га. Гарантована різниця – 1,5-7,3 ц/га. Маса 1000 зерен 37,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,5-14,8% білка, клейковини 26,4-30,6 %, сила борошна 263-332 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100-1220 мл. Цінна пшениця.

® 06007039 Скаген — Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослина висока за висотою. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок.
Соломина слабо виповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла.
Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний за щільністю та довгий за довжиною із сильним восковим нальотом.
На нижній квітковій лусці відсутній кіль.
Зернівка червоного кольору, середньої довжини та середня за шириною, має середній язичок.

Висота рослин 86-89 см. Зимостійкість сорту за роки випробування становила 8,5 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала.
Середньоостиглий, вегетаційний період 281-285 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 69,4 ц/га, Полісся 63,6 ц/га. Гарантована різниця 4,9-11,6 ц/га. Маса 1000 зерен 42,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,5% білка, клейковини 27,2%, сила борошна 260-330 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1000-1070 мл. Цінна пшениця.

® 07007013 Ужинок — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 99-104 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,6-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,1-8,6 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,1-9,0 бала. Середньостигла, достигає за 279-288 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 65,2 ц/га, Полісся 54,6 ц/га. Гарантована різниця 1,3-2,1 ц/га. Маса 1000 зерен 40,9-43,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,2-15,0% білка, клейковини 28,8-31,4%, сила борошна 371-438 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1200 -1300 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 07007021 ФТ Вандер — Полісся

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка білого кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки -94 см. Зимостійкість у польових умовах за роки випробування, становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,1 бала. Стійкість до осипання 8,2 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала.
Середньостигла, достигає за 285 діб.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 55,3 ц/га. Гарантована різниця 2,8 ц/га. Маса 1000 зерен 43,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту задовільні. Зерно містить 13,6% білка, клейковини 27,9%, сила борошна 136 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 850 мл. Філер.

® 07007016 Хоревиця — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець середньо зігнутий.

Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, крупна. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 95-104 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,2-8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,4-7,5 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,7-9,0 бала. Середньорання, достигає за 270-287 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 59,0 ц/га, в зоні Лісостепу 64,3 ц/га, Полісся 54,9 ц/га. Гарантована різниця 0,4-2,4 ц/га. Маса 1000 зерен 42,8-45,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9-14,6% білка, клейковини 28,6-30,1%, сила борошна 356-426 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100-1200 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 07007020 Чорнява

Степ, Лісостеп,Полісся

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена зі слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий, із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець дуже зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, крупна. Язичок — середній, вушка — гострі.

Рослини заввишки 87-90 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,4-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,4-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,7-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,5-8,8 бала. Середньорання, достигає за 269-287 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 66,1 ц/га, в зоні Лісостепу 66,8 ц/га, Полісся 55,9 ц/га. Гарантована різниця 2,9-4,4 ц/га. Маса 1000 зерен 40,6-42,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,6-14,3% білка, клейковини 28,9-30,5%, сила борошна 287-391 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1000-1080 мл. Сильна пшениця

® 07007040 Юнона

Степ, Лісостеп, Полісся-
Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина помірно виповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, дрібна. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 77-80 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,6-8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,1-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,6-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,7бала.
Середньорання, достигає за 268-286 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 61,9 ц/га, в зоні Лісостепу 61,1 ц/га, Полісся 52,2 ц/га. Гарантована різниця 0,2 ц/га. Маса 1000 зерен 37,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,3-14,8% білка, клейковини 29,7-30,8%, сила борошна 307-466 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1110-1300 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

® 07007033 Ярославна

Степ, Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд"

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та

наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, за крупністю дрібна. Язичок — короткий, вушка — тупі.

Рослини заввишки 88-94 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,4 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала.
Середньорання, достигає за 269-276 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 63,0 ц/га, в зоні Лісостепу 65,1 ц/га. Гарантована різниця 1,2-1,3 ц/га. Маса 1000 зерен 36,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 14,0-14,5% білка, клейковини 29,8-30,8%, сила борошна 304-334 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1060-1170 мл. Сильна пшениця.

® 07007018 Яворина — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 91-96 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,3-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,4-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,3-8,6 бала. Ранньостигла, достигає за 264-281 день.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 60,9ц/га, в зоні Лісостепу 63,8 ц/га, Полісся 53,5 ц/га. Гарантована різниця – 1,0 ц/га. Маса 1000 зерен 40,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 14,2-15,5% білка, клейковини 28,4-32,1%, сила борошна 255-276 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 990-1000 мл. Цінна пшениця.

Пшениця м'яка яра

® 06007047 Аншлаг — Степ, Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю Селекційно-насінницький центр "Євросорт"

Тип розвитку — ярий. Кущ — прямостоячий, рослина середня за висотою. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок.
Соломина помірно виповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла.
Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний та середній за довжиною із слабким восковим нальотом та наявними остюками.
На нижній квітковій лусці наявний кіль.
Зернівка червоного кольору, середньої ширини та коротка за довжиною, має короткий язичок.

Рослини заввишки 71 - 89 см. Стійкість сорту до вилягання 7,9 бала. Стійкість до осипання 8,2 бала. Стійкість до посухи 7,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 97-103 діб.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 23,9 ц/га. В зоні Лісостепу 48,6 ц/га.Врожайність по Україні за роки випробування знаходилась на рівні національних стандартів. Маса 1000 зерен 34,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,2 – 16,2 % білка, клейковини 26,9 – 32,9 %, сила борошна 258 - 264 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 980 - 1000 мл. Цінна пшениця.

® 07007053 Етос

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку — ярий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена зі слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, короткий, зі слабким восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, коротка та дрібна. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 60-73 см. Стійкість сорту до вилягання 8,6-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 7,7-8,4 бала. Середньостигла, достигає за 93-101 день.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 25,2 ц/га, в зоні Лісостепу 39,5 ц/га, Полісся 40,2 ц/га. Гарантована різниця – 1,4-1,6 ц/га. Маса 1000 зерен 35,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,3-15,0% білка, клейковини 27,9-31,0%, сила борошна 272-308 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 950-1060 мл. Цінна пшениця.

® 07007054 Тазос

Лісостеп

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку — ярий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече округле, середньої ширини, зубець ледь зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, коротка та дрібна. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 77 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,5 бала. Стійкість до посухи 7,9 бала. Середньостигла, достигає за 94 дні.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 38,3 ц/га. Гарантована різниця – 0,2 ц/га. Маса 1000 зерен 36,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,7% білка, клейковини 28,0%, сила борошна 288 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1020 мл. Цінна пшениця.

07007052 Яргора

Полісся

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Тип розвитку — ярий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та короткий за довжиною, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець дуже зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, крупна. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 85 см. Стійкість сорту до вилягання 8,1 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала. Середньостигла, достигає за 100 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 37,1 ц/га. Маса 1000 зерен 38,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 15,3-16,1% білка, клейковини 32,1-33,0%, сила борошна 296-323 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1130 мл. Сильна пшениця.

® 07008003 Крейсер — Степ, Лісостеп

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Тип розвитку - озимий. Кущ - прямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві та сильний на листковій пластинці з нижнього боку. Остюки світлокоричневого кольору зі слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має сильний восковий наліт на верхньому міжвузлі та слабке опушення верхнього вузла. Колос короткий, циліндричної форми, середньої щільності, слабко забарвлений при достиганні і має дуже сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска видовжена, плече скошене, вузьке, зубець середньозігнутий, короткий.

Рослини заввишки 90 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 7,5-8,2 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,1-8,0 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 8,3-8,8 бала. Середньорання, достигає за 270-273 дні. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 59,6 ц/га, в зоні Лісостепу 65,2 ц/га. Гарантована різниця 6,0 ц/га. Маса 1000 зерен 43,7 г. Зерно містить 13,5-14,6% білка. Загальна оцінка крупи 9,0 бала.

® 07008001 Лінкор — Степ, Лісостеп

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Тип розвитку - озимий. Кущ - прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві та сильний на листковій пластинці з нижнього боку. Остюки чорного кольору зі слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має сильний восковий наліт на верхньому міжвузлі та відсутнє або дуже слабке опушення верхнього вузла. Колос дуже короткий, циліндричної форми, середньої щільності, білий при достиганні і має дуже сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска дуже видовжена, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий, короткий.

Рослини заввишки 85 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 7,5-8,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,3 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,0 бала.
Середньорання, достигає за 270-275 днів.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 55,6 ц/га, в зоні Лісостепу 64,4 ц/га. Маса 1000 зерен 42,0 г. Зерно містить 13,9-15,5% білка.
Загальна оцінка крупи 8,0-9,0 бала.

Пшениця тверда яра

07008002 Метиска — Степ, Лісостеп

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Тип розвитку - ярий. Кущ - напівпрямостоячий, рослини низькорослі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві та слабкий на листковій пластинці з нижнього боку. Остюки світлокоричневого кольору з помірним антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має сильний восковий наліт на верхньому міжвузлі та відсутнє або дуже слабке опушення верхнього вузла. Колос середньої довжини, циліндричної форми, щільний, слабко забарвлений при достиганні і має дуже сильний восковий наліт. Зернівка напіввидовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска дуже видовжена, плече скошене, вузьке, зубець ледь зігнутий, середньої довжини.

Рослини заввишки 64-68 см. Стійкість сорту до вилягання 8,5 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 7,5 бала. Середньостигла, достигає за 89-93 дні.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 29,1 ц/га, в зоні Лісостепу 38,2 ц/га. Гарантована різниця – 1,7-2,5 ц/га. Маса 1000 зерен 39,4 г. Зерно містить 14,2-15,0% білка. Загальна оцінка 8,0-8,5 бала.

Жито озиме

07003005 Аскарі — Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку – озимий. Рослина - диплоїд, низька, кущ - прямостоячий. Колеоптиль середньої довжини із помірним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок має дуже коротку піхву зі слабким восковим нальотом та коротку листкову пластинку. Соломина має середню відстань між верхнім вузлом і колосом та слабке опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має напівпохиле положенням в просторі та помірний сизий наліт. Зернівка середньої довжини з помірним забарвленням алейронового шару. Висока маса 1000 зерен.

Середня урожайність сорту за роки випробування у зоні Лісостепу 68,8 ц/га, гарантована прибавка 25,4 ц/га.. Вегетаційний період 277 днів. Висота рослини 132 см. Маса 1000 зерен 31,7 г.Сорт в цій зоні відносно стійкий до хвороб борошнистої росси, снігової плісняви. Відносно стійкий до вилягання, 6,8 бала, осипання 8,6 балів, засухи 8,7 бала. Число падіння 261. Вміст білку 7,1 %. Сережня урожайність сорту за роки випробування у зоні Полісся 58,5 ц\га., гарантована прибавка 17,9 ц\га. Вегетаційний період 289 днів. Висота рослини 130,7 см. Масса 1000 зерен 30,9 г. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, снігової плісняви. Стійкий до вилягання 7,7 бала, осипання 8,4 бала, засухи 8,8 бала. Число падіння 264. Вміст білку 8,7 %. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення Агротехніка звичайна для зон вирощування.

07003004 Забава — Лісостеп, Полісся

Заявник: Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Тип розвитку – озимий. Рослина - диплоїд, середньої висоти, кущ - прямостоячий. Колеоптиль середньої довжини із сильним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок має дуже коротку піхву із сильним восковим нальотом та дуже коротку листкову пластинку. Соломина має середню відстань між верхнім вузлом і колосом та дуже сильне опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має напівпохиле положенням в просторі та сильний сизий наліт. Зернівка середньої довжини з помірним забарвленням алейронового шару. Дуже висока маса 1000 зерен.

Середня урожайність сорту за роки випробування у зоні Лісостепу 57,1 ц/га, гарантована прибавка 13,7 ц/га.. Вегетаційний період 280 днів. Висота рослини 121 см. Маса 1000 зерен 39,9 г.Сорт в цій зоні відносно стійкий до хвороб борошнистої росси, снігової плісняви. Відносно стійкий до вилягання, 7,2 бала, осипання 8,3 балів, засухи 8,7 бала. Число падіння 265. Вміст білку 7,8 %. Сережня урожайність сорту за роки випробування у зоні Полісся 46,4 ц\га., гарантована прибавка 45,8 ц\га. Вегетаційний період 291днів. Висота рослини 120 см. Масса 1000 зерен 40,8 г. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, снігової плісняви. Стійкий до вилягання 8,4 бала, осипання 8, 6 бала, засухи 8,7 бала. Число падіння 247. Вміст білку 9,0 %. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення Агротехніка звичайна для зон вирощування.

® 07003002 Пам`ять Худоєрка — Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Тип розвитку – озимий. Рослина - диплоїд, середньої висоти, кущ - прямостоячий. Колеоптиль середньої довжини зі слабким антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок має дуже коротку піхву з помірним восковим нальотом та коротку листкову пластинку. Соломина має середню відстань між верхнім вузлом і колосом та сильне опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має напівпохиле положенням в просторі та слабкий сизий наліт. Зернівка середньої довжини з помірним забарвленням алейронового шару. Висока маса 1000 зерен.

Середня урожайність сорту за роки випробування у зоні Лісостепу 54,9 ц/га, гарантована прибавка 11,5 ц/га.. Вегетаційний період 279 днів. Висота рослини 137,7 см. Маса 1000 зерен 31,9 г.Сорт в цій зоні відносно стійкий до хвороб борошнистої росси, снігової плісняви. Відносно стійкий до вилягання, 6,7 бала, осипання 8,5 балів, засухи 8,7 бала. Число падіння 236. Вміст білку 7,6 %. Сережня урожайність сорту за роки випробування у зоні Полісся 45,5 ц\га., гарантована прибавка 4,9 ц\га. Вегетаційний період 288 днів. Висота рослини 138 см. Масса 1000 зерен 33,7 г. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, снігової плісняви. Стійкий до вилягання 8,2 бала, осипання 8, 5 бала, засухи 8,5 бала. Число падіння 223. Вміст білку 9,0 %. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення Агротехніка звичайна для зон вирощування.

07003003 Радомирське — Лісостеп, Полісся

Заявник: Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук

Тип розвитку – озимий. Рослина - диплоїд, середньої висоти, кущ - напіврозлогий. Колеоптиль середньої довжини зі слабким антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок має дуже коротку піхву із сильним восковим нальотом та дуже коротку листкову пластинку. Соломина має середню відстань між верхнім вузлом і колосом та слабке опушення під колосом. Колос середньої довжини та щільності, має напівпохиле положенням в просторі та слабкий сизий наліт. Зернівка середньої довжини з помірним забарвленням алейронового шару. Висока маса 1000 зерен.

Середня урожайність сорту за роки випробування у зоні Лісостепу 53,6 ц/га, гарантована прибавка 10,2 ц/га.. Вегетаційний період 281 днів. Висота рослини 139 см. Маса 1000 зерен 31,6 г.Сорт в цій зоні відносно стійкий до хвороб борошнистої росси, снігової плісняви. Відносно стійкий до вилягання, 6,0 бала, осипання 7,8 балів, засухи 8,3 бала. Число падіння 206. Вміст білку 7,1 %. Сережня урожайність сорту за роки випробування у зоні Полісся 45,1 ц\га., гарантована прибавка 4,5 ц\га. Вегетаційний період 290 днів. Висота рослини 139 см. Масса 1000 зерен 33,0 г. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, снігової плісняви. Стійкий до вилягання 8,2 бала, осипання 8, 5 бала, засухи 8,5 бала. Число падіння 211. Вміст білку 8,8 %. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення Агротехніка звичайна для зон вирощування.

07003006 Фестус — Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку – озимий. Рослина - диплоїд, низька, кущ - прямостоячий. Колеоптиль середньої довжини з помірним антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок має дуже коротку піхву із сильним восковим нальотом та дуже коротку листкову пластинку. Соломина має середню відстань між верхнім вузлом і колосом та слабке опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має похиле положенням в просторі та слабкий сизий наліт. Зернівка середньої довжини з помірним забарвленням алейронового шару. Висока маса 1000 зерен.

Середня урожайність сорту за роки випробування у зоні Лісостепу 70,7 ц/га, гарантована прибавка 27,3 ц/га.. Вегетаційний період 279 днів. Висота рослини 126 см. Маса 1000 зерен 31 г.Сорт в цій зоні відносно стійкий до хвороб борошнистої росси, снігової плісняви. Відносно стійкий до вилягання, 6,4 бала, осипання 8,6 балів, засухи 8,7 бала. Число падіння 238. Вміст білку 7,1 %. Сережня урожайність сорту за роки випробування у зоні Полісся 55,1 ц\га., гарантована прибавка 14,5 ц\га. Вегетаційний період 285 днів. Висота рослини 123см. Масса 1000 зерен 34,5 г. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, снігової плісняви. Стійкий до вилягання 8,3 бала, осипання 8, 6 бала, засухи 8,8 бала. Число падіння 231. Вміст білку 8,8 %. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення Агротехніка звичайна для зон вирощування.

Тритикале озиме

® 07011006 Амур — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Рослини низькорослі, кущ — напівпрямий. Прапорцевий листок має слабке антоціанове забарвлення вушок, дуже сильний сизий восковий наліт на піхві, листкова пластинка середньої довжини, вузька. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення, довші відносно колосу. Соломина середньо-виповнена із сильним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос білого кольору, середньої щільності, довжини та ширини, циліндричної форми з пониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска має довгий кільовий та малий другий зубець. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричневого кольору, крупна, видовженої форми, слабко-зморшкувата.

Степ. Висота рослини 103,5см.Зимостійкість сорту в умовах проморожування 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 8 балів. Стійкість до осипання 9 балів. Стійкість до засухи 8 балів. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий , достигає за 273 днів. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 60,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту у зоні Степу 2,5 ц/га. Маса зерен 44 г. Зерно містить 13,6 % білку.
Лісостеп: Висота рослини 107 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 7,2 бала. Стійкість до осипання 8,8 балів. Стійкість до посухи 8,7 бала.За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 285 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 63,1 ц\га. Прибавка до національного стандарту у зоні Лісостепу 5,5 ц\га. Маса зерен 50 г. Зерно містить 12,9 % білка.
Полісся: Висота рослини 101,5 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування висока. У польових умовах за роки випробування стійкість сорту становила 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 8,5 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий , достигає за 286 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Полісся 49,4 ц\га. Прибавка до національного стандарту у зоні Полісся 6,4 ц\га. Маса зерен 44,5 г. Зерно містить 12,2% білка.

® 07011005 Атлет — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Приватне підприємство " Сорт"

Тип розвитку — озимий. Рослини дуже низькорослі, кущ — прямий. Прапорцевий листок має відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок, сильний сизий восковий наліт на піхві, листкова пластинка дуже коротка та вузька. Остюки мають відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення, середньої довжини відносно колосу. Соломина середньо-виповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос сіро-димчастого кольору, нещільний, середньої довжини, вузький, циліндричної форми з напівпрямим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска має довгий кільовий та малий другий зубець. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричневого кольору, середньої крупності, яйцеподібної форми, слабко зморшкувата.

Степ. Висота рослини 98см.Зимостійкість сорту в умовах проморожування 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до осипання 9 балів. Стійкість до засухи 8,6 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий , достигає за 271 днів. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 64 ц/га. Прибавка до національного стандарту у зоні Степу 5,7 ц/га. Маса зерен 42,1 г. Зерно містить 13,5 % білку.

Лісостеп: Висота рослини 97 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування 8,6 балів. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до осипання 9 балів. Стійкість до посухи 8,6 бала.За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 281 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 66,9 ц\га. Прибавка до національного стандарту у зоні Лісостепу 9,3 ц\га. Маса зерен 45,5 г. Зерно містить 12,5 % білка.
Полісся: Висота рослини 91,2 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування висока. У польових умовах за роки випробування стійкість сорту становила 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 9 балів. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За

роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий , достигає за 286 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Полісся 51,1 ц\га. Прибавка до національного стандарту у зоні Полісся 8,1ц\га. Маса зерен 42 г. Зерно містить 12,1% білка.

Овес посівний

® 06005002 Бусол — Степ

Заявник: Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Рослина пряма, за довжиною довга, час викидання волоті – середній. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочок стисла, положення гілочок напівпряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски – відсутня, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Зерно: колір нижньої квіткової луски-жовтий. Первинне зерно: має середні базальні волоски, та середній стрижень другого зерна.

Тип розвитку - ярий. Різновидність - ауреа. Середньостиглий, вегетаційний період в зоні Степу - 91 день, відрізняється швидким стартовим ростом до викидання волоті, достигає одночасно із стандартом. Сорт посухостійкий, стійкий проти вилягання. Під час збирання осипається мало.
Маса 1000 насінин - 35,2 г, плівчастість - 24,2 %, сирого протеїну - 16,0 %.
Стебло середньої висоти - 70 см, міцне . Кущ прямостоячий.
За роки державного випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин в зоні Степу отримали середній урожай - 29,7 ц/ га, що на 2,1 відсотки більше стандартів.Потенційна можливість сорту - 65 ц/га.
Агротехніка звичайна для зони вирощування. Стійкий до ураження борошнистою росою.Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв.Шведською мухою пошкоджується менше стандартів.
Придатний для поширення в зоні Степу.

07005001 Дарунок — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом проміжна, середньої довжини,рідко зустрічаються рослини із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті - середній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочок стисла, положення гілочок напівпряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та слабкою сіруватістю. Первинне зерно: відсутня помірна сіруватість нижньої квіткової луски, тенденція до остистості помірна. Колір нижньої квіткової луски - білий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та середній стрижень другого зерна.

Вегетаційний період 89 - 102 дн. Сорт середньостиглий. Маса 1000 насінин 27,6 - 32,2 г.
Стійкий проти вилягання, осипаня та посухи.
Урожайний. За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 28,2 - 40,8 ц / га, що на 3,7 - 11,6 відсотків більше національних стандартів.
Сорт стійкий проти сажки, середньо уражується корончастою і стебловою іржею.
Круп"яні якості добрі. Плівчастість 23,8 - 30,3 %, білок в зерні складає 13,1 - 15,2 %
Рекомендований для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

08005001 Марафон — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Республіканське унітарне підприємство"Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі по землеробству"

Рослина за габітусом напівпряма, середньої довжини, часто зустрічаються рослини із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті - середній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки слабка. Опушеність на найвищому вузлі дуже слабка. Волоть: коротка, орієнтація гілочок стисла, положення гілочок напівпряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із відсутньою або дуже слабкою сіруватістю. Первинне зерно: відсутня сіруватість нижньої квіткової луски, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - жовтий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Вегетаційний період 91 - 101 день. Сорт середньостиглий, відрізняється від інших сортів швидким ростом до викидання волоті. Рослини висотою 79 - 97 см. Маса 1000 насінин 23,3 - 27,6 г. Зернівка гола.
Стійкий проти вилягання та осипання. Посухостійкість середня.
За роки випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 20,5 - 31,6 ц / га Вирівняність зерна висока, вихід крупи 100 відсотків. Сорт має підвищений вміст білку 16,7 - 18,8 %, що 4 - 5 % більше, ніж у стандарта.
Корончастою іржею, бактеріальним опіком, борошнистою росою і летючою сажкою уражується нижче стандартів.
Рекомендований для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

07005003 Скарб України — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом напівпряма, середньої довжини, рідко зустрічаються рослини із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті - середній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: дуже коротка за довжиною, орієнтація гілочок розкидиста, положення гілочок напівпряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із відсутньою сіруватістю. Первинне зерно: відсутня помірна сіруватість нижньої квіткової луски, тенденція до остистості слабка. Колір нижньої квіткової луски - білий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та середній стрижень другого

Вегетаційний період 89 - 99 днів. Сорт середньоранній, дозріває на 2 - 3 дні раніше стандартів. Маса 1000 насінин 32,4 - 34,9 г.
Стійкість проти вилягання висока, проте в умовах надмірного зволоження вилягає. Посухостійкість середня, осипається мало.
За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 32,1 - 37,2 ц / га, що на 1,1 - 6,2 відсотки більше національного стандарту.
Голозерний , білка має в зерні 12,8 - 14,8 %.
Сорт середньо уражується корончастою іржею.
Рекомендований для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

07005002 Шервуд — Степ. Лісостеп, Полісся

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Рослина за габітусом напівпряма, середньої довжини, рідко зустрічаються рослини із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті - середній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла наявна. Волоть: дуже коротка за довжиною, орієнтація гілочок розкидиста, положення гілочок горизонтальне, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та із відсутньою сіруватістю. Первинне зерно: наявна помірна сіруватість нижньої квіткової луски, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - білий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та середній стрижень другого зерна.

Вегетаційний період 90 - 101 день, Сорт середньостиглий. Рослини висотою 84 - 101 см. Маса 1000 насінин 22,2 - 28,2 г. Зернівка гола, добре виповнена.

Стійкість проти вилягання та осипання досить висока. Посухостійкість вища середньої. В умовах надмірного зволоження вилягає.

За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 22,7 - 31,4 ц / га.,

Сорт має підвищений вміст білка 13,8 - 18,6 відсотки.

Стійкий проти летючої сажки, слабко уражується бактеріальним опіком, Шведською мухою пошкоджується нижче стандартів.

Рекомендований для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся

Ячмінь звичайний озимий

® 06012026 Жерар — Степ, Лісостеп

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок з помірним антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з горизонтальним положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 54 ц/га., гарантована прибавка 2,3 ц/га. Вегетаційний період 254 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, вилягання 8,2 балів, та засухи 8,5 балів. Вміст білку 13,7%. Висота рослин 88 см. Маса 1000 зерен 42,9 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 62,3 ц/га., гарантована прибавка врожаю 6,3 ц/га. Вегетаційний період 258 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,1 балів, вилягання 8,2 балів, та стійкий проти засухи 8,7 бала. Вміст білку 13,5 %. Висота рослин 89 см. Маса 1000 зерен 41,5 г.

® 07012009 Кондрат — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок зі слабким антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з прямим положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, короткий та середньої щільності. Стрижень колосу першого сегмента короткий та відсутній або дуже слабкий вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - короткий.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 57,6 ц/га., гарантована прибавка 5,9 ц/га. Вегетаційний період 257 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, вилягання 8,8 бала, та засухи 9 балів. Вміст білку 13,0 %. Висота рослин 90,1 см. Маса 1000 зерен 38,1 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 68,2 ц/га., гарантована прибавка врожаю 12,2 ц/га. Вегетаційний період 263 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,7 балів, вилягання 8,6 балів, та стійкий проти засухи 8,8 балів. Вміст білку 12,7 %. Висота рослин 92,2 см. Маса 1000 зерен 37,4 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 57,1 ц/га., гарантована прибавка 7,1 ц/га. Вегетаційний період 274 днів.

Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 8,7 балів, стійкий до вилягання 9 балів. Вміст білку 12,5%. Висота рослин 85,7 см. Маса 1000 зерен 40,4 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

07012015 Наомі

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки з відсутнім антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з напівпрямим положенням в просторі, має більше двох рядів, пірамідальної форми, короткий, нещільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 53,5ц/га., гарантована прибавка 1,8 ц/га. Вегетаційний період 259 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,8 балів, вилягання 8,8 бала, та засухи 8,1 балів. Вміст білку 13,7 %. Висота рослин 88 см. Маса 1000 зерен 43,4 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 68,4 ц/га., гарантована прибавка врожаю 12,4 ц/га. Вегетаційний період 261 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,6 балів, вилягання 8,7 балів, та стійкий проти посухи9,0 балів. Вміст білку 12,7 %. Висота рослин 88 см. Маса 1000 зерен 48,6 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 55,2 ц/га., гарантована прибавка 5,2 ц/га. Вегетаційний період 272 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та посухи 9 балів, стійкий до вилягання 9 балів. Вміст білку 12,6%. Висота рослин 83 см. Маса 1000 зерен 47,5 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

® 07012008 Переможець

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок зі слабким антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з напівпрямим положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, короткий, щільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 57,3 ц/га., гарантована прибавка 5,6 ц/га. Вегетаційний період 257 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, вилягання 8,5 балів, та засухи 8,8 балів. Вміст білку 13,6 %. Висота рослин 89,6 см. Маса 1000 зерен 37,9 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 68,5 ц/га., гарантована прибавка врожаю 12,5 ц/га. Вегетаційний період 256 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,3 бала, вилягання 8,5 бала, та стійкий проти засухи 8 балів. Вміст білку 12,6 %. Висота рослин 87,5 см. Маса 1000 зерен 38,1 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 51,3 ц/га., гарантована прибавка 1,3 ц/га. Вегетаційний період 270 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 8,6

балів, стійкий до вилягання 8,5 балів. Вміст білку 12,1%. Висота рослин 90,6 см. Маса 1000 зерен 41,6 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

® 07012010 Платон — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають відсутнє або слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з прямим положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, щільний, короткий. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 54,5 ц/га., гарантована прибавка 2,8 ц/га. Вегетаційний період 256 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,9 балів, вилягання 8,5 балів, та засухи 8,3 балів. Вміст білку 13,4 %. Висота рослин 87 см. Маса 1000 зерен 40,4 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 69,5 ц/га., гарантована прибавка врожаю 13,5 ц/га. Вегетаційний період 261 день. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,4 балів, вилягання 8,3 балів, та стійкий проти засухи 9 балів. Вміст білку 12,9 %. Висота рослин 88,6см. Маса 1000 зерен 43,3 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 54 ц/га., гарантована прибавка 4 ц/га. Вегетаційний період 268 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 8,9 балів, стійкий до вилягання 9 балів. Вміст білку 12,8%. Висота рослин 85,8 см. Маса 1000 зерен 43,9 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

07012007 Скарпія — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, високі. Прапорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки з відсутнім антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з напівпрямим положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 61,3 ц/га., гарантована прибавка 9,6ц/га. Вегетаційний період 256 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,8 балів, вилягання 8,8 бала, та засухи 8,8 балів. Вміст білку 13,3 %. Висота рослин 92,1 см. Маса 1000 зерен 44,3 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 67,9 ц/га., гарантована прибавка врожаю 11,9ц/га. Вегетаційний період 258 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,6 балів, вилягання 8,8 балів, та стійкий проти засухи 9 балів. Вміст білку 12,8 %. Висота рослин 93,1 см. Маса 1000 зерен 47,3 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 63,3 ц/га., гарантована прибавка 13,3 ц/га. Вегетаційний період 269 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 9 балів, стійкий до вилягання 8,7 балів. Вміст білку 12,4%. Висота рослин 89,8 см. Маса 1000 зерен 48,7 г. Добрі результати дає при внесенні повного

мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

® 07012005 Хайлайт — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Дойче Заатфередєлунг АГ

Тип розвитку - озимий. Рослини від напіврозлогого до розлогого габітусом та від високої до дуже високої висоти. Прапорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Остюки з відсутнім антоціановим забарвленням на кінчиках, довжина відносно колоса - від середнього до довгого. Колос із помірним восковим нальотом, з напівпрямим положенням у просторі, багаторядний, циліндричної форми, довгий та від середньої щільності до щільного. Стрижень колосу має від середньої довжини першого сегмента до довгої та слабкий вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, наявне опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 54,6 ц/га., гарантована прибавка 2,9 ц/га. Вегетаційний період 258 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,8 балів, вилягання 8,4 балів, та засухи 8,1 балів. Вміст білку 13,2 %. Висота рослин 92 см. Маса 1000 зерен 47,1 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 60,2 ц/га., гарантована прибавка врожаю 4,2 ц/га. Вегетаційний період 259 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,4 балів, вилягання 9 балів, та стійкий проти засухи 8,4 бала. Вміст білку 13,0 %. Висота рослин 98,6 см. Маса 1000 зерен 50,8 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 56,4 ц/га., гарантована прибавка 6,4 ц/га. Вегетаційний період 272 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,6 балів, та засухи 8,5 балів, стійкий до вилягання 8,5 балів. Вміст білку 12,6%. Висота рослин 100,6 см. Маса 1000 зерен 47,8 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

Ячмінь звичайний ярий

06012029 Джей Бі Мальтазія — Степ , Лісостеп , Полісся

Заявник: Заатцухт Йозеф Бройн ГмбХ і Ко. КГ

Тип розвитку – ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини за висотою середні. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок сильна, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння – середній. Соломина - слабо виповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, прямий, дворядний, циліндричної форми, нещільний та середній за довжиною. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул, алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, видовжено-еліптична, поверхня тонко зморшкувата. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньостиглий , вегетаційний період 85 - 98 днів. Маса 1000 насінин 39,5 - 44,6 г.

Сорт інтенсивного типу . Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення . Пластичний , стійкий до посухи , полягання та осипання . Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації .

За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин .

Урожайний . На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 42,4 - 51,2 ц / га , що на 4,9 - 14,9 відсотки більше стандартів .

Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11,8 % , екстрактивних речовин - 79 - 81 % .

Стійкий до борошнистої роси , гельмінтоспоріозу . Агротехніка звичайна для зони вирощування . Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 фф забезпечує повний захист рослин від хвороб .

® 07012029 ІН 0616 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В.

Тип розвитку - ярий. Рослини з напіврозлогим габітусом, низькорослі. Прапорцевий листок з помірним антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки з дуже сильним антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос з помірним восковим нальотом, з напівпрямим положенням в просторі, дворядний, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу має коротку довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня грубозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та повне охоплення соломини. Язичок - середній.

Сорт середньостиглий, вегетаційний період в зонах Степу складає 88 днів, Лісостепу 90 днів, Полісся 96 днів. Солома міцна, стійка проти вилягання. Рослини висотою 60 - 65 см.
Добре кущиться. За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4,0 - 4,5 млн / га насінин.
Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесені повного мінерального живлення. Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до значного недобору врожаю.
За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 39,6 - 48,5 ц / га, що на 10,3 - 18,2 відсотки більше національних стандартів. Стійкий до осипання та посухи. Маса 1000 насінин 42,4 - 46,4 г. Потенційна можливість сорту 7,5 - 9,0 т / га.
Агротехніка звичайна для зони вирощування. Пивоварні якості добрі. Білка має 11,5 - 11,7 відсотки, плівчастість 7 - 8 відсотків, екстрактивних речовин 78 - 80 відсотків та вирівняність зерна складає 91,6 - 96,2 відсотки.
Стійкий до борошнистої роси, гельмінтоспоріозом уражується на рівні стандартів.
Рекомендований для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

® 05012001 Кристалія — Полісся

Заявник: Сінгента Сідз ЛТД

Тип розвитку - ярий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середньорослі. Прапорцевий листок з помірним антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки зі слабким антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос з помірним восковим нальотом, з горизонтальним положенням в просторі, дворядний, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, форма ромбічна, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середньостиглий, вегетаційний період в зоні Полісся 94 дні. Стійкий проти вилягання, осипання, Посухостійкість середня.
Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добре реагує на повне мінеральне живлення. Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до значного недобору врожаю (від 3,5 до 7 ц / га) та погіршення якості зерна.
Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 фф забезпечує повний захист рослин від хвороб і підвищення врожаю.
За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай в зоні Полісся 50,6 ц / га, що на 12,9

відсотки більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту 85 центнерів з гектара.
Пивоварні якості добрі. Білка має 11,8 %, плівчастість 8 - 9 %, екстрактивних речовин 78 - 80 %, вирівняність зерна складає 95,7 %.
Стійкий до борошнистої роси, карликової іржі, гельмінтоспоріозу.
Рекомендований для поширення в зоні Полісся

06012030 Козацький — Полісся

Заявник: Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Тип розвитку - ярий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки із відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, з прямим положенням в просторі, дворядний, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка без плівки,короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок середньої довжини.

Рослини висотою 63-70 см. Середньостиглий, вегетаційний період 87-98 днів. Маса 1000 насінин 41,3-46,8 см.
Потенційна врожайність сорту 75 ц/га.
За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 5 млн/га насінин.
Борошнистою росою, гельмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується нижче стандартів. Протруєння насіння препаратом Максим забезпечує повний захист рослин від хвороб.

® 06012015 Оберіг

Заявник: Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Тип розвитку - ярий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок зі слабким антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з прямим положенням в просторі, дворядний, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має коротку довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, короткі волоски основної щетинки, слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Рослини висотою 74-82 дні. Вегетаційний період 86- 98 днів.Маса 1000 насінин 40,0-45,9 г.
Потенційна врожайність сорту 96ц/га. За даними заявника рекомендується висівати за 100- господарської придатності 4,5 -5 млн/га насінин.
Борошнистою росою, гельмінтоспоріозом пошкоджується менше стандартів. Перед посівом рекомендується протруювати насіння препаратом Максим.

06012009 Ратник

Заявник: Державна наукова установа Всеросійський науково - дослідний інститут зернових культур ім. І.Г.Калиненко

Тип розвитку - ярий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок з помірним антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки із сильним антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, з прямим положенням в просторі, дворядний, циліндричної форми, дуже нещільний, середньої довжини. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - довгий.

Рослини висотою 62-73 см. Середньостиглий, вегетаційний період 62-73 дні. Маса 1000насінин 46,2-50,3 г.
Сорт напівінтенсивного типу. Потенційна урожайність 85 ц/га.
В закладах експертизи за роки випробування отримали середній урожай 37,9-46,3 ц/га, що на 2,7- 3,3 відсотки більше національних стандартів.
Сорт стійкий до борошнистої роси, гельмінтоспоріозу.

® 06012028 Совіра — Степ

Заявник: Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Тип розвитку – ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок сильна, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння – середнє. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, прямий, дворядний, циліндричної форми, нещільний та середній за довжиною. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул, алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньостиглий , вегетаційний період 85 днів у зоні Степу . Маса 1000 насінин 47,1 г. Сорт напівінтенсивного типу . Має підвищену стійкість проти посухи . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га схожих насінин .

За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай 42,9 ц / га в зоні Степу , що на 16,2 відсотки більше національних стандартів . Потенційна можливість сорту 85 ц / га .

Агротехніка звичайна для зони вирощування .Рекомендується протруювання насіння Вітаваксом 200 фф . Слабко уражується гельмінтоспоріозом і твердою сажкою .

Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до значного недобору врожаю . Особливістю сорту є те , що він відрізняється підвищеною кущистістю та раннім строком сіву .

Круп"яні якості від середніх до добрих . Білка має 15,4 % , вихід крупи 44,5 % .

® 05012015 Хадар — Степ

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Тип розвитку – ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середні за висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок сильна, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння – пізнє. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, напівпрямий, дворядний, циліндричної форми, нещільний та середній за довжиною. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул, алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньостиглий , вегетаційний період - 88 - 96 днів . Маса 1000 насінин 45,1 - 47,6 г .
За даними заяввника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4,5 - 5 млн / га насінин . Рослини середньої висоти , досить стійкі проти полягання та осипання .

Належить до сортів інтенсивного типу , за сприятливих умов здатний давати урожай більше 75 - 80 ц / га . Відрізняється стійкістю до весняних заморозків , добре використовує осадки другої половини вегетації .

На державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній врожай 40,6 - 45,5 ц / га , що на 1,6 - 10 відсотків більше національних стандартів .

Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11,2 % , екстрактивних речовин 78 - 80 %

Сорт відрізняється підвищеною посухостійкістю у всіх фазах розвитку .

Слабо уражується борошнистою росою та карликовою іржею . Обов"язкове протруювання насіння проти летючої сажки .

Кукурудза

06004098 Сілекс — Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини- оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 80,6 ц/га, Лісостепу - 90,8 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 14 ц/га та 4 ц/га. Стійкість до засухи 8-8,7 балів, вилягання - 8,6-9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,0%, Лісостепу - 80,4%. Вміст крохмалю відповідно - 73,2-72,2%, білка 9,4%.

® 07004073 СУМ 1467 — Степ

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Форма верхівки першого листка -від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - вісутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 69,8 ц/га, гарантований приріст складає 3 ц/га. Стійкість до засухи 7,7 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,2%. Вміст крохмалю відповідно - 73,2%, білка 8,8%.

07004074 СУМ 1088

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабка. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Антоціанове забарвлення колоскоихї лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- помірна. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 87,7 ц/га, Лісостепу - 88,4 ц/га, Полісся - 85,0 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 25,5 ц/га, в зоні Лісостепу та Полісся - на рівні стандартів. Стійкість до засухи 8-9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 82,6-80,0-81,1 %. Вміст крохмалю 74,2-72,7-73,8 %, білку 9,4-9,5-8,4 %.

® 07004075 СУМ1487

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвленя колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - дуже сильна.

Урожайність по зоні Степу - 87,2 ц/га, Лісостепу - 95,1 ц/га, Полісся - 88,9 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 20,4 ц/га, 7,4 ц/га та 5,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,2-8,5-8,9 балів, вилягання - 8,8-9-8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 78,9%, Лісостепу - 78,1%, Полісся - 79,4 %. Вміст крохмалю відповідно - 73,0%, 72,1% та 73,2%, білка 8,7 %, 9,6%, 9,3%.

® 07004076 СУМ 1359

Степ

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - сильне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 79,6 ц/га, гарантований приріст складає 13 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,8%. Вміст крохмалю відповідно - 72,3%, білка 8,8%.

® 07004077 СУМ 1304

Степ

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 73,2 ц/га, гарантований приріст складає 6,5 ц/га. Стійкість до засухи 7,7 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,4%. Вміст крохмалю відповідно - 71,6%, білка 10,0%.

06004099 Аякс

Полісся

Заявник: Р2н

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - від слабкого до помірного. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Полісся - 84,0 ц/га, гарантований приріст на рівні стандартів. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання - 8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,8%. Вміст крохмалю відповідно - 72,3%, білка 9,0%.

06004054 Адеміо

Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - від слабкого до помірного. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - від довгої до дуже довгої. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - від середньої до довгої. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною

- короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 70,1 ц/га, гарантований приріст складає 3,4 ц/га. Стійкість до засухи 7,7 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,5%. Вміст крохмалю відповідно - 72,1%, білка 9,0%.

08004038 Агральп - 200 — Степ

Заявник: Панам Франція САРЛ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слібке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 74,1 ц/га, гарантований приріст складає 7,4 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,6%. Вміст крохмалю - 74,7%, білка 9,0%.

05004041 Аррігo — Степ, Полісся

Заявник: Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 78,1 ц/га, Полісся - 90,6 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 11,3 ц/га, та 7 ц/га. Стійкість до засухи 8,5-8,8 балів, вилягання - 8,8-9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 80,6%, Полісся - 73,7 %. Вміст крохмалю відповідно - 72,5% та 73,2%, білка 9,1%.

® 07004125 Ааспід — Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке, антоціанове забарлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть,

см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 76,1 ц/га, гарантований приріст складає 9,4 ц/га. Стійкість до засухи 7,8 балів, вилягання - 8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,8%. Вміст крохмалю відповідно - 72,8%, білка 9,4%.

® 06004051 Артемів 280 СВ — Степ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – дуже сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 8,1 до 10,0 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 78,0 ц/га, гарантована прибавка до стандарту становить 15,8 ц/га. Стійкість до засухи 7,2 бали, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79,8 %. Вміст крохмалю 71,6 %, білку 9,7 %.

08004020 Анкора — Степ

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – дуже сильне. Зигзагоподібність стебла – дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок (за винятком основи) - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка.
Антоціанове забарвлення піхви листка – від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – від короткого до середнього. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто -оранжевий, низу зернини - оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 88,2 ц/га, гарантована прибавка складає - 26 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79,0 %. Вміст крохмалю 72,7 %, білку 9,4 %.

08004027 Агральп - 260 — Степ

Заявник: Панам Франція САРЛ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи

"шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 74,7 ц/га, гарантований приріст складає 8 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 78,8%. Вміст крохмалю відповідно - 72,4%, білка 9,6%.

06004095 Авіксен — Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - сильне, антоціанове забарвлення колоскових лусокза виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 73,8 ц/га, Лісостепу - 87,2 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 7 ц/га та 1 ц/га. Стійкість до засухи 8,1-8,4 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 85,1%, Лісостепу - 80,3%. Вміст крохмалю відповідно - 72,0%, 72,9% та 73,2%, білка 9,7%.

06004105 Бергксон — Степ

Заявник: Р2н

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть від нещільного до середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - від середньої до довгої. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - від короткого до середнього. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

Урожайність по зоні Степу - 84,9ц/га, гарантований приріст складає 2,7 ц/га. Стійкість до засухи - 7,7 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,9%. Вміст крохмалю відповідно - 72,8%, білка 8,1%.

07004018 Боян 277 МВ — Степ

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - від помірного до

сильного. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски - відсутнє або дуже слабке. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 101 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 80,2 ц/га, гарантована прибавка складає 18 ц/га, Стійкість до засухи 8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 77,8 %. Вміст крохмалю 71,1 %, білку 9,5 %.

® 08004008 Бц 223 — Степ

Заявник: БЦ Інститут селекції і рослинництва

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – дуже сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутнє або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть не щільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- помірна. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 15 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 76,3 ц/га, гарантована прибавка складає - 14,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81,9 %. Вміст крохмалю 73,4 %, білку 8,3 %.

® 08004009 Бц 244 — Степ

Заявник: БЦ Інститут селекції і рослинництва

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – помірне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- відсутня або дуже слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – довга (від 20,1 до 40 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 15 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 80,2 ц/га, гарантована прибавка складає - 18,5 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,1 %. Вміст крохмалю 73,4 %, білку 10,0 %.

08004010 Балерина — Степ

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі

волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 88,7 ц/га, гарантований приріст складає 21,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,6 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,2%. Вміст крохмалю відповідно - 72,0%, білка 9,7%.

® 07004034 Батурин 287 МВ — Степ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - дуже сильне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 81,4 ц/га, гарантований приріст складає 14,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання - 8,6 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,8%. Вміст крохмалю відповідно - 71,6%, білка 9,9%.

06004121 Бренди — Степ, Лісостеп

Заявник: Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 81,2 ц/га, Лісостепу - 90,3 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 14,6 ц/га та 3,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,2-8,6 балів, вилягання - 8,8-9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,4%, Лісостепу - 80,3%. Вміст крохмалю відповідно - 75,2-73,3%, білка 9,1%.

07004001 Бц 182 — Степ

Заявник: БЦ Інститут селекції і рослинництва

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – ранній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті –помірне. Волоть щільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 70,1 ц/га, гарантована прибавка становить 8,4 ц/га. Стійкість до засухи 7,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82%. Вміст крохмалю 73,1 %, білку 9,3 %.

06004060 Варта МВ — Степ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі сильно похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла -сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) -середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 69,9ц/га, гарантований приріст складає 8,2 ц/га. Стійкість до засухи 7,5 балів, вилягання - 8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 76,7%. Вміст крохмалю відповідно - 71,5%, білка 8,9%.

® 07004039 Вексель МС — Степ

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 86,2 ц/га, гарантований приріст складає 19,5ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 79,4%. Вміст крохмалю - 73,1%, білка - 9,8%.

07004079 ДКС 2971 — Степ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусний, за довжиною - від короткого до середнього. Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 76,7 ц/га, гарантований приріст складає 10 ц/га. Стійкість до засухи 7,8 балів, вилягання - 8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 85,8%. Вміст крохмалю відповідно - 74,0%, білка 9,4%.

07004080 ДКС 3472 — Степ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – дуже сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку" – помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – слабка.

Урожайність по зоні Степу - 81,2 ц/га, гарантований приріст складає 14,4 ц/га. Стійкість до засухи 7,9 балів, вилягання - 8,7 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,3%. Вміст крохмалю відповідно - 74,7%, білка 9,0%.

® 07004081 ДКС 4490 — Степ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – слабке. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку" – відсутнє. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутня або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19 – 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 88,9 ц/га, гарантована прибавка складає - 12,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 85,0 %. Вміст крохмалю 74,6 %, білку 8,0 %.

® 07004082 ДКС 3871 — Степ, Лісостеп

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – слабке. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку" – відсутнє або дуже слабке. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19 – 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 88,1 ц/га, Лісостепу - 92,0 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 25,8 ц/га, в зоні Лісостепу - 2,5 ц/га. Стійкість до засухи 7,8-8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 84,1-78,2 %. Вміст крохмалю 74,6-74,4 %, білку 8,6-9,7 %.

07004083 ДКС 3476 — Степ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – від слабкого до помірного. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – від слабкого до помірного, антоціанове забарвлення колоскової луски за виключення основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- помірна. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини –жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – слабка.

Урожайність по зоні Степу 83,7 ц/га, гарантована прибавка складає - 21,5 ц/га. Стійкість до засухи 7,5 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 84,4 %. Вміст крохмалю 73,8 %, білку 8,5 %.

07004084 ДКС 5170 — Степ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Форма верхівки першого листка - від округлуної до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 89,0ц/га, гарантований приріст складає 6,9 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 84,7%. Вміст крохмалю відповідно - 73,3%, білка 10,2%.

® 07004085 ДКС 4964 — Степ, Лісостеп

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – слабке. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку" – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19 – 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – від слабкої до помірної.

Урожайність по зоні Степу 98,2 ц/га, Лісостепу - 90,6 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 33,5 ц/га, в зоні Лісостепу - 2 ц/га. Стійкість до засухи 8,7-8,8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 84,2-77,8 %. Вміст крохмалю 74,6-72,8 %, білку 8,4-9,7 %.

® 07004086 ДКС 4860 — Степ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – дуже сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – помірне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку" – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – довга (від 20,1 до 40 см). Качан за формою формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19 – 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 92,4 ц/га, гарантована прибавка складає - 16,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 84,2 %. Вміст крохмалю 73,8 %, білку 8,3 %.

07004087 ДКС4983 — Степ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – сильне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку" – помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – від середньої до довгої. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – слабка.

Урожайність по зоні Степу 85,8 ц/га, гарантована прибавка складає - 9,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 84,5 %. Вміст крохмалю 74,5 %, білку 8,0 %.

07004088 ДКС3795 — Степ, Лісостеп

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – слабке. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку" – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий.

Урожайність по зоні Степу 79,3 ц/га, Лісостепу - 97,1 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 17,6 ц/га, в зоні Лісостепу - 7,6 ц/га. Стійкість до засухи 8-9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 84,6-80,2 %. Вміст крохмалю 73,6-71,0 %, білку 8,7-9,7 %.

® 07004090 ДКС 5276 — Степ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – пізній. Антоціанове забарвленнялснови колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колосковиxx лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку" – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – слабка.

Урожайність по зоні Степу 90,1 ц/га, гарантована прибавка складає - 13,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,3 %. Вміст крохмалю 72,1 %, білку 8,4 %.

06004113 ДКС2870 — Степ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – пізній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку" – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – середня (від 15 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – слабка.

Урожайність по зоні Степу 78,3 ц/га, гарантована прибавка складає 16,1 ц/га. Стійкість до засухи 7,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,2 %. Вміст крохмалю 73,6 %, білку 9,6 %.

® 07004037 ДМС Сектор — Степ, Лісостеп

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної

осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 101 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 97,1 ц/га, Лісостепу - 90,1 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 32,4 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандарту. Стійкість до засухи 8,0-8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 79,1-79,0 %. Вміст крохмалю 70,9-73,4 %, білку 9,1-9,9 %.

® 07004038 ДМС Адаптер — Степ

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвленняоснови колоскової луски - слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 74,4 ц/га, гарантована прибавка складає - 9,7 ц/га. Стійкість до засухи 7,5 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 78,3 %. Вміст крохмалю 73,1 %, білку 9,6 %.

® 07004040 Депозит МС — Степ

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - сильне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 67,8 ц/га, гарантований приріст складає 8 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,4%. Вміст крохмалю відповідно - 72,8%, білка 10,1%.

06004015 ДК 287 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення

листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 83,5 ц/га, Лісостепу - 86,8 ц/га, Полісся - 86,3 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 17ц/га, 1,0 ц/га та 2,5 ц/га. Стійкість до засухи 7,9-8,7 балів, вилягання - 8,7-9-8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,5%, Лісостепу - 78,1%, Полісся - 79,1%. Вміст крохмалю відповідно - 73,8%, 74,0% та 74,6%, білка 9,4%, 9,2%, 8,8%.

® 06004078 Джайв

Степ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- відсутнє. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга від 151 до 200 см. Ніжка качана за довжиною – середня від 10,1 до 20. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – середня (від 15 до 18 шт.), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий.

Урожайність по зоні Степу 91,4 ц/га, гарантована прибавка складає - 26,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 78,2 %. Вміст крохмалю 74,4 %, білку 8,4 %.

06004106 ЕС Макіла

Степ, Полісся

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – ранній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані – ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий.

Урожайність по зоні Степу 75,9 ц/га, Полісся - 90,6 ц/га, гарантована прибавка відповідно 14,2 - 4,6 ц/га. Стійкість до засухи 7,5 - 8,8 балів, вилягання 8,8 - 8,9 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,3-79,6 %. Вміст крохмалю 73,4 - 72,9 %, білку 9,3 - 9,1 %.

06004107 ЕС Бітл

Степ

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) –

ранній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – сильне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- сильна. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий.

Урожайність по зоні Степу 73,3 ц/га, гарантована прибавка 11,6 ц/га. Стійкість до засухи 7,7 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,2 %. Вміст крохмалю 72,7 %, білку 8,9 %.

06004108 ЕС Крістель — Степ, Полісся

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла –сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – від слабкого до помірного. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- сильна. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу - 79,3 ц/га, Полісся - 87,9 ц/га, гарантована прибавка відповідно 17,1- 1,9 ц/га. Стійкість до засухи 7,9-8,7 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,0-79,7%. Вміст крохмалю 72,3 %, білку 9,4 - 8,8 %.

07004026 ЕС Поттер — Степ

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- відсутня або дуже слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 63,3 ц/га, гарантована прибавка відповідно складає 1,8 ц/га. Стійкість до засухи 6,7 балів, вилягання 8,8 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,2 %. Вміст крохмалю 73,9 %, білку 9,0 %.

® 07004111 ЕС Гарант — Степ

Заявник: Євраліс Семанс

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основ колоскових лусок - відсутє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 %

рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - від слабкої до помірної.

Урожайність по зоні Степу - 83,4 ц/га, гарантований приріст складає 16,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8,4 бали, вилягання - 8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,1%. Вміст крохмалю відповідно - 71,8%, білка - 10,2%.

07004112 ЕС Сігма

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Форма верхівки першого листка - округла. Положення листкової пластинки у просторі - ледь похиле. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – помірне. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головоної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - помірне. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок (за винятком основи) - слабке. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – від короткого до середнього. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, низу зернини - жовто-оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 87,7 ц/га, Лісостепу - 91,2 ц/га, Полісся - 88,7 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 25,5 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандартів, в зоні Полісся - 2,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,3-8,7 балів, вилягання 8,6-9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 83,4-79,8-75,9 %. Вміст крохмалю 71,4-72,7-71,6 %, білку 8,8-9,3-9,9 %.

07004113 ЕС Сенсор

Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Форма верхівки першого листка - від окрцглої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 87,3 ц/га, Лісостепу - 95,7 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 22,6 ц/га, в зоні Лісостепу - 7,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 81,6-80,2 %. Вміст крохмалю 74,7-73,6 %, білку 8,9-9,9 %.

07004114 ЕС Марко

Степ

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Форма верхівки першого листка - округла. Положення листкової пластинки у просторі - ледь похиле. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок (за винятком основи) - слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головоної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - помірне. Волоть нещільна. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - середній (26-50). Час появи шовку на качані – ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини кременистий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір зернини – оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня – відсутнє.

Урожайність по зоні Степу 76,4 ц/га, гарантована прибавка складає - 14,1 ц/га. Стійкість до засухи 7,6 балів, вилягання 8,6 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,8 %. Вміст крохмалю 73,0 %, білку 9,6 %.

® 06004072 Запорізький 333 МВ — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 79,5 ц/га, Лісостепу - 91,7 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 14,8 ц/га, в зоні Лісостепу - 3,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 79,8-79,3 %. Вміст крохмалю 72,6-74,5 %, білку 8,8-8,1 %.

06004035 ЗУМ 1093 — Степ

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільне. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 73,5 ц/га, гарантована прибавка складає - 10,5 ц/га. Стійкість до засухи 7,8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82,5 %. Вміст крохмалю 71,6 %, білку 9,7 %.

06004036 ЗУМ 0307 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – середня (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 85,5 ц/га, Лісостепу - 87,3 ц/га, Полісся - 88,4 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 23,3 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандартів, в зоні Полісся - 2,4 ц/га. Стійкість до засухи 8-9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 82,1-77,5-78,4 %. Вміст крохмалю 72,1-71,3-71,6 %, білку 9,1-9,9-9,5 %.

06004056 Інгрід — Степ, Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке, антоціанове забарвлення колоскової луски за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 66,6 ц/га, Лісостепу - 86,2 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 1 ц/га, 1 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,6%, Лісостепу - 78,2%. Вміст крохмалю відповідно - 74,9% та 72,5%, білка 8,3 - 9,0%.

06004062 Індустрія МВ — Степ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка -від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - дуже сильне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 77,6 ц/га, гарантований приріст складає 11,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,1 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 79,1%. Вміст крохмалю відповідно - 72,7%, білка 9,2%.

® 07004035 Ізяслав 220 МВ — Степ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 73,8 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 7 ц/га. Стійкість до засухи 7,8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,5%. Вміст крохмалю відповідно - 72,8%, білка 9,3 %.

07004123 Йогі КС — Степ

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 78,4 ц/га, гарантований приріст складає 12 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,8%. Вміст крохмалю - 71,8%, білка 9,0 %.

06004058 Кодімі — Степ

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвленняо снови колоскової луски - сильне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевимй, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового

забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 69,8 ц/га, гарантований приріст складає 3 ц/га. Стійкість до засухи 6,9 балів, вилягання - 8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 85,3%. Вміст крохмалю відповідно - 73,3%, білка 8,9%.

® 06004061 Кредит МВ

Степ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – помірне. Волоть щільне. Час появи шовку на качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- відсутня або дужен слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – від відсутнє або до дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга від 151 до 200 см. Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – середня (від 15 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий

Урожайність по зоні Степу 68,3 ц/га, гарантована прибавка складає - 3,6 ц/га. Стійкість до засухи 7,9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79,1 %. Вміст крохмалю 72,5 %, білку 8,8 %.
Урожайність в умовах зрошення становить 111,6 ц/га, гарантована прибавка складає - 4 ц/га. Вихід зерна при обмолоті 82,3 %.

07004131 Кріспі

Степ

Заявник: Маїсадур Семанс

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 82,8 ц/га, гарантований приріст складає 16 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 78,7%. Вміст крохмалю - 72,9% білка 9,8%.

06004065 Командос

Степ, Лісостеп

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий,

кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу 73,2 ц/га, Лісостепу - 92,4 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 8,4 ц/га, в зоні Лісостепу - 3,7 ц/га. Стійкість до засухи 8-8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 82,9-79,4 %. Вміст крохмалю 72,7-75,1 %, білку 9,9-8,5 %.

® 07004036 Красилів 327 МВ — Степ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарсвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 91,0 ц/га, гарантований приріст складає 24,4 ц/га. Стійкість до засухи - 8,6 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 72,0%. Вміст крохмалю відповідно - 72,8%, білка 9,4%.

07004119 Кразі — Степ, Полісся

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - від слабкого до помірного. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключення основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 87,2 ц/га, Полісся - 86,1 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 20,4 ц/га та 2,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,3-8,6 балів, вилягання - 8,8-9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,5%, Полісся - 79,9 %. Вміст крохмалю відповідно - 72,3% та 74,4%, білка 9,6 %, 9,0%.

07004120 Корнаді КС — Степ

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже

слабке,антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 80,3 ц/га, гарантований приріст складає 14 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 84,5%. Вміст крохмалю відповідно - 73,5%, білка 9,8%.

07004122 Кларіті — Степ

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 80,5 ц/га, гарантований приріст складає 14 ц/га. Стійкість до засухи 8,1 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 85,0 %. Вміст крохмалю відповідно - 72,6%, білка 10,1%.

® 07004062 Квітневий 187 МВ — Степ, Полісся

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 77,8 ц/га, Полісся - 82,9 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 18 ц/га та 2 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 80,6%, Полісся - 80,2 %. Вміст крохмалю відповідно - 72,4% та 73,2%, білка 9,5% та 9,8%.

07004070 Каріфолс — Степ, Лісостеп

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - від сильного до дуже сильного. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - дуже слабке. Час повного цвітіння (

середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 84,6 ц/га, Лісостепу - 90,8 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 19,8 ц/га, в зоні Лісостепу - 2,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,3-8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 83,0-78,7 %. Вміст крохмалю 74,4-72,6 %, білку 8,5-9,7 %.

® 07004129 ЛГ3285

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,0 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

® 06004068 Липовець 225 МВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - від округленої ло лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 78,1 ц/га, Полісся - 90,6 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 11,3 ц/га, та 7 ц/га. Стійкість до засухи 8,5-8,8 балів, вилягання - 8,8-9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 80,6%, Полісся - 73,7 %. Вміст крохмалю відповідно - 72,5% та 73,2%, білка 9,1%.

06004057 ЛГ3475

Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвленя колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - від середньої до широкої. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 84,3ц/га, гарантований приріст складає 2,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,4%. Вміст крохмалю відповідно - 71,5%, білка 7,9%.

® 07004124 ЛГ3258

Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - від слабкого до помірного. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке,антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - від слібкого до помірного. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 75,0 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 8,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,5%. Вміст крохмалю 71,5% білка 9,9%.

® 07004126 ЛГ3350

Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основиколоскових лусок -сильне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,0 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 84,7ц/га, гарантований приріст складає 18,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,8%. Вміст крохмалю відповідно - 72,3%, білка 9,5%.

® 07004128 ЛГ3395

Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 83,1ц/га, гарантований приріст складає 1,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,8%. Вміст крохмалю відповідно - 72,4%, білка 9,7%.

08004019 Леона — Степ

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – від помірного до сильного. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – від слабкого до помірного. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – ранній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- від слабкої до помірної. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – від довгої до дуже довгої. Ніжка качана за довжиною – від короткої до середньої. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 78,5 ц/га, гарантована прибавка 16,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,1 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 76,6 %. Вміст крохмалю 71,4 %, білку 10,0 %.

08004024 Лотар — Степ

Заявник: Панам Франція САРЛ

Форма верхівки першого листка - округла. Положення листкової пластинки у просторі - сильно похиле. Зигзагоподібність стебла – сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Антоціанове забарвлення колоскових лусок (за винятком основи) - від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головоної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - слабке. Волоть середньої щільності. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - середній (26-50). Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, низу зернини - червоно-оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 70,3 ц/га, гарантована прибавка складає 8,6 ц/га. Стійкість до засухи 7,5 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79,6 %. Вміст крохмалю 74,4 %, білку 8,8 %.

06004110 МАС 44А

Степ

Заявник: Маїсадур Семанс

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

Урожайність по зоні Степу - 83,1ц/га, гарантований приріст складає 7,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання - 8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,5%. Вміст крохмалю відповідно - 73,9%, білка 8,7%.

07004135 МАС 26К

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Маїсадур Семанс

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середньораннього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок -слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кркменистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 82,2 ц/га, Лісостепу - 86,6 ц/га, Полісся - 83,4 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 15,4 ц/га, 1 ц/га та 1 ц/га. Стійкість до засухи 8,3-8,4-8,7 балів, вилягання - 8,9-8,9-8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 79,3%, Лісостепу - 77,3%, Полісся - 78,4 %. Вміст крохмалю відповідно - 73,1%, 71,5% та 73,5%, білка 9,4 %, 10,3%, 9,1%.

07004136 МАС 18Т

Степ, Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня.

Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірне.

Урожайність по зоні Степу - 76,8 ц/га, Лісостепу - 82,5 ц/га, гарантований приріст відповідно складає 17 ц/га та 2,5ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 79,7%, Лісостепу - 78,4%. Вміст крохмалю відповідно - 72,1% та 73,3%, білка 9,2 та 9,9%.

08004011 Морісат — Степ

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 81,2 ц/га, гарантований приріст складає 14,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 8,7 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 79,7%. Вміст крохмалю відповідно - 70,8%, білка 10,1%.

08004026 Маді — Степ

Заявник: Панам Франція САРЛ

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Положення листкової пластинки у просторі - ледь похиле. Зигзагоподібність стебла – сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головоної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - слабке. Волоть середньої щільності. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - середній (26-50). Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини кременистий, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 79,6 ц/га, гарантована прибавка складає - 17,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання 8,7 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 79,2 %. Вміст крохмалю 74,2 %, білку 9,5 %.

08004033 Мозаїк — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сарл Адріен Момон і Сини

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – слабке. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть середньощільна. Час

появи шовку на качані – середній. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини кременистий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – оранжевий.

Урожайність по зоні Степу 73,5 ц/га, Лісостепу - 88,3 ц/га, Полісся - 88,7 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 11,8 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандартів, в зоні Полісся - 2,7 ц/га. Стійкість до засухи 7,5-9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 80,3-78,8-76,1 %. Вміст крохмалю 72,8-73,5-72,1 %, білку 9,1-9,4-10,4 %.

® 07004102 НС 2022 — Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – середній. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 77,0 ц/га, гарантована прибавка складає - 15,3 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання 8,5 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,5 %. Вміст крохмалю 70,2 %, білку 10 %.

® 07004092 НС 444 Ультра — Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - слабке. Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Положення листкової пластинки у просторі - похиле. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головоної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - помірне. Волоть щільна. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - середній (26-50). Час появи шовку на качані – дуже пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – від довгої до дуже довгої (від151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною – від середнього до довгого. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, низу зернини - жовто-оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 86,8 ц/га, гарантована прибавка складає - 10,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79,8 %. Вміст крохмалю 72,9 %, білку 9,7 %.

06004116 НК Сімба — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть середньощільна. Час появи шовку на

качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 86,0 ц/га, Лісостепу - 96,2 ц/га, Полісся - 88,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 23,8-6,8- 2,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,1-8,8-8,7 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 81%. Вміст крохмалю 71,2-73,1-73,6 %, білку 9,5 - 8,4 %.

® 07004014 НС 3014 — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи - сильне. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізньогою. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга (20,1 до 40 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 92,4 ц/га, Лісостепу - 91,0 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 27,6 ц/га, в зоні Лісостепу - 2,3 ц/га. Стійкість до засухи 7,5-8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 80,2-77,1 %. Вміст крохмалю 73,0-73,2 %, білку 8,3-9,8 %.

® 07004015 НС 2016 — Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"-слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 75,7 ц/га, гарантована прибавка - 14 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 84,1%. Вміст крохмалю 73,2 %, білку 9,3 %.

06004119 НК Фортіус — Степ

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла -сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі

волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забервлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 80,8ц/га, гарантований приріст складає 4,7 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,5%. Вміст крохмалю відповідно - 74,1%, білка 8,8%.

08004018 Новання

Степ

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірне. Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатеподібної. Положення листкової пластинки у просторі - сильно похиле. Зигзагоподібність стебла – сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Антоціанове забарвлення колоскових лусок (за винятком основи) - помірне. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головоної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - слабке. Волоть середньої щільності. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - середній (26-50). Час появи шовку на качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – від середньої до довгої. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 86,2 ц/га, гарантована прибавка складає - 21,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 8,5 балів. Вихід зерна при обмолоті 77,8 %. Вміст крохмалю 76,6 %, білку 10,3 %.

07004093 НК Ігл

Степ, Лісостеп

Заявник: ТОВ "Сингента"

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – відсутнє або дуже слабке. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – від слабкого до помірного. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- від слабкої до помірної. Антоціанове забарвлення піхви листка – від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – від короткої до середньої. Качан за формою циліндричний, за довжиною – від середньої до довгої. Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 87,9 ц/га, Лісостепу - 91,0 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 25,7 ц/га, в зоні Лісостепу - 1,5 ц/га. Стійкість до засухи 8-9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 82,7-80,1 %. Вміст крохмалю 73,6-71,4 %, білку 8,4-9,5 %.

07004095 НК Луціус

Степ

Заявник: ТОВ "Сингента"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - від середньої до широкої. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - від короткого до середнього. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 83,1 ц/га, гарантований приріст складає 16,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання - 8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,1%. Вміст крохмалю - 71,9%, білка - 8,4%.

07004096 НК Джитаго — Степ

Заявник: ТОВ "Сингента"

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – відсутнє або дуже слабке. Зигзагоподібність стебла – сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини кременистий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – оранжевий.

Урожайність по зоні Степу 73,7 ц/га, гарантована прибавка складає - 12 ц/га, Стійкість до засухи 8,1 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,7 %. Вміст крохмалю 71,6 %, білку 10,0 %.

07004097 НК Топ — Степ

Заявник: ТОВ "Сингента"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - від довгої до дуже довгої. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 75,6 ц/га, гарантований приріст складає 9 ц/га. Стійкість до засухи 7,8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 84,9%. Вміст крохмалю - 72,0%, білка 9,7%.

07004099 НК Канзас — Степ

Заявник: ТОВ "Сингента"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціаносе забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - від довгої до дуже довгої. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 85,1 ц/га, гарантований приріст складає 18,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання - 8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,8%. Вміст крохмалю відповідно - 72,8%, білка 8,9%.

07004100 НС 2014 Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - від відсутнього або дуже слабкого до слабкого, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - від слабкого до помірного. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - від середньої до широкої. Ніжка качана за довжиною - від середньої до довгої. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів від малої до середньої, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - від помірної до сильної.

Урожайність по зоні Степу - 77,6 ц/га, гарантований приріст складає 11 ц/га. Стійкість до засухи 7,8 балів, вилягання - 8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,9%. Вміст крохмалю відповідно - 71,8%, білка 9,8%.

® 07004101 НС 4015 Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильне. Форма верхівки першого листка - округла. Положення листкової пластинки у просторі - похиле. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Антоціанове забарвлення колоскових лусок (за винятком основи) - слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головоної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - слабке. Волоть середньої щільності. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - малий (5-25). Час появи шовку на качані – від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір зернини – жовтий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 93,9 ц/га, гарантована прибавка складає - 17,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,7 %. Вміст крохмалю 73,6 %, білку 8,9 %.

08004003 Опока — Степ

Заявник: Ходовля Рослин Смоліце Сп.з.о.о Група IXAP

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 74,9 ц/га, гарантований приріст складає 8,2 ц/га. Стійкість до засухи 7,9 балів, вилягання - 8,7 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,9%. Вміст крохмалю відповідно - 73,2%, білка 9,4%.

® 07004029 Остреч СВ — Степ

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - від помірної до сильної.

Урожайність по зоні Степу - 80,5 ц/га, гарантований приріст складає 20,6ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79,2%. Вміст крохмалю - 71,8%, білка 9,7%.

® 06004071 Оржиця 237 МВ — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – дуже сильне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – середня. Ніжка качана за довжиною – середня (від 8,1 до 10,0 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 75,9 ц/га, Лісостепу - 87,8 ц/га, гарантована прибавка по Степу 13,7 ц/га, в Лісостепу на рівні стандарту. Стійкість до засухи 7,5- 8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,2-78,5 %. Вміст крохмалю 73,1 - 74,0 %, білку 9,2 - 8,6 %.

® 07004067 Олігарх МВ — Степ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – сильне. Волоть щільна. Час появи шовку на качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- відсутнє або дуже слабке. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою циліндрична, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 87,0 ц/га, гарантована прибавка складає - 24,8 ц/га, Стійкість до засухи 8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 76,8 %. Вміст крохмалю 74,7 %, білку 8,8 %.

® 07004032 Полтава — Степ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробнича комерційна фірма "Селекта"

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла –сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- помірна. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – від короткого до середнього. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 85,8 ц/га, гарантована прибавка складає - 23,6 ц/га, Стійкість до засухи 8,1 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 79,1 %. Вміст крохмалю 74,0 %, білку 9,8 %.

05004009 ПАН 240 — Степ, Полісся

Заявник: Панам Франція САРЛ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 78,7ц/га, Полісся - 88,8ц/га, гарантований приріст відповідно складає 16,5 - 2,8 ц/га. Стійкість до засухи 7,4 -

8,9 балів, вилягання - 8,6-9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,3%, Полісся - 80,4. Вміст крохмалю відповідно - 72,7-73,3%, білка 9,0-9,1%.

07004044 ПР36Д79 — Степ

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - від середньої до довгої. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильне.

Урожайність по зоні Степу - 84,9ц/га, гарантований приріст складає 2,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,1%. Вміст крохмалю відповідно - 72,7%, білка 10,3%.

07004045 ПР38А22 — Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 86,3 ц/га, Лісостепу - 85,5 ц/га, гарантований приріст в зоні Степу складає 19,7 ц/га а в зоні Лісостепу приріст на рівні стиандарту. Стійкість до засухи 8,3 бали, вилягання - 9-8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,6%, Лісостепу - 77,8%. Вміст крохмалю відповідно - 73,9-72,8%, білка 9,6-9,5%.

07004046 ПР39Д60 — Степ

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - дуже сильне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключеням основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини

кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 71,7 ц/га, гарантований приріст складає 11,7 ц/га. Стійкість до засухи 7,7 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,4%. Вміст крохмалю відповідно - 72,6%, білка - 9,8%.

07004047 ПР39А61

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 77,7 ц/га, Лісостепу - 78,8 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає в зоні Степу - 18 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандарту. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,5%, Лісостепу - 78,2%. Вміст крохмалю відповідно - 72,3% та 73,5%, білка 9,6 % та 9,2%.

07004047 ПР39А61

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до серенього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 77,7 ц/га, Лісостепу - 78,8 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає в зоні Степу - 18 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандарту. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,5%, Лісостепу - 78,2%. Вміст крохмалю відповідно - 72,3% та 73,5%, білка 9,6 % та 9,2%.

07004048 ПР39А50

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від

раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 81,0 ц/га, Лісостепу - 81,8 ц/га, Полісся - 82,1 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 21 ц/га, 1,6 ц/га та 1 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,0%, Лісостепу - 80,0%, Полісся - 82,0 %. Вміст крохмалю відповідно - 74,5%, 72,9% та 73,2%, білка 8,3 %, 9,1%, 8,8%.

07004049 ПР39Н39 — Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 77,3 ц/га, Лісостепу - 80,6 ц/га, гарантований приріст складає 17,3 ц/га, 1,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,5%, Лісостепу - 80,0%. Вміст крохмалю відповідно - 73,6%, 73,7%, білка - 9,3 %, 9,5%.

07004052 ПР38Н86 — Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) -від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 73,2 ц/га, Лісостепу - 86,5 ц/га, гарантований приріст в зоні Степу складає 6,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,3-8,2 балів, вилягання - 9-8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,7%, Лісостепу - 79,5%. Вміст крохмалю відповідно - 73,3-73,1%, білка 9,6-9,5%.

07004054 ПР35Т06 — Степ

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

Урожайність по зоні Степу - 92,6ц/га, гарантований приріст складає 10,4 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 80,5%. Вміст крохмалю відповідно - 72,7%, білка 9,2%.

07004055 ПР38А79 — Степ

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - від дуже короткого до короткого. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 75,2 ц/га, гарантований приріст складає 8,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,1 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,5%. Вміст крохмалю відповідно - 71,9%, білка 9,3%.

07004057 ПР37Н01 — Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 90,3 ц/га, Лісостепу - 86,9 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 23,7 ц/га та 1,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,3-8,5 балів, вилягання - 9-8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,7%, Лісостепу - 78,8%. Вміст крохмалю відповідно - 73,3-73,2%, білка 9,0-9,9%.

07004058 ПР37Н54 — Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 86,8 ц/га, Лісостепу - 86,4 ц/га, гарантований приріст в зоні Степу складає 14,6 ц/га в зоні Лісостепу - врожайність на рівні стандарту. Стійкість до засухи 8,4 бали, вилягання - 9-8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,5%, Лісостепу - 77,7%. Вміст крохмалю відповідно - 73,3-75,2%, білка 9,4-9,0%.

06004049 Ріст СВ — Степ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - від помірного до сильного. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок -відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - від слабкого до помірного. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - від середньої до довгої. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - ж2овтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 71,9 ц/га, гарантований приріст складає 12 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,0%. Вміст крохмалю - 72,3%, білка - 9,0%.

07004121 Реаллі КС — Степ

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть нещільне. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 96,2 ц/га, гарантований приріст складає 29,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 85,1%. Вміст крохмалю відповідно - 72,9%, білка 9,8%.

07004004 Сегеді ТС 367

Степ, Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна компанія зернових культур"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи -слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 79,3 ц/га, Лісостепу - 84,8 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає в зоні Степу - 12,8 ц/га, а зоні Лісостепу приріст на рівні стандартів. Стійкість до засухи 8,2-8,5 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 84,5%, Лісостепу - 80,6%. Вміст крохмалю відповідно - 70,8-73,9%, білка 10,2-9,4%.

06004059 Скафор

Степ, Полісся

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - помірне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 70,1 ц/га, Полісся - 86,5 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 3,4 ц/га та 3 ц/га. Стійкість до засухи 7,8-8,6 балів, вилягання - 8,8-9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,7%, Полісся - 81,2 %. Вміст крохмалю відповідно - 71,2% та 74,4%, білка 10,0 %, 8,5%.

06004112 Салюдо

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Р2н

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за

довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 72,5 ц/га, Лісостепу - 86,1 ц/га, Полісся - 85,6 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 5,8 ц/га, 1,0 ц/га та 2 ц/га. Стійкість до засухи 8,8-9-8,8 балів, вилягання - 8,8-9-8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 84,6%, Лісостепу - 79,9%, Полісся - 78,8 %. Вміст крохмалю відповідно - 73,9%, 73,5% та 70,3%, білка 8,6 %, 9,4%, 8,3%.

® 07004030 Смотрич МВ — Степ

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - помірне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням сонови - слабке. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 69,4 ц/га, гарантований приріст- 9,5 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 79,1%. Вміст крохмалю - 72,3%, білка 10,3%.

® 07004041 Собор МС — Степ

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок -від слабкого до помірного, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - від помірного до сильного. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 79,9 ц/га, гарантований приріст складає 13,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 бали, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,2%. Вміст крохмалю 72,6%, білка 8,8%.

® 06004048 Сквирський 280 СВ — Степ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Колос"

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – відсутнє або дуже слабке. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть середньощільна. Час

появи шовку на качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- відсутня або дуже слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною – від короткого до середнього. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 69,5 ц/га, гарантована прибавка становить 7,8 ц/га. Стійкість до засухи 7,7 балів, вилягання 8,8 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 79,2 %. Вміст крохмалю 71,6 %, білку 9,6 %.

07004003 Сегеді 363 — Степ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна компанія зернових культур"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - від помірного до сильного. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - від короткого до середнього (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 80,4 ц/га, гарантований приріст складає 13,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82,6%. Вміст крохмалю відповідно - 72,1%, білка 9,9%.

07004134 Тібор — Степ

Заявник: Маїсадур Семанс

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колосколусок за виключенням основи - помірне. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 85,7 ц/га, гарантований приріст складає 19 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 баліввилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 78,8%. Вміст крохмалю відповідно - 74,3%, білка 9,4%.

08004025 Торонто — Степ

Заявник: Панам Франція САРЛ

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – відсутнє або дуже слабке. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) –

від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку"- відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – від короткого до середнього. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 78,4ц/га, гарантована прибавка складає 16,7 ц/га. Стійкість до засухи 7,8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,7 %. Вміст крохмалю 72,0 %, білку 9,7 %.

07004013 ХЛ 2015 — Степ

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 66,2 ц/га, гарантований приріст складає 6,3 ц/га. Стійкість до засухи 7,5 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 77,3%. Вміст крохмалю відповідно - 74,0%, білка 9,9%.

07004002 Шаролта — Степ, Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна компанія зернових культур"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 79,9 ц/га, Полісся - 84,0 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 13 ц/га та 1 ц/га. Стійкість до засухи 8,1-8,6 балів, вилягання - 8,8-8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 80,5%, Полісся - 79,9 %. Вміст крохмалю відповідно - 73,2% - 71,6%, білка 8,6%.

® 06004070 Яровець 243 МВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі

волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок -помірне, антоціанове забарвленняколоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Гібрид районовано по зоні Степу, урожайність склала - 77,9 ц/га, гарантований приріст- 15,6 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81,0%. Вміст крохмалю - 73,9%, білка 9,4%.

Степ

® 08004001 Ятрань МВ

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - від сильної до дуже сильної.

Урожайність по зоні Степу - 75,4 ц/га, гарантований приріст складає 15,4 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79,1%. Вміст крохмалю - 72,5%, білка 9,7%.

Кукурудза - батьківські компоненти

08004287 01НЛ1

Заявник: ТОВ "Монсанто Україна"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня (від 126 до 150 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,1). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

08004283 4114

Заявник: ТОВ "Монсанто Україна"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в

просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременистий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

08004291 91HX2

Заявник: ТОВ "Монсанто Україна"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня (від 126 до 150 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,1). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

08004278 ABC40442

Заявник: ТОВ "Монсанто Україна"

Форма верхівки першого листка -від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - від помірного до сильного. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Волоть від нещільної до середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - коротка (від 101 до 125 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременстий, кількість зернових рядів дуже мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

08004282 АВД11662

Заявник: ТОВ "Монсанто Україна"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть

нещільне. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відлсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

® 09004027 АЛ 0055 А

Заявник: Суедвестсаат ГбР

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі від прямого до ледь похилого. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть від нещільної до середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - від середньої до широкої. Ніжка качана за довжиною -коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - віід середньої до довгої. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

® 09004028 АЦ1330

Заявник: Суедвестсаат ГбР

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірна. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від ранього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - коротка (від 101 до 125 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - від середньої до широкої. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів від малої до счередньої, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

09004175 Вера МВ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см)

- середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - червоно-оранжевий, колір низу зернини червоно-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

09004794 Дн 619

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

® 09004487 ДВ03 ДВ48

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дужа слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

09004572 К 15

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (23-26 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини

жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

09004573 К 4

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (23-26 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

® 09004479 ЛІМНОТ21 ЛІМІВТ44

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

® 09004503 ЛІММСІ29 ЛІМІВХ77

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

08004310 ПХБФО

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - від помірного до сильного. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - від середнього до довгої. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

08004413 РС7085

Заявник: Євраліс Семанс

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня (від 126 до 150 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

08004426 РПК7254

Заявник: Євраліс Семанс

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - від сильного до дуже сильного. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - від помірного до сильного. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - від дуже вузької до вузької. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

08004464 РПК7250ЦМС*ЕГ7002

Заявник: Євраліс Семанс

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - не визначається. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня (від 126 до 150 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів велика, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

® 09004030 P1129

Заявник: Суедвестсаат ГбР

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - від дуже короткої до куроткої. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - від середньої до довгої. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів від малої до середньої, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини червоно-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

® 09004036 P7050

Заявник: Суедвестсаат ГбР

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабка. Положення листкової пластинки в просторі від прямого до ледь похилого Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Волоть від середньої щільності до щільного. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня (від 126 до 150 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,0). Ніжка качана за довжиною - від довгої до дуже довгої. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - від короткого до середнього. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів від середньої до великої, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - від помірної до сильної.

® 09004281 Ук 1712 СВ

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабка. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть нещільне. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня (від 126 до 150 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - відсутня або дуже коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

09004130 Харківська 19 ЗМ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня (від 126 до 150 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

® 09004177 Харківська 164 зМ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня (від 126 до 150 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Сільськогосподарські: бобові

Горох посівний

® 07001008 Баритон

Степ , Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток жовто-зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух", з восковим нальотом, короткий, середньої ширини та малою щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та відсутньою або дуже слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків; середньої довжини, вузький, зеленого кольору з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Середньостиглий. Вегетаційний період 81 - 92 дні. Рослини висотою 58 - 85 см. Маса 1000 насінин 231 - 236 г.
Посухостійкий, досить стійкий до осипання та посухи.
Агротехніка звичайна для зони вирощування . За даними заявника норма висіву 1,2 млн / га схожих насінин.
За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 29,9 - 35,5 ц / га , що на 11,1 -- 26,5 відсотки більше національних стандартів. Потенційна урожайність сорту 55 - 60 ц / га.
Білка має 23,4 - 25,4 %.
Сорт інтенсивного типу, придатний до прямого комбайнування.
Аскохітозом та антракнозом уражується нижче стандартів.
Придатний для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся

® 06001006 Веселик

Заявник: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання .

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має малу кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок зеленого кольору помірної інтенсивності без сіруватого відтінку. Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, відсутністю воскового нальоту на верхніх листочках, малим розміром, середніми довжиною та шириною, відсутньою зубчастістю.

Прилисток зеленого кольору помірної його інтенсивності без сіруватого відтінку, добре розвинутий з відсутніми формою "кролячих вух" і воскового нальоту, має середні параметри і довжини, і ширини та помірну щільність плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з малою максимальною його шириною, вигутою формою основи та помірною інтенсивністю його хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середню довжину, широкий , зелений колір з помірною інтенсивністю його прояву, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину та слабкий ступінь його прояву.

Насінина циліндричної форми, має просту форму крохмальних зерен і сім'ядолі жовтого кольору зі слабкою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

® 07001005 Клеопатра — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору слабко інтенсивності та відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух" з восковим нальотом, має довжину від короткого до середнього, ширину від вузької до середньої та відсутню плямистість.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика середній.

Квітка з довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки від малої до середньої, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, з формою основи від піднесеної до прямої та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має кількість насінних зачатків від малої до середнбої, середню довжину та ширину, від слабкої до помірної інтенсивності зелений колір з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та дуже слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з наявною слабкою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Середньостиглий. Вегетаційний період 79 - 91 день. Рослини висотою 50 - 73 дні. Маса 1000 насінин 222 - 235 г.
Сорт посухостійкий, стійкий до осипання та полягання.
Агротехніка звичайна для зони вирощування. За даними заявника норма висіву 1,2 - 1,4 млн. / га схожих насінин.
За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 29,7 - 31,6 ц / га, що на 10,5 - 20,3 відсотки більше національних стандартів. Потенційна урожайність сорту 65 ц / га.
Сорт інтенсивного типу, придатний для прямого комбайнування.
Стійкий до пошкодження кореневими гниллями та аскохітозом. Гороховою плодожеркою та попелицею уражується нижче стандартів.
Придатний для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся

07001004 Оплот — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток блакитно-зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух", з восковим нальотом, має середню довжину, вузький та дуже малою щільністю плямистості.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика короткий.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків; середньої довжини та вузький, помірно зеленого кольору з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Вегетаційний період 80 - 93 дні. Сорт середньопізній. Рослини висотою 60 - 81 см. Маса 1000 насінин 246 - 250 г.
Інтенсивний. За даними заявника норма висіву 1,2 млн / га схожих насінин.Агротехніка звичайна для зони вирощування.
Урожайний. За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 30,2 - 32 ц / га, що на 16,1 - 16,9 відсотки більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту 60 ц / га
Сорт стійкий до вилягання, осипання та посухи.
Смакові якості ірозварюваність добрі. Білка має 21,3 - 26 %.
Сорт стійкий до аскохітозу і борошнистої роси.
Придатний для поширення в зоні Степу, Лісостепу та Полісся.

07001003 Отаман

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору сильної інтенсивності та відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух" з восковим нальотом, має середню довжину від вузької до середньої ширину та наявну помірну щільність плямистості.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика короткий.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, вигнутою формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, довгий з шириною між вузько і середньою, слабкої інтенсивності зелений колір з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Середньостиглий, дозріває за 79 - 92 дні. Рослини висотою 55 - 69 см. Маса 1000 насінин 226 - 234 г.
Інтенсивний. За даними заявника норма висіву 1,2 млн / га схожих насінин. Придатний для прямого комбайнування.
Сорт стійкий до вилягання, осипання та посухи.
Урожайний. За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 27,8 - 30,6 ц / га, що на 9,4 - 13,1 відсоток більше за національні стандарти.

Смакові якості і розварюваність добрі. Білка має 22,9 - 23,5 %.
Гороховою плодожеркою і попелицею пошкоджується нижче стандартів.
Придатний для поширення в зоні Степу, Лісостепу та Полісся

® 06001003 Стартер — Лісостеп , Полісся .

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час цвітіння, і достигання .

Стебло нефасційоване, коротке та має середню кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору помірної його інтенсивності без сіруватого відтінку, добре розвинутий з наявною формою "кролячих вух", восковим нальотом, має середні параметри і довжини, і ширини та малу щільність плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з малою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середню і довжину, і ширину , зелений колір з помірною інтенсивністю його прояву, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину та слабкий ступінь його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Тип розвитку ярий. Середньоранній, вегетаційний період - 80 - 94 дні. Рослини висотою 51 - 78 днів. Маса 1000 насінин 203 - 230 г. Придатний для механізованого збирання. Агротехніка звичайна для зони вирощування. За даними заявника норма висіву 1,1 - 1,2 млн / га схожих насінин.

Урожайний, За роки випробування отримали середній урожай на державних центрах експертизи сортів рослин - 34,8 - 36,3 ц / га , що на 11,2 - 15,6 відсотки більше національних стандартів.

Високобілковий, сирого протеїну має 23,1 - 26,5 % , збір білка з 1 га - 8,3 - 8,7 ц / га .
Стійкий проти полягання, осипання, посухи та кореневих гнилей.

06001008 Факел — Степ , Лісостеп , Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання .

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має середню кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток блакитно-зеленого кольору без сіруватого відтінку. добре розвинутий з відсутніми формою "кролячих вух" і воскового нальоту, має такі параметри розміру: довгий і середньої ширини з помірною щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса від білого до кремового з малою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та помірною інтенсивністю його хвилястості.

Біб має велику кількість насінних зачатків, наступні параметри розміру: довгий з середньою шириною, зелений колір сильної інтенсивності його прояву, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину та слабкий ступінь його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен та сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне

забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Тип розвитку ярий . Середньостиглий , вегетаційний період - 85 - 96 днів . Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання . Агротехніка звичайна для зони вирощування . За даними заявника норма висіву 1,1 - 1,2 млн / га схожих насінин . Рослини висотою 48 - 75 см . Маса 1000 насінин 253 - 266 г .

Урожайний . За роки випробування на державних центрах експертизи сортів рослин середня врожайність в зоні Степу 30,3 ц / га , Лісостепу - 33,7 ц / га , Поліссі - 33,0 ц / га , що на 4,5 - 6,1 відсотки більше стандартів .

Збір білка з 1 гектара - 7,2 - 7,7 ц / га . Смакові якості і розварюваність добрі.

Стійкий до осипання , кореневих гнилей та антракнозу .

Квасоля звичайна

® 06087006 Веселка

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти з середнім часом цвітіння, мають кущовий сланкий тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє.

Листки дуже світло-зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю. Середній листочок середнього розміру, має округлу форму з коротко загостроою верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться в листках.

Квітка має рожевий колір паруса і білий крил та середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) – довгий з середньою шириною посередині та має форму поперечного перерізу через насінину від еліптичної до яйцевидної, середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами, гладеньку текстуру поверхні бобу та помірне звуження в сухому стані.

Біб – світло-жовтого кольору з наявною волокнистістю, має увігнуту форму вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його увігнутості та загострену форму верхівки (за виключенням гачка).

Гачок – короткий з відсутнім або дуже слабким його вигином.

Стигле насіння двокольорове зі слабким жилкуванням, має нирковидну форму поздовжнього розтину зі слабким ступенем його вигину, еліптичною форму поперечного перерізу з середньою його шириною.

Основний колір насінини – червоний, переважаючий вторинний колір – коричневий з пістрявим його розподілом, зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – відрізняється від фону насінини.

Маса 1000 насінин – велика.

® 06087007 Несподіванка

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти з середнім часом цвітіння, мають кущовий несланкий тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє.

Листки дуже світло-зеленого кольору з помірною зморшкуватістю. Середній листочок середнього розміру, має форму від трикутної до округлої з гострою верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.

Квітка має білий колір і паруса, і крил та середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) – короткий з малою шириною посередині та має серцевидну форму поперечного перерізу через насінину, середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами, гладеньку текстуру поверхні бобу та помірно виражене звуження в сухому стані.

Біб – світло-жовтого кольору з наявною волокнистістю, має увігнуту форму вигину зі слабким ступенем його увігнутості та форму верхівки (за виключенням гачка) від загостреної до тупої.

Гачок – короткий з відсутнім або дуже слабким його вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.

Стигле насіння однокольорове зі слабким жилкуванням, має нирковидну форму поздовжнього розтину зі слабким ступенем його вигину, еліптичною форму поперечного перерізу з малою його шириною.

Колір насінини – білий зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – середня.

07087004 Отрада

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту мають кущовий несланкий тип росту, середньої висоти з середнім часом цвітіння, антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє.

Листки темно-зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю.

Середній листочок середнього розміру, має округлу форму з коротко загостреною верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.

Квітка має білі кольори і паруса, і крил та маленький розмір приквітка.

Біб – одного помірно зеленого кольору, гладенький, з наявною волокнистістю, включно з гачком короткої довжини з середньою шириною посередині, формою поперечного перерізу через насінину від еліптичної до яйцевидної, має середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами та помірне звуження в сухому стані, увігнуту форму вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його увігнутості та форму верхівку (за виключенням гачка) від загостреної до тупої.

Гачок – середньої довжини з відсутнім або дуже слабким вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.

Стигле насіння однокольорове, біле зі слабким жилкуванням, має округлі форми і поздовжнього розтину, і поперечного перерізу з середньою його шириною.

Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – мала

® 07087005 Щедра

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Рослини сорту мають кущовий несланкий тип росту, середньої висоти з пізнім часом цвітіння, антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє.

Листки темно-зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю.

Середній листочок середнього розміру, має від трикутної до округлої форму з вузькозагостреною верхівкою.
Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.
Квітка має білі кольори і паруса, і крил та середній розмір приквітка.
Біб – одного помірно зеленого кольору, гладенький, з відсутньою волокнистістю, короткої довжини включно з гачком та середньою його шириною посередині, має форму поперечного перерізу через насінину від еліптичної до яйцевидної, середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами та відсутнє або дуже слабке звуження в сухому стані, увігнуту форму вигину зі слабким ступенем його увігнутості та форму верхівку (за виключенням гачка) від загостреної до тупої.
Гачок – середньої довжини з середнім його вигином.
Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.
Стигле насіння однокольорове, біле зі слабким жилкуванням, має форму поздовжнього розтину від округлої до еліптичної, а поперечного перерізу – еліптичну з середньою його шириною.
Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.
Маса 1000 насінин – середня.

Сільськогосподарські: круп'яні

Гречка їстивна

07002001 Дев'ятка

Степ, Лісостеп

Заявник: ВНДІ зернобобових і круп'яних культур

Сорт диплоїдний. Сім'ядолі дрібні, мають ниркоподібну форму, зеленого забарвлення зі слабкої інтенсивності антоціановим забарвленням. Гіпокотиль – середньої довжини.
Рослина за габітусом компактна, детермінантного типу, висока (більше 110 см), з середньою гіллястістю (4-6), має середні часи настання масового цвітіння (26-32 доби) та достигання (71-80 діб).
Висота головного пагона (стебла), стосовно висоти гілок, знаходиться на рівні гілок. Головний пагін – слабко ребристий, на третьому вузлі – товстий, з середніми зонами і галуження, і плодоутворення, має багато вузлів у зоні галуження, середню висоту прикріплення і першої гілки, і першого суцвіття.
Пагони з майже суцільним поширенням антоціанового забарвлення середньої інтенсивності. Вузли пагонів середньо виражені, червоного кольору. Опушення перших двох вузлів середнє.
Третій листок має довгий черешок, середні показники довжини, ширини та розміру. Листкова пластинка середньої товщини зі слабко хвилястою поверхнею, стріловидною формою, має зелене забарвлення зі слабко вираженою антоціановою плямою біля основи та слабким червоним забарвленням жилок біля неї, відсутнє або дуже слабке опушенням жилок з нижнього боку та нещільні волокна на жилках.
Квітка – дуже великого розміру, гетеростильного типу з блідо-блідо-рожевим кольором оцвітини та видовженою формою її листочків, розташування яких відокремлене. Квітка має малиновий колір пиляків, овальну форму нектарників та середній аромат.
Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: середньої довжини квітконосом, вузько циліндричною формою середньої щільності та середньою довжиною.
Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні – зонтик середньої довжини.
Плід – довгий і широкий з вигнутою напівкільцем формою плодоніжки з середніми її показниками і довжини, і товщини; має видовжену форму з середніми крилами, гострими ребрами, увігнутою формою граней, гострою формою верхівки та основою з видовженим

ступенем її вираження..

Оплодень на час наливу плоду – зеленого кольору з малиновою облямівкою на ребрах, а за повного достигання стає коричневим з наявними рідкими штрихами та відсутнім восковим нальотом на ньому.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середньою вирівняністю та помірною плівчастістю.

Середня урожайність сорту за роки випробування: Степ - 18,9 ц/га, Лісостеп- 19,9 ц/га., . Вегетаційний період: Степ- 83дн, Лісостеп-95дн. Висота рослини: С-87,6см, Л-91,4см. Маса 1000зерен: С-29,2г, Л-29,6г..Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білку становить: Степ - 16,5%, Лісостеп - 15,8%. крупність ядра: С - 52,5%, Л - 51,4%, плівчастість: С- 22,8%, Л-22,3%, вихід крупи: С-75,3%, Л-75,6%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

07002002 Дикуль — Полісся

Заявник: ВНДІ зернобобових і круп'яних культур

Сорт диплоїдний. Сім'ядолі середнього розміру, мають ниркоподібну форму зеленого кольору, слабкої інтенсивності антоціанове забарвлення. Гіпокотиль – середньої довжини.

Рослина за габітусом еректоїдна, детермінантного типу, висока (більше 110 см), з сильною гіллястістю (більше 6), має середні часи настання масового цвітіння (26-32 доби) та достигання (71-80 діб).

Висота головного пагона (стебла) стосовно висоти гілок знаходиться на рівні гілок. Головний пагін – середньо ребристий, на третьому вузлі – товстий, з середніми зонами і галуження, і плодоутворення, має багато вузлів у зоні галуження, низькі прикріплення і першої гілки, і першого суцвіття.

Пагони з майже суцільним поширенням антоціанового забарвлення середньої інтенсивності. Вузли пагонів середньо виражені, блідо-зеленого кольору. Опушення перших двох вузлів сильне.

Третій листок має середні показники довжину черешка, довжини, ширини та розміру. Листкова пластинка середньої товщини з хвилястою поверхнею, стріловидною формою, має зелене забарвлення зі слабо вираженою антоціановою плямою біля основи та слабким червоним забарвленням жилок біля неї, відсутнє або дуже слабке опушенням жилок з нижнього боку та нещільні волокна на жилках.

Квітка – дуже великого розміру, гетеростильного типу з блідо-блідо-рожевим кольором оцвітини та овальною формою її листочків, розташування яких дотичне. Квітка має малиновий колір пиляків, грибоподібну форму нектарників та середній аромат.

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: середньої довжини квітконос, вузькоциліндрична форма середньої щільності, довге.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні – китиця середньої довжини.

Плід – довгий і широкий з вигнутою напівкільцем формою плодоніжки з середніми її показниками і довжини, і товщини; видовженої форми з середніми крилами, гострими ребрами та гострою формою верхівки.

Форма граней плоду – увігнута, верхівка – гостра з видовженим ступенем вираження основи.

Оплодень на час наливу плоду блідо-зеленого кольору, а за повного достигання стає коричневим з наявними рідкими штрихами та відсутнім восковим нальотом на ньому.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середньою вирівняністю та помірною плівчастістю.

Середня урожайність сорту за роки випробування: Полісся - 15,7ц/га. Вегетаційний період: Полісся-100 дн.. Висота рослини: П-91,4см. Маса 1000зерен: П-27,6г.Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білку становить: Полісся - 15,0%, крупність ядра: П- 38,3%, плівчастість: П-24,2%, вихід крупи: П-72,5%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

® 07002003 Син-3/02 Степ, Лісостеп,Полісся

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Сорт диплоїдний. Сім'ядолі ниркоподібної форми, зеленого кольору слабкої інтенсивності з наявним антоціановим забарвлення. Гіпокотиль – середньої довжини.

Рослина за габітусом еректоїдна, індетермінантного типу, висока (більше 110 см), з середньою кількістю гілок (4-6), має середні часи настання і масового цвітіння (26-32 доби), і достигання (71-80 діб).

Висота головного пагона (стебла), стосовно висоти гілок, знаходиться на рівні гілок. Головний пагін – слабо ребристий, на третьому вузлі – товстий з середніми зонами і галуження, і плодоутворення; має багато вузлів у зоні галуження, низькі прикріплення першої гілки та першого суцвіття.

Пагони з майже суцільним антоціановим забарвленням середньої інтенсивності. Вузли пагонів середньо виражені, червоного кольору. Опушення перших двох вузлів сильної інтенсивності.

Третій листок має середні довжину, ширину та розмір. Листкова пластинка має середню товщину та слабо хвилясту поверхню, стріловидна, зеленого кольору зі слабо вираженою антоціановою плямою біля основи та слабо червоним забарвленням жилок біля неї, слабким опушенням жилок з нижнього боку та нещільними волокнами на жилках.

Квітка – дуже великого розміру, гетеростильного типу з блідо-рожевим кольором оцвітини та овальною формою її листочків, роташування яких відокремлене. Квітка має блідо-червоний колір пиляків, грибоподібну форму нектарників та середній аромат.

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: середньої довжини квітконос, вузькоциліндричну форму середньої щільності та середню його довжину.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні – зонтик з великою шириною розмаху

Плід – довгий і широкий, краплеподібної форми з середніми крилами та з гострими ребрами, має середні довжину та товщину плодоніжки.

Форма граней плоду – плеската, верхівки – гостра з ледь помітним ступенем вираженням основи.

Оплодень на час наливу плоду – блідо-зеленого кольору, а за повного достигання стає коричневим з наявними рідкими штрихами та відсутнім восковим нальотом на ньому.

Сорт характеризується середніми показниками маси 1000 плодів і вирівняності та високою плівчастістю.

Середня урожайність сорту за роки випробування:Степ - 17,5 ц/га, Лісостеп- 20,2 ц/га., Полісся - 17,0ц/га. Вегетаційний період: Степ-84дн, Лісостеп-92дн, Полісся-99 дн.. Висота рослини: С-105,4см, Л-108,6см, П-99,1см. Маса 1000зерен: С-27,8г, Л-28,0г, П-26,8г.Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білку становить: Степ - 17,6%, Лісостеп - 16,4%, Полісся - 15,5%, крупність ядра: С - 27,0%, Л - 34,5%, П- 31,5%, плівчастість: С-22,2%, Л-22,4%, П-23,5%, вихід крупи: С- 75,4%, Л-75,3%, П-73,9%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Просо посівне

07006003 Козацьке Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослина середньої висоти з малою кількістю вузлів на головному стеблі, має ранній час викидання волоті.

Листки без антоціанового забарвлення, відносно стебла – слабко-похилені. Прапорцевий листок має середні показники і довжини, і ширини.

Верхнє міжвузля коротке та товсте.

Волоть стиснута, довга, вузька, похила, з відхиленими гілочок в одному напрямку та нещільна. Гілочки першого порядку середньої довжини з середнім ступенем звисання. Подушечки на гілочках відсутні

Колосок має округлу форму, жовтий. Колоскові луски без антоціанового забарвлення. Приймочка маточки має рожеве забарвлення.

Зернівка великого розміру, майже кулястої форми. Квіткові луски кремові, грубі. Ядро (нешліфоване) яскраво-жовте. Інтенсивністю коричневого забарвлення плацентної плями ядра – світла.

Маса 1000 зерен – середня.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні: Степу - 34,4ц/га, Лісостеп - 31,2ц/га, Полісся - 34,8ц/га. Вегетаційний період: Степ - 83дн, Лісостеп - 92дн, Полісся - 99дн. Висота рослини: Степ - 113,8см, Лісостеп - 121,4см, Полісся - 131,5см. Маса 1000 зерен: Степ - 7,7г, Лісостеп - 7,7г, Полісся - 7,8г. Вміст білку складає: Степ - 14,3%, Лісостеп - 12,1%, Полісся - 13,2%. Плівчастість: Степ - 16,9%, Лісостеп 17,2%, Полісся - 16,5%. Вихід крупи: Степ -77,9%, Лісостеп - 77,6%, Полісся - 78,0% .

Сорт стійкий до хвороб, бактеріальної плямистості, сажки. Стійкий до посухи, осипання, полягання.

Агротехніка звичайна для зони вирощування.

Сорго звичайне двокольорове

® 07064002 Алба F1 — Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Рослини сорту характеризуються середнім часом викидання волоті та низькою висотою на час викидання волоті, а на час достигання - середньою вистотою та тонким стеблом.

Паросток з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням колеоптиля, відсутнім або дуже слабким забарвленням як дорсального боку першого листка, так і його пазухи.

Листок з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її за викидання волоті.

За достигання третій листок від верхівки має середні показники і довжини, і ширини.

Прапорцевий листок має помірне обезбарвлення середньої жилки, світліше зелене забарвлення її порівняно з листковою пластинкою та відсутніє або дуже слабке жовте забарвлення.

Волоть в кінці цвітіння помірної щільності. За достигання волоть має середню довжина без шийки, щільна, симетричної форми з короткою видимою шийкою над пазухою та середньою довжиною гілочок в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою під час цвітіння – середньої довжини. Остюк на нижній квітковій лусці відсутній або дуже слабко розвинутий.

На час цвітіння колоскова луска жовто-зелена з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час достигання вона стає темно-червоною, середьої довжини.

Приймочка дуже коротка з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та відсутнім або дуже слабким жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння - тьмяно-жовте.

Зернівка після достигання має біле забарвлення, округлу форму зі спинки та еліптичну в профіль, великий розмір зародка; середню поверхню, вкриту насінною шкіркою та на 1/2 склоподібну структуру ендосперму в подовжньому розрізі з білим забарвленням.

Маса 1000 зерен - середня.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 33,1 ц/га., гарантована прибавка - 4,0 ц/га. Сорт відноситься до середньостиглої групи стиглості. Маса 1000 зерен 26,8 г. Висота рослини 103 см. Стійкий до вилягання 8,9 балів, осипання 8,9 балів, та засухи 8,1 балів. Стійкий до пухирчатої сажки, гельмінтоспоріозу, кукурудзяного метелика. Вміст білка - 11,2 %. Вміст крохмалю - 75,3 %.

07064010 Арліс — Степ, Лісостеп

Заявник: СЮД СЕРЕАЛЬ

Рослини сорту характеризуються середнім часом викидання волоті та середньою висотою на час викидання волоті, а на час достигання - низькою вистотою та тонким стеблом верхньої третини рослини.

Паросток з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням колеоптиля, відсутнім або дуже слабким забарвленням як дорсального боку першого листка, так і його пазухи.

Листок з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її за викидання волоті.

За достигання третій листок від верхівки короткий та вузький.

Прапорцевий листок має відсутнє або дуже слабке обезбарвлення середньої жилки зі світлішим зеленим забарвлення її порівняно з листковою пластинкою та відсутнє або дуже слабке жовте забарвлення.

Волоть в кінці цвітіння помірної щільності. За достигання волоть має середню довжину без шийки, нещільна, пірамідальної форми з довгою видимою шийкою над пазухою та середньою довжиною гілочок в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою під час цвітіння – середньої довжини. Остюк на нижній квітковій лусці відсутній або дуже слабко розвинутий.

На час цвітіння колоскова луска зелено-жовтого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час достигання вона стає темно-червоною, середньої довжини.

Приймочка дуже коротка з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та помірним жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння – червоно-коричневе.

Зернівка після достигання має оранжево-червоне забарвлення, округлу форму зі спинки та еліптичну в профіль, великий розмір зародка; середню поверхню, вкриту насінною шкіркою та на 1/2 склоподібну структуру ендосперму в подовжньому розрізі з білим його забарвленням.

Маса 1000 зерен – дуже велика.

Урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 38,6ц/га,Лісостепу - 52,7 ц/га. Сорт відноситься до ранньостиглої групи стиглості. Маса 1000 зерен С-27,9г, Л-30,4г. Висота рослини С-113 см, Л-120см. Днів до достигання С-117, Л-121дн. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти, пухирчатої сажки. Вміст білка С- 13,1 %, Л-10,2%. Вміст крохмалю С - 73,4 %, Л-75,2%.

07064011 Аракан

Степ, Лісостеп

Заявник: СЮД СЕРЕАЛЬ

Рослини сорту характеризуються середнім часом викидання волоті та низькою висотою на час викидання волоті, а на час достигання - низькою вистотою та тонким стеблом верхньої третини рослини.

Паросток зі слабким антоціановим забарвленням колеоптиля, слабким забарвленням як дорсального боку першого листка, так і його пазухи.

Листок з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії п'ятого листка та помірним зеленим забарвленням її за викидання волоті.

За достигання третій листок від верхівки - короткий та вузький.

Прапорцевий листок має відсутнє або дуже слабке обезбарвлення середньої жилки зі світлішим зеленим забарвлення її порівняно з листковою пластинкою та відсутнє або дуже слабке жовте забарвлення.

Волоть в кінці цвітіння помірної щільності. За достигання волоть має середню довжина без шийки, нещільна, пірамідальної форми з середньою видимою шийкою над пазухою та середньою довжиною гілочок в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою під час цвітіння – середньої довжини, остюк на нижній квітковій лусці відсутній або дуже слабко розвинутий.

На час цвітіння колоскова луска - жовто-зеленого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час достигання вона стає темно-червоною, середньої довжини.

Приймочка - коротка з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та сильним жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння – червоно-коричневе.

Зернівка після достигання має оранжево-червоне забарвлення, еліптичну форму як зі спинки, так і в профіль, середній розмір зародка; середню поверхню, вкриту насінною шкіркою та на 1/2 склоподібну структуру ендосперму в подовжньому розрізі з білим його забарвленням.

Маса 1000 зерен – велика.

Урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 39,9ц/га,Лісостепу - 47,3 ц/га. Сорт відноситься досередньо ранньої групи стиглості. Маса 1000 зерен С-29,4г, Л-30,3г. Висота рослини С-106 см, Л-112см. Днів до достигання С-116, Л-123дн. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти, пухирчатої сажки. Вміст білка С- 12,9 %, Л-10,7%. Вміст крохмалю С - 73,8%, Л-75,6%. Напрям використання зерно.

® 07064001 НС-1 Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Рослини сорту характеризуються середнім часом викидання волоті та середньою висотою як на час викидання волоті, так і на час достигання та середньою товщиною стебла верхньої його третини.

Паросток з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням колеоптиля, відсутнім або дуже слабким забарвленням як дорсального боку першого листка, так і його пазухи.

Листок з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її за викидання волоті.

За достигання третій листок від верхівки має середні полказники і довжини, і ширини.

Прапорцевий листок має слабке обезбарвлення середньої жилки, світліше зелене забарвлення її порівняно з листковою пластинкою та відсутнє або дуже слабке жовте забарвлення.

Волоть у кінці цвітіння помірної щільності. За достигання довжина волоті без шийки - середня, помірної щільності, симетричної форми, з середньою видимою шийкою над пазухою та середньою довжиною гілочок в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою під час цвітіння – середньої довжини. Остюк на нижній квітковій лусці відсутній або дуже слабко розвинутий.

На час цвітіння колоскова луска жовто-зелена з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час достигання вона стає темно-червоною середеньої довжини.

Приймочка дуже коротка з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та слабким жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння - оранжево-червоне.

Зернівка після достигання має червоно-коричнев забарвлення, округлу форму зі спинки та вузькоеліптичну в профіль, великий розмір зародка; середню поверхню, вкриту насінною шкіркою та на 1/2 склоподібну структуру ендосперму в подовжньому розрізі з білим забарвленням.

Маса 1000 зерен - мала. Вміст таніну у зернівці - відсутній або дуже низький.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 31,7 ц/га., гарантована прибавка - 2,6 ц/га. Сорт відноситься до середньостиглої групи стиглості. Маса 1000 зерен 26,4 г. Висота рослини 103 см. Стійкий до вилягання 8,9 балів, осипання 8,9 балів, та засухи 7,9 балів. Стійкий до пухирчатої сажки, гельмінтоспоріозу, кукурудзяного метелика. Вміст білка - 12,2 %. Вміст крохмалю - 74,0 %.

06064006 Сонцедар Степ

Заявник: Пітер Богдан Чикалюк

Рослини сорту характеризуються дуже пізнім часом викидання волоті та низькою висотою як на час викидання волоті, так і на час достигання з середньою товщиною стебла верхньої його третини.

Паросток з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням колеоптиля, відсутнім або дуже слабким забарвленням як

дорсального боку першого листка, так і його пазухи.

Листок з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її за викидання волоті. За достигання третій листок від верхівки середньої і довжини, і ширини.

Прапорцевий листок має помірне поширення обезбарвлення середньої жилки, світліше зелене забарвлення її порівняно з листковою пластинкою та відсутнім або дуже слабким жовтим забарвленням.

Волоть в кінці цвітіння щільна. За достигання довжина волоті без шийки - середня, симетричної форми, з відсутньою або дуже короткою видимою шийкою над пазухою та середньої довжини гілочками в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою під час цвітіння – середньої довжини. Остюк на нижній квітковій лусці відсутній або дуже слабко розвинутий.

На час цвітіння колоскова луска жовто-зеленого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час достигання вона стає світло-жовтою та короткою.

Приймочка дуже коротка з відсутнім або дуже слабким як антоціановим забарвленням, так і жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння - тьмяно-жовте.

Зернівка після достигання має біле забарвлення, округлу форму зі спинки та еліптичну в профіль, великий розмір зародка; малу поверхню, вкриту насінною шкіркою та на 1/2 склоподібну структуру ендосперму в подовжньому розрізі з білим забарвленням.

Маса 1000 зерен - велика. Вміст таніну у зернівці - відсутній або дуже низький.

Урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 37,9 ц/га. Сорт відноситься до середньоранньої групи стиглості. Маса 1000 зерен 26,2 г. Висота рослини 106,6см.Днів до достигання -117дн. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти, пухирчатої сажки. Вміст білку - 12,0 %. Вміст крохмалю - 74,3% . Напрям використання зерно..

07064008 Соларіус

Степ

Заявник: СЮД СЕРЕАЛЬ

Рослини сорту характеризуються середнім часом викидання волоті та низькою висотою на час викидання волоті, на час достигання – рослина також низька та тонка у верхній тетині рослини.

Паросток з помірними показниками антоціанового забарвленням і колеоптиля, і забарвленням як дорсального боку першого листка , так і його пазухи.

Листок зі слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її (листової пластинки) за викидання волоті.

За достигання третій листок від верхівки – середньої довжини та вузький.

Прапорцевий листок має відсутнє або дуже слабке обезбарвлення середньої жилки зі світлішим зеленим забарвлення її порівняно з листковою пластинкою та відсутнє або дуже слабке її (середньої жилки) жовте забарвлення.

Волоть в кінці цвітіння - щільна. За достигання волоть має середню довжину без шийки, нещільна, пірамідальної форми з середньою видимою шийкою над пазухою та середньою довжиною гілочок в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою під час цвітіння – середньої довжини. Остюк на нижній квітковій лусці під час цвітіння відсутній або дуже слабко розвинутий.

На час цвітіння колоскова луска жовто-зеленого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушенням, а на час достигання колоскова луска стає темно-червоною і довгою.

Приймочка під час цвітінні – коротка з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та сильним жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння – червоно-коричневе.

Зернівка після достигання має оранжево-червоне забарвлення, еліптичну форму як зі спинки, так і в профіль; середній розмір зародка; велику поверхню, вкриту насінною шкіркою та на 1/2 склоподібну структуру ендосперму в подовжньому розрізі з білим його забарвленням.

Маса 1000 зерен –велика.

Урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 41,7ц/га,. Сорт відноситься до пізньостиглої групи стиглості. Маса 1000 зерен С-29,5г.Висота рослини С-108 см. Днів до достигання С-122. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти, пухирчатої сажки. Вміст білка С-12,4%. Вміст крохмалю С - 74,6%.Напрям використання зерно.

07064009 Фулгус — Степ, Лісостеп

Заявник: СЮД СЕРЕАЛЬ

Рослини сорту характеризуються середнім часом викидання волоті та середньою висотою на час викидання волоті, а на час достигання - низькою висотою та середньою товщиною стебла верхньої третини рослини.

Паросток зі слабким антоціановим забарвленням колеоптиля, дуже слабким забарвленням як дорсального боку першого листка, так і його пазухи.

Листок з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її за викидання волоті.

За достигання третій листок від верхівки – середньої довжини та вузький.

Прапорцевий листок має відсутнє або дуже слабке обезбарвлення середньої жилки зі світлішим зеленим забарвлення її порівняно з листковою пластинкою та відсутнє або дуже слабке її (середньої жилки) жовте забарвлення.

Волоть в кінці цвітіння щільна. За достигання волоть має середню довжину без шийки, нещільна, ширша в нижній частині з середньою видимою шийкою над пазухою та середньою довжиною гілочок в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою під час цвітіння – середньої довжини. Остюк на нижній квітковій лусці відсутній або дуже слабко розвинутий.

На час цвітіння колоскова луска жовто-зеленого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час достигання вона стає червонувато-коричневою і короткою.

Приймочка під час цвітінні – коротка з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та помірним жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння – червоно-коричневе.

Зернівка після достигання має світло-коричневе забарвлення, округлу форму зі спинки та еліптичну в профіль, великий розмір зародка; малу поверхню, вкриту насінною шкіркою та на 3/4 склоподібну структуру ендосперму в подовжньому розрізі з білим його забарвленням.

Маса 1000 зерен –велика.

Урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 39,9ц/га,Лісостепу - 56,4ц/га. Сорт відноситься пізньостиглої групи стиглості. Маса 1000 зерен С-27,9г, Л-30,2г. Висота рослини С-113см, Л-108см. Днів до достигання С-120, Л-130дн. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти, пухирчатої сажки. Вміст білка С- 12,6%, Л-9,2%. Вміст крохмалю С - 73,9%, Л-74,1%. Напрям використання зерно.

Сориз

® 08330001 Атлант — Степ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Рослини гібриду мають паросток дуже світло-зеленого кольору, ранні строки кущіння та середні викидання волоті. На час викидання волоті рослин мають середню висоту.

На час достигання рослини також середньої висоти та характеризуються слабкою здатністю до кущистості та відсутньою здатністю до гілкування, мають тонке головне стебло та слабку його залистяність.

Листок на час викидання волоті – зелений, помірної інтенсивності. На час дозрівання листок – короткий та вузький.

Прапорцевий листок на час викидання волоті має помірне знебарвлення середньої жилки. Інтенсивність зеленого забарвлення

середньої жилки порівняно з пластинкою однакова, а жовте її забарвлення слабке.

Колоскова луска під час цвітіння жовто-зеленого кольору, а при дозрівання – жовто-оранжевого, коротка.

Квітка за довжиною – середня. Приймочка середньої довжини з помірно жовтим забарвленням. На нижній квітковій лусці остюк відсутній або дуже слабко розвинений. Сухі тичинки світло-жовтого кольору.

Волоть на кінець цвітіння щільна, а на час достигання помірно щільна, еліпсоподібна, середньої довжини без шийки та має середні за довжиною гілочки першого порядку в середній третині волоті. Шийка волоті над пазухою – середня.

Зернівка після достигання жовтого кольору, має округлу форму зі спинки і еліптичну в профіль, малий розмір зародка та слабко відкриту поверхню від насінної шкірки.

Структура ендосперму зерна в поздовжньому розрізі на 3/4 склоподібна з дуже високою і екструзивною здатністю, і за твердістю ендосперму. Забарвлення ендосперму – оранжеве.

Маса 1000 зерен – велика.

Урожайність сорту за період випробування в зоні Степу - 59,3 ц/га. Сорт відноситься до середньоранньої групи стиглості. Маса 1000 зерен 39,5 г. Висота рослини 125 см. Стійкий до вилягання, засухи, осипання. Стійкий проти, пухирчатої сажки, гельмінтоспоріозу,кукурудзяного метелика. Вміст білка - 13,9 %. Вміст крохмалю - 72,0 %. Вміст жиру - 3,5%. Вихід крупи - 85%.

Рис посівний ярий

08009001 Онтаріо — Степ

Заявник: Інститут рису Української академії аграрних наук

Рослини сорту з безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають пряме положення стебел з середнім часом як викидання волоті, так і часу достигання.

Стебло не здатне утворювати коліно, має середні показники і довжини, і товщини з відсутнім антоціановим забарвленням як міжвузлів, так і вузлів.

Листок помірно зеленого забарвлення, має середні показники і довжини, і ширини, відсутнє антоціанового забарвлення листової пластинки, зелений колір піхви, відсутню або дуже слабку опушеність поверхні пластинки та середнє старіння (пожовтіння): на час збирання врожаю один листок зберігає свій колір.

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок має подвійну форму та безбарвний.

Прапорцевий листок має пряме положення пластинки як за раннього обстеження, так і за пізнього.

Рослини сорту мають середню кількість волотей без остюків з середньою довжиною головної осі та прямим її вигином, без вторинного гілкування. Положення гілок волоті - пряме.

Колосок з білим забарвленням приймочки, має короткої довжини нижню стерильну колоскову луску солом'яного кольору.

Нижня квіткова луска з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням як кіля та зони під верхівкою, так і самої верхівки зі слабким її опушенням та білим кольором.

Зернівка має середні довжину та ширину з відсутньою реакцією нижньої квіткової луски на фенол.

Обрушена зернівка білого кольору, без аромату, має напівкруглу форму збоку, середні довжину та ширину.

Ендосперм – неглютинозний, має від 11 до 15 % амілази та слабо дигестує (розщеплюється).

Маса 1000 розвинених зерен – середня (30 г).

Урожайність сорту за період випробування в зоні Степу - 92,6 ц/га. Відноситься до середньостиглої групи. Має видовжену форму зерна. Висота рослин - 101 см. Маса 1000 зерен - 32г. Вегетаційний період 120 днів. Сорт стійкий проти хвороб, пірикуляріозу, кореневої гнилі. Стійкий до осипання, вилягання. Вихід крупи - 69,0 %, склоподібність - 98 %, плівчастість - 17,5 %, вихід цілого ядра - 91,0%.

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Соняшник однорічний

07017031 8X449ДМ — Степ, Лісостеп

Заявник: Доу Агросайенсіс ВмбХ

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, помірною пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна . Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, зігнуті за довжиною, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки довга. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою низька. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила: в зоні Степу 27,9 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,3 ц/га, до національних стандартів 5,1 ц/га; в зоні Лісостепу 34,7 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 6,8 ц/га, до національних стандартів 9,3 ц/га. Вміст жиру 51,3 - 52,2%, білку 15,8 - 16,1%, олеїнової кислоти 81%. Вихід олії 1382 - 1584 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи, за час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

06017058 Альбатр — Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, веретиновидні, зігнуті за довжиною, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,4 ц/га; в умовах Лісостепу 28,7 ц/га, гарантована прибавка 0,6 ц/га. Вміст жиру 50,6%, білку 16,2 - 17,3%. Вихід олії 1461 -1485 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами і пошкодження шкідниками незначне.

06017053 Боллiл — Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та

великими вушками. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 30,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,0 ц/га, до національних стандартів 2,7 ц/га; в умовах Лісостепу 30,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно 0,1 і 2,1 ц/га. Вміст жиру 51,0 - 51,9 %, білку 15,5 - 16,5 %. Вихід олії 1487 - 1601 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017032 Байзер КЛ

Степ, Лісостеп

Заявник: Доу Агросайенсіс ВмбХ

Гіпокотиль з наявним помірним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром зі слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка загострена, крила листка відсутні абослабко виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцеполдібної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини низькі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром маленький, форма з боку сім`янок злегка випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Скоростиглий гібрид з високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,8 ц/га; в зоні Лісостепу 22,3 ц/га. Вміст жиру 50,8%, білку 16,5%, олеїнової кислоти 79,8%. Вихід олії 1406 - 1494 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017091 Голдсан

Степ, Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчатістю, грубими зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, довгі, вузько-яйцевидної форми . Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика великий, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка дрібна, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 30,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,4 ц/га; в зоні Лісостепу 28,5 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49, 2 %, білку 16,7 - 17, 0 %. Вихід олії 1526 - 1572 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; генетично стійкий до гербіцидів групи IMI. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017056 Геліабест — Степ

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність в зоні Степу за час випробування становила 29,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,4 ц/га. Вміст жиру 50,9 %, олеїнової кислоти 81,0 %, білку 16,8 %. Вихід олії 1614 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, плсухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017037 Далія КС — Степ, Лісостеп

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 29,5 ц/га, в зоні Лісостепу 28,5 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 49,6 %, білку 16,4 - 17,2 %. Вихід олії 1457 - 1568 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017040 Дрофа — Степ, Лісостеп

Заявник: Науково-дослідний центр "Магроселект"

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середня. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка велика,

широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 28,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,4 цга; в зоні Лісостепу 27,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,8 %, білку 15,4 - 16,5 %. Вихід олії 1430 - 1458 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

06017052 ЕС Флоріміс

Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу разом із прямим стебла, за розміром середній, форма з боку сім`янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастістьвідсутня або дуже слабка.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 29,2 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,3 ц/га, до національних стандартів 4,3 ц/га; в умовах Ліслстепу 29,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,0 ц/га, до національних стандартів 3,7 ц/га. Вміст жиру 48,4 - 48,8%, білку 16,6 - 17,4%.Вихід олії 1312 - 1415 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи; ураження хворобами, пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017054 ЕС Діагора

Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з наявним помырним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко видовжені, чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу разом із прямим стеблом, за розміром великий, форма з боку сім`янок злегка випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Смугастість на краях відсутня або дуже слабка, сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,6 ц/га; в умовах Лісостепу 27,3 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 50,6 %, білку 16,4 - 17,1 %. Вихід

олії 1334 - 1475 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017055 ЕС Артіміс

Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з наявним помірним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка від широкотрикутної до загостреної, крила листка відсутні або слабко виражені, наявні помірні вушка . Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу разом із прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім`янок злегка випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має дуже сильну смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Середньоранній гібрид олійного напрямку випробування. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,0 ц/га, в зоні Лісостепу 28,4 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,4 %, олеїнової кислоти 87 %, білку 16,2 - 16,9 %. Вихід олії 1308 - 1422 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017081 ЕС Віскі

Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,2 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,2 ц/га, до національних стандартів 4,3 ц/га; в зоні Лісостепу 33,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 4,8 ц/га, до національних стандартів 8,3 ц/га. Вміст жиру 49,3 - 50,0%, білку 16,1% - 16,6%. Вихід олії 1457 - 1502 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017082 ЕС Веніція

Степ

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою

пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки щільні, веретиновидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,5 ц/га, до національних стандартів 4,5 ц/га. Вміст жиру 50,3%, білку 16,5%. Вихід олії 1439 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи, за час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Степ, Лісостеп

® 07017083 ЕГХ786

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки нещільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена,але й чітко округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дужу слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид має високий вміст олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,6 ц/га, гарантована прибавка 0,9 ц/га; в зоні Лісостепу 24,9 ц/га, гарантована прибавка 4,4 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,6 %, білку 16,5 - 17,1 %, олеїнової кислоти 84, 1 - 86,0 %. Вихід олії 1285 - 1576 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

Степ, Лісостеп

® 07017084 ЕС Петунія

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім`янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га; в зоні Лісостепу 27,8 ц/га, гарантована прибавка 7,3 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,7 %, білку 16,3 - 16,5 %. Вихід олії 1387 - 1578 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017031 Евіта — Степ, Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агросинтез"

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю сильна. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 27,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,8 ц/га; в умовах Лісостепу 27,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,3 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 49,9%, білку 16,2 - 16,8%. Вихід олії 1408 - 1504 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий порти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 06017032 Європа — Степ, .Лісостеп

Заявник: Щербань Сергій Васильович

Гіпокотиль з наявним сильним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, малий за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка від широкотрикутної до загостреної, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка помірні. Опушеність верхівки (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини високі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім`янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має дуже сильну смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

06017049 Ікллор — Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з відсутньою аба дуже слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки

оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,4 ц/га , до національних стандартів 4,1 ц/га; в умовах Лісостепу 29,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га. Вміст жиру 50,9 - 51,1 %, білку 16,0 - 16,9 %. Вихід олії 1571 - 1701 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

05017083 Іоллін — Степ, Лісостеп

Заявник: P2н

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість помірна, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середня. Рослина середня, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,2 ц/га, гарантована прибавка до стандарту 1,8 ц/га; в зоні Лісостепу 27,1 ц/га. Потенційна урожайність 45,5 ц/га. Вміст жиру 48,0 - 49,8 %, олеїнової кислоти 86,2 %, білку 16,5 - 17,1 %. Вихід олії 1166 - 1341 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017065 Іоллна (PA1001735) — Степ, Лісостеп

Заявник: P2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла відсутня або дуже слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,4 ц/га, в зоні Лісостепу 25,4 ц/га. Вміст жиру 49,5 - 50,1 %, білку 16,8 %. Вихід олії 1304 - 1600 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобамси та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017087 Імерія КС — Степ, Лісостеп

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла відсутня або дуже слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, за довжиною довгі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривлення стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,9 ц/га; в зоні Лісостепу 27,9 ц/га, гарантована прибавка 2,0 ц/га. Вміст жиру 50,8 - 51,1 %, білку 16,1 - 16,6 %. Вихід олії 1381 - 1567 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017034 Ілона КЛ — Степ, Лісостеп

Заявник: Доу Агросайенсіс ВмбХ

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість помірна, зубці грубі, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина за висотою середня, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид має високий вміст олеїнової килоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,0 ц/га; в зоні Лісостепу 25,1 ц/га, гарантована прибавка 0,9 ц/га. Вміст жиру 51,6 - 52,3 %, білку 16,2 5, олеїнової кислоти 82,6 %. Вихід олії 1381 - 1517 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017057 Курсор — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - слабка. Листок середнього розміру з помірною пухирчастістю, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжені , верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина низька, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - маленький, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 22,9 ц/га, в зоні Лісостепу 21,9 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 50,8 %, білку 16,3%. Вихід олії 1310 - 1324 кг/га. Гібрид відрізняється підвищеним вмістом пальметинової кислоти, стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування

незначне.

06017042 Ксения — Степ, Лісостеп

Заявник: Науково-дослідний центр "Магроселект"

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці дрібні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка слабко виражені, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, довгії за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини високі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім`янок злегка випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, товста чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га; в зоні Лісостепу 28,6 ц/га, гарантована прибавка 3,3 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 50,9 %, білку 16,2 - 16,8 %. Вихід олії 1446 - 1502 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017001 Каменяр — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжені але й чітко округлі, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в умовах Лісостепу 27,1 ц/га, гарантована прибавка 1,8 ц/га. Вміст жиру 49,9 %, білку 16, 7 - 17,2 %. Вихід олії 1342 - 1504 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017033 ЛГ 5654 КЛ — Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - сильна. Листок середнього розміру з помірною пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та короткі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжені , але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір

зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 29,0 ц/га. Вміст жиру 50,4 %, білку 16,3 %. Вихід олії 1583 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017089 ЛГ5451ХО КЛ — Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - помірна. Листок середнього розміру з помірною пухирчастістю, зубці помірні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжені, але й чітко округлі , верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - маленький, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність в зоні Лісостепу за час випробування становила 26,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,3 ц/га. Вміст жиру 48,2 %, білку 17,5 %. Вихід олії 1460 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017090 ЛГ5663 КЛ — Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із стеблом. Кошик за розміром середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 33,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,1 ц/га, до національного стандарту 2,5 ц/га. Вміст жиру 50,2%, білку 16,6%. Вихід олії 1597 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

® 07017092 ЛГ5658 КЛ — Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, грубими зубцями та

помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором сіра, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,4 ц/га. Вміст жиру 51,4 %, білку 16,2 %. Вихід олії 1496 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017093 ЛГ5550

Степ, Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, грубими зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена,округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями дуже сильна, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,5 ц/га; в зоні Лісостепу 27,2 ц/га, гарантована прибавка 1,3 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 50,6 %, білку 16,4 - 16,6 %. Вихід олії 1456 - 1570 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017094 ЛГ5370

Степ, Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки помірна . Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика маленький, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,7 ц/га, в зоні Лісостепу 26,1 ц/га. Вміст жиру 50,2 %, білку 16,4 %. Вихід олії 1434 - 1557 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017047 Летізія

Степ, Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 29,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,7 ц/га; в умовах Лісостепу 27,7 ц/га. Вміст жиру 50,1 - 50,1%, білку 16,0 - 16,8 %. Вихід олії 1514 - 1660 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017008 Ларісса — Степ, Лісостеп

Заявник: Кволіті Кропс Агро СРЛ

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з відсутня або дуже слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската, форма верхівки загострена. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) відсутня або дуже слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із стеблом. Кошик за розміром середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 27,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,6 ц/га; в зоні Лісостепу 30,1 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,2 ц/га, до національних стандартів 4,8 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 49,7%, білку 16,7 - 17,1%. Вихід олії 1410 - 1594 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. Ураження хворобами і пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

07017056 Максимус — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірн ими зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високи вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,5 ц/га; в зоні Лісостепу 24,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 4,4 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,5 %, олеїнової кислоти 74,6 - 75,8 %, білку 16,5%. Вихід олії 1315 - 1461 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи, генетично стійкий до гербіцидів групи IMI. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017048 MAC 91A

Степ, Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з помірною пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, зігнуті за довжиною, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки темний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 31,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,7 ц/га, до національних стандартів 3,4 ц/га; в умовах Лісостепу 28,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,2 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 49,5%, білку 16,7 - 17,5%. Вихід олії 1462 - 1670 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

06017050 MAC 92ОЛ

Степ, Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослини низькі, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) плеската. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид має високий вміст олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,7 ц/га, в зоні Лісостепу 27,2 ц/га. Вміст жиру 48,1 - 49,6 %, олеїнової кислоти 84 %, білку 16,9 - 17,6 %. Вихід олії 1336 - 1433 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017051 MAC 95IP

Степ

Заявник: Маїсадур Семанс

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з помірною пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската, форма верхівки загострена. Листок з помірними вушками та слабко

вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, зігнуті за довжиною, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою низька. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,9 ц/га. Вміст жиру 50,3%, білку 17,3%. Вихід олії 1474 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017062 Маріца — Степ, Лісостеп

Заявник: Добружанський Сільськогосподарський Інститут

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,1 ц/га; в зоні Лісостепу 24,5 ц/га, гарантована прибавка 4,0 ц/га. Вміст жиру 49,3 - 49,9 %, білку 16,4 - 16,6%. Вихід олії 1319 - 1544 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017095 MAC 98M — Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, довгі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування в зоні Лісостепу становила 29,2 ц/га, гарантована прибавка 8,7 ц/га. Вміст жиру 49,0%, білку 16,7 %. Вихід олії 1324 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017097 MAC 91IP — Степ, Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжені але й чітко округлі, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослини за природньою висотою низькі. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором сіра, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 26, 2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га; в зоні Лісостепу 28,3 ц/га, гарпнтована прибавка до національних стандартів 4,1 ц/га. Вміст жиру 51,2 - 52,3%, білку 15,6 - 16,0%. Вихід олії 1464 - 1516 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017098 МАС 96ОЛ — Степ, Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослини низькі, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) плеската. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,8 ц/га, в зоні Лісостепу 26,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 6,4 ц/га. Вміст жиру 49,7%, білку 1ё7,1 %. Вихід олії 1297 - 1350 ц/га. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017026 МН6320 — Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Кроп Протекшн АГ

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки ширококутна. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, зігнуті за довжиною, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик за розміром середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,8 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,9 ц/га, до національних стандартів 6,0 ц/га; в зоні Лісостепу 25,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,4 ц/га. Вміст жиру 49,4 - 49,4%, білку 16,0 0 16,5%. Вихід олії 1284 -1554 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017071 МН 7268 — Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Кроп Протекшн АГ

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 26,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в умовах Лісостепу 27,7 ц/га, гарантована прибавка 2,4 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,6%, білку 15,6 - 16,4 %. Вихід олії 1274 - 1477 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випрбування незначне.

07017006 МН 6219 — Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Кроп Протекшн АГ

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,3 ц/га, до національних стандартів 4,4 ц/га; в умовах Лісостепу 29,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 0,5 ц/га, до національних стандартів 4,0 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,0 %, білку 16,2 - 16,7%. Вихід олії 1503 -1593 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

07017047 НС-Х-6059 — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - слабка. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою

пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжені , верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 28,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 4,1 ц/га; в умовах Лісостепу 28,2 ц/га, гарантована прибавка 4,0 ц/га. Вміст жиру 50, 3 - 52,2 %, білку 15,6 - 15,8 %. Вихід олії 1430 - 1533 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

Степ, Лісостеп

07017048 НС-Х-6043

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжені, чітко округлені , верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 25,9 ц/га, в зоні Лісостепу 25,8 ц/га, гарантована прибавка 5,3 ц/га. Вміст жиру 49,2 %, білку 16,7 - 17,0 %. Вихід олії 1322 - 1393 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Степ, Лісостеп

07017049 НС-Х-6044

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - слабка. Листок малого розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю, зубці помірні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та довгі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжена але і чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина низька, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - маленький, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 25,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,7 ц/га; в зоні Лісостепу 24,5 ц/га, гарантована прибавка 0,3 ц/га. Вміст жиру 48,9 %, білку 16,9 %, вихід олії 1273 - 1391 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання , осипання. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017050 НС-Х-6045 Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена,але й чітко округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика маленький, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,9 ц/га, в зоні Лісостепу 24,9 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 51,0 %, білку 15,9 - 16,2 %. Вихід олії 1343 - 1536 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017062 НК Октава Лісостеп

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Лісостепу становила 32,8 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,5 ц/га, до національного стандарту 3,1 ц/га. Вміст жиру 50,0%, білку 16,1%. Вихід олії 1499 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

06017064 НК Дуета Лісостеп

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, зігнуті за довжиною, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки жовті. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик маленький, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Лісостепу становила 29,9 ц/га, гарантована прибавка до національного стандарту 0,2 ц/га. Вміст жиру 50,9%, білку 16,4%. Вихід олії 1504 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. Ураження хворобами і пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

Степ, Лісостеп

06017065 НК Неома

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки нещільні, зігнуті за довжиною, вузько-яйцевидні, короткі, помірно-жовті. Трубчасті квітки жовті. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик маленький, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 30,8 ц/га, в зоні Лісостепу 29,4 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,6%, білку 16,7 - 17,5%. Вихід олії 1477 - 1588 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Степ, Лісостеп

06017067 НК Армоні

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, зігнуті за довжиною, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки жовті. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 33,9 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,5 ц/га, до національного стандарту 2,8 ц/га; в умовах Лісостепу 30,9 ц/га, гарантована прибавка до національного стандарту 1,2 ц/га. Вміст жиру 50,4 - 51,8%, білку 15,6 - 16,4%. Вихід олії 1670 - 1864 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами і пошкодження шкідниками незначне.

Степ, Лісостеп

® 06017074 НС Сумо 2017

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого.

Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 26,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,4 ц/га; в зоні Лісостепу 28,0 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,7 %, білку 16,4 - 17,0 %. Вихід олії 1492 - 1514 кг/га. Гібрид стійкий до гербіцидів групи IMI, відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

® 06017077 НС Сумо 2019 — Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з помірною пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з великими вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Лісостепу становила 29,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,0 ц/га, до національних стандартів 3,7 ц/га. Вміст жиру 49,5%, білку 15,5%. Вихід олії 1429 кг/га. Гібрид стійкий до гербіцидів групи IMI, відносно стійкий проти вилягання та посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

® 06017078 НС Сумо 2018 — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика обернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 28,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,5 ц/га; в зоні Лісостепу 27,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,9 ц/га. Вміст жиру 49,8 -

50,2 %, білку 16,5 - 17,1%. Вихід олії 1344 - 1568 кг/га. Гібрид стійкий до гербіцидів групи IMI; відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

® 07017043 НС-Х-2063

Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок малий, помірного зеленого кольору помірною пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі сильно увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з великими вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким □викривленням стебла. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 30,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,5 ц/га, до національних стандартів 5,6 ц/га. Вміст жиру 49,1%, білку 17,2%. Вихід олії 1376 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017044 НС-Х-6042

Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - слабка. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Лісостепу 25,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 5,3 ц/га, що дорівнює 20,5 %. Вміст жиру 49,0 %, білку 16,6 %. Вихід олії 1294 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017045 НС-Х-6046

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з помірною пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена,але й чітко округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок)

злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,0 ц/га; в зоні Лісостепу 28,6 ц/га, гарантована прибавка 8,1 ц/га. Вміст жиру 49,6 - 50,5 %, білку 16,5%. Вихід олії 1452 - 1505 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

05017089 Оллімі — Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю сильна. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю та вушками, грубими зубцями. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором сіра, смугастість на краях та між краями сім'янки - відсутня.

Ранньостиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в умовах Степу 25,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в умовах Лісостепу 25,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,6 ц/га. Вміст жиру 49,5 - 50,0%, олеїнової кислоти 77,4%, білку 16,2 - 16,6%. Вихід олії 1350 - 1423 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне. Стійкий до гербіцидів групи IMI.

06017076 Оливер — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з середнім аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута та формою верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Язичкові квітки середньої щільності, широко-яйцевидні, плоскі, короткі, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик за розміром середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність становила в зоні Степу 27,8 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,2 ц/га, національних стандартів 5,0 ц/га; в зоні Лісостепу 27,2 ц/га - гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га. Вміст жиру 50,1 - 50,6%, олеїнової кислоти 82%, білку 16,4 - 17,0%. Вихід олії 1344 - 1485 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017088 Обрая КС — Степ

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок за розміром великий із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями

та вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, за довжиною довгі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжені, верхівка довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за висотою низька, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 29,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,0 ц/га. Вміст жиру 50,7 %, білку 16,7 %. Вихід олії 1577 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017003 Політ 2

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко-увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила: в зоні Степу 24,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в зоні Лісостепу 27,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,4 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 50,5%, білку 16,0 - 16,4%. Вихід олії 1311 - 1413 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, відносно стійкий проти посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 07017025 Параізо 102 CL

Степ, Лісостеп

Заявник: Заатен-Унион Румунія Срл.

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю дуже слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, грубими зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,6 ц/га, в зоні Лісостепу 26,6 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,0 %, білку 16,7 %. Вихід олії 1387 - 1876 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; генетично стійкий до гербіцидів групи IMI. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017010 Прімі

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі сильно увігнута, форма верхівки загострена. Листок з дуже великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 27,1 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,5 ц/га, до національних стандартів 4,3 ц/га; в умовах Лісостепу 27,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,9 ц/га. Вміст жиру 48,0 -48,2 %, білку 16,5 - 17,2%. Вихід олії 1197 - 1560 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне. Стійкий до гербіцидів групи IMI.

06017023 ПР64Г47 — Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, довгі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Серед-ня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,2 ц/га, в зоні Лісостепу 27, 5 ц/га. Вміст жиру 48,8 - 49,1 %, олеїнової кислоти 86 %, білку 17,0 - 17,5 %. Вихід олії 1403 - 1410 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017074 ПАЛ - 255 — Степ

Заявник: Палента технолоджіс

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з великими вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,2 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 17,8%. Вихід олії 1378 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017075 ПАЛ - 175

Степ

Заявник: Палента технолоджіс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена,округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування в зоні Степу становила 17,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,0 ц/га. Вміст жиру 49,1 %, білку 16,7 %. Вихід олії 1432 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробу-вання незначне.

06017026 ПР64Ф66

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром зі слабкою пухирчастістю. Зубці грубі. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка загострена, крила листка слабко вираженіі, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцеполдібної форми, за положенням плоскі, короткіі за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середньої висоти, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу з прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім`янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має дуже сильну смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість дуже сильна.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 30,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,6 ц/га, до національних стандартів 5,7 ц/га; в умовах Лісостепу 33,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 4,6 ц/га, до національних стандартів 8,1 ц/га. Вміст жиру 48,7 - 49,3 %, білку 16,8 - 17,3 %. Вихід олії 1404 - 1634 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017076 ПАЛ - 035

Степ, Лісостеп

Заявник: Палента технолоджіс

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною

пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослин середня, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу разом із прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім`янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастістьвідсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,5 ц/га; в зоні Лісостепу 24,3 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 50,4 %, білку 16,3 - 16,5 %. Вихід олії 1300 - 1423 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

06017027 ПР64А15 — Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка від широкотрикутної до загостреної, крила листка відсутні або слабко виражені, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім`янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 33,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,5 ц/га, до національних стандартів 5,4 ц/га; в умовах Лісостепу 31,4 ц/га, гарантована прибавка відповідно 1,7 і 3,3 ц/га. Вміст жиру 52,2 %, білку 15,2 - 15,9 %. Вихід олії 1450 - 1786 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017077 ПАЛ - 083 — Степ, Лісостеп

Заявник: Палента технолоджіс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та за довжиною довгі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка,

смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,3 ц/га; в зоні Лісостепу 23,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,0 ц/га. Вміст жиру 49,9 %, олеїнової кислоти 86,1 %, білку 16,6 %. Вихід олії 1267 - 1430 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017078 ПАЛ - 0917 — Степ

Заявник: Палента технолоджіс

Листок середній, помірного зеленого кольору, помірною пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі сильно увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками тупий. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика нахилене. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в умовах Степу 29,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,5 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 17,7%. Вихід олії 1242 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

06017029 ПР64Е71 — Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската, форма верхівки загострена. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик за розміром середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькокояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 32,9 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,3 ц/га, до національних стандартів 5,0 ц/га; в зоні Лісостепу 31,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,6 ц/га, до національних стандартів 3,2 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 50,0%, білку 16,1 - 16,9%. Вихід олії 1324 - 1498 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017016 ПР63Г40 — Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній.

Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніших листків обгортки- чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, кошик маленький, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування в зоні Лісостепу становила 25,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 5,0 ц/га. Вміст жиру 48,0 %, білку 17,2 %. Вихід олії 1244 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017079 ПАЛ - 093 — Степ, Лісостеп

Заявник: Палента технолоджіс

Гіпокотиль з дуже слабким аноціановим забарвленням. Листок великий, помірного зеленого кольору, помірною пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки жовті. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика дуже охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, плескатої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 30,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,4 ц/га, до національних стандартів 5,5 ц/га; в умовах Лісостепу 30,1 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,2 ц/га, до національних стандартів 4,8 ц/га. Вміст жиру 48,0 - 48,5%, білку 17,1 - 17,6%. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи, стійкий до гербіцидів групи IMI. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017017 ПР64Г34 — Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю. Зубці дрібні. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка загострена, крила листка слабко виражені, вушка помірні. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослин середня, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу разом з легким викривленням стебла, за розміром маленький, форма з боку сім`янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 25,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,3 ц/га; в зоні Лісостепу 25,8 ц/га, гарантована прибавка1,6 ц/га. Вміст жиру 48,7 - 49,3 %, білку 16,9 - 17,0 %. Вихід олії 1284 - 1411 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами та пошкодження

шкідниками за період випробування незначне.

Степ

07017080 ПАЛ - 0117

Заявник: Палента технолоджіс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність в зоні Степу за час випробування становила 25,7 ц/га. Вміст жиру 50,1 %, білку 16,2 %. Вихід олії 1558 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

Степ

07017018 ПР64Г46

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка слабко виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослин середня, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу разос із прямим стеблом, за розміром маленький, форма з боку сім`янок злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування в зоні Степу становила 28,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га. Вміст жиру 49,1 %, білку 16,6 %. Вихід олії 1672 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

Степ

07017019 ПР63К83

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю сильна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, грубими зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або

дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку випробування. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,4 ц/га, до національних стандартів 4,1 ц/га. Вміст жиру 52,2 %, білку 16,1 %. Вихід олії 1580 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017020 ПР64Ф50 — Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослини середня, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу разом з прямим стеблом, за розміром великий, форма з боку сім`янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку випробування. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу та Лісостепу 30,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,2 - 5,0 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 50,0 %, білку 16,5 %. Вихід олії 1546 - 1660 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017036 Робія КС — Степ, Лісостеп

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з дуже слабкою або відсутньою пухирчатістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки-чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,2 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,9 ц/га, до національних стандартів 1,1 ц/га; в умовах Лісостепу 29,3 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,5 %, білку 17,2 - 17,4 %. Вихід олії 1514 - 1674 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 06017038 Романс — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою

пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, злека випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, тонка, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 25,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,5 ц/га; в зоні Лісостепу 27,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,6 ц/га. Вміст жиру 49,9 - 50,1%, білку 16,0 - 16,6%. Вихід олії 1364 - 1384 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами, пошкодження шкідниками незначне.

Лісостеп.

® 06017039 Рюрик

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. За період випробування середня урожайність в зоні Лісостепу становила 26,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,3 ц/га. Вміст жиру 50,0%, білку 16,2%. Вихід олії 1421 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

Степ, Лісостеп

07017055 Раут

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з помірною пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка ссильно увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,3 ц/га; в зоні Лісостепу 22,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,4

ц/га. Вміст жиру 49,4 %, білку 16,7 %, олеїнової кислоти 79, 3 - 83,6 %. Вихід олії 1320 - 1440 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017004 Регіон — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром зі слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка майже відсутні, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцеполдібної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки коротка, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини високі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім`янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, тонка чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила: в зоні Степу 26,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 0,8 ц/га, до національних стандартів 3,6 ц/га; в зоні Лісостепу 28,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га. Вміст жиру 49,9 - 50,8%, білку 16,0 - 16,2%. Вихід олії 1376 - 1454 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 07017009 PIMI 2 — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору слабкою пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з дуже великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками гострий. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою низька. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий гібрид. За період випробування середня урожайність становила: в зоні Степу 28,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,0 ц/га, до національних стандартів 5,8 ц/га; в зоні Лісостепу 28,5 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 0,6 ц/га, до національних стандартів 3,1 ц/га. Вміст жиру 48,6 - 50,4%, білку 16,2 - 16,7%. Вихід олії 1294 - 1624 кг/га. Гібрид стійкий до гербіцидів групи IMI, відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

06017041 Сорока — Степ, Лісостеп

Заявник: Науково-дослідний центр "Магроселект"

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок за розміром великий із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями

та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, довгі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га; в умовах Лісостепу 27,0 ц/га, гарантована прибавка 1,7 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 50,9 %, білку 15,8 - 16,7 %. Вихід олії 1421 - 1488 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017057 Селлор

Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжені, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 31,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,8 ц/га, до національних стандартів 3,5 ц/га; в умовах Лісостепу 29,8/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,7 ц/га. Вміст жиру 50,1 - 51,5 %, білку 15,7 - 16,4 %. Вихід олії 1644 - 1684 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017063 Сан Лука

Степ, Лісостеп

Заявник: Добружанський Сільськогосподарський Інститут

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка помірні. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослин середня, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу разом з прямим стебла, за розміром середній, форма з боку сім`янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, тонка чорного кольору. Смугастість на краях відсутня або дуже слабка, сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,7 ц/га; в зоні Лісостепу 24,6 ц/га, гарантована прибавка 4,1 ц/га. Вміст жиру 49,4 - 49,8 %, білку 16,5 - 16,8 %, вихід олії 1428 - 1512 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами та пошкодження шкідниками

за період випробування незначне.

® 08017009 Сілует — Степ, Лісостеп

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Гіпокотиль з наявним помірним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослини низькі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром маленький, форма з боку сім`янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за період випробування становила в умовах Степу 31,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 6,9 ц/га; в умовах Лісостепу 27,1 ц/га, гарантована прибавка 2,9 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 50,5%, білку 16,1 - 16,9%. Вихід олії 1406 - 1524 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання та посухи, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017035 Тунка — Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, помірною пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна . Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,9 ц/га, гарантована прибавка до національного стандарту 2,8 ц/га. Вміст жиру 48,4%, олеїнової кислоти 82%, білку 17,2%. Вихід олії 1492 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017051 Тітанік-ПР — Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжені але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене

донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плеската. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 27,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,8 ц/га. Вміст жиру 49,0%, білку 17,0 %. Вихід олії 1450 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017058 Трубіж

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, помірно жовті, веретеновидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки - чітко видовжені, але й чітко округлі , верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина низька, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 23,0 ц/га, в зоні Лісостепу 24,5 ц/га. Вміст жиру 50,7%, білку 16,5%. Вихід олії 1344 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробання незначне.

06017073 Федот

Степ, Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агропромислова фірма "Еліта Дона"

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик за розміром середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, тонка, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий гібрид на стерильній основі. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 23,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,0 ц/га; в зоні Лісостепу 26,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,7 ц/га. Вміст жиру 50,9 - 51,2 %, білку 15,3 - 15,7%. Вихід олії 1363 - 1408 кг/га. Гібрид стійкий до полягання та посухи, відносно стійкий до ураження хворобами.

07017085 Фушія КЛ

Степ

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Гіпокотиль з слабкою інтенсивністю аноціанового забарвлення. Листок за розміром середній, помірного зеленого кольору з слабкою

пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин) на рівні. Стебло опушеність верхівки (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності. Язичкові квітки вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Продукування пилкунаявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня. Зовнішні листки обгортки з помірним зеленим кольором зовнішнього боку. Зовнішні листки обгортки положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній. Форма кошику з боку сім'янок злегка випукла. Сім'янка за розміром середня, вузькояйцеподібна. Сім'янка середня, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 31,9 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,5 ц/га, до національного 0,8 ц/га. Вміст жиру 48,3%, білку 17,1%. Вихід олії 1429 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017054 ЦОДТ5210 — Степ, Лісостеп

Заявник: Дікманн ГмбХ і Ко. КГ

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,0 ц/га; в зоні Лісостепу 26,8 ц/га, гарантована прибавка 0,9 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,6 %, білку 16,4 - 16,6 %. Вихід олії 1351 - 1628 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 06017075 Яніна — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням.Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута та формою верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна,тонка, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,1 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,1 ц/га, да національних стандартів 4,2 ц/а; в зоні Лісостепу 29,4 ц/га - гарантована прибавка до умовного стандарту 1,4 ц/га, до національних стандартів 4,1 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,7%, білку 15,7 - 16,9 %. Вихід олії 1483 - 1519 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Соя

07018008 Антарес

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Ідентифікаційний опис. Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотиля, сірим опушенням, параметрами висоти від середньої до високої, мають ін детермінантний тип росту, середній ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середні час початку цвітіння та достигання та з відсутнім опаданням листя.

- Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.
- Листок – темно-зеленого кольору та зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має заокруглену форму верхівки.
- Забарвлення квітки – фіолетове.
- Біб має середні параметри довжини та ширини, серповидну форму. Забарвлення бобу – світле.
- Насінина – округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.
- Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.
Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 18,6 ц/га, Лісостепу – 19,8 ц/га, Полісся – 17,4 ц/га. Вміст жиру відповідно – 18,5; 18,8; 19,1%. Вміст білку відповідно – 40,0; 40,2; 38,0%.
Висота прикріплення нижнього бобу у межах 12-19 см. Маса 1000 насінин – 102,5-153,0 г.
Середньостійкий до вилягання. Стійкий до осипання та посухи.

® 06018008 Антошка

Степ

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Висота рослин сорту знаходиться в межах від середньої до високої (91-110 см) та мають проміжний тип росту, сіре опушенням, середній ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середній час початку цвітіння і середній достигання з наявним опадання листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм), має середню кількістю вузлів 10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок великий за розміром, ланцетовидної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка має біле забарвлення віночка. Біб світлого кольору, має серповидну форму та середні показники і довжини (40,1-50,0 мм), і ширини (9,1-12,0 мм).

Насінина овальої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та жовтим забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми без вічком на ньому і без малюнка (смужок) навколо нього.

Маса 1000 зерен – середня (131-190 г).

Напрям використання – зерновий.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 19,9 ц/га з вмістом жиру 18,2%, білку – 42,6%.
Висота прикріплення нижнього бобу – 14,8 см. Маса 1000 насінин – 149,2 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

® 06018009 Анастасія — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту з проміжним типом росту, відсутнім або дуже слабким ступенем завивання, мають висоту від середньої до високої (91- 110 см), сіре опушення, напівстиснуту форму куща.

Час початку цвітіння від дуже раннього до раннього, а час достигання - ранній з наявним опадання листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм), має середню кількістю вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, ланцетної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світлого кольору, серповидної формуи та має середню довжину (40,1-50,0 мм), вузький (менше 9 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та має жовтого кольору рубчик лінійної форми з відсутнім вічком.

Насіння за масою 1000 зерен – дрібне (менше 130 г).

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 20,4 ц/га, Лісостепу – 24,4 ц/га, Полісся – 20,1 ц/га з вмістом жиру відповідно 20,8; 21,2 і 22,4%, білку – 38,5; 37,4 і 34,8%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 10,4-15,1 см. Маса 1000 насінин – 120,6-136,6 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018005 Богеміанс — Степ, Полісся

Заявник: Семенсес Прогрейн ІНК

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотиля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранній час початку цвітіння та ранній достигання з відсутнім опаданням листя.

□Стебло з малою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

□Листок – помірно-зеленого кольору та з відсутньою або буже слабкою пухирчастостю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокреглену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – фіолетове.

□Біб середньої довжини та вузький, прямої форми. Забарвлення бобу – світло-коричневе.

□Насінина – округло-випуклої форми з основним світло-коричневим забарвленням оболонки. Рубчик насінини жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2007-209) у зоні Степу – 20,3 ц/га, Поліссі – 19,9 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,9; 22,1%. Вміст білку відповідно – 38,2; 35,2%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 10-13 см. Стійкий до посухи, осипання та вилягання.

® 06018012 Вінні — Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Висота рослин знаходиться в межах від низької до середньої (51-70 см). Рослини мають детермінантний тип росту з жовто-коричневим опушенням, ступенем завивання стебла відсутнім або дуже слабким, напівстиснуту форму куща, час і початку цвітіння, і час достигання знаходяться в межах від дуже раннього до ранньо з наявним опадання листя.

Стебло нефасційоване, тонке (менше 7,0 мм), має середню кількістю вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальний із загосреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має серповидну форму, середній за довжиною (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та темно-коричневим забарвленням рубчика.

Рубчик клиновидної форми без вічка на ньому та з малюнком (смужками) навколо нього.

Маса 1000 зерен – середня (131- 190 г).

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 18,5 ц/га, Лісостепу – 22,0 ц/га, з вмістом жиру відповідно 19,1 і 21,0%, білку – 40,5 і 39,2%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 10,8-12,9 см. Маса 1000 насінин – 138,6-141,7 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

Степ

® 06018013 Вежа

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Висота рослин сорту - середня (71-90 см). Рослини проміжного типу росту, з сірим опушенням, ступенем завивання стебла відсутнім або дуже слабким з напівстиснутою формою куща. Час і початку цвітіння, і час достигання знаходиться в межах від дуже раннього до ранньо з наявним опадання листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0 - 12,0 мм), має середню кількістю вузлів (10-15 шт.). Листок світло- зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, клиновидний із загосреною формою верхівки.

Квітка має біле забарвлення віночка. Біб світлого кольору, має слабкозігнуту форму , середньої довжини (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та світло-коричневим забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми з наявним вічком на ньому та з малюнком (смужками) навколо нього.

Маса 1000 зерен – велика (більше 190 г).

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 19,4 ц/га з вмістом жиру 20,2%, білку – 39,8%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 11,5 см. Маса 1000 насінин – 169,6 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

Степ

06018007 Георгіна

Заявник: Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотиля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабке завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середній час початку цвітіння та середньопізній достигання з наявним опаданням листя.

- Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.
- Листок – помірно-зеленого кольору з помірною ступінню пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має

заокруглену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – біле.

□Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозігнуту форму верхівки. Забарвлення бобу – коричневе.

□Насінина – овальної форми з основним жовто-зеленим забарвленням оболонки. Рубчик насінини чорного кольору, овальної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 18,1 ц/га з вмістом жиру 18,4%, білку – 42,9%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 13,5 см.

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, середньостійкий до посухи.

07018015 Десна — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотиля, жовто-коричневим опушенням, з параметрами висоти від низької до середньої, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, ранні час початку цвітіння та середньоранній достигання з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має загострену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – фіолетове.

□Біб середньої довжини та вузький, слабозігнутої форми. Забарвлення бобу – світло-коричневе.

□Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,2 ц/га, Лісостепу – 21,8 ц/га, Полісся – 21,8 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,7; 21,0; 21,2%. Вміст білку відповідно – 39,9; 38,8; 37,3%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-12 см. Маса 1000 насінин – 147,5-189,5 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

® 06018010 Данко — Степ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту мають висоту від середньої до високої (91-110 см), проміжний тип росту та жовто-коричневе опушенням, слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середньо-ранній час початку і цвітіння, і достигання з наявним опадання листя.

Стебло нефасційоване, тонке (менше 7,0 мм), має середню кількістю вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості.. Середній листочок середній за розміром, овальної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має слабкозігнуту форму, середні показники довжини (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та частково чорним забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми з наявним вічком та відсутнім малюнком біля нього.

Маса 1000 зерен – середня (131-190 г).

Напрям використання – зерновий.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 24,4 ц/га з вмістом жиру 19,6%, білку – 41,6%.
Висота прикріплення нижнього бобу – 14,1 см. Маса 1000 насінин – 146,2 г.
Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018016 Либідь

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотиля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, ранні час початку цвітіння та достигання та з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

□Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – фіолетове.

□Біб середньої довжини, вузький, має слабозігнуту форму. Забарвлення бобу – світле.

□Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини чорного кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.
Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 23,4 ц/га, Лісостепу – 25,3 ц/га, Полісся – 23,0 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,3; 20,8; 21,8%. Вміст білку відповідно – 40,0; 39,2; 36,6%.
Висота прикріплення нижнього бобу у межах 11-12 см. Маса 1000 насінин – 157,2-180,8 г.
Стійкий до вилягання, осипання, посухи.

07018017 Лариса

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотиля, жовто-коричневим опушенням, з параметрами висоти від низької до середньої, мають індетермінантний тип росту, відсутнє або дуже слабке завивання стебла, стиснуту форму куща, ранній час початку цвітіння та від дуже раннього до раннього – достигання з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□Листок – помірно-зеленого кольору зі слабкою пухирчастістю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – біле.

□Біб середньої довжини та вузький, слабкозігнутої форми. Забарвлення бобу – світле.

□Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини чорного кольору, клиновидної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□Насіння за масою 1000 зерен – дрібне.

Напрям використання – зерновий.
Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 18,7 ц/га, Лісостепу – 21,5 ц/га, Полісся – 21,3 ц/га. Вміст жиру

відповідно – 20,8; 21,2; 21,9%. Вміст білку відповідно – 39,9; 38,3; 37,1%.
Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-14 см. Маса 1000 насінин – 149,0-201,4 г.
Стійкий до вилягання та осипання. Середньостійкий до посухи.

07018001 ПВС 008 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сіркл Сі Сідс Інк.

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотиля, сірим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабке завивання стебла, проміжну форму куща, ранній час і початку цвітіння, і достигання з наявним опаданням листя.

- Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.
- Листок – помірно-зеленого кольору зі помірною пухирчастістю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.
- Забарвлення квітки – біле.
- Біб середньої довжини та вузький, слабкозігнутої форми. Забарвлення бобу – світло-коричневе.
- Насінина – округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.
- Насіння за масою 1000 зерен – середнє.

Напрям використання – зерновий.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 22,2 ц/га, Лісостепу – 23,6 ц/га, Полісся – 21,6 ц/га з вмістом жиру відповідно 20,3%, 21,4% і 21,6%, білку – 38,4%, 37,9% і 35,4%.
Висота прикріплення нижнього бобу – 10,8-14,1 см.
Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018003 Спонсор — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль у рослин сорту без антоціанового забарвлення. Висота рослин знаходиться в межах від середньої до високої (91-110 см). Рослини мають проміжний тип росту з жовто-коричневим опушенням, середнім ступенем завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середньопізній час початку цвітіння і середній час достигання з наявним опадання листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм), з середньою кількістю вузлів (10-15 шт.). Листок зеленого кольору від помірної до темної інтенсивності його прояву та ступенем пухирчастості від відсутньої або дуже слабкої до слабкої. Середній листочок великий за розміром, овальний із загостреною формою верхівки.

Квітка має біле забарвлення віночка. Біб темно-коричневого кольору, прямий за формою, короткий за довжиною (менше 40,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та темно-коричневим забарвленням рубчика.

Рубчик овальної форми без вічка на ньому.

Маса 1000 зерен – середня (131- 190 г).

Напрям використання – зерновий.
Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,2 ц/га, Лісостепу – 21,8 ц/га, Полісся – 21,8 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,7; 21,0; 21,2%. Вміст білку відповідно – 39,9; 38,8; 37,3%.
Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-12 см. Маса 1000 насінин – 147,5-189,5 г.
Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

® 07018009 Срібна Рута

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотиля, сірим опушенням, середньої висоти, мають детермінантний тип росту, середню ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середньоранні час початку цвітіння та достигання з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

□Листок – помірно-зеленого кольору зі слабкою ступінню пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, широкояйцевидний та має заокруглену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – біле.

□Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозігнуту форму. Забарвлення бобу – сіре.

□Насінина – округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також жовтого кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.
Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,6 ц/га, Лісостепу – 19,2 ц/га, Полісся – 19,2 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,0; 20,4; 20,6%. Вміст білку відповідно – 38,8; 38,9; 36,5%.
Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-13 см. Маса 1000 насінин – 130,1-155,8 г.
Середньостійкий до вилягання. Стійкий до посухи та осипання.

® 07018010 Смуглянка

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотиля, жовто-коричневим опушенням, високі, мають індетермінантний тип росту, середню ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранні час початку цвітіння та достигання та з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□Листок – помірно-зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має загострену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – біле.

□Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозігнуту форму. Забарвлення бобу – темно-коричневе.

□Насінина – овальної форми з основним жовто-зеленим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.
Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,4 ц/га, Лісостепу – 22,4 ц/га, Полісся – 21,5 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,4; 20,6; 20,8%. Вміст білку відповідно – 39,0; 38,8; 36,7%.
Висота прикріплення нижнього бобу у межах 13-22 см. Маса 1000 насінин – 121,9-167,8 г.
Середньостійкий до посухи. Стійкий до осипання та вилягання.

® 07018012 Сузір'я

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотиля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають детермінантний тип росту, відсутнє або дуже слабке завивання стебла, стиснуту форму куща, ранні час початку цвітіння та достигання з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□Листок – помірно-зеленого кольору з помірною ступінню пухирчастості. Середній листочок за розміром – малий, клиновидний та має загострену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – фіолетове.

□Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозігнуту форму верхівки. Забарвлення бобу – коричневе.

□Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 17,7 ц/га, Лісостепу – 21,8 ц/га, Полісся – 20,5 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,4; 19,9; 20,6%. Вміст білку відповідно – 41,0; 39,7; 37,5%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 10-14 см. Маса 1000 насінин – 134,5-165,6 г.

Стійкий до вилягання та осипання. Середньостійкий до посухи.

® 06018011 Сяйво — Степ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту з проміжним типом росту та слабким ступенем завивання, мають середню висоту (71-90 см), жовто-коричневе опушення та проміжну форму куща. Час початку цвітіння середній, а час достигання - середньопізній з наявним опадання листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм) з середньою кількістю вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середнй за розміром, овальної форми із заокругленою формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має пряму форму та коротку довжину (менше 40 мм), вузький (менше 9 мм).

Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки та має темно-коричневого кольору рубчик овальної форми з наявним вічком на ньому та без малюнка (смужок) біля нього.

Насіння за масою 1000 зерен –середнє (131-190 г).

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 24,1 ц/га з вмістом жиру 20,4%, білку – 39,4%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 17,2 см. Маса 1000 насінин – 153,2 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018018 Фортуна — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотиля, сірим опушенням, з параметрами висоти від середньої до високої, мають проміжний тип росту, відсутнє або дуже слабке завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середній час і початку цвітіння, і достигання – достигання з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□Листок – помірно-зеленого кольору зі слабкою пухирчастостю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має

заокруглену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – фіолетове.

□Біб середньої довжини та вузький, слабкозігнутої форми. Забарвлення бобу – світле.

□Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□Насіння за масою 1000 зерен – середнє.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,5 ц/га, Лісостепу – 21,7 ц/га, Полісся – 22,6 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,3; 19,5; 19,8%. Вміст білку відповідно – 40,8; 39,8; 37,7%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 12-18 см. Маса 1000 насінин – 126,9-168,3 г.

Стійкий до вилягання та осипання. Середньостійкий до посухи.

07018006 Хуторяночка

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотиля, сірим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабку ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранні час початку цвітіння та достигання та з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□Листок – помірно-зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має загострену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – фіолетове.

□Біб має середні параметри довжини та ширини, серповидну форму. Забарвлення бобу – світле.

□Насінина – округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,9 ц/га, Лісостепу – 22,5 ц/га, Полісся – 19,6 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,2; 19,5; 20,6%. Вміст білку відповідно – 40,0; 39,1; 36,9%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 11-16 см. Маса 1000 насінин – 134,5-151,7 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

07018014 Черемош

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотиля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, ранні час початку цвітіння та достигання з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має загострену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – фіолетове.

□Біб короткий та вузький, слабозігнутої форми. Забарвлення бобу – світло-коричневе.

Насінина – овально-видовженої форми з основним світло-коричневим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 22,6 ц/га, Лісостепу – 22,5 ц/га, Полісся – 21,5 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,7; 20,5; 20,6%. Вміст білку відповідно – 39,8; 38,9; 38,4%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 10-12 см. Маса 1000 насінин – 164,1-187,5 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

Ріпак озимий

07016030 Ексел — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - вузька, за довжиною - коротка. Зубчастість краю листка помірна. Листок короткий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 36,5 ц/га, Лісостепу – 38,5 ц/га, Полісся – 34,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 45,6-45,8%, білку – в межах 20,1-22,7%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,8%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,9; посухи – 8,4-9,0; осипання – 6,9-7,4 бала.

Зимостійкість – в межах 7,9-8,8 бала.

06016025 Астрада — Лісостеп

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з великою кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 36,9 ц/га. Вміст жиру – 44,4%, білку – 22,9%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,5%.

Стійкість до вилягання – 8,5; посухи –8,5; осипання –7,5 бала.

Зимостійкість – 8,2 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 9,0 балів.

07016017 Абакус — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з великою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 37,9 ц/га, Лісостепу – 36,6 ц/га, Полісся – 30,82 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,4-44,8%, білку – в межах 23,0-24,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,9; посухи – 7,7-8,6; осипання – 6,7-7,0 бала.

Зимостійкість – в межах 7,3-8,7 бала.

07016020 Аплаус

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Селген, а.с.

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 28,3 ц/га, Лісостепу – 31,6 ц/га, Полісся – 26,6 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,4-44,6%, білку – в межах 22,4-23,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,3-8,9; посухи – 8,7-8,9; осипання – 6,5-7,4 бала.
Зимостійкість – в межах 8,2-8,7 бала.

® 07016035 Брентано

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 28,3 ц/га, Лісостепу – 37,5 ц/га, Полісся – 28,9 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-44,1%, білку – в межах 22,8-23,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,0-8,9; посухи – 8,4-8,7; осипання – 7,0-7,1 бала.
Зимостійкість – в межах 8,1-8,6 бала.

® 07016039 Багіра

Лісостеп, Полісся

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Ранній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 41,0 ц/га, Полісся – 28,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,1%, білку – 22,5-22,7%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,6; посухи – 8,4-8,6; осипання – 7,0-7,8 бала.
Зимостійкість – в межах 7,9-8,6 бала.

® 07016041 Белана

Лісостеп, Полісся

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з великою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Ранній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 39,0 ц/га, Полісся – 28,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,1%, білку – 23,0-23,9%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,0-8,9; посухи – 8,6; осипання – 6,9-8,2 бала.

Зимостійкість – в межах 8,4-8,7 бала.

07016018 Вісбі — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 30,5 ц/га, Лісостепу – 33,9 ц/га, Полісся – 32,6 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,7-45,0%, білку – в межах 20,0-23,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,9-9,0; посухи – 8,2-9,0; осипання – 7,0-7,4 бала.
Зимостійкість – в межах 6,9-8,7 бала.

06016027 Геркулес — Лісостеп

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини і широка. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини, часток багато Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 38,8 ц/га. Вміст жиру – 44,9%, білку – 22,3%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,5%.
Стійкість до вилягання – 8,5; посухи –8,5; осипання –8,0 балів.
Зимостійкість – 8,3 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 9,0 балів.

07016031 ДК Секвоя — Лісостеп

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широкий, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка сильна. Листок середній з великою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 36,6 ц/га. Вміст жиру – 44,5%, білку – 22,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 9,0; посухи – 8,3; осипання – 7,4 бала.
Зимостійкість – 8,7 бала.

07016033 ДК Ексепт — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довгий. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 36,6 ц/га, Лісостепу – 33,8 ц/га, Полісся – 29,3 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-45,0%, білку – в межах 22,3-23,4%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,0-8,9; посухи – 8,6-8,8; осипання – 6,5-7,5 бала.
Зимостійкість – в межах 7,9-8,8 бала.

07016034 ДК Екстрейн

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довгий. Зубчастість краю листка сильна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 33,1 ц/га, Лісостепу – 32,6 ц/га, Полісся – 27,5 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,3%, білку – в межах 22,6-24,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи – 8,5-8,8; осипання – 7,0-7,4 бала.
Зимостійкість – в межах 7,5-8,8 бала.

06016019 ДК Серенада

Степ, Лісостеп

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 32,9 ц/га, Лісостепу – 38,3 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,6-44,7%, білку – в межах 22,2-24,0%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,7-0,8%.
Стійкість до вилягання – 8,3-8,8; посухи – 8,3-8,4; осипання – 7,1-7,7 бала.
Зимостійкість – в межах 7,0-8,4 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,8-9,0 балів.

06016020 ДК Секюр

Степ, Лісостеп

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середня кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 31,3 ц/га, Лісостепу – 39,1 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,4-43,8%, білку – в межах 23,1-24,2%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,8%.
Стійкість до вилягання – 8,7-8,8; посухи – 8,1-8,3; осипання – 6,5-7,4 бала.
Зимостійкість – в межах 6,8-8,4 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом –9,0; бактеріозом –9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,7-9,0 балів.

06016018 Екзотік

Степ, Лісостеп

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середня кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною

короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 31,4 ц/га, Лісостепу – 35,6 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,4-44,0%, білку – в межах 22,6-24,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,7-0,9%.
Стійкість до вилягання – 7,9-8,6; посухи – 8,3-8,5; осипання – 6,6-7,5 бала.
Зимостійкість – в межах 6,3-8,5 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,8-9,0 балів.

06016021 Екстенд — Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби помірна.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 36,5 ц/га, Полісся – 34,1 ц/га. Вміст жиру – 43,8%, білку – 23,2%. Вміст ерукової кислоти – 0,2%, глюкозинолатів – 0,8%.
Стійкість до вилягання – 8,7-8,8; посухи – 8,4-8,5; осипання – 6,9-7,5 бала.
Зимостійкість – в межах 8,4-8,6 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом –9,0; бактеріозом –9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,4-8,7 бала.

06016022 Емблем — Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна , листок середньої довжини і ширини, середня кількість часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 36,1 ц/га, Лісостепу – 35,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,3-43,6%, білку – в межах 23,2-24,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,7-0,8%.
Стійкість до вилягання – 8,5-8,8; посухи – 8,4; осипання – 7,1-7,5 бала.
Зимостійкість – в межах 6,6-8,4 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,6-8,8 бала.

06016023 ЕС Артіст — Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна , листок середньої довжини і ширини, середня кількість часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 33,1 ц/га, Лісостепу – 37,1 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,2-44,0%, білку – в межах 22,0-24,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,2%, глюкозинолатів – 0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,1-8,5; посухи – 8,1-8,4; осипання – 7,1-7,5 бала.
Зимостійкість – в межах 6,4-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,4-8,6 бала.

Полісся

07016008 ЕС Аліас

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довгий. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Полісся – 29,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,5%, білку – в межах 23,0-24,1%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 9,0; посухи – 8,6; осипання – 6,9 бала.
Зимостійкість – 8,8 бала.

Лісостеп, Полісся

07016009 ЕС Нептун

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок великий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Пізній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 32,4 ц/га, Полісся – 29,0 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,4-44,8%, білку – 24,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,8%.
Стійкість до вилягання – 9,0; посухи – 8,3-8,6; осипання – 6,9-7,0 балів.
Зимостійкість – в межах 8,1-8,8 бала.

Степ, Лісостеп, Полісся

06016038 Клеопатра

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довгий. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 28,9 ц/га, Лісостепу – 32,3 ц/га, Полісся – 31,9 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,5-44,7%, білку – в межах 22,6-24,0%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,6-8,9; посухи – 8,3-8,7; осипання – 6,7-7,0 балів.
Зимостійкість – в межах 7,5-8,7 бала

Степ, Лісостеп, Полісся

06016043 Ладога

Заявник: Лімагрейн Юроп

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній.Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 29,3 ц/га, Лісостепу – 33,6 ц/га, Полісся – 29,4 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,7-45,4%, білку – в межах 20,5-22,8%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,8-9,0; посухи – 8,1-8,7; осипання – 7,0-7,4 бала.
Зимостійкість – в межах 7,8-8,7 бала.

® 07016043 Мерано — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 30,6 ц/га, Лісостепу – 39,3 ц/га, Полісся – 29,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,8-44,6%, білку – в межах 21,1-23,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,3-8,9; посухи – 8,0-8,6; осипання – 7,0-8,2 бала.
Зимостійкість – в межах 7,5-8,6 бала.

06016044 Манітоба — Лісостеп, Полісся

Заявник: Лімагрейн Юроп

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка слабка. Листок короткий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 34,3 ц/га, Полісся – 31,3 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,4-44,5%, білку – в межах 21,3-23,3%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,9-9,0; посухи – 8,4-8,6; осипання – 7,0-7,5 бала.
Зимостійкість – в межах 8,4-8,8 бала.

® 06016032 ОПБН13 — Лісостеп

Заявник: Осева ПРО с.р.о.а

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середньої, за шириною широкі. Зубчастість краю листка помірна , листок середньої довжини і ширини, мала кількість часток. Довжина черешка листка середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 35,4 ц/га. Вміст жиру – 44,7%, білку – 22,2%. Вміст ерукової кислоти – 0,2%, глюкозинолатів – 0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,3; посухи –8,5; осипання –7,2 бала.
Зимостійкість – 8,6 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 9,0 балів.

07016022 ОП 02 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Осева ПРО с.р.о.а

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з малою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній.Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 27,8 ц/га, Лісостепу – 36,1 ц/га, Полісся – 24,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,7-44,8%, білку – в межах 21,8-22,7%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи 8,6-8,7; осипання – 6,6-7,5 бала.
Зимостійкість – в межах 7,0-8,7 бала.

® 07016014 Релли — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Дойче Заатфеределунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - выд середньої до довгої. Зубчастість краю листка від помірної до сильної. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина за висотою середня. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби помірна..

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 38,2 ц/га, Лісостепу – 39,2 ц/га, Полісся – 31,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,5%, білку – в межах 22,4-23,4%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,0-8,9; посухи – 8,3-8,8; осипання – 7,2-8,1 бала.
Зимостійкість – в межах 7,6-8,0 балів.

07016019 Рохан — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з великою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Дуже ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 35,3 ц/га, Лісостепу – 36,1 ц/га, Полісся – 32,4 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-45,4%, білку – в межах 21,9-24,1%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,5-0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,0-9,0; посухи – 7,8-8,6; осипання – 7,0-7,9 бала.
Зимостійкість – в межах 7,8-8,7 бала.

06016037 Снігова королева — Лісостеп, Полісся

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з малою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослини середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 37,2 ц/га, Полісся – 29,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,6-45,0%, білку – в межах 22,9-23,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,6-8,9; посухи – 8,3-8,6; осипання – 7,0 балів.
Зимостійкість – в межах 8,1-8,7 бала.

® 07016013 Сітро — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Дойче Заатфеределунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість помірна. Листок середній з середньою до великої кількісті часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина за висотою від середньої до довгої. Колір

пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Від ранього до середнього часу цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби помірна..

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 39,8 ц/га, Лісостепу – 38,0 ц/га, Полісся – 32,4 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,8%, білку – в межах 22,0-23,7%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 7,5-8,9; посухи – 8,4-8,8; осипання – 7,2-8,1 бала.
Зимостійкість – в межах 7,5-8,7 бала.

06016040 Тассіло — Лісостеп, Полісся

Заявник: KBC ЗААТ АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній.Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 33,2 ц/га, Полісся – 29,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,8-45,0%, білку – в межах 20,9-23,2%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,5-8,7; посухи – 8,4; осипання – 7,0-7,3 бала.
Зимостійкість – в межах 8,0-8,7 бала.

07016048 Труді — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Дікманн ГмбХ і Ко. КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю слабка. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина за висотою середня. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Середній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 30,7 ц/га, Лісостепу – 31,1 ц/га, Полісся – 30,0 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,9-44,2%, білку – в межах 21,0-23,2%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,3-8,8; посухи – 8,5-8,7; осипання – 6,8-7,4 бала.
Зимостійкість – в межах 7,9-8,6 бала.

® 07016046 Флеш — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Дойче Заатфеределунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка від помірної до сильної. Листок кількістю часток від середньої до великої. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Від раннього до середнього часу цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби від дуже слабкої до слабкої..

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 37,4 ц/га, Лісостепу – 39,9 ц/га, Полісся – 32,2 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-44,8%, білку – в межах 22,4-23,4%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,0-8,7; посухи – 8,1-8,8; осипання – 7,2-8,0 бала.
Зимостійкість – в межах 7,5-8,7 бала.

06016029 Фінесс — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини і ширини. Зубчастість краю листка слабка, листок середньої довжини і ширини з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 32,8 ц/га, Лісостепу – 37,5 ц/га, Полісся – 32,5 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-46,3%, білку – в межах 20,1-21,9%. Вміст ерукової кислоти –0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи – 8,3-8,8; осипання – 7,1-7,5 бала.
Зимостійкість – в межах 7,5-8,8 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,3-9,0 балів.

Лісостеп

06016033 Франкі

Заявник: Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною короткі, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна , листок короткий за довжиною і вузький за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка коротка. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий з довгим зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 36,4 ц/га. Вміст жиру – 44,0%, білку – 23,1%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,6; посухи –8,2; осипання –7,6 бала.
Зимостійкість – 8,1 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,7 бала.

Степ, Лісостеп, Полісся

07016049 Харді

Заявник: Дікманн ГмбХ і Ко. КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листоккороткий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 30,9 ц/га, Лісостепу – 31,5 ц/га, Полісся – 28,5 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,8-44,6%, білку – в межах 22,5-23,2%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,1-8,6; посухи – 7,9-8,5; осипання – 6,8-7,4 бала.
Зимостійкість – в межах 7,4-8,4 бала.

Степ, Лісостеп, Полісся

® 05016003 Хорнет

Заявник: Дойче Заатфеределунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - слабка.

Урожайність за роки випробування (2006, 2007, 2009) у зоні Степу – 39,0 ц/га, Лісостепу – 39,0 ц/га, Полісся – 34,6 ц/га. Вміст жиру – в межах 44-45%, білку – в межах 19,9-23,5%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,3%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,9%.
Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи – 8,4-9,0; осипання – 7,3-8,3 бала.
Зимостійкість – в межах 8,3-9,0 балів.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,0-9,0; бактеріозом – 8,0-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 7,0-9,0 балів.

06016015 Хенрі — Степ, Лісостеп

Заявник: Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - вузька, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок короткий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 30,5 ц/га, Лісостепу – 35,9 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,2-44,4%, білку – в межах 22,8-23,7%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,4-8,8; посухи – 8,3-8,4; осипання – 6,8-7,4 бала.
Зимостійкість – в межах 6,5-8,4 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,6-8,8 бала.

Ріпак ярий

06016039 71 20 КЛ — Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Технолоджі ЛТД

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок короткий з малою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина за висотою висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Ранній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 21,5 ц/га, Полісся – 19,2 ц/га. Вміст жиру – 44,5%. Вміст білку – 24,6%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%. Вміст глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкий до вилягання та посухи. Середньостійкий до осипання.

® 08016004 Белінда — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною довгі, за шириною широкі. Зубчастість краю листка помірна , листок середній за довжиною і вузький за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою . Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з середньою довжиною зубця. Час цвітіння пізній.

Урожайність за роки випробування (2008-2009) у зоні Степу – 15,9 ц/га, Лісостепу – 24,3 ц/га, Полісся – 22,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 45,0-45,3%, білку – в межах 24,2-25,8%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,5-0,6%.
Стійкість до вилягання – в межах 8,3-9,0; посухи – в межах 6,4-8,3; осипання – в межах 6,9-8,3 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 7,8-9,0 балів.

06016046 Делайт — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середні, за шириною вузькі. Зубчастість краю листка слабка , листок середній за

довжиною і середній за шириною, мала кількість часток. Довжина черешка листка короткий. Рослина коротка за висотою . Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з середнім зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 18,5 ц/га, Лісостепу – 24,0 ц/га, Полісся – 22,1 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,4-45,0%, білку – в межах 23,3-24,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.
Стійкість до вилягання – в межах 8,3-9,0; посухи – в межах 7,8-8,2; осипання – в межах 7,2-8,3 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – в межах 8,3-9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,8-9,0 балів.

07016099 Ерлібьорд

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Маїсадур Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгиц. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 17,4 ц/га, Лісостепу – 20,9 ц/га, Полісся – 20,3 ц/га. Вміст жиру – у межах 44-45%. Вміст білку – 24-26%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%. Вміст глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкий до вилягання. Середньостійкий до посухи та осипання.

® 07016059 ЕС Катя

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середні, за довжиною - середні. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина висока . Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 15,9 ц/га, Лісостепу – 19,8 ц/га, Полісся – 17,6 ц/га. Вміст жиру – 45%. Вміст білку – у межах 23-25%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%. Вміст глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкий до вилягання. Середньостійкий до посухи та осипання.

® 06016041 Зоня КЛ

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середні, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна , листок середній за довжиною і середній за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою . Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з коротким зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 16,7 ц/га, Лісостепу – 22,6 ц/га, Полісся – 21,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,5-44,9%, білку – в межах 23,8-25,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,5-0,7%.
Стійкість до вилягання – в межах 8,0-9,0; посухи – в межах 7,7-8,2; осипання – в межах 7,2-8,2 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,3-9,0 балів.

07016055 Калібр

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - коротка. Рослина довга. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок короткий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 13,2 ц/га, Лісостепу – 18,1 ц/га, Полісся – 13,9 ц/га. Вміст жиру – у межах 44-45%. Вміст білку – 24-26%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%. Вміст глюкозинолатів – 0,5-0,6%.
Стійкий до вилягання. Середньостійкий до посухи та осипання.

06016047 Ларісса — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною короткі, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна , листок середній за довжиною і середній за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою . Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з середнім зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 16,0 ц/га, Лісостепу – 22,4 ц/га, Полісся – 20,5 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,6-45,6%, білку – в межах 23,2-24,3%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,4-0,6%.
Стійкість до вилягання – в межах 8,3-9,0; посухи – в межах 6,9-8,3; осипання – в межах 7,0-8,6 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0 балів; бактеріозом – в межах 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,6-9,0 балів.

® 08016006 Мірко КЛ — Лісостеп, Полісся

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середні, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна , листок середній за довжиною і середній за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою . Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок короткий за довжиною з довгим зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2008-2009) у зоні Лісостепу – 21,4 ц/га, Полісся – 20,6 ц/га. Вміст жиру – в межах 45,1-45,3%, білку – в межах 24,6-25,4%. Вміст ерукової кислоти –0,1%, глюкозинолатів – 0,5-0,6%.
Стійкість до вилягання – в межах 8,3-8,4; посухи – в межах 8,0-8,2; осипання – в межах 6,9-7,0 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 9,0 балів.

06016045 ПР45Г73 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння.Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - дуже сильна.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 15,0 ц/га, Лісостепу – 21,7 ц/га, Полісся – 21,5 ц/га. Вміст жиру – у межах 44,7-45,2%. Вміст білку – у межах 23,0-24,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%. Вміст глюкозинолатів – 0,6-0,7%.
Стійкий до вилягання та посухи. Середньостійкий до осипання.

06016050 ПР45Г72 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина за повного цвітіння висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній.Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - дуже сильна..

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 15,0 ц/га, Лісостепу – 20,4 ц/га, Полісся – 20,3 ц/га. Вміст жиру – у межах 44,5-45,2%. Вміст білку – у межах 22,5-25,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%. Вміст глюкозинолатів – 0,6-0,7%. Стійкий до вилягання. Середньостійкий до осипання та посухи.

® 06016042 Сальса КЛ

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середні, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна , листок середній за довжиною і середній за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою . Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з коротким зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 14,3 ц/га, Лісостепу – 20,9 ц/га, Полісся – 21,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,6-45,9%, білку – в межах 23,8-25,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6-0,7%.
Стійкість до вилягання – в межах 8,3-9,0; посухи – в межах 6,6-8,3; осипання – в межах 7,2-8,3 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,3-9,0 балів.

Гірчиця сарептська

® 09144001 Ельвіра

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: ТОВ "Науково-дослідне виробниче аграрне підприємство "Українська гірчиця"

Ерукова кислота в насінні відсутня, ефірність насіння висока (понад 0,6 %), забарвлення насіння жовте, маса 1000 насінин велика, сім'ядолі зелені за кольором. Нижній листок за розміром пластинки великий, за формою – еліптичний, за фор
мою краю та розсіченістю листкової пластинки зубчастий. Верхній листок за краєм листкової пластинки зубчастий. Опу
шеність листка відсутня, справжній листок темно-зеленого кольору, восковий наліт на листку відсутній. Рослина за висо
тою висока, за кольором стебла – зелена, восковий наліт на стеблі відсутній. Форма суцвіття китиця, забарвлення пелюсток квітки золотисто-жовті, стручок короткий за довжиною, за довжиною зубця – короткий, за тривалістю вегетаційного періоду сорт пізньостиглий.

За даними заявника урожайність 30,0 ц/га, вміст ефірної олії 46 %, вміст ерукової кислоти 2,0 %, ураження пероноспорозом 2 %.

® 09144002 Іріда

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: ТОВ "Науково-дослідне виробниче аграрне підприємство "Українська гірчиця"

Ерукова кислота в насінні відсутня, ефірність насіння висока (понад 0,6 %), забарвлення темно-коричневе, маса 1000 насінин велика, сім'ядолі зелені за кольором. Нижній листок за розміром пластинки великий, за формою – ліровидний, за формою краю та розсіченістю листкової пластинки зубчастий. Верхній листок за краєм листкової пластинки зубчастий. Опушеність листка відсутня, справжній листок зеленого кольору, восковий наліт на листку відсутній. Рослина середня за

висотою, за кольором стебла – зелена, восковий наліт на стеблі відсутній. Форма суцвіття китиця, забарвлення пелюсток квітки блідо-жовті, стручок довгий за довжиною, за довжиною зубця – короткий, за тривалістю вегетаційного періоду сорт скоростиглий.

За даними заявника урожайність 2,5 ц/га, вміст ефірної олії 45 %, вміст ерукової кислоти 1,0 %, ураження переноспорозом 2 %.

Гірчиця біла

® 08092002 Запоріжанка — Зона вирощування: Лісостеп.

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Рослина за висотою (під час цвітіння) із середньої до високої, за загальною довжиною – довга, інтенсивність зеленого забарвлення листка помірна, кількість часток листка (за повного розвитку) - середня, зубчатість краю листка - помірна, довжина черешка листка довга, листок за шириною - широкий, за довжиною - довгий, час цвітіння середній, інтенсивність жовтого забарвлення пелюсток квітки світла, довжина пелюсток квітки довга, ширина від середньої до широкої, стручок за довжиною середній, стручок - довжина гачка - середній, довжина ніжки стручка середня, кількість насінин у стручку середня, маса 1000 насінин велика, сім'ядоля за довжиною від середньої до довгої, за шириною – широка, ерукова кислота в насінні наявна. Диплоїд.

За даними заявника урожайність насіння (за 12% вологості) 2,0 т/га, вміст глюкозинолатів 25 мколь, вміст олії 30 %, вміст ерукової кислоти 7,0 %. Стійкість до бактеріозу та переноспорозу висока (по 7 балів), стійкість до квіткогризу 9 балів, стійкість до ураження пильщиком і жуком-блішкою по 7 балів. Напрям використання - на насіння, фураж і сидерати.

09092002 Ослава — Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Рослина за висотою (під час цвітіння) висока, інтенсивність зеленого забарвлення листка помірна, кількість часток листка (за повного розвитку) - середня, зубчатість краю листка - помірна, довжина черешка листка довга, листок за шириною - широкий, за довжиною - довгий, час цвітіння ранній, інтенсивність жовтого забарвлення пелюсток квітки помірна, довжина і ширина пелюсток квітки середня, стручок за довжиною короткий, стручок - довжина гачка - довгий, довжина ніжки стручка середня, кількість насінин в стручку середня, маса 1000 насінин середня, сім'ядоля за довжиною середня, за шириною – середня, ерукова кислота в насінні наявна. Диплоїд.

За даними заявника урожайність насіння (за 12% вологості) 2,8 т/га, вміст білка 27,5 %, вміст глюкозинолатів 55 мколь, вміст олії 26 %, вміст ерукової кислоти 18,5 %. Стійкість до бактеріозу та переноспорозу по 1 балу, пошкодження квіткогризом і пильщиком по 3 бали, стійкість до ураження жуком-блішкою 5 балів. Напрям використання - на насіння, фураж і сидерати.

Мак снотворний

05095001 Альмадін — Зона вирощування: Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"

Опушення та білі плями листкової розетки відсутні. Стебло: діаметр розетки середній, розгалуження стебла подвоєне, за довжиною середнє, антоціанове забарвлення (між коробочкою та верхівкою стебла) відсутнє, опушеність – середня. Стеблового листок з верхньої сторони має зелений колір з жовтуватим відтінком, восковий наліт слабкий, надрізи країв стеблового листка двічі зубчасті. Пелюстка білого забарвлення з плямами у вигляді смуг фіолетового кольору, інтенсивність фіолетового забарвлення плям слабка, колір тичинки білий, розсічення пелюстки відсутнє. Час цвітіння середній. Коробочка: еліптичної форми (у

поздовжньому розрізі) із слабким восковим нальотом, за довжиною (від основи до диску приймочки) – середня, за діаметром – середня, жилкування коробочки слабке. Диск приймочки: конічної форми, кількість часток середня, поверхня часток рівна. Насіння білого кольору. Вміст наркотичних речовин в коробочці малий, вміст морфіну – низький.

За даними заявника урожайність (за стандартної вологості 13%) 1,2 т/га, урожай коробочок без насіння 0,5 т/га, середня маса коробочки без насіння 3,4 г, маса 1000 сім'янок 0,3 г, висота рослин 90 см, тривалість вегетаційного періоду 100 діб, ступінь визрівання 96 %, вирівненість 99 %. Стійкість до посухи, до осипання, вилягання – низька (по 4 бали), ураження основними хворобами та пошкодження шкідниками – 2-4 %. Вміст жиру в сухому насінні 45,0 %, вміст білку 25,3 %, вміст морфіну в коробочках 0,05 %.

05095005 Корунд

Зона вирощування: Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"

Опушення та білі плями листкової розетки відсутні. Стебло: діаметр розетки середній, розгалуження стебла потроєне, за довжиною середнє, антоціанове забарвлення (між коробочкою та верхівкою стебла) відсутнє, опушеність – слабка. Стебловий листок з верхньої сторони має зелений колір з жовтуватим відтінком, восковий наліт помірний, надрізи країв стебло вого листка двічі зубчасті. Пелюстка білого забарвлення, на пелюстках присутні плями фіолетового кольору, інтенсивність фіолетового забарвлення плям помірна, колір тичинки світло-фіолетовий, розсічення пелюстки відсутнє. Час цвітіння середній. Коробочка: еліптичної форми (у поздовжньому розрізі) із помірним восковим нальотом, за довжиною (від основи до диску приймочки) – середня, за діаметром – середня, жилкування коробочки слабке. Диск приймочки: конічної форми, кількість часток середня, поверхня часток рівна. Насіння голубуватого кольору. Вміст наркотичних речовин в коробочці малий, вміст морфіну – низький.

За даними заявника урожайність (за стандартної вологості 13%) 1,5 т/га, урожай коробочок без насіння 0,5 т/га, середня маса коробочки без насіння 2,5 г, маса 1000 сім'янок 0,4 г, висота рослин 120 см, тривалість вегетаційного періоду 100 діб, ступінь визрівання 96 %, вирівненість 99 %. Стійкість до посухи, до осипання, вилягання – низька (3,5-4 бали), ураження несправжньою борошнистою росою 2%, ураження іншими основними хворобами та пошкодження шкідниками не визначалося. Вміст жиру в сухому насінні 50,0 %, вміст білку 26,0 %, вміст морфіну в коробочках 0,06 %.

05095006 Нефрит

Зона вирощування: Степ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"

Опушення та білі плями листкової розетки відсутні. Стебло: діаметр розетки середній, розгалуження стебла потроєне, за довжиною середнє, антоціанове забарвлення (між коробочкою та верхівкою стебла) відсутнє, опушеність – середня. Стебловий листок з верхньої сторони має зелений колір з жовтуватим відтінком, восковий наліт помірний, надрізи країв стебло вого листка двічі зубчасті. Пелюстка білого забарвлення, на пелюстках присутні плями червоного кольору, інтенсивність фіолетового забарвлення плям слабка, колір тичинки білий, розсічення пелюстки відсутнє. Час цвітіння середній. Коробочка: еліптичної форми (у поздовжньому розрізі) із помірним восковим нальотом, за довжиною (від основи до диску приймочки) – середня, за діаметром – середня, жилкування коробочки слабке. Диск приймочки: конічної форми, кількість часток середня, поверхня часток рівна. Насіння рожевого кольору. Вміст наркотичних речовин в коробочці малий, вміст морфіну – низький.

За даними заявника урожайність (за стандартної вологості 13%) 1,6 т/га, урожай коробочок без насіння 0,6 т/га, середня маса коробочки без насіння 2,0 г, маса 1000 сім'янок 0,4 г, висота рослин 105 см, тривалість вегетаційного періоду 100 діб, ступінь визрівання 95 %, вирівненість 100 %. Стійкість до посухи, осипання і вилягання – низька (4,2-4,5 бали), показники ураження основними хворобами та пошкодження шкідниками не надавалися. Вміст жиру в сухому насінні 55,0 %, вміст білку 30,0 %, вміст морфіну в коробочках 0,05 %.

Льон звичайний, довгунець

08015001 Агата — Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В.

Рослина за висотою, враховуючи гілочки (під час цвітіння) від середньої до високої, стебло за довжиною, не враховуючи коротких гілочок (під час повного розвитку) від середнього до довгого. Розмір віночка квітки (на початку цвітіння) середній, плямистість чашолисток (у фазі пуп'янка) відсутня або дуже слабка, колір пелюстки (у фазі пуп'янка перед розкриванням квітки) блакитно-фіолетовий, колір віночка пелюстки (за повного цвітіння) блакитний, у пелюстки відсутній поздовжній згин, колір дистальної частини нитки тичинки (одразу після розкриття квітки) блакитний, пиляк – голубуватого кольору, основа стовпчика маточки – блакитного кольору. Розмір коробочки від малої до середньої, війчатість несправжніх перетинок коробочки відсутня. Маса 1000 насінин мала, насіння помірно-коричневого кольору. Час початку цвітіння середній.

За даними заявника урожайність насіння 380,0 ц/га, вміст усього волокна 34,2 %, вихід довгого волокна 19,7 %, середній номер довгого волокна 14, розривне навантаження волокна 18,2 кгс. Тривалість вегетаційного періоду 98 діб, стійкість до вилягання 2,5 бали, стійкість до основних хвороб і шкідників висока.

Коноплі посівні

® 09014001 Вікторія

Заявник: Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук

Форма сім'ядолей паростка видовжена, довжина більшої сім'ядолі велика, довжина гіпокотиля мала, антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє. Рослина: забарвлення верхівки зелене, рослина однодомна, частка чоловічих квіток у суцвітті рослин від дуже малої до малої. Довжина черешка листка середня, кількість часток середня, центральна частка листка: за довжиною довга, за шириною – вузька, відношення довжини до ширини велике, довжина верхівки середня, кількість головних зубців мала. Суцвіття: довжина квітконіжки чоловічої квітки мала, ступінь компактності суцвіття середній, за довжиною – середнє, за шириною – вузьке, за формою – ромбічне. Забарвлення стебла під час достигання жовто-зелене, діаметр стебла середній, кількість міжвузлів на стеблі середня, довжина міжвузля середня, кількість листків на стеблі середня. Тривалість вегетаційного періоду короткий, загальний вміст волокна дуже високий, маса 1000 насінин середня, основне забарвлення оболонки насіння сіре, дуже багато насінин з мозаїчним забарвленням оболонки, інтенсивність прояву мозаїки насіння слабка, величина мозаїчних плям оболонки середня, вміст канабіноїдних сполук в рослині відсутній або дуже низький.

Сільськогосподарські: буряк

Буряк цукровий

07013045 Беліно — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова

пластинка середня за розміром, з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, наполовину заглиблений в грунт .

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 676,1 ц/га, Лісостепу – 576,6 ц/га, Полісся – 611,7 ц/га. Цукристість відповідно –17,7; 17,5; 17,2%. Збір цукру з гектара відповідно – 120,2; 100,9; 105,3 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,5%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,0; 7,2; 5,8 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,2-8,7 бала.

06013039 Берні

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, циліндрично-конічної форми, заглиблений в грунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 537,1 ц/га, Лісостепу – 552,1 ц/га, Полісся – 614,5 ц/га. Цукристість відповідно –17,4; 17,1; 18,0%. Збір цукру з гектара відповідно – 93,6; 94,5; 109,4 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,6%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 5,3; 7,1; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,6 бала.

® 07013014 Булава

Полісся

Заявник: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Триплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок довгий. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, слабко гофрована. Черешок білий, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 587,3 ц/га Цукристість – 18,3%. Збір цукру з гектара – 104,2 ц. Втрати цукру в мелясі – 2,0%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно –3,8 бала. Придатність до механізованого збирання – 5,6 бала.

07013008 Ворсар

Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Триплоїд. Клубочок – багаторостковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною широкий з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, на 3/4 заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 585,1 ц/га. Цукристість – 16,3%. Збір цукру з гектара – 94,7 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,7%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 6,0 бала. Придатність до механізованого збирання – 7,5 бала.

07013001 Венера — Полісся

Заявник: Насіннєва компанія Аурора с.п.а.

Триплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – напіврозлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, слабко гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 623,5 ц/га. Цукристість – 18,9%. Збір цукру з гектара – 119,7 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 4,7 бала. Придатність до механізованого збирання – 5,7 бала.

07013043 Геліос — Степ, Лісостеп

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплідсереднього розміру та середній за довжиною, цширококонічної форми, наполовину заглиблений в грунт .

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 599,5 ц/га, Лісостепу – 563,8 ц/га. Цукристість відповідно – 17,4; 17,0%. Збір цукру з гектара відповідно – 104,2; 96,1 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,0; 6,6 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 8,0-8,3 бала.

07013024 Дарія КВС — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з сильною хвилястістю країв, слабко гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 657,4 ц/га, Лісостепу – 572,1 ц/га, Полісся – 602,0 ц/га. Цукристість відповідно –17,6; 17,8; 17,4%. Збір цукру з гектара відповідно – 115,6; 102,3; 104,7 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,5%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,5; 7,2; 3,8 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,5 бала.

07013040 Ельдорадо — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок довгий. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато

зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середньої довжини, циліндрично-конічної форми, на 3/4 заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 606,6 ц/га, Лісостепу – 587,3 ц/га, Полісся – 608,1 ц/га. Цукристість відповідно – 16,8; 17,3;17,6%. Збір цукру з гектара відповідно – 101,6; 101,7; 106,3 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно – 1,2; 1,3; 1,3%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,0; 7,2; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,6-8,2 бала.

Полісся

® 07013015 Злука

Заявник: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Триплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, сильно гофрована. Черешок зелений, за шириною вузький з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід малого розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиблений в грунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 565,8 ц/га. Цукристість – 18,6%. Збір цукру з гектара – 106,5 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,9%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання – 5,2 бала.

Степ, Полісся

07013035 Зум

Заявник: Насіннєва компанія Лаєн Сідс Лімітед

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок середній. Листкова пластинка мала за розміром, з сильно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок червонуватий, за шириною дуже вузький з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід малого розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, на 3/4 заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 543,6 ц/га, Полісся – 556,6 ц/га. Цукристість відповідно – 17,8; 19,9%. Збір цукру з гектара відповідно – 96,5; 111,6 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,6%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,5; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,2-8,0 бала.

Степ

07013009 Компроміс

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – напіврозлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, цширококонічної форми, на 3/4 заглиблений в грунт .

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 590,0 ц/га. Цукристість – 16,3%. Збір цукру з гектара – 96,1 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 6,0 бала. Придатність до механізованого збирання – 8,5 бала.

07013039 Коала — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Диплоїд. Клубочок – однопростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною широкий з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середній за довжиною, ширококонічно форми, на 3/4 заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 586,3 ц/га, Лісостепу – 584,2 ц/га, Полісся – 604,0 ц/га. Цукристість відповідно –17,2; 17,4; 17,2%. Збір цукру з гектара відповідно – 100,6; 101,9; 104,7 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,7%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,0; 6,8; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,6-8,3 бала.

07013042 Контіненталь — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Диплоїд. Клубочок – однопростковий. Паросток без антоціанового забарвлення . Тип розетки – напівпохила. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, із сильною хвилястістю країв, слабко гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середньої довжини, циліндрично-конічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 546,4 ц/га, Лісостепу – 575,8 ц/га, Полісся – 573,6 ц/га. Цукристість відповідно – 17,8; 17,9;18,3%. Збір цукру з гектара відповідно – 97,0; 103,3; 104,2 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,6%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,8; 8,2; 4,2 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,8 бала.

® 07013013 Кварта — Полісся

Заявник: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Триплоїд. Клубочок – однопростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – напіврозлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з слабкою хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок білий, за шириною середній з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиблений в грунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 555,1 ц/га. Цукристість – 18,8%. Збір цукру з гектара – 106,0 ц. Втрати цукру в мелясі – 2,0%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 4,2 бала. Придатність до механізованого збирання – 5,8 бала.

06013045 Койот — Лісостеп

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Диплоїд. Клубочок – однопростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, слабко гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-

зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середній за довжиною, циліндрично-конічної форми, на 3/4 заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 585,6 ц/га. Цукристість – 16,8%. Збір цукру з гектара – 98,0 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,9%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 6,9 бала. Придатність до механізованого збирання – 7,9 бала.

07013023 Марішка КВС

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з слабкою хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та короткий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 577,8 ц/га, Лісостепу – 545,6 ц/га, Полісся – 624,8 ц/га. Цукристість відповідно –17,9; 17,5; 17,7%. Збір цукру з гектара відповідно – 102,8; 95,6; 110,9 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,7%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,0; 7,3; 3,8 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,5 бала.

07013044 Мілорд

Степ, Полісся

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з Сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок білий, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, наполовину заглиблений в грунт .

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 630,9 ц/га, Полісся – 619,4 ц/га. Цукристість відповідно – 16,7; 18,2%. Збір цукру з гектара відповідно – 104,5; 113,9 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,7; 4,6 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 8,7-9,0 бала.

07013033 Мішель

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Насіннєва компанія Аурора с.п.а.

Триплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка мала за розміром, з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною вузький з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 610,1 ц/га, Лісостепу – 540,3 ц/га, Полісся – 552,6 ц/га. Цукристість відповідно – 17,3; 17,8; 19,4%. Збір цукру з гектара відповідно –105,5; 96,5; 107,6 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,7%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 5,5; 6,7; 4,2 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,3 бала.

07013036 НС-Х-081 РЦ — Степ, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення . Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, із помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиблений в грунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2010) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 504,3 ц/га, Полісся – 499,7 ц/га. Цукристість відповідно – 16,3; 17,1%. Збір цукру з гектара відповідно – 82,2; 86,4 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5%. Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 5 балів. Придатність до механізованого збирання – 6 балів.

06013043 HI 0450 — Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Сідс АБ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та довжини, ширококонічної форми, наполовину заглиблений в грунт..

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 558,4 ц/га, Лісостепу – 552,2 ц/га. Цукристість відповідно – 17,0; 16,8%. Збір цукру з гектара відповідно – 94,5; 92,7 ц. Втрати цукру в мелясі 1,7%. Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,0; 7,7 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 7,5-8,5 бала.

07013037 НС-Х-082 РЦ — Степ, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення . Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, із помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиблений в грунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2010) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 473,8 ц/га, Полісся – 519,1 ц/га. Цукристість – 16,5%. Збір цукру з гектара відповідно – 78,0; 85,8 ц. Втрати цукру в мелясі 1,6%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 5 балів. Придатність до механізованого збирання – 6 балів.

06013044 Пітон — Лісостеп, Полісся

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з

білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиблений в грунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 557,3 ц/га, Полісся – 656,1 ц/га. Цукристість – 17,1%. Збір цукру з гектара відповідно – 95,5; 112,8 ц. Втрати цукру в мелясі 1,6%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,7; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,6-8,6 бала.

Степ, Лісостеп, Полісся

07013034 Родос

Заявник: Насіннєва компанія Аурора с.п.а.

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка мала за розміром, з сильною хвилястістю країв, сильно гофрована. Черешок білий, за шириною дуже вузький з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 588,0 ц/га, Лісостепу – 561,4 ц/га, Полісся – 532,9 ц/га. Цукристість відповідно –18,0; 17,9; 20,1%. Збір цукру з гектара відповідно – 105,3; 100,5; 107,8 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,6%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,5; 6,8; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,5 бала.

Лісостеп, Полісся

07013038 Сілента

Заявник: Сингента Кроп Протекшн АГ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – напівпохила. Листок довгий. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною вузький з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт..

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 561,0 ц/га, Полісся – 604,4 ц/га. Цукристість відповідно – 17,9;17,8%. Збір цукру з гектара відповідно – 92,5; 95,7 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно – 1,4; 1,5%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,5; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,6-8,5 бала.

Степ, Лісостеп

07013022 Слатка КВС

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напівпохила. Листок короткий. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, широкий з світло-оранжевим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середній за довжиною, циліндрично-конічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 610,1 ц/га, Лісостепу – 566,8 ц/га. Цукристість відповідно – 18,2; 17,7%. Збір цукру з гектара відповідно –110,9; 100,6 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно – 1,8; 2,0%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,0; 6,7 бала. Придатність до

механізованого збирання у межах 7,5-8,3 бала.

06013038 Сідерал — Полісся

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Диплоїд. Клубочок – однопростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, на половину заглиблений в грунт .

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 644,1 ц/га. Цукристість – 16,9%. Збір цукру з гектара – 109,3 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,7%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 5,6 бала. Придатність до механізованого збирання – 5,1 бала.

07013003 Тінкер — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Марібо Сід ГмбХ

Диплоїд. Клубочок – однопростковий. Паросток з слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки – вертикальна. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за розміром, з помірною хвилястістю країв, слабко гофрована. Черешок зелений, за шириною зузький з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, ширококонічної форми, заглиблений в грунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 574,3 ц/га, Лісостепу – 578,7 ц/га, Полісся – 657,6 ц/га. Цукристість відповідно –16,6; 17,1; 18,2%. Збір цукру з гектара відповідно – 95,6; 99,5; 118,1 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 5,0; 8,0; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 4,8-8,2 бала.

07013004 Туніка — Лісостеп, Полісся

Заявник: Марібо Сід ГмбХ

Триплоїд. Клубочок – однопростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок короткий. Листкова пластинка коротка за розміром, з помірною хвилястістю країв, слабко гофрована. Черешок зелений, за шириною дуже вузький з білувато -зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та короткий за довжиною, вузькоконічної форми, на 3/4 заглиблений в грунт .

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 575,0 ц/га, Полісся – 626,7 ц/га. Цукр истість відповідно – 17,1; 17,6%. Збір цукру з гектара відповідно – 98,5; 109,6 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,9%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,4; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,0-8,3 бала.

06013037 Урал — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Диплоїд. Клубочок – однопростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-

зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, заглиблений наполовину в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 569,3 ц/га, Лісостепу – 575,5 ц/га, Полісся – 622,9 ц/га. Цукристість відповідно –16,7; 16,5; 16,9%. Збір цукру з гектара відповідно – 99,2; 95,6; 104,9 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 5,4; 7,1; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,1 бала.

07013002 Феррара

Степ, Полісся

Заявник: Насіннєва компанія Аурора с.п.а.

Триплоїд.Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – напіврозлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, слабко гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 567,8 ц/га, Полісся – 590,8 ц/га. Цукристість відповідно – 17,1; 19,5%. Збір цукру з гектара відповідно – 96,8; 115,8 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,6%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,0; 4,7 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,7-7,3 бала.

07013041 Шейен

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з слабкою хвилястістю країв, слабко гофрована. Черешок зелений, за шириною широкий з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середній за довжиною, циліндрично-конічної форми, на 3/4 заглиблений в грунт .

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 551,2 ц/га, Лісостепу – 544,3 ц/га, Полісся – 608,0 ц/га. Цукристість відповідно –17,3; 17,3; 18,3%. Збір цукру з гектара відповідно – 95,4; 97,0; 112,7 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,4%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,5; 7,7; 5,8 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,2-8,3 бала.

07013020 Яносік

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Кутновска Годовла Бурака Цукрового Сп. з о.о.

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, цширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт .

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 565,6 ц/га, Лісостепу – 574,6 ц/га, Полісся – 591,6 ц/га. Цукристість – 17,4%. Збір цукру з гектара відповідно – 98,3; 100,0; 102,4 ц. Втрати цукру в

мелясі – 1,7%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,5; 7,5; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,6-8,5 бала.

06013033 Янова — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Кутновска Годовла Бурака Цукрового Сп. з о.о.

Триплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок середній. Листкова пластинка велика за розміром, з слабкою хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 572,0 ц/га, Лісостепу – 544,9 ц/га, Полісся – 593,9 ц/га. Цукристість відповідно –16,2; 17,0; 17,7%. Збір цукру з гектара відповідно – 92,1; 92,5; 105,4 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,9%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 4,3; 6,2; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,0-8,4 бала.

Буряк кормовий

07046001 Юнітек — Степ, Полісся

Заявник: Насіннєва компанія Аурора с.п.а.

Диплоїдна рослина. Клубочок - однопаростковий. Листок середній за довжиною, середній за шириною. Листкова пластинка характеризується середнім відношенням довжини до ширини, помірною інтенсивністю зеленого кольору. Форма кінчика - злегка округла. Черешок середньої довжини з білувато-зеленим забарвлення основи. Коренеплід конічної форми, середній за довжиною, глибока ступінь заглиблення у грунт.

У період випробування (2008-2010 рр.) середня урожайність коренеплодів у зоні Степу становила 526,3 ц/га, у зоні Полісся – 751,1 ц/га. Вміст сухої речовини відповідно – 16,9; 12,5%. Сорт слабо уражується коренеїдом та церкоспорозом. Придатність до механізованого збирання у межах 5 балів.

Сільськогосподарські: картопля

Картопля

08031001 Сильвана — Л.П.

Заявник: Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.

Рослина - висока з напіврозлогим габітусом, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - слабке. Листок - середнього розміру, помірно зеленого забарвлення, проміжний. Віночок квітки -середнього розміру з помірним антоціановим забарвленням зовнішнього боку квітки. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - жовті, короткоовальної форми, вічка - мілкі, жовті. М`якуш - світло-жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 204,5; П.- 280,6. Гарантована прибавка до національного стандарту, ц/га: Л. - 31,1, П - 80,2. Гарантована прибавка до національного стандарту, %: Л. - 17,9, П - 40,0. Вміст крохмалю, %: Л.- 11,9, П.- 13,6; низькокрохмальний сорт;. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 21,2; П.- 33,4. Вміст сухої речовини, %: Л - 21,4, П - 13,5. Вміст цукрів, %: П - 0,2. Вегетаційний період, днів: Л.- 93; П.- 97. Маса бульб, гр: Л. - 75,4; П.- 88,7.Товарність бульб, %: Л - 59, П - 86. Смакові якості, бал: Л.- 7,5; П.- 8,1. Група стиглості - середньоранній. Напрям

використання - столовий..

Л.П.

08031006 Сіфра

Заявник: Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.

Рослина - середньої висоти з напіврозлогим габітусом, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - слабке. Листок - середнього розміру, темно - зеленого забарвлення, закритий. Віночок квітки - малого розміру, білий. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - жовті, кулястої форми, вічка - середні, жовті. М`якуш - білий.

Урожайність, ц/га: Л.- 243,2, П.- 261,5. Гарантована прибавка до національного стандарту, ц/га: Л. - 73,2, П - 51,0. Гарантована прибавка до національного стандарту, %: Л. - 43,1, П - 24,2. Вміст крохмалю, %: Л.- 14,3, П.- 18,3; середньокрохмальний сорт;. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 30,0; П.- 34,1. Вміст сухої речовини, %: Л - 21,0, П - 21,7. Вміст цукрів, %: Л - 0,5; П - 0,8. Вегетаційний період, днів: Л.- 106; П.- 106. Маса бульб, гр: Л.- 84,3; П.- 81,1. Товарність бульб, %: Л - 71,3, П - 84,3. Смакові якості, бал: Л.- 6,5; П.- 7,4. Група стиглості - середньостиглий. Напрям використання - столовий.

П.

07031018 Альбатрос

Заявник: Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ

Рослина - висока з напіврозлогим габітусом, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - відсутнє або дуже слабке. Листок - середнього розміру, темно - зеленого забарвлення, закритий. Віночок квітки -середнього розміру, білий. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - жовті, короткоовальної форми, вічка - середні, жовті. М`якуш - темно-жовтий.

Урожайність, ц/га: П.- 243,4. Вміст крохмалю, %: П.- 21,7; висококрохмальний сорт;. Збір крохмалю, ц/га: П.- 46,9. Вміст сухої речовини, %: П - 30,7. Вміст цукрів, %: П - 0,4. Вегетаційний період, днів: П.- 117. Маса бульб, гр: П.- 83,7. Товарність бульб, %: П - 81,1. Смакові якості, бал: П.- 7,1. Група стиглості - середньостиглий. Напрям використання - столовий.

Л.П.

08031004 Вікторія

Заявник: Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.

Рослина - пряма, висока, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - слабке. Листок - середнього розміру, темно-зеленого забарвлення, проміжний. Віночок квітки -середнього розміру, білий. Рясність цвітіння - рясна. Бульби - жовті, овальної форми, вічка - мілкі, жовті. М`якуш - світло-жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 215,4; П.- 257,2. Гарантована прибавка до національного стандарту, ц/га: Л. - 42,0, П - 56,8. Гарантована прибавка до національного стандарту, %: Л. - 24,2, П - 28,3. Вміст крохмалю, %: Л.- 14,6, П.- 15,8; середньокрохмальний сорт;. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 27,6; П.- 36,2. Вміст сухої речовини, %: Л - 23,9, П - 24,6. Вміст цукрів, %: Л - 0,2; П - 0,4. Вегетаційний період, днів: Л.- 99; П.- 102. Маса бульб, гр: Л.- 73,6; П.- 81,2. Товарність бульб, %: Л - 55,3, П - 82,5. Смакові якості, бал: Л.- 7,0; П.- 8,5. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - столовий, переробка на фрі..

Л.П.

® 07031019 Віена

Заявник: Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ

Рослина - середньої висоти з напіврозлогим габітусом, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - відсутнє або дуже слабке. Листок - середнього розміру, помірно зеленого забарвлення, проміжний. Віночок квітки -середнього розміру, білий. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - жовті, видовженоовальної форми, вічка - мілкі, жовті. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 189; П.- 241. Гарантована прибавка до національного стандарту,, ц/га: Л. - 15,5, П - 40,3. Гарантована прибавка до національного стандарту,, %: Л. - 8,9, П - 20,1. Вміст крохмалю, %: Л.- 11,6, середньокрохмальний сорт; П.- 16,1. Збір крохмалю, ц/га: Л.-

22,9; П.- 30,3. Вміст сухої речовини, %: Л - 23,0, П - 23,3. Вміст цукрів, %: П і Л - 0,5. Вегетаційний період, днів: Л.- 92; П.- 94. Маса бульб, гр: Л.- 55; П.- 70. Товарність бульб, %: Л - 63,4, П - 79,2. Смакові якості, бал: Л.- 7,6; П.- 7,4. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - технічно - столовий..

® 06031014 Глазурна П

Заявник: Інститут картоплярства Української академії аграрних наук

Кущ - прямий, середньої висоти, проміжного типу. Листок - темно - зеленого кольору, середнього розміру, проміжного типу. Віночок квітки -середнього розміру з слабким антоціановим забарвленням зовнішнього боку. Рясність цвітіння - обрідне. Бульби - червоні, короткоовальної форми, вічка - мілкі, червоні. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: П.- 298. Гарантована прибавка, ц/га: П.- 22. Гарантована прибавка, %: П.- 8. Вміст крохмалю, %: П.- 16,4. Збір крохмалю, ц/га: П.- 48,9. Вегетаційний період, днів: П.- 103. Маса бульб, гр: П.- 78. Смакові якості, бал: П.- 7,0. Група стиглості - ранньостиглий. Напрям використання - столовий..

® 07031016 Гала Л.П.

Заявник: Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ

Кущ - розлогий, середньої висоти, листкового типу, антоціанового забарвлення на стеблі відсутнє. Листок - середнього розміру, темно - зеленого кольору, проміжного. Віночок квітки -середнього розміру, білий. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - жовті, овальної форми, вічка - мілкі, жовті. М`якуш - темно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 245,5; П.- 303,4. Гарантована прибавка, ц/га: Л.- 34,3. Гарантована прибавка, %: Л.- 16. Вміст крохмалю, %: Л.- 13,5; П.- 14,8. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 33,1; П.- 44,9. Вегетаційний період, днів: Л.- 93; П.- 96. Маса бульб, гр: Л.- 52; П.- 67. Смакові якості, бал: Л.- 7,9; П.- 8,3. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - столовий..

08031002 Дербі Л.П.

Заявник: Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.

Рослина - висока з напіврозлогим габітусом, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - відсутнє або дуже слабке. Листок - середнього розміру, помірно зеленого забарвлення, проміжний. Віночок квітки - середнього розміру, білий. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - жовті, короткоовальної форми, вічка - середні, жовті. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 209.6; П.- 246,0. Гарантована прибавка до національного стандарту, ц/га: Л. - 78,3. Гарантована прибавка до національного стандарту, %: Л. - 59,6. Вміст крохмалю, %: Л.- 13,3; П.- 14,9, середньокрохмалистий. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 24,2; П.- 44,8. Вміст сухої речовини, %: Л.- 21,6; П.- 22,8. Вміст цукрів, %: П - 0,4. Вегетаційний період, днів: Л.- 92; П.- 91. Маса бульб, гр: Л.- 71; П.- 82.Товарність бульб, %: Л - 73,7, П - 84,7. Смакові якості, бал: Л.- 6,4; П.- 7,9. Група стиглості - ранньостиглий. Напрям використання - столовий..

06031001 Дублянська ювілейна Л.П.

Заявник: Львівський національний аграрний університет

Кущ - прямий, середньої висоти, стеблового типу без антоціану на стеблі. Листок - середній, помірно зеленого кольору, відкритий. Віночок квітки -середнього розміру, білий. Рясність цвітіння - обрідна. Бульби - жовті, короткоовальної форми, вічка - середньої глибини, червоні. М`якуш - світло жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 280,8; П.- 345,8. Гарантована прибавка, ц/га: Л. - 69,6; П. - 27,3. Гарантована прибавка, %: Л. - 33; П. - 8. Вміст крохмалю, %: Л.- 12,8; П.- 13,6. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 35,9; П.- 46,9. Вегетаційний період, днів: Л.- 101; П.- 102. Маса бульб, гр: Л.- 80; П.-

84. Смакові якості, бал: Л.- 8,0; П.- 6,8. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - столовий..

Л.П.

08031012 Джеллі

Заявник: Європлант Пфланценцухт Гмбх

Рослина - з напіврозлогим габітусом, висока, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - слабке. Листок - середнього розміру, помірно зеленого забарвлення, проміжний. Віночок квітки -середнього розміру, білий. Рясність цвітіння - рясне. Бульби - жовті, короткоовальної форми, вічка - мілкі, жовті. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 231,6; П.- 269,2. Гарантована прибавка до національного стандарту, ц/га: Л. - 61,6, П - 58,7. Гарантована прибавка до національного стандарту, %: Л. - 36,2, П - 27,9. Вміст крохмалю, %: Л.- 15,1, П.- 18,5; середньокрохмальний сорт;. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 27,8; П.- 38,2. Вміст сухої речовини, %: Л - 23,5, П - 22,9. Вміст цукрів, %: Л - 0,2; П - 0,3. Вегетаційний період, днів: Л.- 110; П.- 111. Маса бульб, гр: Л.- 77,4; П.- 84,2. Товарність бульб, %: Л - 68,3, П - 84,6. Смакові якості, бал: Л.- 5,7; П.- 7,9. Група стиглості - середньостиглий. Напрям використання - столовий.

Л.П.

06031002 Дужа

Заявник: Львівський національний аграрний університет

Кущ - напіврозлогий, середньої висоти, проміжного типу і. Листок - помірно зеленого кольору, відкритий. Віночок квітки - середній з слабким антоціановим забарвленням зовнішнього боку. Рясність цвітіння - обрідна. Бульби - жовті, округлої форми, вічка - середньої глибини, жовті. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 231,8; П.- 264,0. Гарантована прибавка, ц/га: Л.- 20,6. Гарантована прибавка, %: Л.- 6. Вміст крохмалю, %: Л.- 14,4; П. - 16,2. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 33,4; П.- 42,8. Вегетаційний період, днів: Л.- 100; П.- 103. Маса бульб, гр: Л.- 66; П.- 65. Смакові якості, бал: Л.- 8,0; П.- 8,0. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - технічно-столовий

П.

08031013 Евеліна

Заявник: Європлант Пфланценцухт Гмбх

Рослина - висока з напіврозлогим габітусом, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - слабке. Листок - середнього розміру, помірно зеленого забарвлення, проміжний. Віночок квітки -середнього розміру, білий. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - жовті, короткоовальної форми, вічка - мілкі, жовті. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: П.- 248,6. Гарантована прибавка до національного стандарту, ц/га: П - 48,2. Гарантована прибавка до національного стандарту, %: П - 24,0. Вміст крохмалю, %:П.- 14,2; середньокрохмальний сорт;. Збір крохмалю, ц/га: П.- 31,1. Вміст сухої речовини, %: П - 22,6. Вміст цукрів, %: П - 0,5. Вегетаційний період, днів: П.- 93. Маса бульб, гр: П.- 74,5. Товарність бульб, %: П - 81,2. Смакові якості, бал: П.- 7,8. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - столовий.

Л.П.

® 08031010 Євростарч

Заявник: Європлант Пфланценцухт Гмбх

Кущ - прямий, високий, проміжного типу без антоціану на стеблі. Листок - темно зеленого кольору, проміжний, середнього розміру. Віночок квітки -середнього розміру, білий з рясним цвітінням. Бульби - жовті, короткоовальної форми, вічка - середньої глибини, жовті. М`якуш - білий.

Урожайність, ц/га: Л.- 301,3; П.- 339,2. Гарантована прибавка, ц/га: Л. - 57,7; П. - 5,1. Гарантована прибавка, %: Л. - 24; П.- 2. Вміст крохмалю, %: Л.- 23,2; П.- 20,8. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 69,8; П.- 70,5 Вегетаційний період, днів: Л.- 106; П.- 119. Маса бульб, гр: Л.- 72; П.- 81. Смакові якості, бал: Л.- 7,8; П.- 8,0. Група стиглості - середньостиглий. Напрям використання - технічний..

08031008 Каррера Л.П.

Заявник: Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.

Кущ - напіврозлогий, середньої висоти, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - помірно зеленого кольору, відкритий. Віночок квітки -середнього розміру з слабким антоціановим забарвленням зовнішнього боку. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - жовті, овальної форми, вічка - середньої глибини, жовті. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 246; П.- 313. Гарантована прибавка, ц/га: П.- 37. Гарантована прибавка, %: П.- 13. Вміст крохмалю, %: Л.- 10,9; П.- 12,8. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 26,8; П.- 40,0. Вегетаційний період, днів: Л.- 90; П.- 92. Маса бульб, гр:
Л.- 71; П.- 86. Смакові якості, бал: Л.- 6,6; П.- 7,6. Група стиглості - ранньостиглий. Напрям використання - столовий..

06031013 Курас Л.

Заявник: Агріко Кооператив Б.А.

Кущ - прямий, середньої висоти, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - середнього розміру, помірно зеленого кольору, проміжний. Віночок квітки -середнього розміру з білими, рясними квітками.. Бульби - жовті, короткоовальної форми, вічка - глибокі, жовті. М`якуш - білий.

Урожайність, ц/га: Л.- 253. Гарантована прибавка, ц/га: Л. - 28,3. Гарантована прибавка, %: Л. - 13. Вміст крохмалю, %: Л.- 22,6. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 71,6. Вегетаційний період, днів: Л.- 123. Маса бульб, гр: Л.- 63. Смакові якості, бал: Л.- 9,0. Група стиглості - середньопізній. Напрям використання - технічно - столовий..

® 06031009 Мандрівниця Л.П.

Заявник: Інститут картоплярства Української академії аграрних наук

Кущ - прямий, середньої висоти, листкового типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - великий, темно зеленого кольору, проміжний. Віночок квітки -середнього розміру з помірним антоціановим забарвленням зовнішнього боку. Рясність цвітіння - обрідне. Бульби - червоні, короткоовальної форми, вічка - середньої глибини, червоні. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 257,3; П.- 372,8. Гарантована прибавка, ц/га: Л. - 13,7; П. - 38,7. Гарантована прибавка, %: Л. - 6; П. - 10. Вміст крохмалю, %: Л.- 14,9; П.- 18,3. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 38,3; П.- 68,2. Вегетаційний період, днів: Л.- 95; П.- 120. Маса бульб, гр: Л.- 67; П.- 100. Смакові якості, бал: Л.- 7,0; П.- 9,0. Група стиглості - середньостиглий. Напрям використання - столовий..

08031005 Моцарт Л.П.

Заявник: Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.

Рослина - пряма, середньої висоти, проміжного типу з помірним антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - середнього розміру, темно-зеленого забарвлення, проміжний. Віночок квітки - середнього розміру з помірним антоціановим забарвленням зовнішнього боку квітки та середнім співвідношенням блакитного у антоціановому забарвленні зовнішнього боку квітки. Рясність цвітіння - рясна. Бульби - червоні, короткоовальної форми, вічка - мілкі, білі. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 209,4; П.- 268,8. Гарантована прибавка до національного стандарту, ц/га: Л. - 36,0, П - 68,4. Гарантована прибавка до національного стандарту, %: Л. - 20,7, П - 34,1. Вміст крохмалю, %: Л.- 14,1, П.- 15,5; середньокрохмальний сорт;. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 26,6; П.- 35,1. Вміст сухої речовини, %: Л - 24,4, П - 25,3. Вміст цукрів, %: П - 0,2. Вегетаційний період, днів: Л.- 101; П.- 103. Маса бульб, гр: Л.- 79,3; П.- 83,2. Товарність бульб, %: Л - 72,3, П - 83,0. Смакові якості, бал: Л.- 7,2; П.- 8,1. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - столовий.

08031017 Плюшка

П.

Заявник: Сумський національний аграрний університет

Рослина - пряма, середньої висоти, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - помірне. Листок - середнього розміру, темно - зеленого забарвлення, проміжний. Віночок квітки - малий з помірним антоціановим забарвленням зовнішнього боку та з середнім співвідношенням блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку квітки. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - червоні, кулястої форми, вічка - мілкі, червоні. М`якуш - білий.

Урожайність, ц/га: П.- 193,4. Вміст крохмалю, %: П.- 19,6; висококрохмальний сорт;. Збір крохмалю, ц/га: П.- 29,0. Вміст сухої речовини, %: П - 26,3. Вміст цукрів, %: П - 0,2. Вегетаційний період, днів:П.- 95. Маса бульб, гр: П.- 76. Товарність бульб, %: П - 95,3. Смакові якості, бал: П.- 7,0. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - для переробки..

® 07031017 ПомКвін

Л.П.

Заявник: Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ

Кущ - прямий, високий, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - середнього розміру, темно зеленого кольору, відкритий. Віночок квітки -середнього розміру з білими, рясними квітками. Бульби - жовті, овальної форми, вічка - мілкі, жовті. М`якуш - темно - жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 231,9; П.- 325,9. Гарантована прибавка, ц/га: Л. - 7,2. Гарантована прибавка, %: Л. - 3. Вміст крохмалю, %: Л.- 16,9; П.- 15,8. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 39,1; П.- 51,5. Вегетаційний період, днів: Л.- 122; П.- 120. Маса бульб, гр: Л.- 57; П.- 98. Смакові якості, бал: Л.- 7,0; П.- 8,0. Група стиглості - середньопізній. Напрям використання - столовий..

® 07031002 Романце

Л.П.

Заявник: Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ

Кущ - прямий, середньої висоти, проміжного типу з сильним антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - середнього розміру, темного кольору, відкритий. Віночок квітки -середнього розміру з помірним антоціановим забарвленням зовнішнього боку. Рясність цвітіння - рясна. Бульби - червоні, овальної форми, вічка - мілкі, червоні. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 240,8; П.- 272. Гарантована прибавка, ц/га: Л. - 29,6. Гарантована прибавка, %: Л. - 14. Вміст крохмалю, %: Л.- 16,0; П. - 18,3. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 38,5; П.- 49,8. Вегетаційний період, днів: Л.- 101; П.- 108. Маса бульб, гр: Л.- 74; П.- 70. Смакові якості, бал: Л.- 8,3; П.- 8,3. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - технічно - столовий..

08031007 Родео

Л.П.

Заявник: Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.

Рослина - пряма, висока, стеблового типу, антоціанове забарвленням на стеблі - сильне. Листок - середнього розміру, темно - зеленого забарвлення, відкритий. Віночок квітки -середнього розміру, антоціанове забарвлення зовнішнього боку квітки - помірне, співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку - велике. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - червоні, видовженоовальної форми, вічка - мілкі, жовті. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 188,9; П.- 254,7. Гарантована прибавка до національного стандарту, ц/га: Л. - 19,3, П - 4,1. Гарантована прибавка до національного стандарту, %: Л. - 11,3, П - 1,7. Вміст крохмалю, %: Л.- 14,0, П.- 16,2; середньокрохмальний сорт;. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 19,6; П.- 33,9. Вміст сухої речовини, %: Л - 22,7, П - 23,6. Вміст цукрів, %: Л - 0,5; П - 0,9. Вегетаційний період, днів: Л.- 112; П.- 115. Маса бульб, гр: Л.- 67,5; П.- 82,6. Товарність бульб, %: Л - 75, П - 83. Смакові якості, бал: Л.- 7,0; П.- 7,1. Група стиглості - середньостиглий. Напрям використання - столовий.

08031009 Ред Скарлет

Л.П.

Заявник: Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.

Рослина - середньої висоти з напіврозлогим габітусом, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - помірне. Листок - середнього розміру, темний.. Віночок квітки - середнього розміру, з слабким антоціановим забарвленням квітки з зовнішнього боку. Рясність цвітіння - обрідне. Бульби - червоні, видовженоовальної форми, вічка - мілкі, білі. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 229.0; П.- 263,4. Гарантована прибавка до національного стандарту, ц/га: Л. - 97,7, П - 74,3. Гарантована прибавка до національного стандарту, %: Л. - 13,6, П - 5,4. Вміст крохмалю, %: Л.- 12,5; П.- 13,0, середньокрохмальний. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 23,9; П.- 30,7. Вміст сухої речовини, %: Л.- 20,0; П.- 21,1. Вміст цукрів, %: П - 0,8. Вегетаційний період, днів: Л.- 89; П.- 90. Маса бульб, гр: Л.- 84; П.- 84.Товарність бульб, %: Л - 79,8, П - 84,4. Смакові якості, бал: Л.- 5,2; П.- 7,1. Група стиглості - ранньостиглий. Напрям використання - технічно - столовий..

08031011 Роксана

Л.П.

Заявник: Єврoплант Пфланценцухт Гмбх

Рослина - пряма, середньої висоти, стеблового типу, антоціанове забарвленням на стеблі - відсутнє або дуже слабке. Листок - середнього розміру, помірно зеленого забарвлення, проміжний. Віночок квітки -середнього розміру, білий. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - жовті, короткоовальної форми, вічка - середні, жовті. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 225,8; П.- 262,6. Гарантована прибавка до національного стандарту, ц/га: Л. - 52,4, П - 62,2. Гарантована прибавка до національного стандарту, %: Л. - 30,2, П - 31,0. Вміст крохмалю, %: Л.- 11,6, П.- 14,2; середньокрохмальний сорт;. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 23,1; П.- 32,2. Вміст сухої речовини, %: Л - 22,6, П - 22,2. Вміст цукрів, %: Л - 0,2; П - 0,9. Вегетаційний період, днів: Л.- 101; П.- 101. Маса бульб, гр: Л.- 77,1; П.- 76,7. Товарність бульб, %: Л - 74, П - 80. Смакові якості, бал: Л.- 7,3; П.- 7,0. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - столово - технічний.

08031015 Слобожанка-2

Л.П.

Заявник: Сумський національний аграрний університет

Рослина - висока з напіврозлогим габітусом, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - помірне. Листок - середнього розміру, помірно зеленого забарвлення, проміжний. Віночок квітки - середнього розміру, білий. Рясність цвітіння - обрідне. Бульби - жовті, короткоовальної форми, вічка - мілкі, жовті. М`якуш - білий.

Урожайність, ц/га: Л.- 179,0; П.- 223,4. Гарантована прибавка до національного стандарту,, ц/га: Л. - 47,7. Гарантована прибавка до національного стандарту,, %: Л. - 36,3. Вміст крохмалю, %: Л.- 14,8; П.- 17,3, середньокрохмальний. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 20,8; Вміст сухої речовини, %: Л.- 25,7; П.- 25,2. Вміст цукрів, %: Л - 0,2; П - 0,4. П.- 33,6. Вегетаційний період, днів: Л.- 91; П.- 94. Маса бульб, гр: Л.- 67; П.- 69. Товарність бульб, %: Л - 64,3, П - 74,1. Смакові якості, бал: Л.- 7,1; П.- 8,3. Група стиглості - ранньостиглий. Напрям використання - для переробки..

08031016 Селянська

Л.

Заявник: Сумський національний аграрний університет

Рослина - пряма, середньої висоти, проміжного типу, антоціанове забарвленням на стеблі - відсутнє або дуже слабке. Листок - середнього розміру, помірно зеленого забарвлення, відкритий. Віночок квітки -середнього розміру, білий. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - жовті, короткоовальної форми, вічка - мілкі, жовті. М`якуш - кремовий.

Урожайність, ц/га: Л.- 185,7. Гарантована прибавка до національного стандарту,, ц/га: Л. - 54,4. Гарантована прибавка до національного стандарту,, %: Л. - 41,4. Вміст крохмалю, %: Л.- 14,3, середньокрохмальний. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 23,3. Вміст сухої речовини, %: Л.- 26,3; П.- 24,2. Вміст цукрів, %: П - 0,6. Вегетаційний період, днів: Л.- 92. Маса бульб, гр: Л.- 70,3. Товарність бульб, %: Л - 56.Смакові якості, бал: Л.- 6,6. Група стиглості - ранньостиглий. Напрям використання - для переробки.

Л.П.

® 07031003 Талент

Заявник: Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ

Кущ - прямий, середньої висоти, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - помірно зеленого кольору, проміжного типу, середнього розміру. Віночок квітки -середнього розміру з білими квітками. Рясність цвітіння - обрідна. Бульби - жовті, видовженоовальної форми, вічка - мілкі, жовті. М`якуш - темно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 236,7; П.- 299,2. Гарантована прибавка, ц/га: Л. - 25,5. Гарантована прибавка, %: Л. - 12. Вміст крохмалю, %: Л.- 17,3; П.- 19,3. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 40,9; П.- 57,7. Вегетаційний період, днів: Л.- 101; П.- 106. Маса бульб, гр: Л.- 62; П.- 74. Смакові якості, бал: Л.- 8,1; П.- 8,3. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - технічно - столовий..

Л.П.

07031005 Фазан

Заявник: Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ

Кущ - прямий, високий, стеблового типу. Листок - середній, проміжний, помірно зеленого кольору. Віночок квітки -середнього розміру з рясними білими квітками. Бульби - жовті, округлої форми з мілкими, жовтими вічками. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 226,5; П.- 281,5. Гарантована прибавка, ц/га: Л.- 15,3. Гарантована прибавка, %: Л.- 7. Вміст крохмалю, %: Л.- 21,0; П. - 22,2. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 47,5; П.- 62,4. Вегетаційний період, днів: Л.- 100; П.- 104. Маса бульб, гр: Л.- 54; П.- 68. Смакові якості, бал: Л.- 7,7; П.- 8,5. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - для виробництва чіпсів та сушених продуктів.

Л.П.

08031003 Фабула

Заявник: Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.

Кущ - напіврозлогий, середньої висоти, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - світло зеленого кольору, відкритий. Віночок квітки -середнього розміру з слабким антоціановим забарвленням зовнішнього боку. Рясність цвітіння - помірна. Бульби - жовті, овальної форми, вічка - середньої глибини, жовті. М`якуш - помірно жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 248,9; П.- 328,7. Гарантована прибавка, ц/га: Л. - 37,7; П.- 10,2. Гарантована прибавка, %: Л. - 18; П.- 3. Вміст крохмалю, %: Л.- 12,6; П.- 13,0. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 31,4; П.- 42,7. Вегетаційний період, днів: Л.- 97; П.- 102. Маса бульб, гр: Л.- 97; П.- 107. Смакові якості, бал: Л.- 6,9; П.- 6,9. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - столовий..

Сільськогосподарські: кормові

Сорго-суданковий гібрид

® 08063002 Новоолексіївський

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Паросток має слабке антоціанове забарвлення колеоптелля, габітус рослини прямий, кількість пагонів рослини середня, листкова пластинка за довжиною довга. Ступінь нижньої квіткової луски - помірний, колоски за формою - овальні. Забарвлення колоскової луски зелено-жовте, забарлення на сіння після достигання - світло-коричневе. Маса 1000 зерен велика. Час викидання волоті - середній.

Костриця лучна

® 07054001 Марінца Л,П

Заявник: Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Національної академії аграрних наук

Диплоїд. Рослина: габітус (восени в рік посіву) – напівпрямий, тенденція утворення суцвіття в рік посіву –слабка, час появи суцвіття ранній.
Габітус при появі суцвіття – напівпрямий, природна висота при появі суцвіття – довга. Інтенсивність зеленого кольору листка протягом вегетаційного періоду темна. Прапорцевий листок широкий, довгий. Стебло: довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – довге. Довжина суцвіття, коли воно повністю сформоване – середнє.

Сорт характеризується стійкістю до вилягання, посухи, ураження хворобами. Зимостійкий. Має високу кущистість. Середня урожайність сухої речовини -Л- 40,6ц/га, П-49,6.Вегетаційний період - Л-73дн, П-79дн. Висота рослини -Л-92,1,П- 90,3. Залистяність – Л-42,0, П-51,9%. Вміст сирого протеїну - Л-11,3 %, П-10,2%. Вміст клітковини – Л-30,2, П-28,3 %. .Середньостиглий, сінокісно-пасовищного типу.

Пажитниця багаторічна

® 05062010 Мрія Лісостеп

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Диплоїд. Габітус восени в рік висіву проміжний, тенденція до утворення суцвіть відсутня або дуже слабка.
Навесні габітус проміжний. Листок середній за розміром. Час викидання суцвіть ранній. Суцвіття має середню багато колосків.

Середня урожайність сухої речовини - 46,6ц/га.Гарантована прибавка - 1,9ц/га, 4,07%. Вміст сирого протеїну – 11,0%. Вміст клітковини - 27,0,0%. Сорт середньостиглий, має непогані показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Висота рослини - 68,0см. Днів до достигання 72,7. Залистяність 52,0%..Напрям використання - сінокісно-пасовищний.

® 07062001 Осип Л,П

Заявник: Передкарпатська дослідна станція Інституту землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук

Диплоїд. Габітус восени в рік висіву проміжний, тенденція до утворення суцвіть відсутня або дуже слабка.
Навесні габітус проміжний. Листок середній за розміром. Час викидання суцвіть дуже пізній. Суцвіття має середню кількість колосків.

Середня урожайність сухої речовини - Л-47,6ц/га, П-47,8ц/га. Вміст сирого протеїну Л – 12,9%, П-11,3. Вміст клітковини - Л-27,7%, П-28,4. %. Сорт середньоранній має непогані показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Вегетаційний період - Л-83дн, П-77дн.Висота рослини -Л-73,6см,П- 66,0см. Залистяність складає - Л-45,50%, П-55,3%. Років використання - 5. Напрям використання - сінокіснопасовищний та лукопасовищний.

Горошок (Вика яра)

® 06047001 Владіслава Лісостеп

Заявник: Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Сіянці рослин сорту через 3-4 тижні після появи сходів мають слабке антоціанове забарвлення основи стебла, світло-зелене листя.
Час початку цвітіння у сорту середній. На цей час верхнє міжвузля стебла опушене, антоціанове забарвлення пазух листків відсутнє, або

дуже слабке, форма верхівки листочків на середній третині рослини пряма, листочки за шириною вузькі, антоціанове забарвлення залозок на прилистках відсутнє або дуже слабке, квітка має темно-фіолетове забарвлення паруса.
У фазі повного розвитку боби мають слабке або відсутнє опушення, середню довжину і ширину,короткий дзьобик та середню кількість насінних зачатків.
За збирання, у фазі повної стиглості, сформоване насіння дрібне за розміром та округле за формою. Воно має основне сіро-коричневе забарвлення насінної оболонки коричнева орнаментація відсутня. Вираження коричневої орнаментації дуже слабке. Блакитно-чорна орнаментація крапки і плями.

Середня урожайність: сухої речовини - Лісостеп - 46,9ц/га(гарантована прибавка - 0,4 ц/га або 0,8 %); насіння – Лісостеп - 18,9 ц/га.Вегетаційний період 68,6 дн. Вміст сирого протеїну – 20,0 %. Сорт достатньо посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Залистяність - 54,0 - 69,0 % . Напрям використання - кормовий.

® 06047002 Ліла

Лісостеп, Полісся

Заявник: Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

Сіянці рослин сорту через 3-4 тижні після появи сходів мають слабке антоціанове забарвлення основи стебла, світло-зелене листя.
Час початку цвітіння у сорту середній. На цей час верхнє міжвузля стебла опушене, антоціанове забарвлення пазух листків відсутнє, або дуже слабке, форма верхівки листочків на середній третині рослини пряма, листочки за шириною вузькі, антоціанове забарвлення залозок на прилистках відсутнє або дуже слабке, квітка має фіолетове забарвлення паруса.
У фазі повного розвитку боби мають слабке, середню довжину і ширину,середній дзьобик та середню кількість насінних зачатків.
За збирання, у фазі повної стиглості, сформоване насіння дрібне за розміром та округле за формою. Воно має основне сіро-зелене забарвлення насінної оболонки, коричнева орнаментація відсутня. Вираження коричневої орнаментації дуже слабке. Блакитно-чорна орнаментація відсутня.Насіння має сірувато-коричневе забарвлення сім'ядолей.

Середня урожайність: сухої речовини - Лісостеп - 48,6ц/га(гарантована прибавка - 2,1 ц/га або 4,3 %); Полісся - 76,4 ц/га (гарантована прибавка - 6,5 ц/га або 8,5 %) насіння – Лісостеп - 18,7ц/га.. Вегетаційний період: Лісостеп -67,8 дн, Полісся - 69,4.Вміст сирого протеїну: Лісостеп -19,5 %, Полісся - 20,2%.. Сорт достатньо посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Залистяність - 54,0 - 68,5% . Напрям використання - кормовий.

Еспарцет

® 07050001 Медіно

Л.П

Заявник: Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Національної академії аграрних наук

Рослини сорту першого року життя мають високу схильність до цвітіння.
Рослини за висотою основної зеленої маси , напівпрямі за габітусом, з помірним галуженням. Стебло довге, середньої товщини, немає антоціанового забарвлення та без опушення в середній його частині. Листя зелене, з сіро-зеленим забарвленням, середнє за довжиною, середньої товщини, має ланцетну форму.
Час початку цвітіння рослин і час повного їх цвітіння, а також і період від початку до повного цвітіння - середні. Суцвіття середньої довжини, веретеноподібної форми. Квітка світло-рожевого кольору з нерівномірним забарвленням. Бобик середнього розміру, з короткими зубчикам.

Сорт середньостиглий. Має високу посухостійкість та зимостійкість. Стійкий до вилягання. Ураженість хворобами незначна. Урожайність сухої речовини за роки випробування у зоні Лісостепу - 70,1 ц/га, П-64,6ц/га. Залистяність становила Л-52,3%,П-56,3%. Вегетаційний період -Л-70,0дн, П-74,0дн. Вміст сирого протеїну - Л-18,0%, П-16,2%.

Конюшина лучна

® 06052001 Атлантіс — Полісся

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Тетраплоїд. Час цвітіння пізній. Рослина за висотою, товщиною стебла та кількістю міжвузль середня, з помірною щільністю опушення. Листок середній та з середньою частотою рослин з білими мітками. Забарвленням оболонки насіння жовте, суцвіття- фіолетове.

Середня урожайність сухої речовини становить - 80,7ц/га. Гарантована прибавка - 9,3ц/га, 11,2%.Вміст сирого протеїну- 18,3% Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб.Залистяність - 47,5%.. Днів до достигання 80,7днів. Напрям використання сінокісно-пасовищний.

® 05052001 Полісянка — Полісся

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Сорт тетраплоїдний. Рослини даного сорту характеризуються раннім часом цвітіння (час, коли на рослині зацвітає три головки).Найвище стебло рослини з головкою через 1-2 тижні після цвітіння середнє, з середньою товщиною стебла, та з середньою кількістю міжвузлів.Опушення рослини на четвертому зверху міжвузлі відсутнє або дуже слабке.Центральний листочок верхнього нормально розвинутого листка під останньою квіткою на цей же час за довжиною характеризується проявом ознаки середній та шириною від вузького до середнього.

Частота рослин з білими мітками на листках досягає частої кількості. Забарвлення суцвіття рожеве. Забарвлення оболонки зібраного з досліду насіння багатобарвне.

Середня урожайність сухої речовини становить - 84,3ц/га.Гарантована прибавка - 10,7ц/га, 12,6%. Вміст сирого протеїну- 18,1% Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб.Залистяність - 43,0%.. Днів до достигання 87,0днів. Напрям використання сінокісно-пасовищний.

® 07052001 Уна — Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Сорт диплоїдний. Рослини даного сорту характеризуються раннім часом цвітіння (час, коли на рослині зацвітає три головки). Найвище стебло рослини з головкою через 1-2 тижні після цвітіння середнє, з середньою товщиною стебла, та з середньою кількістю міжвузлів. Опушення рослини на четвертому зверху міжвузлі нещільне. Центральний листочок верхнього нормально розвинутого листка під останньою квіткою на цей же час за довжиною характеризується проявом ознаки середній та середньою шириною.

Частота рослин з білими мітками на листках досягає середньої кількості. Забарвлення суцвіття рожеве. Забарвлення оболонки зібраного з досліду насіння багатобарвне.

Середня урожайність сухої речовини становить - 79,7ц/га. Гарантована прибавка - 9,0ц/га, 10,8%. Вміст сирого протеїну- 17,8 % Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб.Залистяність - 46,7%.. Днів до достигання 79,7днів. Напрям використання сінокісно-пасовищний.

Люцерна посівна

® 05058001 Алія — Лісостеп, Полісся

Заявник: Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Рослина від низької до середньої (через два тижні після осіннього рівнодення) та середня весною. Кущ напівпрямий, листки помірно зеленого забарвлення, центральний листочок довгий., час цвітіння середній. Низька частота рослин з дуже темними синьо-фіолетовими квітками, дуже низька – зі змішаними, кремовими, білими та жовтими квітками. Рослина за довжиною та висотою середня з дуже низькою стійкістю до вертицильозного в'янення.

Середня урожайність сухої речовини становить: Лісостеп - 138,8ц/га, Полісся - 150,7ц/га.Гарантована прибавка: Лісостеп - 27,7ц/га, 19,9%, Полісся - 21,4ц/га, 14,2%. Вміст сирого протеїну: Лісостеп - 16,7% , Полісся - 20,7%.Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб.Залистяність: Лісотеп - 42,0%, Полісся - 40,3%. Днів до достигання: Лісостеп -88,0днів, Полісся - 57,0днів. Напрям використання сінокісно-пасовищний.

Степ

® 07058001 Банат ВС

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Висота рослини від середньої до високої. Габітус проміжний. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, середнього розміру. Квітка середньою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками відсутня або дуже низька. Час початку цвітіння від раннього до середнього. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить - 79,0ц/га, Гарантована прибавка:3,2ц/га, 4,05%. Вміст сирого протеїну - 17,0%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб.Залистяність - 59,0%. Днів до достигання - 80,0дн. Напрям використання сінокісно-пасовищний.

Лісостеп

® 05058002 Зоряна

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Висота рослини середня. Габітус прямий. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, листок за довжиною від середнього до довгого. Квітка з низькою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками відсутня або дуже низька. Час початку цвітіння середній. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить - 150,5ц/га, Гарантована прибавка:39,4ц/га, 26,1%. Вміст сирого протеїну - 22,0%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб.Залистяність - 43,0%. Днів до достигання - 88,0дн. Напрям використання сінокісно-пасовищний.

Степ, Полісся

® 06058001 Синюха

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Висота рослини від середньої до високої. Габітус напівпрямий. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, середнього розміру. Квітка середньою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками низька. Час початку цвітіння від раннього до середнього. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить: Степ - 80,0ц/га, Полісся - 163,3ц/га. Гарантована прибавка: Степ - 4,2ц/га, 5,25%, Полісся - 34,0ц/га, 20,8%. Вміст сирого протеїну: Степ - 18,0% , Полісся - 18,0%.Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб.Залистяність: Степ - 61,,0%, Полісся - 40,0%. Днів до достигання: Степ -80,0 днів, Полісся - 56,5днів. Напрям використання сінокісно-пасовищний.

Щириця

08099002 Пальміра

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Антоціанове забарвлення сімядолі відсутнє, забарвлення листкова пластинка - зелена, габітус рослини прямостоячий, листок за формою - яйцеподібний, інтенсивність антоуіанове забарвлення листка відсутня. Основний колір листка - світло-зелений, час початку цвітіння рослини - пізній, форма у поперечному розрізі стебла - хвилястий, суцвіття з кольором - коричневе, колір коріння підчас цвітіння - білий. Насіння за формою - уліптичне.

Костриця червона

® 08111006 Айра

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Плоїдність. Піхва листка з помірним забарвленням, листкова пластинка відкрита, забарвлення листка (восени в рік висіву) - темно-зелене. Прапорцевий листок за довжиною (на другій рік, за викиданням волоті) - від середньої до довгої, стебло за довжиною найдовшого (суцвітя включно, наприкінці цвітіння) - довге, остюки - відсутні. Нижня квіткова луска, опушення (за повної стиглості) - відсутнє.

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан їстивний

08022001 Біла лілія — Лісостеп, Закритий грунт

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Заявник: : Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. За габітусом рослина: прямостояча; за висотою рослина, (см): середня (40-59);антоціанові забарвлення стебла: відсутнє; опушення стебла: слабке; довжина міжвузлів гілки: середня; за розміром листок, (см): великий (більше за 15); край листка: хвилястий; ступінь хвилястості краю листка: сильна; листок за кольором: зелений; пурпурний колір квітки: світлий; основна форма плоду: циліндрична; колір шкірки плоду у товарній стиглості: білий; ребристість плоду: відсутня; колір м'якуша плоду: білуватий, час фізіологічної стиглості: середній.

Урожайність, т/га: 35; Період від сівби до початку достигання, днів 110, Період плодоношення, днів 75, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9,6.

09022002 Найт Леді F1 — Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Плід рослини овальної форми, довгий, діаметр малий, колір шкірки у товарній стиглості темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні, колір шкірки за фізіологічної стиглості коричневий. Час фізіологічної стиглості середній.

Загальна урожайність - 6,5 кг/м2; період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 95 днів; період плодоношення 60 днів; вміст сухої речовини в плоді 9 %.

® 08022003 Український Барон F1 — Закритий грунт

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Рослина висока, габітус - напівпрямостоячий. Плід середній за довжиною та діаметром, форма циліндрична, колір шкірки у товарній стиглості - темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні. Колір м`якуша плоду білуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду коричневий. Час початку цвітіння і стиглості ранні.

Загальна врожайність - 25,8 т/га; період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 121 день; період плодоношення 161 день; вміст сухої речовини в плоді 8,5 %.

09022005 Шарапова F1

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина висока, габітус - напівпрямостоячий. Плід середній за довжиною, діаметр середній, форма грушоподібна, колір шкірки у товарній стиглості - темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні. Колір м`якуша плоду зеленуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду коричневий. Час початку цвітіння і стиглості середній.

Загальна врожайність - 22,3 т/га, період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 85 днів; період плодоношення 15 днів; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 2, макроспоріозом 2; гнилями 2; вірусними хворобами 3; попелицею 3; вміст сухої речовини в плоді 9,8 %.

Буряк столовий

09023002 Акела

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина напівпряма, тип суплідця - багаторостковий. Антоціанове забарвлення гіпокотеля наявне. Листок за довжиною середній - 51-65 см. Листкова пластинка еліптичної форми середнього розміру, світло-зеленого кольору, з слабким антоціаном. Хвилястість краю слабка, пухирчастість слабка. Листковий черешок вузький, червоного кольору. Коренеплід червоного кольору, округлий, заглиблений у грунт на 1/4. Довжина і ширина коренеплоду середня, форма основи плеската, окорковіння слабке. М'якуш темно-червоного забарвлення, прояв кілець відсутній або дуже слабкий. Схильність до стрілкування за раннього висіву сильна.

Загальна врожайність - 4,4 кг/м2, маса товарного плоду - 470 г. Період від повних сходів до початку достигання - 125 днів. Вміст загального цукру - 7 %, сухої речовини в плоді - 8 %. Ураженість борошнистою росою - 2,3 %, церкоспорозом - 2%.

08023006 Лоретт

Заявник: Клоз

Сорт з одноростковим типом суплідця. Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотиля. Положення черешка у просторі напівпряме. Листок за довжиною і шириною середній, еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової пластинки помірне, хвилястість краю слабка, пухирчастість помірна. Коренеплід еліптичної форми у поздовжньому розрізі, на 1/4 заглиблений в грунт, має помірне окорковіння. Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якуша пурпурове. Прояв кілець помірний. Схильність до стрілкування за раннього висіву слабка.

Загальна урожайність сорту 55,0 т/га. Маса товарного плоду - 450 г. Вміст загального цукру - 9 %. Вміст сухої речовини у плоді - 11 %. Період від повних сходів до початку достигання 95 днів. Ураженість борошнистою росою - 1 %, ураженість церкоспорозом - 1 %.

08023010 Округлий темночервоний

Заявник: Ходовля Рослин Сновідза Сп. З.о.о

Тип суплiддя - багаторостковий. Антоціанове забарвлення гіпокотеля - наявне. Положення черешка листка - пряме. Листок довгий. Листкова пластинка довга, широка, еліптичної форми, світло-зелена, з слабким антоціаном, хвилястість краю - слабка, пухирчастість - слабка. Коренеплід яйцевидний, заглибленість у грунт середня - 1/4. Довжина і ширина коренеплоду середня, форма основи загострена. Окорковіння помірне. Колір шкірки - червоний. Основне забарвлення м'якуша - помірно пурпурове, темно пурпурове.Прояв кілець помірний. Схильність до стрілкування за раннього висіву - сильна.

Загальна врожайність 60 т/га, маса товарного плоду- 150-250 г. Вміст загального цукру - 11,5 %, сухої речовини в плоді - 16,5 %. Період від повних сходів до початку достигання - 115. Ураженість борошнистою росою та церкоспорозом - слабка.

08023008 Ронда F1 — **Степ, Лісостеп, Полісся**

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б. В. Тип суплiддя: багаторостковий; антоціанові забарвлення гіпокотиля паростка: наявне; положення черешка та листової пластинки: пряме; листок за довжиною (разом з черешком), (см): від середнього до довгого; листова пластинка за довжиною (см): довга (більша за 41), листова пластинка за шириною, (см): середня (16-20); форма листової пластинки: еліптична; інтенсивність зеленого забарвлення листової пластинки: помірне; антоціанове забарвлення листової пластинки: помірне; хвилястість краю листової пластинки: помірна; пухирчастість листової пластинки: слабка;форма поздовжнього розрізу коренеплоду: округла; коренеплід за довжиною, (см): середній (11-15); коренеплід за шириною, (см): середній (16-25); форма основи коренеплоду: округла; колір шкірки коренеплоду: червоний; основне забарвлення м'якуша коренеплоду: червоне.

Загальна урожайність сорту 75 т/га, Маса товарного плоду - 230 г. Період від повних сходів до початку достигання 122 діб. Ураженість хворобами, % : церкоспорозом 2, Вміст : загального цукру, % 5,2.

Горох овочевий

08024021 Асана — **Степ, Лісостеп, Полісся**

Заявник: Нюнемс Б.В.

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома-трьома квітками на вузлі, мають ранній час цвітіння і середній достигання .

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має дуже багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок помірно зеленого кольору з наявним сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, середніми параметрами і розміру, і довжини, і ширини, з наявною зубчастістю слабкого ступеня її прояву та довгою відстанню від найширшої частини до основи.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та відсутнім восковим нальотом, середній і за довжиною, і шириною з великою щільністю плямистості.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю його хвилястості.

Біб середньої і довжини, і ширини має зелений колір помірної інтенсивності, середню кількість насінних зачатків, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з середнім ступенем його прояву. Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 45 діб, період плодоношення – 6 діб та дружністю достигання 96 %.

Урожайність товарної продукції становить 12, 0 т/га, а загальної – 11,5 т/га бобів. Маса 100 бобів – 250 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4,5 балів.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20 %, загального цукру – 7,1 %.

Ураженість аскохітозом досягає 2,5 %, кореневими гнилями – 17 %.

08024011 Болеро

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома-трьома квітками на вузлі, мають ранній час цвітіння і середній достигання .

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок блакитно-зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, середніми параметрами і розміру, і довжини, і ширини, з відсутньою зубчастістю та середньою відстанню від найширшої частини до основи.

Прилисток добре розвинутий з наявною формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, з середніми параметрами і довжини, і ширини та відсутньою плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса кремовий з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та помірною інтенсивністю його хвилястості.

Біб середньої довжини і дуже вузький, має блакитно-зелений колір, середню кількість насінних зачатків, відсутню пергаментність, увігнутий тип вигину з відсутнім а бо дуже слабким ступенем його прояву та тупою формою зовнішньої частини верхівки.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з відсутньою їх зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика наявне.

Маса 1000 насінин – середня.

08024013 Бінго

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають пізній час і цвітіння і середній достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має дуже багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток блакитно-зеленого кольору, наявним сіруватим відтінком, добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" і наявним восковим нальотом, середньої довжини та вузький з помірною плямистістю.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика – короткий.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має малу ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою його хвилястістю.

Біб має середню кількість насінних зачатків, короткий і ширини, сильної інтенсивності зелений колір, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину з сильним ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – слабка.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 75 діб, період плодоношення – 5 діб та дружністю достигання 90 %.

Урожайність загальної продукції становить 4, 2 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 240 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 8 балів.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20,5 %, загального цукру – 6,3 %, білка – 21,2 %.

Ураженість аскохітозом досягає 10 %, кореневими гнилями – 10 %.

® 08024020 Бутана

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Нюнемс Б.В.

Рослини сорту високі, без антоціанового забарвлення та наявними вторинними листочками, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання .

Стебло нефасційоване, довге та має дуже багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок помірно зеленого кольору з наявним сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: малою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, дуже маленьким їх розміром, короткі за довжиною та вузькі за шириною, з відсутньою зубчастістю та короткою відстанню від найширшої частини до основи.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, довгий і широкий із помірною щільністю плямистості.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю його хвилястості.

Біб середньої і довжини, і ширини має зелений колір помірної інтенсивності, середню кількість насінних зачатків, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з середнім ступенем його прояву. Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 60 діб, період плодоношення – 7 діб та дружністю достигання 99 %.

Урожайність товарної продукції становить 12, 2 т/га, а загальної – 12,0 т/га бобів. Маса 100 бобів – 240 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4,5 балів.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20 %, загального цукру – 7,1 %.

Ураженість аскохітозом досягає 3 %, кореневими гнилями – 21 %.

08024015 Драгон

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: СЕМО а.с.

Рослини сорту з висотою від низької до середньої без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома квітками на вузлі, мають від дуже раннього до ран ого і час цвітіння, і достигання .

Стебло нефасційоване, має довжину від коротко середньої та малу кількість вузлів (з першим фертильним вузлом включно).

Листок помірно зеленого кольору з відсут атим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими пока иками: від малої до середньою їх кількості, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, середніми параметрами і розміру довжини та шириною – від середньої до широкої, відсутньою зубчастості та середньою відстанню від найширшої частини до осн ви.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою форм "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, довжиною від короткої до середньої, середньою шириною та інтенсивністю ільності плямистості від дуже малої до малої.

Квітка з параметрами довжини квітконіжки від сте а до першої квітки – від середньої до великої, шириною чашолистика – від малої до середньої та загостреною формою верхівки верх ого чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з максимальною його ширино – від малої до середньої, формою основи – від вигнутої до дуже вигнутої та інтенсивністю його хвилястості –від дуже слабкої до абкої.

Біб має довжину від дуже короткої до короткої та ву ку ширину, зелений колір помірної інтенсивності, середню кількість насінних зачатків, наявну пергаментність, увігнутий тип виги зі слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – омірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму к хмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору зі зморшкуватістю від помірної до сильної. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – від дуже малої до малої.

08024016Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 70 діб, період плодоношення – 4 доби та дружність достигання – 91 %.

Урожайність товарної продукції становить 11, 0 т/га, а загальної – 6 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 125 г.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 21 %, загального цукру – 13 %, білка – 6 %, бобів з пергаментом – 100 %.

Ураженість і аскохітозом, і кореневими гнилями досягає 2 %.

08024019 Донана

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Нюнемс Б.В.

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають ранній час цвітіння і середній достигання.

Стебло нефасційоване, коротке та має багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору зі слабкою інтенсивністю забарвлення, відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий з наявною формою "кролячих вух", наявним восковим нальотом, короткий та середньої ширини з великою щільністю плямистості.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика – середній.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та слабкою його хвилястістю.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середньої і довжини, і ширини, помірної інтенсивності зелений колір, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з середнім ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – слабка.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною слабкою

зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.
Маса 1000 насінин – велика.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 49 діб, період плодоношення –7 діб та дружністю достигання 99 %.
Урожайність товарної продукції становить 11, 9 т/га, а загальної – 11,7 т/га бобів. Маса 100 бобів –230 г.
Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4,5 бала.
Вміст сухої речовини в зерні досягає 21 %, загального цукру – 7,2 %.
Ураженість аскохітозом досягає 2,9 %, кореневими гнилями – 18 %.

08024018 Заміра — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Нюнемс Б.В.

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення з наявними вторинними листочками, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.
Стебло нефасційоване, середньої довжини та має дуже багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.
Вторинні листочки дуже маленькі за розміром, короткі та вузькі, кількість їх мала, середньої довжини і вузькі, мають коротку відстань від найширшої частини до основи та відсутню зубчастість. На верхніх вторинних листочках наявний восковий наліт.
Прилисток зеленого кольору з помірною інтенсивністю забарвлення, наявним сіруватим відтінком, добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" і наявним восковим нальотом, середніми показниками довжини і ширини без плямистості.
Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.
Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою його хвилястістю.
Біб має середню кількість насінних зачатків, середньої і довжини, і ширини, сильної інтенсивності зелений колір, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з середнім ступенем його прояву.
Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.
Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.
Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 50 діб, період плодоношення – 6 діб та дружністю достигання 98 %.
Урожайність товарної продукції становить 11, 6 т/га, а загальної – 12,1 т/га бобів. Маса 100 бобів – 220 г.
Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4,5 бала.
Вміст сухої речовини в зерні досягає 20 %, загального цукру – 6,9 %.
Ураженість аскохітозом досягає 3 %, кореневими гнилями – 19 %.

06024003 Ланковий — Лісостеп, Полісся

Заявник: Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослини сорту високі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають пізній час і цвітіння, і достигання .
Стебло нефасційоване, довге та має багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.
Прилисток зеленого кольору помірної інтенсивності з сіруватим відтінком, добре розвинутий з наявними формою "кролячих вух" і воскового нальоту, довгий і широкий з великою щільністю плямистості.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса від білого до кремового з середньою максимальною його шириною, вигнутою формою основи та помірною інтенсивністю його хвилястості.

Біб має велику кількість насінних зачатків, дуже довгий, середньої ширини, помірної інтенсивності зелений колір, наявне пергаментністm, увігнутий тип вигину зі слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 85 діб, період достигання – 10 діб та дружністю достигання 94 %.

Урожайність товарної продукції становить20, 5 т/га, а загальної – 22,3т/га бобів. Маса 1000 зерен – 442,5 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4,6 бала.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20,1 %, загального цукру – 6,3 %.

Ураженість аскохітозом і кореневими гнилями – відсутні.

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп, Полісся.

08024010 Оксамит

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Рослини середньої висоти, без антоціанового забарвлення, наявними вторинними листочками, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання .

Стебло нефасційоване, коротке та має середню кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листки зеленого кольору з сильної інтенсивністю забарвлення, наявним сіруватим відтінком, відсутнім восковим нальотом на верхніх вторинних листочках та середньою їх кількістю.

Вторинні листочки маленькі за розміром, мають середню довжину, вузькі, середню відстань від найширшої частини до основи та відсутню зубчастість.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" і наявним восковим нальотом, має середню і довжину, і ширину з малою плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою його хвилястістю.

Біб має велику кількість насінних зачатків, середню і довжину, і ширину, помірної інтенсивності зелений колір, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 55 діб, період плодоношення – 5 діб та дружністю достигання

87 %.

Урожайність ранньої продукції становить 8,95 т/га, а загальної – 9,57 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 175 г.

Боби з наявною пергаментністю (100 %). Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 8,7 бала.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 21,7 %, загального цукру – 10,4 %.

Ураженість аскохітозом – 0,8 %, кореневими гнилями – 2,1 %.

05024005 Ранок

Степ, Лісосткп, Полісся

Заявник: Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослини сорту за висотою - низькі, без антоціанового забарвлення і вторинними листочками, з одною-двома квітками на вузлі, мають дуже ранній час і цвітіння, і ранній достигання .

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має малу кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору помірної інтенсивності без сіруватого відтінку, добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" і відсутнім восковим нальотом, має середню і довжину, і ширину з малою плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та відсутньою або дуже слабкою його хвилястістю.

Біб має малу кількість насінних зачатків, середню і довжину, і ширину, слабкої інтенсивності зелений колір, з наявною пергаментністю, відсутній тип вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту з періодом від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 50 діб, періодом плодоношення – 21 добу та дружністю достигання
92 %.

Боби з наявною пергаментністю. Урожайність і ранньої, і загальної продукції становить 6,2 т/га бобів.

Ураженість аскохітозом - 18 %, кореневими гнилями – 10.

06024002 Спадок

Заявник: Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослини сорту дуже високі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають пізній час і цвітіння, і достигання .

Стебло нефасційоване, дуже довге та має багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток жовто-зеленого кольору з сіруватим відтінком, добре розвинутий з наявною формою "кролячих вух" та відсутнім восковим нальотом, середньої довжини і широкий із помірною щільністю плямистості.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса від білого до кремового з середньою максимальною його шириною, вигнутою формою основи та слабкою інтенсивністю його хвилястості.

Біб довгий та дуже широкий, має жовтий колір, велику кількість насінних зачатків, частково наявну пергаментність з наявним

потовщенням стулок, увігнутий тип вигину зі слабким ступенем його прояву. Волокна (жилки) шва відсутні або рудиментальні.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною сильною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

08024012 Талбот F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома квітками на вузлі, мають середній час цвітіння і ранній достигання .

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має середню кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок помірно зеленого кольору з наявним сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, середніми параметрами і розміру, і довжини, і ширини, з відсутньою зубчастістю та середньою відстанню від найширшої частини до основи.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, середній і за довжиною та вузький з помірною щільністю плямистості.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, вигнутою формою основи та помірною інтенсивністю його хвилястості.

Біб середньої і довжини і вузький, має зелений колір сильної інтенсивності, велику кількість насінних зачатків, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – сильна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 52 діб, період плодоношення – 8 діб та дружністю достигання 70 %.

Урожайність товарної продукції становить 12, 0 т/га, а загальної – 8 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 140 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4 бали.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20 %, загального цукру – 3,25 %, білка – 4,65 %.

08024022 Урбана

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Нюнемс Б.В.

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має дуже багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору з помірною інтенсивністю забарвлення, наявним сіруватим відтінком, добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" і наявним восковим нальотом, середніми показниками довжини і ширини з помірною плямистістю.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика – середній.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою його хвилястістю.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середньої і довжини, і ширини, помірної інтенсивності зелений колір, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з середнім ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 50 діб, період плодоношення – 6 діб та дружністю достигання 98 %.

Урожайність товарної продукції становить 11, 6 т/га, а загальної – 11,4 т/га бобів. Маса 1000 зерен –240 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4,5 бала.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20 %, загального цукру – 6,9 %.

Ураженість аскохітозом досягає 3 %, кореневими гнилями – 16 %.

® 08024023 Хесбана — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Нюнемс Б.В.

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання .

Стебло нефасційоване, довге та має дуже багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору з помірною інтенсивністю забарвлення, наявним сіруватим відтінком, добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" і наявним восковим нальотом, довгий і широкий з помірною плямистістю.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика – довгий.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою його хвилястістю.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середньої і довжини і ширини, помірної інтенсивності зелений колір, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з середнім ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 50 діб, період плодоношення – 6 діб та дружністю достигання 98 %.

Урожайність товарної продукції становить 11, 6 т/га, а загальної – 11,3 т/га бобів. Маса 1000 зерен –240 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4,5 бала.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20 %, загального цукру – 6,9 %.

Ураженість аскохітозом досягає 3 %, кореневими гнилями – 16 %.

08024014 Цезарь

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: СЕМО а.с.

Рослини сорту з висотою від низької до середньої, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома квітками на вузлі, мають від дуже раннього до раннього і час цвітіння, і достигання .

Стебло нефасційоване, має довжину від короткої до середньої та кількість вузлів (з першим фертильним вузлом включно) від малої до середньої.

Листок помірно зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, від маленького до середнього розміроом, від короткої до середньої довжиною та від вузької до середеьої шириною, відсутньою зубчастості та середньою відстанню від найширшої частини до основи.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, має коротку довжину, вузьку ширину та помірну інтенсивність щільності плямистості.

Квітка з параметрами довжини квітконіжки від стебла до першої квітки – від середньої до великої, малою шириною чашолистика та загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з максимальною його шириною від малої до середньої, формою основи від прямої до дуже вигнутої та інтенсивністю його хвилястості від відсутньої до дуже слабкої.

Біб має середню довжину та вузьку ширину, зелений колір помірної інтенсивності, середню кількість насінних зачатків, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину зі ступенем його прояву від слабкого до середнього.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин –мала.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 75 діб, період плодоношення – 4-5 діб та дружністю достигання 90 %.

Урожайність товарної продукції становить 12, 0 т/га, а загальної – 6,5 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 125 г.

Вміст загального цукру – 13,8 %, білка – 6,2 %, бобів з пергаментом – 100 %.

Ураженість аскохітозом та кореневими гнилями досягає по 2 %.

08024016 Цетрис

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: СЕМО а.с.

Рослини сорту від низької до середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, трьома квітками на вузлі, мають від раннього до середнього час цвітіння і ранній достигання .

Стебло нефасційоване, має довжину від короткої до середньої та середню кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок помірно зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, середніми параметрами і розміру, і довжини та шириною від вузької до середньої, з відсутньою зубчастістю та відстанню від найширшої частини до основи від середньої до довгої.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, середній за довжиною та шириною від вузької до середньої з помірною щільністю плямистості.

Квітка з параметрами довжини квітконіжки від стебла до першої квітки від малої до середньої, шириною чашолистика – від малої до середньої та загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з максимальною його шириною від малої до середньої, формою основи від прямої до вигнутої та інтенсивністю його хвилястості від дуже слабкої до слабкої.

Біб має довжину від дуже короткої до короткої, ширину – від дуже вузької до вузької, зелений колір помірної інтенсивності, кількість насінних зачатків від середньої до великої, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину з ступенем його прояву від слабкого до середнього.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – від дуже малої до малої.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 80 діб, період плодоношення – 4-5 діб та дружністю достигання 92 %.

Урожайність товарної продукції становить 13, 0 т/га, а загальної – 7 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 115 г.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 22 %, загального цукру – 13,2 %, білка – 6,3 %, бобів з пергаментом – 100 %.

Ураженість аскохітозом досягає 1 %, кореневими гнилями – 1 %.

Диня посівна (звичайна)

09025001 Амалік F1 — Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, слабка зубчастість, хвилястість країв помірна. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків вертикальна. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед достиганням сіро-зелений. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період достигання брунатно-жовтий, форма основи і верхівки заокруглена, зморшкуватість поверхні помірна, коркове утворення з сітчастим візерунком. М`якуш в поперечному розрізі середній, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 5,5 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 60 днів; період плодоношення 15 днів; Вміст: сухої речовини у плоді - 17 %, загального цукру - 15,6 %.

® 08025004 Воллер — Лісостеп, Полісся

Заявник: Нюнемс Б.В.

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок короткий за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед достиганням сіро-зелений. Для плоду характерні такі ознаки: короткий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період достигання зелений, форма основи і верхівки плеската, смуги відсутні, наявні зморшкуватість поверхні і коркове утворення з сітчастим візерунком. М`якуш в поперечному розрізі товстий, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 40 т/га; період від повних сходів до першого збору 25 днів; період від першого до останнього збору 15 днів; ураженість борошнистою росою - 30 %, вірусними хворобами - 60%; пошкодження шкідниками - попелицею - 30 %, вміст сухої речовини у плоді - 15 %, вміст загального цукру - 12 %.

Закритий грунт

® 08025003 Євпраксія

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок короткий, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю однодомні. Основний колір шкірки плоду перед достиганням зелений. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період достигання жовтий, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка. М`якуш в поперечному розрізі товстий, колір зелений. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 14,9 т/га; період від повних сходів до першого збору 46 днів; Вміст: сухої речовини у плоді - 7,4 %, загального цукру - 10,1 %.

Закритий грунт

09025002 Каріббіан Голд

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Листкова пластинка характеризується такими показниками: велика, слабка інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, слабка зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю однодомні. Основний колір шкірки плоду перед достиганням сіро-зелений. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу яйцевидна, основний колір шкірки в період достигання білий, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення з сітчастим візерунком. М`якуш в поперечному розрізі середній, колір оранжевий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 45 т/га; період від повних сходів до першого збору 65 днів; період плодоношення 12 днів; ураженість антракнозом - 0,2 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 11 %, загального цукру - 5,5 %.

Закритий грунт

08025008 Має F1

Заявник: Клоз

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю однодомні. Основний колір шкірки плоду перед достиганням зелений. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу еліптична, основний колір шкірки в період достигання зелений, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення з сітчастим візерунком. М`якуш в поперечному розрізі середній за товщиною, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 6 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 95 днів; період плодоношення 60 днів; ураженість борошнистою росою - 0,5 %, бактеріозом - 1,5 %, антракнозом - 0,5 %, вірусними хворобами - 2%. Вміст: сухої речовини у плоді - 10 %, загального цукру - 18 %.

Закритий грунт

09025004 Міра F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, сильна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед достиганням жовтий. Для плоду характерні такі ознаки: короткий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу еліптична, основний колір шкірки в період достигання білий, форма основи плеската, форма верхівки заокруглена, смуги відсутні, наявні зморшкуватість поверхні і коркове утворення з сітчастим візерунком. М`якуш в поперечному розрізі товстий, колір зелений. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 28 т/га; період від повних сходів до першого збору 65 днів; вміст загального цукру - 15 %.

09025003 Раймонд F1

Закритий грунт

Заявник: Хазера Генетікс

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, сильна інтенсивність зеленого забарвлення, сильна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю однодомні. Основний колір шкірки плоду перед достиганням жовтий. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу яйцевидна, основний колір шкірки в період достигання зелений, форма основи і верхівки заокруглена, смуги наявні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення відсутнє. М`якуш в поперечному розрізі середній, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 7 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 65 днів; період плодоношення 15 днів; ураженість борошнистою росою - 5 %, бактеріозом - 3 %, антракнозом - 2 %, вірусними хворобами - 4%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 9 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 8 %, загального цукру - 13 %.

08025010 Сітірекс F1

Закритий грунт

Заявник: Клоз

Листкова пластинка характеризується такими показниками: за розміром від середньої до великої, слабка інтенсивність зеленого забарвлення, вираженість лопатей від слабкої до помірної, слабка зубчастість і помірна хвилястість країв. Черешок короткий, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед достиганням зелений. Для плоду характерні такі ознаки: короткий, за діаметром вузький, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період достигання брунатно-жовтий, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення з сітчастим візерунком. М`якуш в поперечному розрізі товстий, колір зелений. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 6 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 10 днів; ураженість борошнистою росою -0,3 %, бактеріозом - 1,0 %, антракнозом - 0,5 %, вірусними хворобами - 2%. Вміст: сухої речовини у плоді - 10 %, загального цукру - 18 %.

® 06025006 Шрек

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна

вираженість лопатей, помірна зубчастість країв, слабка хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків вертикальне. Квітки за статтю однодомні. Основний колір шкірки плоду перед достиганням зелений. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром вузький, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу видовжена, основний колір шкірки в період достигання зелений, форма основи плеската, форма верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення відсутнє. М`якуш в поперечному розрізі товстий, колір кремовий. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кольору слонової кістки.

Загальний урожай 30-32 т/га; товарна урожайність - 28 т/га; товарних плодів від загального урожаю - 92 %; маса товарного плоду - 400 г; довжина товарного плоду - 20 см; діаметр товарного плоду - 7-10 см; період від повних сходів до першого збору 95 днів; період плодоношення 30 днів; ураженість борошнистою росою - 4 %, антракнозом - 0,2 %, вірусними хворобами - 2,0%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 4,4 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 26 %, загального цукру - 21 %. Транспортабельність - 4,4 балів. Напрямок використання - універсальний.

Кабачок

09026004 Ардендо 174

Закритий грунт

Заявник: Енза Заден Біхір Б.В.

Габітус рослини кущовий, галуження відсутнє. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка відсутня, колір зелений, форма поперечного перерізу округла, плямистість наявна, тип плямистості дифузний та плямистий, основна форма еліптична. Основний колір стиглого плоду - кремовий. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід середній за довжиною.

Товарний урожай 650 ц/га; вміст сухої речовини 4,5%; днів до достигання - 70.

® 03026005 Аспірант

Полісся, Лісостеп, Степ

Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом кущова. Наявна мармуровість листкової пластинки. Основний колір молодого плоду зелений, відсутня плямистість, форма - циліндрична. Основний колір стиглого плоду жовтий.

Товарний урожай - 547 ц/га, середня маса плоду - 600 г, вміст сухої речовини - 6,3 %, дегустаційна оцінка - 4,9 бали, днів до достигання - 38,

08026002 Асма F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Клоз

Габітус рослини кущовий, галуження відсутнє. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка відсутня, колір білуватий і зелений, форма поперечного перерізу округла, крапчастість дифузна та плямиста, основна форма циліндрична. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий.

Товарний урожай 35 ц/га; вміст сухої речовини 9 %; днів до достигання - 40.

09026002 Карізма F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Габітус рослини кущовий, галуження наявне. Молодий плід характеризується такими ознаками: від середнього до довгого за довжиною, середній за діаметром, шийка наявна, колір білуватий, форма поперечного перерізу кутаста, плямистість наявна, тип плямистості тільки дифузний, основна форма булавоподібна. Основний колір стиглого плоду - кремовий. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід довгий.

Вміст сухої речовини 8%; днів до достигання - 44; товарний урожай - 110 ц/га; антракноз 3 %; фузаріоз 3%.

09026001 Карамболь F1 — Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Габітус рослини кущовий, наявне помірне галуження. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка відсутня, колір білуватий і жовтий, форма поперечного перерізу округла, плямистість наявна, тип плямистості дифузний, основна форма циліндрична. Основний колір стиглого плоду - зелений. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід дуже короткий.

Товарний урожай 4,6 ц/га; вміст сухої речовини 10%; днів до достигання - 46; борошниста роса 1 %; антракноз 1 %; плямистість бактеріальна 1,5 %.

08026006 Сціллі F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Габітус рослини кущовий, галуження наявне. Молодий плід характеризується такими ознаками: середній за довжиною, діаметр середній, шийка наявна, колір зелений, форма поперечного перерізу округла, плямистість наявна, тип плямистості дифузний та плямистий, основна форма поперечного перерізу округла, основна форма булавоподібна. Основний колір стиглого плоду - кремовий. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід середній за довжиною.

Товарний урожай 110 ц/га; днів до достигання - 40.

Кавун звичайний

® 07027002 Арсенал — Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Плоїдність: диплоїд; маса плоду, (кг): від великої до дуже великої (6-7); форма поздовжнього розтину плоду: широко-еліптична; основний колір шкірки плоду: зелений; смуги плоду: наявні; ширина смуг плоду: середні; мармурова крапчастість плоду: наявна; колір м'якуша плоду: рожевий; основний колір оболонки сім'янки: червоний.

Загальний урожай 35,5 т/га; період від повних сходів до першого збору 90 днів; пожкодження шкідниками - попелицею, % 25; вміст сухої речовини в плоді, % 9,03; вміст загального цукру, %. 6,45.

08027020 Бонта F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Сім`ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду середня, форма поздовжнього розрізу округла. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середньої ширини смуги, мармурова крапчастість середньої інтенсивності. Колір м`якуша плоду червоний. Початок цвітіння середній, початок достигання ранній.

Загальний урожай 90 т/га; період від повних сходів до першого збору 75 днів; період плодоношення 65 днів; Ураженість хворобами: борошнистою росою - 1,0 %, переноспорозом - 5,0 %, бактеріозом - 5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 %.

08027021 Бостон F1

Степ, Лісостеп

Заявник: Нюнемс Б.В.

Сім`ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за довжиною, широка, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу округла. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість середньої інтенсивності. Колір м`якуша плоду червоний. Початок цвітіння та достигання середні.

Загальний урожай 70 т/га; період від повних сходів до першого збору 75 днів; період плодоношення 10 днів; вміст сухої речовини - 9 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 60 %.

09027014 Бостана F1

Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Сім`ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу округла. Основний колір шкірки плоду жовтий, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м`якуша плоду рожевий. Початок цвітіння середній, початок достигання ранній.

Загальний урожай 50 т/га; період від повних сходів до першого збору 60 днів; період плодоношення 3-5 днів; вміст сухої речовини - 7 %; вміст загального цукру - 10,5 %. Ураженість хворобами: переноспорозом - 10 %, антракнозом - 10 %, борошнистою росою - 10 %.

09027013 ВДЛ 5003

Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Сім`ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від великої до дуже великої, форма поздовжнього розрізу широко-еліптична. Основний колір шкірки плоду жовтий, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м`якуша плоду рожевий. Початок цвітіння середній, початок достигання ранній.

Загальний урожай 60 т/га; період від повних сходів до першого збору 70 днів; період плодоношення 5 днів; вміст сухої речовини - 7 %; вміст загального цукру - 10,5 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 10 %, борошнистою росою - 10 %, переноспорозом - 10 %.

09027006 Екстазі F1

Закритий грунт

Заявник: Хазера Генетікс

Сім`ядолі широко-еліптичної форми, великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м`якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та достигання пізній.

Товарний урожай 7,5 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 25 днів; вміст сухої речовини - 6,0 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: переноспорозом - 5 %, бактеріозом - 5,0 %, борошнистою росою - 3,0 %, антракнозом - 5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7,0 %.

09027003 Ерлі Саманта F1

Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Диплоїд. Рослина кущова, головне стебло довге. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого забарвлення. Плоди еліптичної форми у поздовжньому розрізі, маса - дуже велика. Переважає зелений колір шкірки, наявні дуже широкі смуги, відсутня мармурова крапчастість. М'якуш червоний, помірний за твердістю.

Загальний урожай 5,3 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 75 днів; період плодоношення 12 днів; вміст сухої речовини - 13 %; вміст загального цукру - 15 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 1,5 %, борошнистою росою - 1,5 %, переноспорозом - 1,0 %; вірусними хворобами - 1,0 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 2,0 %.

09027004 Ерлі Джитана F1 — Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Диплоїд. Рослина кущова, головне стебло середньої довжини. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого кольору. Плоди округлої форми у поздовжньому розрізі, маса - від середньої до великої. Переважає жовтий колір шкірки, наявні смуги середнього розміру, наявна дуже слабка мармурова крапчастість. М'якуш червоний, помірний за твердістю.

Загальний урожай 8 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 78 днів; період плодоношення 12 днів; вміст сухої речовини - 13 %; вміст загального цукру - 12,5 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 1,5 %, борошнистою росою - 1,0 %, переноспорозом - 1,5 %; вірусними хворобами - 1,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %.

09027005 Колумбія F1 — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Сім`ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду середня, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість слабкої інтенсивності. Колір м`якуша плоду червоний. Початок цвітіння та достигання ранні.

Загальний урожай 10,3 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 65 днів; період плодоношення 20 днів; вміст сухої речовини - 10 %; вміст загального цукру - 7 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 0,2 %, борошнистою росою - 0,3 %.

08027010 Кароліна F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Клоз

Сім`ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за довжиною та широка, сіро-зеленого кольору. Маса плоду дуже велика, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість дуже слабкої інтенсивності. Колір м`якуша плоду червоний. Початок цвітіння та достигання середній.

Загальний урожай 45 т/га; період від повних сходів до першого збору 69 днів; період плодоношення 15 днів; вміст сухої речовини - 11 %; вміст загального цукру - 8 %. Ураженість хворобами: бактеріозом - 1,5 %, борошнистою росою - 1,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %.

08027023 Кодак F1 — Закритий грунт

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Сім`ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м`якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та достигання пізній.

Загальний урожай 7,5 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 70 днів; період плодоношення 85 днів; вміст сухої речовини - 6,0 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 5,0 %, борошнистою росою - 3,0 %, переноспорозом - 5,0 %, бактеріозом - 5,0 %, вірусними хворобами - 6,0 %.

Закритий грунт

09027002 Карнаката F1

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Сім`ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус кущовидний. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду дуже велика, форма поздовжнього розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні широкі смуги, мармурова крапчастість дуже слабкої інтенсивності. Колір м`якуша плоду червоний. Початок цвітіння та достигання ранні.

Загальний урожай 5,6 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 85 днів; період плодоношення 11 дні; вміст сухої речовини - 14 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: бактеріозом - 1,0 %, антракнозом - 1,0 %, вірусними хворобами - 1,0 %, борошнистою росою - 1,0 %, переноспорозом - 1,0 %. Пошкодження шкідниками - попелицею - 1,0 %.

Закритий грунт

09027008 Капа F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Сім`ядолі вузько-еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду велика, форма поздовжнього розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість слабкої інтенсивності. Колір м`якуша плоду червоний. Початок цвітіння та достигання середні.

Загальний урожай 50 т/га; період від повних сходів до першого збору 60 днів; вміст сухої речовини - 8 %; вміст загального цукру - 10 %.

Степ, Лісостеп, Полісся

08027009 Медісон F1

Заявник: Клоз

Сім`ядолі широко-еліптичної форми, великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду дуже велика, форма поздовжнього розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні широкі смуги, мармурова крапчастість слабкої інтенсивності. Колір м`якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та достигання середні.

Загальний урожай 50 т/га; період від повних сходів до першого збору 68 днів; період плодоношення 20 днів; вміст сухої речовини - 11 %; вміст загального цукру - 7 %. Ураженість хворобами: бактеріозом - 1,5 %, борошнистою росою - 1,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %.

Степ, Лісостеп, Полісся

® 08027022 Макс Плюс

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Сім`ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу широко-еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні широкі смуги, мармурова крапчастість слабкої інтенсивності. Колір м`якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та достигання середні.

Загальний урожай 40,6 т/га; період від повних сходів до першого збору 73 дні; період плодоношення 30 днів; вміст сухої речовини - 9,5 %; вміст загального цукру - 8,2 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 3,5 %.

Закритий грунт

® 08027005 Пестунчик

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Сім`ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду велика, форма поздовжнього розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м`якуша плоду пурпуровий. Початок цвітіння та достигання ранні.

Загальний урожай 14,7 т/га; період плодоношення 38 днів; вміст сухої речовини - 9 %; вміст загального цукру - 4,2 %.

09027001 Призматика F1

Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Диплоїд. Рослина кущова, головне стебло довге. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого кольору. Плоди еліптичної форми у поздовжньому розрізі, маса - дуже велика. Переважає зелений колір шкірки, наявні широкі смуги, мармурова крапчастість відсутня. М'якуш червоний, помірний за твердістю.

Загальний урожай 6,6 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 12 днів; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 1,0 %, борошнистою росою - 1,0 %, переноспорозом - 1,0 %; вірусними хворобами - 1,0 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,0 %.

® 09027007 Cагі F1

Закритий грунт

Заявник: Хазера Генетікс

Сім`ядолі широко-еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м`якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та достигання ранні.

Загальний урожай 7,5 кг/м2; період від повних сходів до першого збору 70 днів; період плодоношення 85 днів; вміст сухої речовини - 6,0 %; вміст загального цукру - 14,0 %. Ураженість хворобами: пероноспорозом - 5%, бактеріозом - 5,0 %, борошнистою росою - 3,0 %, антракнозом - 5 %, вірусними хворобами - 5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7,0 %.

09027012 Селебрейшн F1

Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Сім`ядолі широко-еліптичної форми, великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду жовтий, наявні середні смуги, мармурова крапчастість середньої інтенсивності. Колір м`якуша плоду рожевий. Початок цвітіння середній, початок достигання ранній.

Загальний урожай 90 т/га; період від повних сходів до першого збору 60 днів; період плодоношення 2 дні; вміст сухої речовини - 9 %; вміст загального цукру - 12 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 10 %, борошнистою росою - 10 %, переноспорозом - 10 %.

08027008 Чарльстон грей

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Клоз

Сім`ядолі еліптичної форми, від середнього до великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від великої до дуже великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду білий, відсутні смуги, мармурова крапчастість сильної інтенсивності. Колір м`якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та достигання середні.

Загальний урожай 100 т/га; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 15 днів; вміст сухої речовини - 11 %; вміст загального цукру - 8 %. Ураженість хворобами: бактеріозом - 1,5 %, борошнистою росою - 1,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %.

Степ

® 07027003 Чумак

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Плоїдність: диплоїд; маса плоду, (кг): велика (5,1-6); форма поздовжнього розтину плоду: округла; основний колір шкірки плоду: зелений; смуги плоду: наявні; ширина смуг плоду: середні; мармурова крапчастість плоду: наявна; колір м'якуша плоду: рожевий; основний колір оболонки сім'янки: кремовий.

Загальний урожай 36,5 т/га; період від повних сходів до першого збору 97 днів; пожкодження шкідниками - попелицею, % 8; вміст сухої речовини в плоді, % 10,41; вміст загального цукру, %. 7,49.

Капуста білоголова

Степ, Лісостеп, Полісся

08028015 Бреді F1

Заявник: Клоз

Рослина низька за висотою. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків горизонтальне, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки широко-яйцеподібна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 2,0. Вміст сухої речовини, % - 9,0. Вміст вітаміну С, мг% - 43,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, т/га - 80,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 80. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,5, бактеріозом судинним - 1,5.

Закритий грунт

08028032 Бурбон F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт слабкий, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка нещільна.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 15,0. Вміст вітаміну С, мг% - 25,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, кг/м2 - 9,7. Лежкість, балів - 2. Ураженість хворобами, %: бактеріозом судинним - 8,0.

Степ, Лісостеп, Полісся

08028016 Гардіан F1

Заявник: Клоз

Рослина низька за висотою. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків піднесене, малого розміру, форма пластинки широкообернено-яйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма

поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка нещільна.

Вміст білка, % - 1,5. Вміст сухої речовини, % - 7,9. Вміст вітаміну С, мг% - 50. Вміст загального цукру, % - 4,1. Загальна урожайність, т/га - 110,0. Лежкість, балів - 6. Період від сівби до початку достигання, днів - 75. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 2, бактеріозом судинним - 2.

09028019 Грегоріан F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина за висотою від низької до середньої. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками від малого до середнього, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя від слабкої до помірної, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення від слабкої до помірної. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі увігнута, інтенсивність забарвлення покривних листків від світлої до помірної, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 4,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, т/га - 95,0. Лежкість, балів - 5. Період від сівби до початку достигання, днів - 70. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 10,0, бактеріозом судинним - 10,0.

08028033 Гілсон F1 — Закритий грунт

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків спрямоване догори, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка дуже щільна.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 15,0. Вміст вітаміну С, мг% - 25,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, кг/м2 - 9,7. Лежкість, балів - 2. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 12,0, бактеріозом судинним - 15,0.

08028029 Колія F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкояйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення слабка. Форма поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна.

Вміст білка, % - 1,2-1,5. Вміст сухої речовини, % - 8,5-9,0. Вміст вітаміну С, мг% - 35-53. Вміст загального цукру, % - 2,95-4,1. Загальна урожайність, т/га - 120,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 165.

09028017 Кілатон F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,0. Загальна урожайність, т/га - 110,0. Лежкість, балів - 9. Період від сівби до початку достигання, днів - 135. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 10,0, бактеріозом судинним - 10,0.

Закритий грунт

09028020 Кілагрег F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,0. Загальна урожайність, т/га - 40,0. Лежкість, балів - 3. Період від сівби до початку достигання, днів - 55. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 10, бактеріозом судинним - 10.

Степ, Лісостеп, Полісся

® 09028030 Кіклоп F1

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя від дуже слабкої до слабкої, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення від помірної до сильної. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка дуже щільна.

Загальна урожайність, т/га - 85,0. Лежкість, балів - 8. Період від сівби до початку достигання, днів - 155. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 3,0, бактеріозом судинним - 4,0.

Степ, Лісостеп, Полісся

® 05028010 Лазурна

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Рослина дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя сильна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки обернено-яйцеподібна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст сухої речовини, % - 9,11. Вміст вітаміну С, мг% - 33,18. Вміст загального цукру, % - 5,04. Загальна урожайність, т/га - 64,6-94,4. Період від сівби до початку достигання, днів - 170. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 0,9, бактеріозом судинним - 10,1.

09028021 Лібератор F1

Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великі, форма пластинки широкообернено-яйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 4,5. Вміст сухої речовини, % - 10,5. Вміст вітаміну С, мг% - 38. Вміст загального цукру, % - 3,0. Загальна урожайність, т/га - 35,0. Період від садіння 30-денної розсади до початку достигання, днів - 45. Період плодоношення - 5 днів. Ураженість хворобами, %: бактеріозом судинним - 9,0.

09028010 Місато F1

Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Рослина низька. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків піднесене, малі за розміром, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки плескатий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт слабкий, інтенсивність зеленого забарвлення сильна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна.

Вміст загального цукру, % - 4,1. Загальна урожайність, т/га - 50,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 70. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 11.

09028008 Муксума F1

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків спрямоване догори, великого розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя відсутня або дуже слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки обернено-яйцеподібна, форма основи у поздовжньому розрізі увігнута, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка дуже щільна.

Вміст білка, % - 2,8. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 3,8. Загальна урожайність, т/га - 110,0. Лежкість, балів - 8. Період від сівби до початку достигання, днів - 90. Ураженість хворобами, %: бактеріозом судинним - 0,2.

09028016 Пруктор F1

Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки штрокообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 18,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,5. Загальна урожайність, т/га - 45,0. Лежкість, балів - 5. Період від сівби до початку достигання, днів - 50. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,0, бактеріозом судинним - 1,0.

Степ, Лісостеп, Полісся

08028005 Ріекшн F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: : Бейо Заден Б.В. Форма поздовжнього розрізу головки: округла; за довжиною головка, (см): від короткого до середнього; за діаметром головка, (см): від малої до середньої; розміщення найбільшого діаметра голівки: в середині; ступінь покриття голівки: покрита; щільність голівки: щільна; час збиральної стиглості: від середнього до пізнього.

Загальна врожайність, т/га: 110. Період від сівби до початку достигання, днів 140, Вміст : сухої речовини, % 7,9, Вміст : загального цукру, % 4,1, Вміст : вітаміну С, мг % 50, Вміст : білка, % 1,5, Лежкість, балів 6.

Степ, Лісостеп, Полісся

08028014 Ранокі F1

Заявник: Клоз

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків спрямоване догори, середнього розміру, форма пластинки широкообернено-яйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки обернено-яйцеподібна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна.

Вміст білка, % - 1,5. Вміст сухої речовини, % - 8,0. Вміст вітаміну С, мг% - 50. Вміст загального цукру, % - 6,0. Загальна урожайність, т/га - 125,0. Лежкість, балів - 9. Період від сівби до початку достигання, днів - 140. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,5, бактеріозом судинним - 1,5.

Лісостеп, Степ

06028016 Славанова

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма-Елітсортнасіння"

Заявник: : Бейо Заден Б.В. Форма поздовжнього розрізу головки: піднесена; за довжиною головка, (см): довга; за діаметром головка, (см): велика; розміщення найбільшого діаметра голівки: в середині; ступінь покриття голівки: покрита; щільність голівки: щільна; час збиральної стиглості: середній.

Загальна врожайність, т/га: 45,0. товарний урожай - 40 т/га. Період від сівби до початку достигання, днів 110, Вміст : сухої речовини, % 8,5, Вміст : загального цукру, % 4,3, Вміст : вітаміну С, мг % 58, Лежкість, балів 9. Транспортабельність - 9 балів. Дружність достигання - 90 %. Щільність головки - 7 балів.

Закритий грунт

09028014 Санторіно 60 F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом синьо-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,0. Загальна урожайність, т/га - 35,0. Лежкість, балів - 3. Період від сівби до початку достигання, днів - 60. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,0, бактеріозом судинним - 1,0.

08028017 Сір F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Клоз

Рослина низька за висотою. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, малого розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 2,0. Вміст сухої речовини, % - 9,0. Вміст вітаміну С, мг% - 45,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, т/га - 130,0. Лежкість, балів - 6,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 60. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,5, бактеріозом судинним - 1,5.

09028031 Соня F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки плескатий, пухирчастість зовнішнього листя від дуже слабкої до слабкої, колір з восковим нальотом синьо-зелений, восковий наліт від помірного до сильного, інтенсивність зеленого забарвлення від помірної до сильної. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Загальна урожайність, т/га - 95,0. Лежкість, балів - 8. Період від сівби до початку достигання, днів - 142. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 3,0, бактеріозом судинним - 4,0.

08028019 Сателіт F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: : Бейо Заден Б.В. Форма поздовжнього розрізу головки: округла; за довжиною головка, (см): середня (16-20); за діаметром головка, (см): середня (16-25); розміщення найбільшого діаметра голівки: в середині; ступінь покриття голівки: покрита; щільність голівки: щільна; час збиральної стиглості: середній.

Загальна врожайність, т/га: 95,0. Період від сівби до початку достигання, днів 110, Вміст : сухої речовини, % 7,6, Вміст : загального цукру, % 4,3, Вміст : вітаміну С, мг % 48, Вміст : білка, % 1,5, Лежкість, балів 2.

® 09028029 Таргет F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків від спрямованого догори до піднесеного, великого розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя від дуже слабкої до слабкої, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення від помірної до сильної. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків від помірної до темної, внутрішнє забарвлення качана

білувате, головка дуже щільна.

Загальна урожайність, т/га - 100,0. Лежкість, балів - 8. Період від сівби до початку достигання, днів - 140. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 3,0, бактеріозом судинним - 4,0.

Закритий грунт

09028009 Такома F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великі, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом синьо-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення слабка. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 18,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,0. Загальна урожайність, т/га - 107,0. Лежкість, балів - 8. Період від сівби до початку достигання, днів - 95. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 0,3.

Степ, Лісостеп, Полісся

08028030 Фуріос F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Рослина за висотою від середньої до високої. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка за щільністю: від щільної до дуже щільної.

Вміст білка, % - 1,5. Вміст сухої речовини, % - 9,2. Вміст вітаміну С, мг% - 35-53. Вміст загального цукру, % - 4,1. Загальна урожайність, т/га - 120,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 185.

Степ, Лісостеп, Полісся

08028031 Фундаксі F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками від середнього до великого, положення зовнішніх листків піднесене, розмір від середнього до великого, форма пластинки широкообернено-яйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення від слабкої до помірної. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків від світлої до помірної, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка за щільністю від середньої до щільної.

Вміст білка, % - 1,5. Вміст сухої речовини, % - 9,2. Вміст вітаміну С, мг% - 35-53. Вміст загального цукру, % - 4,1. Загальна урожайність, т/га - 140,0. Лежкість, балів - 9. Період від сівби до початку достигання, днів - 190.

Закритий грунт

09028011 Хітомі F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків горизонтальне, середнього розміру, форма пластинки широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя відсутня або дуже слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма

поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна.

Вміст загального цукру, % - 3,9. Загальна урожайність, т/га - 80,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 85.

09028012 Хонка F1 — Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Рослина дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків горизонтальне, середнього розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом жовто-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення слабка. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна.

Вміст загального цукру, % - 4,5 Загальна урожайність, т/га - 100,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 90.

08028028 Чамп F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Рослина низька. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, зовнішні листки спрямовані догори, середнього розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт слабкий, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення головки жовтувате, щільність головки середня.

Вміст білка, % - 1,1-1,35. Вміст сухої речовини, % - 7,2-8,2. Вміст вітаміну С, мг% - 25-48. Вміст загального цукру, % - 2,89-3,81. Лежкість, балів - 20. Загальна урожайність, т/га - 75,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 92.

Капуста броколі

09148001 Кезі F1 — Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Рослина за висотою - середня, має більше ніж одне стебло. Листок за довжиною середній, за положенням - напівпрямий, зеленого кольору. Головка характеризується такими показниками: маленький розмір, вузько-обернено-еліптична форма поздовжнього розрізу, зеленого кольору, щільна, покривні листки відсутні.

Товарний урожай 29 т/га; днів до достигання 110.

Капуста брюссельська

09149001 Діабло F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Рослина середня за висотою. Тенденція до формування головки відсутня або дуже слабка. Плід округлої форми у поздовжньому розрізі. Колір плоду помірно-зелений, відкритість зовнішніх листків помірна. Зовнішній вигляд колони плодів циліндричний.

Загальний урожай 28 т/га; днів до достигання 155; період плодоношення - 23 дні. Вміст: сухої речовини - 15,5 %; загального цукру - 5,2 %; вітаміну С - 29,1 мг%; білка - 21 %. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий - 3 %; бактеріоз судинний - 3 %.

Капуста червоноголова

08030007 Гарансі F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Клоз

Рослина дуже висока. Найбільший діаметр головки маленький. Зовнішні листки великого розміру, форма пластинки широкояйцевидна, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, наявне зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, частково покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання середній.

Загальний урожай 120 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 140 днів; лежкість, балів 7. Вміст: сухої речовини - 8 %; загального цукру - 5,0 %; вітаміну С - 51 мг%; білка - 1,5 %.

® 09030005 Могікан F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Рослина висока. Найбільший діаметр головки великий. Зовнішні листки великого розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, наявне зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання пізній.

Загальний урожай 80 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 158 днів; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 2, бактеріоз судинний 3; лежкість, балів 8.

09030002 Нуріма F1

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина середня за висотою. Найбільший діаметр головки середній. Зовнішні листки середнього розміру, форма пластинки округла, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, відсутнє зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання пізній.

Загальний урожай 75 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 80 днів; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 0,1, бактеріоз судинний 0,1; лежкість, балів 9. Вміст: сухої речовини - 8 %; загального цукру - 3,4 %; вітаміну С - 35 мг%; білка - 2,5 %.

08030013 Романов F1

Закритий грунт

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Рослина середня за висотою. Найбільший діаметр головки середній. Зовнішні листки середнього розміру, форма пластинки широкояйцевидна, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, відсутнє зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, середня за щільністю, час розтріскування після достигання середній.

Загальний урожай 9,6 кг/м2; період від повних сходів до початку достигання - 82 днів; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 13,0, бактеріоз судинний 14,0; лежкість, балів 2. Вміст: сухої речовини - 15,0 %; загального цукру - 6,0 %; вітаміну С - 24 мг%; білка - 4,0 %.

09030001 Резіма F1 — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків спрямоване догори, середнього розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом фіолетовий, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана фіолетове, головка щільна.

Вміст білка, % - 2,5. Вміст сухої речовини, % - 8,0. Вміст вітаміну С, мг% - 35. Вміст загального цукру, % - 3,4. Загальна урожайність, т/га - 75,0. Лежкість, балів - 9. Період від сівби до початку достигання, днів - 97.

Капуста пекінська

09152002 Зена F1 — Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Габітус рослини напіврозлогий. Рослина висока. Форма зовнішнього листка зворотньояйцеподібна, форма верхівки зрізана. Головка характеризується такими показниками: висока, продовгувата форма поздовжнього розрізу, закритий тип покриття, жовто-зелений колір верхівки, жовте забарвлення внутрішньої частини, рихла за щільністю.

Товарний урожай 45 ц/га; днів до достигання 85.

09152003 Кінка F1 — Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Габітус рослини розлогий. Рослина коротка за висотою. Форма зовнішнього листка широка, форма верхівки зрізана. Головка характеризується такими показниками: середня за висотою, зворотньояйцеподібна форма поздовжнього розрізу, закритий тип покриття, жовто-зелений колір верхівки, білувате забарвлення внутрішньої частини, помірна за щільністю.

Товарний урожай 60 ц/га; днів до достигання 90.

09152001 Ріда F1 — Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Габітус рослини розлогий. Рослина середня за висотою. Головка характеризується такими показниками: висока, еліптична форма поздовжнього розрізу, закритий тип покриття, жовто-зелений колір верхівки, білувате забарвлення внутрішньої частини, помірної щільності.

Товарний урожай 55 ц/га; днів до достигання 60.

Капуста савойська

09153001 Естрема F1 — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина за висотою середня. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великі, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листка помірна, колір з восковим нальотом зелений, інтенсивність забарвлення сильна, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна, час розтріскування качана після дозрівання середній.

Загальна врожайність - 45 т/га, період від повних сходів до початку достигання - 95 днів, період плодоношення - 30 днів, вміст сухої речовини - 7,4 %, загального цукру 5,3 %, вітаміну С - 31 мг%, білку - 1,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз слизний 1%, бактеріоз судинний 1%.

Закритий грунт

09153002 Морама F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків піднесене, великі, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листка слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, інтенсивність забарвлення сильна, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільна головка, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна врожайність - 40 т/га, період від повних сходів до початку достигання - 110 днів, період плодоношення - 30 днів, вміст сухої речовини - 6,5 %, загальног цукру 4,0 %, вітаміну С - 29,2мг%, білка - 1,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз слизний 1%, бактеріоз судинний 1%.

Степ, Лісостеп, Полісся

09153003 Меліса F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Рослина за висотою середня. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкояйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листка сильна, колір з восковим нальотом зелений, інтенсивність забарвлення сильна, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки середня, час розтріскування качана після дозрівання середній.

Загальна врожайність - 52 т/га, період від повних сходів до початку достигання - 80 днів, період плодоношення - 15 днів; вміст сухої речовини - 12,1 %, загального цукру 4,2 %; вітаміну С - 110 мг%; білка - 4,8 %. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий 9%, бактеріоз судинний 9%.

Капуста цвітна

Закритий грунт

09029008 Декстер F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина середня за висотою. Листок плескатої форми поперечного перетину, наявна сильна пухирчастість. Головка середня за висотою і велика за діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість помірна. Час достигання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 35 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 95 днів; період плодоношення 27 днів. Вміст: сухої речовини

- 7,9 %; загального цукру - 3,7 %; вітаміну С - 110 мг%; білка - 1,2%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,2 %, бактеріоз слизистий - 1%.

09029002 Кул F1 — Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середня за висотою. Листок увігнутої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу еліптична, забарвлення білувате, горбкуватість помірна. Час достигання в рекомендований період вирощування ранній.

Загальний урожай 35 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 45 днів; період плодоношення 5 днів. Вміст: сухої речовини - 10,5 %; загального цукру - 3 %; вітаміну С - 38 мг%; білка - 4,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 9 %.

08029009 Мехіко F1 — Закритий грунт

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Рослина середня за висотою. Листок еліптичної форми , опуклої форми поперечного перетину, наявна помірна пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу еліптична, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час достигання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 9,7 кг/м2. Вміст: сухої речовини - 15,0 %; загального цукру - 5 %; вітаміну С - 25 мг%; білка - 3,0%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 15 %, бактеріоз слизистий - 12 %.

09029007 Стабіліс F1 — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина висока. Листок плескатої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час достигання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 40 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 95 днів; період плодоношення 20 днів. Вміст: сухої речовини - 7,2 %; загального цукру - 4,7 %; вітаміну С - 115 мг%; білка - 1,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,5 %, бактеріоз слизистий - 1 %.

09029006 Таберна F1 — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина середня за висотою. Листок плескатої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час достигання в рекомендований період вирощування пізній.

Загальний урожай 40 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 105 днів; період плодоношення 30 днів. Вміст: сухої речовини - 6,9 %; загального цукру - 4,5 %; вітаміну С - 110 мг%; білка - 1,4%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,1 %; бактеріоз слизистий - 1 %.

Квасоля овочева

08087010 Беронія

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Рослини сорту низькі з пізнім часом цвітіння, мають кущовий несланкий тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє.
Листки темно-зеленого кольору з помірною зморшкуватістю. Середній листочок великого розміру, має прямокутну форму з короткозагостреною верхівкою.
Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.
Квітка має білий колір і паруса, і крил та середній розмір приквітка.
Біб (включно з гачком) – довгий з великою шириною посередині та має маленьке відношення ширини впоперек до відстані між швами, помірно зморшкувату текстуру поверхні бобу та слабке звуження в сухому стані.
Біб – зеленого кольору помірної інтенсивності без волокнистості, має опуклу форму вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його увігнутості та загострену верхівку (за виключенням гачка).
Гачок – короткий з відсутнім або дуже слабким вигином.
Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.
Стигле насіння однокольорове, має форму поздовжнього розтину від округлої до еліптичної, широко-еліптичною форму поперечного перерізу з середньою його шириною.
Колір насінини – білий зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.
Маса 1000 насінин – велика.

08087007 Пауліста

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Рослини сорту середньої висоти з середнім часом цвітіння, мають кущовий несланкий тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє.
Листки дуже темно-зеленого кольору зі помірною зморшкуватістю. Середній листочок малий , має прямокутну форму з вузькозагостреною верхівкою.
Суцвіття за повного цвітіння знаходиться в листках.
Квітка має білий колір і паруса, і крил та великий розмір приквітка.
Біб (включно з гачком) – середньої довжини з малою шириною посередині, має округлу форму поперечного перерізу (через насінину) та маленьке відношення ширини впоперек до ширини всередині, гладеньку текстуру поверхні бобу та відсутнє або дуже слабке звуження в сухому стані.
Біб – темно-зеленого кольору з відсутньою волокнистістю, має увігнуту форму вигину зі слабким ступенем його увігнутості та форму верхівки від загостреної до тупої (за виключенням гачка).
Гачок – середньої довжини зі слабким його вигином.
Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.
Стигле насіння однокольорове, має форму поздовжнього розтину від округлої до еліптичної, округлу форму поперечного перерізу з малою його шириною.
Колір насінини – білий зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.
Маса 1000 насінин – мала.

08087009 Унідор

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Рослини сорту високі з середнім часом цвітіння, мають кущовий несланкий тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє. Листки помірно-зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю. Середній листочок малого розміру, має форму від трикутної до округлої з вузькозагостреною верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться в листках.

Квітка має білі кольори і паруса, і крил та маленький розмір приквітка.

Біб – одного, помірно жовтого кольору з помірно зморшкуватою поверхнею, відсутньою волокнистістю, має коротку довжину включно з гачком та малу його ширину посередині, округлу форму поперечного перерізу через насінину, маленьке відношення ширини впоперек до відстані між швами та помірне звуження в сухому стані, S-подібну форму вигину зі слабким ступенем його увігнутості та загострену форму верхівку.

Гачок – середньої довжини зі слабким його вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.

Стигле насіння однокольорове, біле з помірним жилкуванням, має еліптичні форми і поздовжнього розтину, і поперечного перерізу з малою його шириною.

Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – велика.

07087003 Шахиня

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти з раннім часом цвітіння, мають кущовий несланкий тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє.

Листки помірно зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю. Середній листочок середнього розміру, має форму від трикутної до округлої з гострою верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.

Квітка має білий колір і паруса, і крил та середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) – середньої довжини з середньою шириною посередині та середнє відношення ширини впоперек до ширини всередині, гладеньку текстуру поверхні бобу та помірне звуження в сухому стані.

Біб – зеленого кольору помірної інтенсивності з наявною волокнистістю, має увігнуту форму вигину з помірним ступенем його увігнутості та форму верхівки від загостреної до тупої (за виключенням гачка).

Гачок –середньої довжини з середнім його вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – білий.

Стигле насіння однокольорове, має ниркоподібну форму поздовжнього розтину зі слабким ступенем його вигину, широко-еліптичною форму поперечного перерізу з середньою його шириною.

Колір насінини – білий зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – мала.

Кукурудза цукрова

08032012 МС Вега F1

Лісостеп. Степ.

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (до 10). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (11-14 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай (ц/га) - 22

® 09032001 Добриня F1

Полісся, Лісостеп. Степ

Заявник: Ларк Сидс Интернешнл

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - середнє. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (11-14 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтувато-білий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай качанів - 17,0 ц/га, ураженість бактеріозом 8,0%, фузаріозом - 8,0%

08032011 Марта F1

Лісостеп, Степ.

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (11-14 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай (ц/га) - 22,33

08032016 Меркур F1

Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - середнє. Волоть велика. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (15-18 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтувато-білий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай качанів (ц/га) - 210

08032017 Сігнет F1 — Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (до 10). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - довгий (15-18 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтувато-білий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай качанів (ц/га) - 220

08032015 Харвест Голд F1 — Полісся, Лісостеп, Степ.

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутня або дуже слабка. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (11-14 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів велика, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтувато-білий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай качанів (ц/га) - 230.

08032010 Чугайстр — Полісся, Лісостеп, Степ.

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - середнє, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - середнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (до 10). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (15-18 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай (ц/га) - 160, Ураженість хворобами, % : летючою сажкою - 1, пухирчастою сажкою - 0,3, фузаріозом - 1, бактеріозом - 0,3.

Морква посівна

08034011 Белградо F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. За довжиною коренеплід, (см): від середнього до довгого (15-20); діаметр коренеплоду, (см): від середнього до великого; відношення діаметр/довжина коренеплоду: велике; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздок на поверхні коренеплоду: слабко виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): середній (31-50); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоеми (м'якуши): оранжеве; маса коренеплоду: велика; час достигання коренеплоду: середній; вміст каротину в коренеплоді: високий; загальний вміст цукру в коренеплоді: високий.

Товарна урожайність 75,0 т/га, днів до достигання 110, Гниль суха (%) 3, Альтернаріоз (%) 3, Суха речовина, % 8, Загальний цукор, % 5.

08034002 Кантербьюрі F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. За довжиною коренеплід, (см): середній (11-15); діаметр коренеплоду, (см): від великого до дуже великого; відношення діаметр/довжина коренеплоду: середнє; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздок на поверхні коренеплоду: слабко виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): великий (51-60); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоеми (м'якуши): оранжеве; маса коренеплоду:середня; час достигання коренеплоду: від середнього до пізнього; вміст каротину в коренеплоді: середній; загальний вміст цукру в коренеплоді: високий.

Товарна урожайність 78,0 т/га, днів до достигання 137, Гниль суха (%) 3, Альтернаріоз (%) 3, Суха речовина, % 8, Загальний цукор, % 5.

07034005 Карадек F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ. За довжиною коренеплід, (см): дуже довгий (більше 20); діаметр коренеплоду, (см): середній (3-6); відношення діаметр/довжина коренеплоду: мале; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздок на поверхні коренеплоду: помірно виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): великий (51-60); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоеми (м'якуши): оранжеве; маса коренеплоду: середня; час достигання коренеплоду: ранній; вміст каротину в коренеплоді: середній; загальний вміст цукру в коренеплоді: середній.

Товарна урожайність 92,0 т/га, днів до достигання 130, Гниль суха (%) 0,7, Альтернаріоз (%) 3,4, Гниль біла (%) 0,9, Мокра бактеріальна гниль (%) 0,6, Суха речовина, % 9,7, Загальний цукор, % 5,7.

09034003 Каріні — СЛП

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Розетка листків – від середньої до широкої. Листок за положенням у просторі прямий, довгий – разом із черешком до 50 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід короткий – до 10 см, діаметр від середнього до великого. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду тупа. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні від слабко до помірно виражених. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній – 31-50 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Маса коренеплоду від середньої до великої.Час достигання коренеплоду від середнього до пізнього.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Загальний цукор, % - 5. Суха речовина, % - 8,0. Товарний урожай, 75 т/га.

08034023 Комет — Закритий грунт

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Розетка листків – середньої ширини. Листок за положенням у просторі прямий, середній – разом із черешком 31-40 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід за довжиною середній 11-15 см, діаметр середній3-6 см Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плескато-округла. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду жовтий. Наявне антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні слабко виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній – 31-50 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Маса коренеплоду велика.Час достигання коренеплоду середній.

Альтернаріоз, % - 5, гниль біла, % - 3, гниль суха, % - 3, загальний цукор, %- 6, мокра бактеріальна гниль, % - 3, суха речовина, % - 15. Днів до достигання - 110. Товарний урожай - 6,5 кг/м2. Призначений для свіжого ринку та переробки на сік.

09034015 Маестро F1

Заявник: Вілморін

Ширина розетки листків середня, рослина пряма, середня. Розсіченість листка помірна, сильної інтенсивності зеленого забарвлення. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід за довжиною - 11-15 см, діамертом - 3-6 см. Форма коренеплоду у повздовжньому розрізі - вузькоподовжена. Форма плеча - плескато-округла, місце прикріплення листків піднесене, форма кінчика тупа. Колір поверхні коренеплоду - оранжевий. Боріздки на поверхні відсутні або дуже слабко виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра великий - 51-60 %. Забарвлення серцевини та флоеми оранжеве, сильної інтенсивності. Надземна частина коренеплоду - мала.

Загальний вміст цукру, каротину, сухої речовини - високий. Відносний вміст моноцукрів до загального вмісту цукру - середній. Тенденція до стрілкування - слабка. Час достигання - пізній.

08034009 Майор F1 — СПЛ

Заявник: Клоз

Розетка листків – середня. Листок за положенням у просторі прямий, довгий – разом із черешком до 50 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча округла. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду ледь

загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні коренеплоду помірно виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду дуже великий – 60 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Маса коренеплоду середня.Час достигання коренеплоду середній.

Альтернаріоз, % - 2. Гниль суха, % - 1,5. Загальний цукор, % - 5. Мокра бактеріальна гниль, % – 2. Суха речовина, % - 8. Товарний урожай, 50 т/га.

08034012 Нерак F1

Степ, Полісся, Лісостеп

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. За довжиною коренеплід, (см): від середнього до довгого (15-20); діаметр коренеплоду, (см): середній (3-6); відношення діаметр/довжина коренеплоду: мале; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздок на поверхні коренеплоду: відсутні або дуже слабко виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): середній (31-50); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоеми (м'якуши): оранжеве; маса коренеплоду: середня; час достигання коренеплоду: середній; вміст каротину в коренеплоді: високий; загальний вміст цукру в коренеплоді: високий.

Товарна урожайність 75т/га, днів до достигання 119, Гниль суха (%) 3, Альтернаріоз (%) 3, Суха речовина, % 8, Загальний цукор, % 5.

08034006 Нантіндо F1

СЛП

Заявник: Клоз

Розетка листків – середня. Листок за положенням у просторі прямий, дуже довгий – разом із черешком від 50 см. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча округла. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні коренеплоду слабко виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду великий – 51-60 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Маса коренеплоду середня.Час достигання коренеплоду середній.

Гниль суха, % - 1,5. Загальний цукор, % - 5. Мокра бактеріальна гниль, % – 2. Суха речовина, % - 7. Товарний урожай, 80-100 т/га.

09034001 Невіс F1

СЛП

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Розетка листків – від вузької до середньої. Листок за положенням у просторі прямий, – разом із черешком до 40 см, розсіченість від тонкої до помірної. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід від середнього до довгого – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Наявне антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні коренеплоду слабко виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра від малого до середнього. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності до сильної. Маса коренеплоду мала.Час достигання коренеплоду пізній.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Загальний цукор, % - 5,2. Суха речовина, % - 7,4. Товарний урожай, 78 т/га.

09034002 Напа F1

СЛП

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Розетка листків – вузька. Листок за положенням у просторі напівпрямий,середньої довжини – разом із черешком до 40 см, розсіченість

груба. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгии – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні коренеплоду ледве виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду малий – 21-30 %. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Маса коренеплоду мала.Час достигання коренеплоду середній.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Днів до достигання – 115. Загальний цукор, % - 5,1. Суха речовина, % - 7,2. Товарний урожай, 74 т/га.

09034002 Напа F1 СЛП

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Розетка листків – вузька. Листок за положенням у просторі напівпрямий,середньої довжини – разом із черешком до 40 см, розсіченість груба. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні коренеплоду ледве виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду малий – 21-30 %. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Маса коренеплоду мала.Час достигання коренеплоду середній.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Днів до достигання – 115. Загальний цукор, % - 5,1. Суха речовина, % - 7,2. Товарний урожай, 74 т/га.

08034018 Сукцес СЛП

Заявник: Ходовля Рослин Сновідза Сп. З.о.о

Ширина розетки листків від середньої до широкої. Листок напівпрямий, довгий, розсіченість від помірної до грубої, помірно інтенсивного забарвлення. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий - 16-20 см,середнього діаметру 3-6, вузькоподовженої форми. Відношення діаметру до довжини мале.Форма плеча коренеплоду округла, місце прикріплення листків плескате, форма кінчика загострена, колір - оранжевий. Антоціанове забарвлення поверхні плеча - відсутнє, розмір зеленого - малий. Наявність боріздок на поверхні плеча - слабо виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра - від середнього до великого. Забарвлення серцевини порівняно з забарвленням мякуша - однакове. Надземна частина коренеплоду мала, маса коренеплоду від середньої до великої. Час достигання пізній. Вміст каротину, цукру високий, сухої речовини - середній.

Товарний урожай - 70 т/га. Днів до достигання - 150.Загальний цукор - 6,2 %, альтернаріоз - 7%, гниль біла - 5%, гниль суха - 1 %, мокра бактеріальна гниль - 8%. Суха речовина - 14%

08034010 Сатурно F1 СЛП

Заявник: Клоз

Розетка листків – вузька. Листок за положенням у просторі напівпрямий, середній – разом із черешком до 40 см. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча конічна. Місце прикріплення листків піднесене. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні коренеплоду слабко виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду великий – 51-60 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Маса коренеплоду середня.Час достигання коренеплоду дуже ранній.

Огірок посівний

09035004 Акіліна

Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість та хвилястість країв помірна. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, видовжено-циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки відсутні. Опушення відсутнє або дуже незначне. Плямистість відсутня. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 6,0 %. Загальна врожайність - 120 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 45 днів. Період плодоношення - 50 днів. Ураженість пероноспорозом - 0,2 %; борошнистою росою - 0,3%; антракнозом - 0,2%; вірусними хворобами - 0,4%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,5%.

® 07035006 Бонус

Полісся, Лісостеп

Заявник: Приватний підприємець Медведєв Олександр Олександрович

Заявник: Приватний підприємецьМедведєв Олександр Олександрович. Тип росту рослини: індетермінантний; інтенсивність зеленого забарвлення листка: помірна; хвилястість країв листків: слабка; вираження статі рослини: переважно жіночі квітки; забарвлення зав'язі: біле; партенокарпія: відсутня; форма плоду: циліндрична;за довжиною плід, (см): середній (11-20); за діаметром плід, (см): середній (2,1-3,5); плід: відношення довжина/діаметр: середнє; основне забарвлення паренхіми у фазі технічної стиглості: зелене; ребристість плоду: наявна; опушення плоду: відсутнє або дуже незначне; плід: горбочки: наявні; смужки плоду (за виключенням ребер): наявні; плямистість плоду: відсутня; основний колір шкірки плоду у фазі фізіологічної стиглості: жовтий; гіркота сім'ядолі: відсутня.

Загальна урожайність 30,0 т/га, Період від повних сходів до першого збирання 45 днів, Період плодоношення, днів 40, Вміст сухої речовини в плоді, % 4,1.

09035008 Гайдн F1

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Сила росту - сильна. Листок середнього розміру, пухирчастість та хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки наявні. Опушення густе. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність помірна. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 4,7 %. Загальна врожайність - 5 кг/м2. Період від повних сходів до першого збирання - 37 днів. Період плодоношення - 30 днів. Ураженість пероноспорозом - 1,0 %; борошнистою росою - 1,0%; бактеріозом - 1,5 %; антракнозом - 2,0%; вірусними хворобами - 2,0%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 2,0%.

09035007 Джустіна

Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Індетермінантний тип росту. Сила росту - слабка. Листок великого розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід короткий, жовтого кольору, овальної форми. Ребристість відсутня, горбочки відсутні. Опушення помірне. Плямистість відсутня. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 4 %. Загальна врожайність - 100 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 45 днів. Період плодоношення - 35 днів. Ураженість пероноспорозом - 0,5 %; бактеріозом - 0,2 %; антракнозом - 0,1 %; вірусними хворобами - 0,3 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,4 %.

09035009 Еколь F1 — Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки наявні. Опушення помірне. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність слабка. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 6,0 %. Загальна врожайність - 28 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 42 днів. Період плодоношення - 14 днів. Ураженість пероноспорозом - 10,0 %; антракнозом - 5,0%.

08035002 Еврика F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Тип росту рослини: індетермінантний; інтенсивність зеленого забарвлення листка: помірна; хвилястість країв листків: слабка; вираження статі рослини: чоловічих і жіночих квіток майже порівну; забарвлення зав'язі: біле; партенокарпія: відсутня; форма плоду: веретеноподібна;за довжиною плід, (см): короткий (6-10); за діаметром плід, (см): середній (2,1-3,5); плід: відношення довжина/діаметр: середнє; основне забарвлення паренхіми у фазі технічної стиглості: зелене; ребристість плоду: наявна; опушення плоду: відсутнє або дуже незначне; плід: горбочки: наявні; смужки плоду (за виключенням ребер): наявні; плямистість плоду: відсутня; основний колір шкірки плоду у фазі фізіологічної стиглості: оранжевий; гіркота сім'ядолі: наявна.

Загальна урожайність 30,1 т/га, Період від повних сходів до першого збирання 44 днів, Період плодоношення, днів 26, Ураженість хворобами, % : переноспорозом 25, Вміст сухої речовини в плоді, % 5,1.

® 07035007 Забара — Лісостеп, Полісся

Заявник: Приватний підприємець Медведєв Олександр Олександрович

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість та хвилястість країв помірна. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, веретеноподібної форми. Ребристість наявна, ступінь ребристості середня, горбочки наявні. Опушення відсутнє або дуже незначне. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність слабка. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 4,3 %. Загальна врожайність - 50 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 38 днів. Період плодоношення - 30 днів. Ураженість пероноспорозом - 20 %.

® 09035016 Зузана F1 — Закритий грунт

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок середнього розміру, пухирчастість та хвилястість країв помірна. За вираженням статі рослини -майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі опушено-шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість наявна, ступінь ребристості середня, горбочки наявні. Опушення помірне. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність помірна. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 6,0 %. Загальна врожайність - 30 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 35 днів. Період плодоношення - 85 днів. Ураженість пероноспорозом - 15 %; борошнистою росою - 17%; бактеріозом - 9,0 %; антракнозом - 14%; вірусними хворобами - 6,0%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7,0%.

06035036 Калинка F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування. Тип росту рослини: індетермінантний; інтенсивність зеленого забарвлення листка: помірна; хвилястість країв листків: помірна; вираження статі рослини: чоловічих і жіночих квіток майже порівну; забарвлення зав'язі: біле; партенокарпія: відсутня; форма плоду: циліндрична;за довжиною плід, (см): короткий (6-10); за діаметром плід, (см): середній (2,1-3,5); плід: відношення довжина/діаметр: велике; основне забарвлення паренхіми у фазі технічної стиглості: зелене; ребристість плоду: наявна; опушення плоду: відсутнє або дуже незначне; плід: горбочки: наявні; смужки плоду (за виключенням ребер): відсутні; плямистість плоду: наявна; основний колір шкірки плоду у фазі фізіологічної стиглості: коричневий; гіркота сім'ядолі: наявна.

Загальна урожайність 48,9 т/га, товарна врожайність 44 т/га, довжина товарного плоду 11 см. Період від повних сходів до першого збирання 42 днів, дегустаційна оцінка 5 балів.Тривалість зберігання зеленого кольору у зеленця, днів 5.

09035015 Мертус F1

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок середній за розміром, пухирчастість та хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість наявна, ступінь ребристості середня, горбочки наявні. Опушення незначне. Плямистість відсутня. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 4,3 %. Загальна врожайність - 4,5 кг/м2. Період від повних сходів до першого збирання - 30 днів. Період плодоношення - 35 днів. Ураженість пероноспорозом - 1,0 %; борошнистою росою - 1,0%; бактеріозом - 1,5 %; антракнозом - 2,0%; вірусними хворобами - 1,0%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 2,0%.

08035001 Приостерний

Полісся, Лісостеп

Заявник: Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

Заявник: Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету. Тип росту рослини: індетермінантний; інтенсивність зеленого забарвлення листка: слабка; хвилястість країв листків: помірна; вираження статі рослини: чоловічих і жіночих квіток майже порівну; забарвлення зав'язі: біле; партенокарпія: відсутня; форма плоду: циліндрична;за довжиною плід, (см): середній (11-20); за діаметром плід, (см): середній (2,1-3,5); плід: відношення довжина/діаметр: середнє; основне забарвлення паренхіми у фазі технічної стиглості: зелене; ребристість плоду: наявна; опушення плоду: відсутнє або дуже незначне; плід: горбочки: наявні; смужки плоду (за виключенням ребер): відсутні; плямистість плоду: відсутня; основний колір шкірки плоду у фазі фізіологічної стиглості: коричневий; гіркота сім'ядолі: відсутня.

Загальна урожайність 50,0 т/га, Період від повних сходів до першого збирання 40 днів, Період плодоношення, днів 65, Ураженість хворобами, % : пероноспорозом 7, Вміст сухої речовини в плоді, % 4,2.

09035010 СГ 7258 F1

Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки наявні. Опушення помірне. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність слабка. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 6,0 %. Загальна врожайність - 31 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 45 днів. Період плодоношення - 25 днів. Ураженість пероноспорозом - 10 %; борошнистою росою - 10%; антракнозом - 10%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 10%.

09035005 Турмалін — Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки відсутні. Опушення густе. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність слабка. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 2,0 %. Загальна врожайність - 95 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 35 днів. Період плодоношення - 30 днів. Ураженість пероноспорозом - 0,5 %; борошнистою росою - 0,5%; бактеріозом - 0,3 %; антракнозом - 1,0%; вірусними хворобами - 0,2%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,7%.

® 09035017 Толстой F1 — Закритий грунт

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Індетермінантний тип росту. Сила росту - слабка. Листок середнього розміру, пухирчастість помірна, хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість наявна, ступінь ребристості слабкий, горбочки наявні. Опушення незначне. Плямистість відсутня. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 5,0 %. Загальна врожайність - 25 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 60 днів. Період плодоношення - 95 днів. Ураженість пероноспорозом - 20 %; борошнистою росою - 15%; бактеріозом - 10 %; антракнозом - 12%; вірусними хворобами - 18%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0%.

09035006 Циркон — Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, овальної форми. Ребристість відсутня, горбочки відсутні. Опушення помірне. Плямистість відсутня. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 2,0 %. Загальна врожайність - 100 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 45 днів. Період плодоношення - 38 днів. Ураженість пероноспорозом - 1,0 %; борошнистою росою - 0,3%; бактеріозом - 0,5 %; антракнозом - 0,7%; вірусними хворобами - 0,5%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,0%.

Перець гіркий

09036001 Кампай F1 — Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Сіянець з антоціановим забарвленням. Рослина напівпряма, стебло коротке. Листок довгий, середній за шириною, зелений, з слабкою пухирчастістю. Плід пониклий, середній за довжиною, за достигання червоний, форма поздовжнього розрізу вузькотрикутна, форма верхівки заокруглена, плодоніжка середня за довжиною за товщиною.

Товарний урожай 40 ц/га, середня маса плоду 30 г, днів до достигання 70.

09036003 Тандер F1

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Сіянець з антоціановим забарвленням. Рослина пряма, стебло довге. Листок довгий, середній за шириною, зелений, з помірною пухирчастістю. Плід пониклий, дуже довгий, за достигання червоний, форма поздовжньогорозрізу вузькотрикутна, форма верхівки загострена, плодоніжка довга, середня за товщиною.

Товарний урожай 8 ц/га, середня маса плоду 40 г, днів до достигання 85. Ураження хворобами: мозаїка зморшкувата - 4 %, гниль верхівкова - 1,5 %, в'янення - 3,3 %.

Перець солодкий

09037011 Барбі F1

Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М`якоть середня за товщиною. Час достигання середній.

Товарний урожай 425 ц/га, середня маса плоду 100 г; днів до достигання - 62; суха речовина 14,0%; загальний цукор 5,5%; вітамін С 150 мг/%; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 10,0 %.Товщина стінки плоду - 6 мм.

09037027 Відре F1

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, слабка глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді дві-три. М`якоть середня за товщиною. Час достигання ранній.

Товарний урожай 8,5 ц/га, середня маса плоду 70 г; днів до достигання - 115; суха речовина 10,0%; загальний цукор 4,0%; вітамін С 470 мг/%; клітковина 1,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,5 %,, гниллю верхівковою - 5,5 %.

09037009 Діментіо F1

Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині

рослини) відсутнє. Листок зелений, довгий, широкий, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М`якоть середня за товщиною. Час достигання середній.

Товарний урожай 625 ц/га, середня маса плоду 120 г; суха речовина 14,0%; загальний цукор 6,5%; вітамін С 140 мг/%; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 10,0 %. Днів до достигання - 65 балів. Товщина стінки плоду - 8 мм.

09037029 Злата — Закритий грунт

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, короткий за довжиною, середній за шириною, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М`якоть середня за товщиною. Час достигання середній.

Товарний урожай 800 ц/га, середня маса плоду 160 г; днів до достигання - 90; Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 2,0 %. Товщина стінки плоду - 6 мм.

08037005 Марадонна F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Антоціанове забарвлення гіпокотиля паросткавідсутнє. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - зеленувато-білий, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М`якоть середня. Час достигання середній.

Товарний урожай 350 ц/га, середня маса плоду 170-200 г; днів до достигання - 65; суха речовина 6,9-7,2%; загальний цукор 2,4%; вітамін С 76-114 мг/%.

09037010 Мінтос F1 — Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, слабка глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М`якоть середня за товщиною. Час достигання ранній.

Товарний урожай 525 ц/га, середня маса плоду 125 г; днів до достигання - 70; суха речовина 13,0%; загальний цукор 6,5%; вітамін С 160 мг/%; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: антракнозом - 10,0 %,, гниллю верхівковою - 10,0 %. Товщина стінки плоду - 8 мм.

09037026 Мазурка F1 — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Відсутнє антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, довгий, середній за шириною, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - еліптична. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М`якоть товста. Час достигання середній.

Товарний урожай 9,5 ц/га, середня маса плоду 75 г; днів до достигання - 110; суха речовина 10,5%; загальний цукор 4,3%; вітамін С 480 мг/%; клітковина 0,9%. Товщина стінки плоду - 4,2 мм. Ураження хворобами: антракнозом - 2,5 %, гниллю верхівковою - 5 %.

Закритий грунт

® 09037002 Сол F1

Заявник: Хазера Генетікс

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, сильна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М`якоть товста. Час достигання середній.

Товарний урожай 7,56 ц/га, середня маса плоду 150 г; днів до достигання - 100; суха речовина 4,0%; загальний цукор 8,0%; вітамін С 12 мг/%; клітковина 4,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 1,0 %,, гниллю верхівковою - 1,0 %. Товщина стінки плоду - 5 мм.

Закритий грунт

10037003 Сондела F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за довжиною, вузький, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу прямокутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М`якоть середня за товщиною. Час достигання пізній.

Товарний урожай 8,5 ц/га, середня маса плоду 75 г; тривалість періоду до достигання - 110 діб; суха речовина 10,0%; загальний цукор 4,0%; вітамін С 470 мг/%; клітковина 1,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,0 %, гниллю верхівковою - 4,9 %. Товщина стінки плоду - 4 мм.

Закритий грунт

® 09037003 Телестар F1

Заявник: Хазера Генетікс

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, сильна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М`якоть товста. Час достигання пізній.

Товарний урожай 7,56 ц/га, середня маса плоду 1500 г; днів до достигання - 90; суха речовина 5,0%; загальний цукор 8,0%; вітамін С 14 мг/%; клітковина 4,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,0 %,, гниллю верхівковою - 1,0 %. Товщина стінки плоду - 5 мм.

Закритий грунт

® 08037002 Творець

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Відсутнє антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду горизонтальне. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду дуже зморшкувата, колір - оранжевий, сильна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М`якоть товста. Час достигання ранній.

Товарний урожай 14,6 ц/га, середня маса плоду 165 г; днів до достигання - 142; суха речовина 7,5%; загальний цукор 5,9%; вітамін С 200 мг/%; клітковина 1,6%. Товщина стінки плоду - 8 мм.

Петрушка городня

09163002 Атіка

Заявник: СЕМО а.с.

Коренева петрушка. Рослина висока, широка напівпряма з щільними листками. Кучерявість листкової пластинки відсутня. Кількість листків - від середньої кількості до великої.Форма листка - вузько-трикутна. Глибина розрізу часток - велика. Середня кількість синусів краю листка. Черешок товстий з відсутнім або дуже слабким антоціаном. Корінь за довжиною від середнього до довгого, товстий, трикутної форми з слабким галуженням.

09163003 Арат СЛП

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Рослина середньої висоти та ширини, з рідкою щільністю листків. Кучерявість листкової пластинки відсутня, без загнутихчасток догори, листкова пластинка довга, велика, кількість листків середня. Листкова пластинка з помірною інтенсивністю зеленого кольору. Форма листка - трикутна. Розріз часток листка за глибиною помірний. Середня кількість синусів краю листка. Рослина за положенням у просторі напівпряма. Черешок листка довгий, товстий. Потовщення основного кореня наявне. Корінь за довжиною довгий, середньої товщини, трикутної форми з помірним галуженням.

Маса коренеплоду - 90 г, товарний урожай - 6,8 т/га. Днів до достигання - 150, борошниста роса, % - 7, гниль біла, % - 7.

09163004 Алба СЛП

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Коренева петрушка. Рослина напівпряма, висока, широка з помірною щільністю великої кількості листків. Кучерявість листкової пластинки відсутня, без загнутих часток догори. Листкова пластинка середня, помірної інтенсивності зеленого кольору. Листок за формою вузько-трикутний, з великою глибиною розрізу часток, середня кількість синусів краю. Черешок листка довгий, середньої товщини, антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке. Потовщення основного кореня наявне. Корінь за довжиною середній, товстий, трикутної форми з слабким галуженням, гладкою білою поверхнею. Сорт призначений для свіжого споживання, зберігання, переробки. Рекомендовано для вирощування і на важких грунтах.

Маса коренеплоду - 135 г, борошниста роса, % - 11, гниль біла, % - 7. Днів до достигання - 150. Товарний урожай - 60 т/га.

Помідор їстивний

08040055 6 пунто 7 F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) від горизонтального до похилого, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість від помірної до сильної. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід за розміром від дуже маленького до маленького, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки від дуже слабкого до слабкого. Розмір рубчика плодоніжки від дуже маленького до маленького. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід за твердістю від помірного до твердого, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 73 т/га; маса товарного плоду - 17 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,7%; вміст загального цукру - 3,2 %; вміст вітаміну С - 16,2 мг%. Загальна кислотність - 0,35 %.

09040016 Адванс

Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, широкий, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 95 т/га; маса товарного плоду - 90 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 80 днів; період плодоношення - 30 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 3 мг%; вміст загального цукру - 5,0 %; вміст вітаміну С - 21 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,2 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,1 %, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,2 %.

09040030 Асвон F1

Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 75 т/га; маса товарного плоду - 75 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 105 днів; період плодоношення - 50 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,8%.

09040052 Бейбіно F1

Закритий грунт

Заявник: СЕМО а.с.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною, від середнього до широкого за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід маленький, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 35 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 50 днів; період плодоношення - 70 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст загального цукру - 5,5 %; вміст вітаміну С - 22 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 4,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 6,0 %, макроспоріозом - 6,0%, фітофторозом - 7,0 %.

® 06040039 Боярин — Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: округла; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: три-чотири; зелене плече плоду (перед достиганням) : відсутнє; колір плоду за достигання: червоний; колір м'якоті плоду (за достигання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час достигання: помірно.

Загальна урожайність - 40 т/га; товарна урожайність 35 т/га; маса товарного плоду - 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 115 днів; період плодоношення - 65 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,8 %; вміст загального цукру, 4,5 %; дегустаційна оцінка, балів : свіжих плодів 4,9, дегустаційна оцінка, балів : у переробці 4,9; траспортабельність - 7 бали.

® 06040041 Бенефіс — Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: кутаста; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: чотири, п`ять або шість; зелене плече плоду (перед достиганням) : відсутнє; колір плоду за достигання: червоний; колір м'якоті плоду (за достигання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час достигання: помірно.

Загальна урожайність - 35 т/га; товарна урожайність 33,3 т/га; маса товарного плоду - 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,4 %; вміст загального цукру, 3,3 %; дегустаційна оцінка, балів : свіжих плодів 4,8, дегустаційна оцінка, балів : у переробці 4,4; траспортабельність - 5 балів.

09040040 Бігдена F1 — Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід дуже великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки сильне. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 610 т/га; маса товарного плоду - 250 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 120 днів; період плодоношення - 240 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,5%; вміст каротину - 30 мг%; вміст загального цукру - 3,5 %; вміст вітаміну С - 28 мг%. Загальна кислотність - 3%.

09040007 Бріксол F1 — Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки короткі, середні за шириною, пухирчастість слабка, глянсуватість помірно виражена. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі округлої форми з товстим перикарпом, 4-5, або 6-камерний. Плід за достигання

червоного забарвлення. Час цвітіння та достигання - ранній.

Загальна урожайність - 8 кг/м2; маса товарного плоду - 75 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 105 днів; період плодоношення - 30 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,8%; вміст каротину - 2,4 мг%; вміст загального цукру - 3,0 %; вміст вітаміну С - 27 мг%. Загальна кислотність - 0,7 %.

08040076 ВП 1

Закритий грунт

Заявник: Вілморін

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, короткий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 8 кг/м2; маса товарного плоду - 250 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 45 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,1%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 6,8 %; вміст вітаміну С - 18 мг%.

09040028 Вірта F1

Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 140 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,0%.

09040032 Верон F1

Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість та глянсуватістьслабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 75 т/га; маса товарного плоду - 85 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,0%.

09040021 Грифон F1

Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер -

чотири, п'ять або шість. Плід твердий, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 85 т/га; маса товарного плоду - 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,8%; вміст загального цукру - 3,2 %; вміст вітаміну С - 18 мг%; вміст каротину - 1,3 мг%. Загальна кислотність - 0,8%.

09040070 Гаяна F1 — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід твердий, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 4 кг/м2; маса товарного плоду - 135 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 40 днів; вміст сухої речовини в плоді - 7%; вміст загального цукру - 7 %; вміст каротину - 3 мг%; вміст вітаміну С - 18 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,3 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,1 %.

08040057 Елегро F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 135 т/га; маса товарного плоду - 190-230 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 37 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,7%; вміст загального цукру - 2,5-2,8 %; вміст вітаміну С - 13,5-16,2 мг%. Загальна кислотність - 0,5%.

09040033 Зута — Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) маленького розміру. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 150 т/га; маса товарного плоду - 160 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 65 днів; період плодоношення - 75 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,8%; вміст загального цукру - 4,5 %.

09040020 Каліста F1 — Закритий грунт

Заявник: Хазера Генетікс

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід маленький, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчика плодоніжки дуже маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 7,5 кг/м2; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 90 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,1%; вміст каротину - 3,3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 8,5 мг%. Загальна кислотність - 4,5%.

09040035 Карато

Закритий грунт

Заявник: ICI Сементі С.п.А.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, короткий, вузький, перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) наявне. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 5,3 кг/м2; маса товарного плоду - 255 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 63 дні; період плодоношення - 20 днів; вміст сухої речовини в плоді - 9,0%; вміст каротину - 0,13 мг%; вміст загального цукру - 5,7 %; вміст вітаміну С - 0,17 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 5,0 %, макроспоріозом - 5,0%, фітофторозом - 5,0 %.

09040038 Каріока

Закритий грунт

Заявник: ICI Сементі С.п.А.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід великий, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) наявне. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 5,4 кг/м2; маса товарного плоду - 257 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 63 днів; період плодоношення - 18 днів; вміст сухої речовини в плоді - 8,5%; вміст каротину - 0,17 мг%; вміст загального цукру - 6,7 %; вміст вітаміну С - 0,2 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 5,0 %, макроспоріозом - 5,0%, фітофторозом - 5,0 %. Загальна кислотність - 2,3 %.

09040066 Каракас F1

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід дуже твердий, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 4 кг/м2; маса товарного плоду - 125 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 2 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 20

мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,5 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,2 %.

09040067 Кларабелла F1 — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід помірний за твердістю, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м2; маса товарного плоду - 130 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 19 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,5 %, гнилями - 0,3 %, макроспоріозом - 0,2%, фітофторозом - 0,2 %.

09040027 Касаморі F1 — Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед достиганням) мале. Плід помірний за твердістю, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 60 т/га; маса товарного плоду - 230 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 90 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,2%.

09040068 Куерідо F1 — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 4 кг/м2; маса товарного плоду - 130 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 40 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 18 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,3 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,1 %.

09040037 Лідер F1 — Закритий грунт

Заявник: ICI Сементі С.п.А.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, короткий, вузький, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід дуже маленький, кутастої форми у поздовжньому

розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчика плодоніжки дуже маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) наявне. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості дуже довгий.

Загальна урожайність - 5,5 кг/м2; маса товарного плоду - 250 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 60 днів; період плодоношення - 18 днів; вміст сухої речовини в плоді - 8,0%; вміст каротину - 0,15 мг%; вміст загального цукру - 4,7 %; вміст вітаміну С - 0,15 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 5,0 %, макроспоріозом - 5,0%, фітофторозом - 5,0 %. Загальна кислотність - 3,3 %.

08040034 Лорелі F1

Закритий грунт

Заявник: Клоз

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, за довжиною від довгого до дуже довгого, дуже широкий, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість дуже слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Маса товарного плоду - 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 45 днів; вміст каротину - 2,1 мг%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 21 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 1,0 %, гнилями - 1,3 %, макроспоріозом - 3,0%, фітофторозом - 2,0 %.

08040028 Ліона F1

Закритий грунт

Заявник: Клоз

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, за довжиною від середнього до довгого, за шириною від середнього до широкого, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість дуже слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, яйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки від дуже слабкого до слабкого. Розмір рубчика плодоніжки від дуже маленького до маленького. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід за твердістю від помірного до твердого, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 6,5 кг/м2; маса товарного плоду - 140 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 75 днів; період плодоношення - 45 днів; вміст сухої речовини в соку - 6,0%; вміст каротину - 2 мг%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 21 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 1,0 %, гнилями - 1,3 %, макроспоріозом - 3,0%, фітофторозом - 2,0 %.

09040069 Леванцо F1

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - три -чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості помірний

Загальна урожайність - 3,5 кг/м2; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 85 днів; період плодоношення - 40 днів; вміст сухої речовини в плоді - 7,0%; вміст каротину - 2 мг%; вміст вітаміну С - 20 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,3 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,2 %.

09040017 Логур F1

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - три-чотири. Плід твердий, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м2; маса товарного плоду - 130 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 75 днів; період плодоношення - 40 днів; вміст каротину - 2 мг%; вміст сухої речовини в плоді - 7,0%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 20 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,5 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,2%.

09040036 Міленіум F1

Закритий грунт

Заявник: ICI Сементі С.п.А.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, короткий, вузький, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід дуже маленький, яйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчика плодоніжки дуже маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) наявне. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості дуже довгий.

Загальна урожайність - 5 кг/м2; маса товарного плоду - 280 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 65 днів; період плодоношення - 15 днів; вміст сухої речовини в плоді - 8,0%; вміст каротину - 0,12 мг%; вміст загального цукру - 4,7 %; вміст вітаміну С - 0,1 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 5,0 %, макроспоріозом - 5,0%, фітофторозом - 5,0 %. Загальна кислотність - 3,35 %.

08040029 Муна F1

Закритий грунт

Заявник: Клоз

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість дуже слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід маленький, яйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки від дуже слабкого до слабкого. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 5,5 кг/м2; маса товарного плоду - 95 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 45 днів; вміст сухої речовини в соку - 6,0%; вміст каротину - 2,1 мг%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 21 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 1,0 %, гнилями - 1,3 %, макроспоріозом - 3,0%, фітофторозом - 2,0 %.

08040059 Мірсіні F1

Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за

розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 120 т/га; маса товарного плоду - 210-230 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 115 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,5%; вміст загального цукру - 2,3-2,6 %; вміст вітаміну С - 13,5-16,5 мг%. Загальна кислотність - 0,5%.

Закритий грунт

09040029 Магали F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною, широкий, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 85 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,5%.

Закритий грунт

® 08040020 Ната F1

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід великий, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 32,8 т/га; маса товарного плоду - 160 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 96 днів; період плодоношення - 182 дні; вміст сухої речовини в плоді - 5,8%; вміст каротину - 0,41 мг%; вміст загального цукру - 3,4 %; вміст вітаміну С - 21,2 мг%.

Закритий грунт

09040065 Нергал F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід дуже великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м2; маса товарного плоду - 145 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 40 днів; вміст сухої речовини в плоді - 7,0%; вміст каротину - 3 мг%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 19 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,5 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,2%, фітофторозом - 0,1 %.

Закритий грунт

® 08040019 Окраса F1

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 18,6 т/га; маса товарного плоду - 140 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 76 днів; період плодоношення - 83 дні; вміст сухої речовини в плоді - 4,8%; вміст каротину - 0,44 мг%; вміст загального цукру - 3,8 %; вміст вітаміну С - 20,9 мг%.

09040077 Полсет F1 — Закритий грунт

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід м'який, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 20,2 кг/м2; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 20 днів; вміст каротину - 2,5 мг%; вміст сухої речовини в плоді - 6,1%; вміст загального цукру - 5,1 %; вміст вітаміну С - 21,7мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 7 %, гнилями - 7 %, макроспоріозом - 8%, фітофторозом - 9 %.

09040051 Парто F1 — Закритий грунт

Заявник: CEMO a.c.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, від середнього до широкого за шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід за розміром від середнього до великого, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки від середнього до великого. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості від помірного до довгого.

Загальна урожайність - 100 т/га; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 55 днів; період плодоношення - 70 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,9%; вміст загального цукру - 3,8 %; вміст вітаміну С - 17,1 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 6,0 %, макроспоріозом - 7,0%, фітофторозом - 7,0 %.

08040031 Посадас F1 — Закритий грунт

Заявник: Клоз

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість дуже слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, яйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки від дуже слабкого до слабкого. Розмір рубчика плодоніжки від маленького до дуже маленького. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід за твердістю від помірного до твердого, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м2; маса товарного плоду - 110 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 65 днів; період плодоношення - 45 днів; вміст каротину - 2 мг%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 21 мг%, вміст сухої речовини в соку - 6 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 1,0 %, гнилями - 1,3 %, макроспоріозом - 3,0%, фітофторозом - 2,0 %.

06040053 Полфаст F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: циліндрична; за товщиною перикарду плоду: тонкий; кількість камер: дві-три; зелене плече плоду (перед достиганням) : відсутнє; колір плоду за достигання: червоний; колір м'якоті плоду (за достигання): червоний; строк лежкості плоду: довгий; час достигання: помірно.

Група стиглості - ранньостиглий. Загальна урожайність - 100 т/га; товарна урожайність 90 т/га; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 50 днів; період плодоношення - 45 днів; ;дегустаційна оцінка, балів : свіжих плодів 9, дегустаційна оцінка, балів : у переробці 9.

06040018 Пілмек

Лісостеп, Степ

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: кутаста; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: чотири, п'ять або шість; зелене плече плоду (перед достиганням) : відсутнє; колір плоду за достигання: червоний; колір м'якоті плоду (за достигання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час достигання: помірно.

Загальна урожайність - 55 т/га; маса товарного плоду - 70 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 90 днів; дружність визрівання - 70 %; вміст сухої речовини в плоді - 6,2%; вміст загального цукру - 5,1 %; траспортабельність - 7 балів;

08040064 Рапіт F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 100 т/га; маса товарного плоду - 60 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 105 днів; період плодоношення - 27 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,0-4,1 %; вміст загального цукру - 2,3-2,6 %; вміст вітаміну С - 13,5-16,2 мг%; загальна кислотність - 0,5 %.

09040013 Саргон F1

Лісостеп

Заявник: Агро-Тіп

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за шириною та довжиною, перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром, кутастої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 160 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 98 днів; період плодоношення - 115 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 100 мг/100 г, вміст каротину - 5 мг/г. Загальна кислотність - 40%. Пошкодження шкідниками: попелицею - <5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - <5 %, гнилями - <5 %, макроспоріозом - <5%, фітофторозом - <5 %.

09040047 Т 47110 F1

Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, широкий, перистий, пухирчастість та глянсуватістьслабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 510 т/га; маса товарного плоду - 95 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 120 днів; період плодоношення - 240 днів; вміст каротину - 30 мг%; вміст сухої речовини в плоді - 6,5%; вміст загального цукру - 3,5 %; вміст вітаміну С - 25 мг%. Загальна кислотність - 4,0 %. Ураженість хворобами: макроспоріозом - 10 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 10 %.

® 09040019 Таша F1

Закритий грунт

Заявник: Хазера Генетікс

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід маленький, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки дуже маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 8 кг/м2; маса товарного плоду - 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,1%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 17,5 мг%. Загальна кислотність - 4,5 %.

09040048 Тіраде Пінк F1

Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід дуже великий, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки сильне. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 610 т/га; маса товарного плоду - 110 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 130 днів; період плодоношення - 210 днів; вміст сухої речовини в плоді - 7,5%; вміст каротину - 30 мг%; вміст загального цукру - 5,5 %; вміст вітаміну С - 30 мг%. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 10,0 %, гнилями - 10,0 %, макроспоріозом - 10,0%, фітофторозом - 10,0 %.

09040011 Торрос F1

Лісостеп

Заявник: Агро-Тіп

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за шириною та довжиною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром,

еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 100 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 95 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,2%; вміст загального цукру - 5,8 %; вміст вітаміну С - 160 мг/100 г; вміст каротину - 5 мг/г. Загальна кислотність - 40%. Пошкодження шкідниками: попелицею - <5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - <5 %, гнилями - <5 %, макроспоріозом - <5%, фітофторозом - <5 %.

® 07040007 Тайм

Лісостеп, Степ

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: округла; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: три-чотири; зелене плече плоду (перед достиганням) : наявне; колір плоду за достигання: червоний; колір м'якоті плоду (за достигання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час достигання: рано.

Загальна урожайність - 65 т/га; маса товарного плоду - 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 108 днів; період плодоношення - 45 днів; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 4,5; вміст сухої речовини в плоді - 5,7%; вміст загального цукру - 3,6 %; вміст вітаміну С - 22,6 мг%;

09040076 Тойото F1

Закритий грунт

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 24 кг/м2; маса товарного плоду - 140 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 20 днів; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст загального цукру - 5,3 %; вміст вітаміну С - 22,3мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 7 %, гнилями - 7 %, макроспоріозом - 8%, фітофторозом - 9 %.

09040014 Темис F1

Лісостеп

Заявник: Агро-Тіп

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за шириною та довжиною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, кутастої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 100 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 110 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,2%; вміст загального цукру - 5,3 %; вміст вітаміну С - 100 мг/100 г; вміст каротину - 5 мг/г. Загальна кислотність - 40%. Пошкодження шкідниками: попелицею - <5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - <5 %, гнилями - <5 %, макроспоріозом - <5%, фітофторозом - <5 %.

® 09040053 TEX2721 — Закритий грунт

Заявник: Такіі Європа Б.В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед достиганням) наявне. Плід помірний за твердістю, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості короткий.

Загальна урожайність - 240 т/га; маса товарного плоду - 220 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 150 днів; вміст сухої речовини в плоді - 7,5%; вміст каротину - 2,1 мг%; вміст загального цукру - 3,7 %; вміст вітаміну С - 16,1 мг%. Загальна кислотність - 0,5 %.

® 06040040 Талан — Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: плескато-округла; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: чотири, п`ять або шість; зелене плече плоду (перед достиганням) : відсутнє; колір плоду за достигання: червоний; колір м'якоті плоду (за достигання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час достигання: помірно.

Загальна урожайність - 35 т/га; товарна урожайність 33 т/га; маса товарного плоду - 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 47 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,6 %; вміст загального цукру, 2,4 %; дегустаційна оцінка, балів : свіжих плодів 4,6.

09040046 Темпра F1 — Закритий грунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід дуже великий за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки сильне. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 510 т/га; маса товарного плоду - 185 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 120 днів; період плодоношення - 230 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,5%; вміст загального цукру - 3,5 %; вміст вітаміну С - 28,0 мг%; вміст каротину - 30 мг% . Загальна кислотність - 4%. Ураженість хворобами: фітофторозом - 10 %, макроспоріозом - 10%, фітофторозом - <5 %.

06040052 Торбей F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: циліндрична; за товщиною перикарду плоду: тонкий; кількість камер: дві-три; зелене плече плоду (перед достиганням) : відсутнє; колір плоду за достигання: рожевий; колір м'якоті плоду (за достигання): рожевий; строк лежкості плоду: довгий; час достигання: помірно.

Загальна урожайність - 110 т/га; товарна урожайність 100 т/га; маса товарного плоду - 150 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 50 днів; ;дегустаційна оцінка, балів : свіжих плодів 9, дегустаційна оцінка, балів : у переробці

9; траспортабельність - 3 бали.

09040006 Тропікал Джем F1

Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки короткі, середні за шириною, пухирчастість помірна, глянсуватість слабко виражена. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі плескато-округлої форми з товстим перикарпом, 4-5, або 6-камерний. Плід за достигання рожевого забарвлення. Час цвітіння - середній, час достигання - середній.

Загальна урожайність - 8,2 кг/м2; маса товарного плоду - 250 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 113 днів; період плодоношення - 33 дні; вміст сухої речовини в плоді - 5,3%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 3,3 %; вміст вітаміну С - 29 мг%. Загальна кислотність - 0,8 %.

09040031 Теза F1

Закритий грунт

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 70 т/га; маса товарного плоду - 150 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 98 днів; період плодоношення - 55 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,0%.

09040008 Уно Россо F1

Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки короткі, середні за шириною, пухирчастість та глянсуватість помірно виражені. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі округлої форми з середнім перикарпом, 3-4-камерний. Плід за достигання червоного забарвлення. Час цвітіння - та достигання - середній.

Загальна урожайність - 7,5 кг/м2; маса товарного плоду - 60 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 112 днів; період плодоношення - 30 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,5%; вміст каротину - 2,6 мг%; вміст загального цукру - 2,5 %; вміст вітаміну С - 25 мг%. Загальна кислотність - 0,6 %.

09040010 Уракан F1

Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки середньої довжини, вузькі, пухирчастість помірна, глянсуватість слабко виражена. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі плескато-округлої форми з товстим перикарпом, кількість камер - більше шести. Плід за достигання рожевого забарвлення. Час цвітіння та достигання середній.

Загальна урожайність - 8,3 кг/м2; маса товарного плоду - 250 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 110 днів; період плодоношення - 32 дні; вміст сухої речовини в плоді - 4,7%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 3,2 %; вміст вітаміну С - 26 мг%. Загальна кислотність - 0,9 %.

09040012 Халлар F1

Лісостеп

Заявник: Агро-Тіп

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за шириною та довжиною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість сильна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 84 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 110 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,8%; вміст загального цукру - 5,2 %; вміст вітаміну С - 100мг/100 г; вміст каротину - 5 мг/г. Загальна кислотність - 40%. Пошкодження шкідниками: попелицею - <5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - <5 %, гнилями - <5 %, макроспоріозом - <5%, фітофторозом - <5 %.

® 09040018 Шанті F1 — Закритий грунт

Заявник: Хазера Генетікс

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, оберненояйцеподібної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчика плодоніжки дуже маленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 8 кг/м2; маса товарного плоду - 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 110 днів; період плодоношення - 85 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,1%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 17,5 мг%. Загальна кислотність - 4,5 %.

05040083 Шахтарський — Лісостеп, Степ

Заявник: Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: серцевидна; за товщиною перикарду плоду: тонкий; кількість камер: чотири, п'ять або шість; зелене плече плоду (перед достиганням) : наявне; колір плоду за достигання: рожевий; колір м'якоті плоду (за достигання): рожевий; строк лежкості плоду: короткий; час достигання: помірно.

Загальна урожайність - 36,8 т/га; товарна урожайність 15,6 т/га; маса товарного плоду - 106 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 47 днів; д вміст сухої речовини в плоді - 4,14%; вміст загального цукру - 23,56 %;дегустаційна оцінка, балів : свіжих плодів 4,5.

09040004 Юджі 8168 F1 — Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки короткі, середні за шириною, пухирчастість та глянсуватість помірно виражені. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі округлої форми з товстим перикарпом, 4-5, або 6-камерний. Плід за достигання рожевого забарвлення. Час цвітіння та достигання - ранній.

Загальна урожайність - 7,3 кг/м2; маса товарного плоду - 90 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 112 днів; період плодоношення - 29 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,6%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 3,2 %; вміст вітаміну С - 26 мг%. Загальна кислотність - 0,5 %.

09040005 Юджі Ред F1

Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки короткі, середні за шириною, пухирчастість та глянсуватість помірно виражені. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі округлої форми з товстим перикарпом, 2-камерний. Плід за достигання червоного забарвлення. Час цвітіння та достигання - середній.

Загальна урожайність - 7,3 кг/м2; маса товарного плоду - 75 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 27 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,5%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 3,1 %; вміст вітаміну С - 25 мг%. Загальна кислотність - 0,6 %.

09040009 Юнірекс F1

Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки короткі, середні за шириною, пухирчастість та глянсуватість помірно виражені. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі округлої форми з товстим перикарпом, 2-камерний. Плід за достигання червоного забарвлення. Час цвітіння - середній, час достигання - ранній.

Загальна урожайність - 7,6 кг/м2; маса товарного плоду - 100 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 32 дні; вміст сухої речовини в плоді - 5,5%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 0,7 %; вміст вітаміну С - 27 мг%. Загальна кислотність - 8,5 %.

Редиска

08038003 Добриня

ПСЛ, закритий грунт

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Сорт - диплоїд. Листкова розетка за шириною зростання при основі - широка. Листок довгий, напівпрямий, вузько-обернено-яйцевидний, форма верхівки - округла, кількість лопатей - дуже мало, надрізи країв - відсутні, опушення слабке. Коренеплід товстий, форми - льодяна бурулька, форма верхівки - випукла, основи - гостра, забарвлення однокольорове червоне, товщина кори середня. Забарвлення м'якоті - матове біле, пізній час достигання. Здатність до утворення дупла слабка.

Середня маса плоду - 98 г. Суха речовина - 5,1 %, вітамін С 25,1 мг/%. Днів до достигання - 42.

08038004 Кармен

Заявник: Ходовля Рослин Сновідза Сп. З.о.о

Сорт - диплоїд. Листкова розетка за шириною зростання при основі - від вузької до середньої. Листок короткий, напівпрямий-горизонтальний, обернено-яйцевидний, широко-обернено-яйцевидний, форма верхівки - округла, кількість лопатей - від середньої кількості до багато, надрізи країв - наявні, опушення сильне. Коренеплід середньої товщини, форма - округла, форма верхівки - плеската, основи - тупа, забарвлення однокольорове червоне, товщина кори від середньої до товстої. Забарвлення м'якоті - матове біле, середній час достигання - 35 днів. Здатність до утворення дупла відсутня або дуже слабка.

Товарний урожай - 30 ц/га, середня маса плоду - 20 г, вітамін С - 30 мг/%, гниль біла - 1%, гниль мокра - 3%, ніжка чорна - 2%, суха речовина 6,2 %.

08038005 Кармеса

СЛП, закритий грунт

Заявник: Ходовля Рослин Сновідза Сп. З.о.о

Сорт - диплоїд. Листкова розетка за шириною зростання при основі - від середньої до широкої. Листок середній , напівпрямий-горизонтальний, обернено-яйцевидний, форма верхівки - округла, кількість лопатей - від середньої кількості до багато, надрізи країв - наявні, опушення помірне. Коренеплід середньої товщини, форма - округла, форма верхівки - плеската, основи - округла, забарвлення однокольорове червоне, товщина кори середня. Забарвлення м'якоті - матове біле, середній час достигання. Здатність до утворення дупла відсутня або дуже слабка.

Товарний урожай - 20 ц/га, середня маса плоду - 15 г. Суха речовина- 5,8 %, Вітамін С - 25 мг/%, гниль біла - 2%, гниль мокра -5%, ніжка чорна - 4%. Днів до достигання - 30 днів.

08038001 Титан

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Листкова розетка: за шириною зростання при основі середня. Положення листка у просторі напівпрямий, довгий, широко-обернено-яйцевидної форми із сіруватим відтінком. Опушення помірне. Черешок без антоціанового забарвлення. Коренеплід форми льодяної бурульки. Товщина кори тонка. Забарвлення м'якоті матове біле. Час достигання дуже пізній.

Середня маса плоду - 0,900 г. Ураження хворобами: білою гниллю - 5 %, мокрою гниллю - 4 %, чорною ніжкою - 2 %.

Салат головчастий

08165004 Робінсон

Закритий грунт

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Насіння коричневе. Рослина середня за діаметром, головка відкрита, середня за щільністю, середня за розміром. Форма головки у поздовжньому перерізі широкоеліптична.Листки жовтуватого кольору, еліптичної форми. На листках наявна слабка пухирчастість та хвилястість краю. Пазушне гілкування помірне.Час збиральної стиглості ранній.

Товарний урожай 6 кг/м2; середня маса плоду 110 г; днів до достигання - 50; лежкість 95 %. Щільність головки - 4 бали.

Салат латук

09291006 Аргентінас

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка закрита, дуже щільна, велика за розміром, широкоеліптичної форми у поздовжньому перерізі. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість помірна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Помірна хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 220 ц/га; днів до достигання - 60. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

09291009 Бернардінас

Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка закрита, щільна, велика за розміром, широкоеліптичної форми у поздовжньому перерізі. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість слабка. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Помірна

хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 220 ц/га; днів до достигання - 65. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

® 08291007 Галера — Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Насіння чорне. Рослина середня за діаметром, головка закрита, щільна, середня за розміром.. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість від помірної до сильної. Глянсуватість з верхнього боку слабка. Хвилястість краю від слабкої до помірної, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 400 ц/га; днів до достигання - 40.

09291001 Гондар — Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Насіння чорне. Рослина дуже велика за діаметром, головка закрита, середня за щільністю, велика за розміром, широкоеліптичної форми у поздовжньому перерізі. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість помірна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Помірна хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості середній.

Товарний урожай 220 ц/га; днів до достигання - 45. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

09291002 Граніт — Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка закрита, дуже щільна, велика за розміром, широкоеліптична форма у поздовжньому перерізі. Листки округлої форми, пухирчастість слабка. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Слабка хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 235 ц/га; днів до достигання - 40. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

09291008 Діамантінас — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Насіння чорне. Рослина середня за діаметром, головка закрита, щільна, велика за розміром, широкоеліптичної форми у поздовжньому перерізі. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість сильна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Сильна хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 215 ц/га; днів до достигання - 65. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

® 08291005 Куала — Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Насіння чорне. Рослина за діаметром від середньої до великої, головка закрита, ща щільністю від щільної до дуже щільної, середня за розміром. Листки оберненотрикутної форми, пухирчастість сильна. Глянсуватість з верхнього боку слабка. Хвилястість краю від слабкої до помірної, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 400 ц/га; днів до достигання - 45.

08291010 Красунчик — Закритий грунт

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість помірна. Глянсуватість з верхнього боку помірна. Хвилястість краю дуже сильна. Антоціанове забарвлення на листках наявне, інтенсивність сильна. Час збиральної стиглості середній.

Товарний урожай 218 ц/га; днів до достигання - 38.

08291006 Мульті — Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Насіння чорне. Рослина маленька за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість від дуже слабкої до слабкої. Глянсуватість з верхнього боку від помірної до сильної. Хвилястість краю помірна, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості від ранньої до середньої.

Товарний урожай 500 ц/га; днів до достигання - 35.

® 08291008 Онікс — Закритий грунт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-вузькоеліптичної форми, пухирчастість від помірної до сильної. Глянсуватість з верхнього боку від слабкої до помірної. Хвилястість краю дуже сильна, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості від ранньої до середньої.

Товарний урожай 400 ц/га; днів до достигання - 40.

09291007 Сільвінас — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка закрита, щільна, велика за розміром, широкоеліптичної форми у поздовжньому перерізі. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість помірна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Помірна хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 210 ц/га; днів до достигання - 70. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

Цибуля городня

07041011 Скапіно F1 — Степ

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: напівпряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна

форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 75, Вегетаційний період, днів 108, Вміст : сухої речовини в плоді, % 12, Вміст :загального цукру, % 9,3, Вміст : вітаміну С, мг% 10,8.

07041012 Аренал F1 — Полісся, Лісостеп

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): коротка; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): яйцевидна; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка опукла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 80, Вегетаційний період, днів 130, , Вміст : сухої речовини в плоді, % 13,5, Вміст :загального цукру, % 9,8, Вміст : вітаміну С, мг% 10,5

® 07041015 Алтана — Степ, Лісостеп, Полісся, Закритий грунт

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: напівпряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: слабкий; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: сильна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: жовтий.

Загальна урожайність, т/га 36, Вегетаційний період, днів 115, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 10, Ураженість хворобами, % : гнилями 1, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою 1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 18, Вміст :загального цукру, % 11, Вміст : вітаміну С, мг% 9

08041031 Антилопа F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт помірний. Листок середній. Цибулина середнього розміру, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка товста, рожевого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 67,0-70,0 т/га, вегетаційний період 115 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 7,3-9,7. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,6. Вміст загального цукру, % - 5,9-6,2.

® 05041008 Булат — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт помірний. Листок середній. Цибулина велика за розміром, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка тонка, жовтого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання середній. Відсутня або дуже низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 30,0-75,0 т/га, товарна урожайність - 28,0-74,0 т/га, маса товарної цибулини 80,0-150,0 г, вегетаційний період 90,0-95,0 днів. Лежкість - 90-95%. Вміст вітаміну С, мг% - 5,0-8,2. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,5-12,2. Вміст загального цукру, % - 8,5-9,3.

07041010 Бугатті F1 — Полісся, Лісостеп

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: велика; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого;; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: помірна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 80, Вегетаційний період, днів 115, Вміст : сухої речовини в плоді, % 12, Вміст :загального цукру, % 9,8, Вміст : вітаміну С, мг% 10,5.

® 06041026 Батир — Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Кількість листків на псевдо стеблі: велика; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: слабка; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): широко-яйцевидна; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка спадаюча; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: жовтий.

Загальна урожайність, т/га 35, Товарна урожайність, т/га 32, Маса товарної цибулини, г 120, Вегетаційний період, днів 135, Лежкість, % 97, Рівень достигання, % : перед збиранням 90, Рівень достигання, % : після дозрівання 98, Придатність для механізованого збирання, балів 7, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Вміст : сухої речовини в плоді, % 11,9, Вміст :загального цукру, % 9,3, Вміст : вітаміну С, мг% 8,8, Транспортабельність, балів 7.

08041038 Бургос — Закритий грунт

Заявник: Вілморін

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт сильний. Листок довгий. Цибулина велика, висока, широкообернено-яйцевидної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання сильна. Суха шкірка товста, жовтого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Чоловіча стерильність рослини відсутня або дуже низька.

Загальна врожайність – 4,5 кг/м2, вегетаційний період 130 днів. Ураженість хворобами: гнилями - 1 %. Пошкодження шкідниками: цибулевою мухою - 2 %. Вміст вітаміну С, мг% - 4,0. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,0. Вміст загального цукру, % - 5,0.

08041032 Балстар F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини кількість листків на псевдостеблі від помірної до великої. Положення листя напівпряме, восковий наліт помірний. Листок середній за довжиною. Цибулина велика, висока, широкоеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середня за товщиною, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Кількість зачатків від дуже малої до малої. Початок проростання цибулини протягом зберігання ранній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 55,0 т/га, вегетаційний період 265 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 9,7. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,5. Вміст загального цукру, % - 6,2.

® 08041033 Валеро

Степ, Лісостеп

Заявник: Нюнемс Б.В.

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя від прямого до напівпрямого, восковий наліт відсутній або дуже слабкий. Листок довгий. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання слабка. Суха шкірка середня за товщиною, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 50-70 т/га, вегетаційний період 110 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 10,0. Вміст сухої речовини в плоді, % - 13,0. Вміст загального цукру, % - 12,0.

08041004 Варяг

Лісостеп, Степ

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: помірний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): плеската; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 25, Вегетаційний період, днів 104, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 34,6, Ураженість хворобами, % : гнилями 5,7, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою1,5, Вміст : сухої речовини в плоді, % 12,5, Вміст :загального цукру, % 8,7, Вміст : вітаміну С, мг% 6,5

08041029 Варес F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, восковий наліт дуже сильний. Листок довгий. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання від помірної до сильної. Суха шкірка товста, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 70,0 т/га, вегетаційний період 105 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 9,7. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,9. Вміст загального цукру, % - 6,2.

08041019 Глейсер — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: напівпряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): коротка; восковий наліт листя: від дуже слабкого до помірного; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): злегка конусовидна; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка опукла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: білий; чоловіча стерильність рослини: відсутня або дуже низька.

Загальна урожайність, т/га 93, Вегетаційний період, днів 95, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 10,1, Вміст :загального цукру, % 3, Вміст : вітаміну С, мг% 7.4

08041026 Грейтфул Ред F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя від прямого до напівпрямого, восковий наліт відсутній або дуже слабкий. Листок середній за довжиною. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, широкооберненояйцевидної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання слабка. Суха шкірка товста, червоного кольору. Забарвлення соковитих лусок червонувате. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання середній. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 85,0 т/га, вегетаційний період 120 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 9,2. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,7. Вміст загального цукру, % - 6,5.

08041025 Дамаскус F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя від прямого до напівпрямого, восковий наліт від слабкого до помірного. Листок середній за довжиною. Цибулина за розміром від середньої до великої, широкооберненояйцевидної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання сильна. Суха шкірка середня за товщиною, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Кількість зачатків від дуже малої до малої.

Загальна врожайність – 60,0 т/га, вегетаційний період 118 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 9,2. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,8. Вміст загального цукру, % - 6,2.

09041001 Екстра Ерлі Голд F1 — Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Рослина з малою кількістю листків на псевдостеблі. Листки прямі, середні за довжиною та діаметром, з помірним восковим нальотом, інтенсивністю зеленого кольору, зігнутість відсутня або дуже слабка. Несправжнє стебло коротке, діаметр середній.Цибулина не розщеплюється на цибулинки, середнього розміру, округла, форма плеча верхівки та основи округла. Основний колір сухої шкірки жовтий.

Загальний урожай 3,7 кг/м2; вегетаційний період - 250 днів; вміст сухої речовини - 11 %; вміст загального цукру - 9,1 %; вітаміну С - 12,3 мг%.

07041014 Ікарус F1

Степ

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: помірний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: сильна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 75, Вміст : сухої речовини в плоді, % 10, Вміст :загального цукру, % 9,3, Вміст : вітаміну С, мг% 10,8

® 07041002 Корсар

Лісостеп, Степ

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Заявник: Приватне підприємство «Агросвіт». Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: сильна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: помірний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: мала; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): поперечно-еліптична; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): заглиблена; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): плеската; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: червоний.

Загальна урожайність, т/га 50, Товарна урожайність, т/га 45, Маса товарної цибулини, г 110, Вегетаційний період, днів 105, Лежкість, % 75, Рівень достигання, % : перед збиранням 98, Придатність для механізованого збирання, балів 4,5, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9.8, Вміст :загального цукру, % 6,8, Вміст : вітаміну С, мг% 5, Транспортабельність, балів 4,5.

08041016 Кассіопея

Степ, Лісостеп

Заявник: Енза Заден Біхір Б.В.

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт слабкий. Листок середній. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання сильна. Суха шкірка середньої товщини, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання середній. Відсутня або дуже низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 65,0 т/га, вегетаційний період 115 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 10,1. Вміст сухої речовини в плоді, % - 16,5. Вміст загального цукру, % - 10,7.

09041002 Копер Бол F1

Закритий грунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Рослина з великою кількістю листків на псевдостеблі. Листки напівпрямі, середні за довжиною та діаметром, з помірним восковим нальотом, слабкою інтенсивністю зеленого кольору, зігнутість відсутня або дуже слабка. Несправжнє стебло середнє за довжиною, діаметр середній.Цибулина не розщеплюється на цибулинки, середнього розміру, широкояйцевидна, форма плеча верхівки та основи округла. Основний колір сухої шкірки коричневий.

Загальна врожайність – 3,5 кг/м2, вегетаційний період 113 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 10,6. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,2. Вміст

загального цукру, % - 9,3.

® 06041027 Оберіг — Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Кількість листків на псевдо стеблі: велика; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: пряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): коротка; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): поперечно-еліптична; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): плеската; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка опукла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: помірна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: жовтий.

Загальна урожайність, т/га 40, Товарна урожайність, т/га 38, Маса товарної цибулини, г 140, Вегетаційний період, днів 140, Лежкість, % 95, Рівень достигання, % : перед збиранням 92, Рівень достигання, % : після дозрівання 98, Придатність для механізованого збирання, балів 7, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 9, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Вміст : сухої речовини в плоді, % 11,3, Вміст :загального цукру, % 9,1, Вміст : вітаміну С, мг% 7,6, Транспортабельність, балів 4,

08041028 Орізаба F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя від прямого до напівпрямого, восковий наліт слабкий. Листок довгий. Цибулина за розміром від середньої до великої, за висотою від середньої до високої, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки від слабкої до помірної. Суха шкірка за товщиною від тонкої до середньої, білого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Кількість зачатків від дуже малої до малої. Початок проростання цибулини протягом зберігання ранній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 80,0 т/га, вегетаційний період 118 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 9,7. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,6. Вміст загального цукру, % - 6,2.

08041020 Песо — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: слабка; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): від середньої до довгої; восковий наліт листя: від дуже слабкого до слабкого; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: від малої до середньої; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: від слабкої до помірної; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий; чоловіча стерильність рослини: висока.

Загальна урожайність, т/га 95, Вегетаційний період, днів 95, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9.9, Вміст :загального цукру, % 3,2, Вміст : вітаміну С, мг% 7.4

08041018 Сафран F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: велика; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: від помірного до сильного; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: від середньої до великої; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): широко-еліптична; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): злегка конусовидна; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка опукла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: від помірної до сильної; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий; чоловіча стерильність рослини: відсутня або дуже низька.

Загальна урожайність, т/га 94, Вегетаційний період, днів 105, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 10,1, Вміст :загального цукру, % 3,2, Вміст : вітаміну С, мг% 7.6

08041021 Свіфт

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: напівпряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): коротка; восковий наліт листя: дуже сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): кругла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка спадаюча; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий; чоловіча стерильність рослини: відсутня або дуже низька.

Загальна урожайність, т/га 95, Вегетаційний період, днів 95, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9.8, Вміст :загального цукру, % 3, Вміст : вітаміну С, мг% 7.2

06041015 Сулов F1

Лісостеп

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С. Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: слабка; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): широко-еліптична; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): злегка конусовидна; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка спадаюча; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: помірна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 45, Товарна урожайність, т/га 42, Маса товарної цибулини, г 220, Вегетаційний період, днів 110, Рівень достигання, % : перед збиранням 90, Транспортабельність, балів 9.

08041027 Толука F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт слабкий. Листок середній. Цибулина середнього розміру, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка товста, білого кольору.

Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання ранній. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 60,0 т/га, вегетаційний період 122 днів. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,8. Ураженість хворобами: несправжня борошниста роса - 70 %.

07041013 Шерпа — Полісся, Лісостеп

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: слабкий; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): яйцевидна; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): плеската; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: сильна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 95, Вегетаційний період, днів 150, , Вміст : сухої речовини в плоді, % 13, Вміст :загального цукру, % 9,8, Вміст : вітаміну С, мг% 10,5

Цибуля порей

09175001 Колумбус — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Рослина висока, щільність листків помірна, листки напівпрямі, сіро-зеленого кольору. Антоціанове забарвлення на листковій пластинці відсутнє або дуже слабке, восковий наліт слабкий, жолобкуватість наявна. Стебло за довжиною та діаметром середні, формування цибулини помірне, звуження до основи відсутнє. Квітка біла за кольором.

Загальна врожайність - 45 т/га. Вегетаційний період - 85 днів. Вміст: сухої речовини у плоді - 11 %; загального цукру - 6,5 %; вітаміну С - 35 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 3 %; гнилями - 3 %. Пошкодження шкідниками: цибулевою мухою - 2 %.

08175003 Порбелла — Закритий грунт

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Рослина середня за висотою, щільність листків помірна, листки прямі, зеленого кольору. Антоціанове забарвлення на листковій пластинці відсутнє або дуже слабке, восковий наліт помірний, жолобкуватість наявна. Стебло середнє за довжиною, товсте за діаметром середні, формування цибулини відсутнє або дуже слабке, звуження до основи відсутнє. Квітка біла за кольором.

Загальна врожайність - 4,5 кг/м2. Вегетаційний період - 90 днів. Вміст: сухої речовини у плоді - 14 %; загального цукру - 3,0 %; вітаміну С - 12,0 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 7%; гнилями - 8 %. Пошкодження шкідниками: цибулевою мухою - 5 %.

Цибуля скорода (шніт)

® 09177001 Дівон — Степ, Лісостеп, Полісся, закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина за типом росту багатостеблова, середня кількість несправжніх стебел, середня за висотою, за габітусом напівпіднесена. Листки блакитно-зелені за забарвленням, короткі, середні за товщиною, восковий наліт помірний. Несправжнє стебло середнє за довжиною, тонке, антоціанове забарвлення наявне. Суцвіття за довжиною середнє. Час початку цвітіння пізній.

Загальна врожайність - 50 т/га, тривалість вегетаційного періоду - 100 днів. Вміст сухої речовини в цибулині - 11 %; загального цукру - 12 %; вітаміну С - 7 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 0,1 %; гнилями - 0,1 %.

Цибуля шалот

® 08176002 Оксамит — Полісся

Заявник: Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт слабкий. Листок довгий. Цибулина велика, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середня за товщиною, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок червонувате. Середня кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Чоловіча стерильність рослини відсутня або дуже низька.

Загальна врожайність – 25,0 т/га, вегетаційний період 68 днів. Ураження хворобами: несправжньою борошнистою росою - 2 %, гнилями - 10 %. Вміст вітаміну С, мг% - 17,6. Вміст сухої речовини в плоді, % - 16,9. Вміст загального цукру, % - 8,6.

Шпинат городній

09179003 Ель Форте F1 — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Листкова пластинка має тупу форму верхівки, форма у поздовжньому розрізі опукла. У квітучих рослин дуже багато часток однодомних рослин, відсутня або дуже мала кількість рослин з жіночими і чоловічими квітками.

Товарний урожай 200 ц/га; днів до достигання 55; ураження хворобами: пероноспорозом - 10%.

® 08179003 Переможець — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Листкова пластинка має широко-еліптичну форму, тупу форму верхівки, форма у поздовжньому розрізі плеската. У квітучих рослин мала частка однодомних рослин, середня кількість рослин з жіночими квітками, мала кількість з чоловічими квітками.

Товарний урожай 212 ц/га; днів до достигання 26.

Гарбуз мускусний

® 08429002 Бальзам — Степ, Лісостеп

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, середня кількість стебел. Стебло за кольором жовте, округло-гранчасте за формою, має середнє м'яке опушення. Листкова пластинка середня за розміром, нирковидна, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька. Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення м'яке, положення відносно грунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Форма плоду плеската, поверхня нерівна, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість

кольорів кори один, основний колір коричневий. М'якуш товстий, основний колір оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня шорстка.

Товарний урожай - 359 ц/га; вміст сухої речовини - 9,1 %. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 0,9 %.

® 08429001 Доля — Степ, Лісостеп

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, велика кількість стебел. Стебло за кольором зелене, округло-гранчасте за формою, має середнє м'яке опушення. Листкова пластинка за розміром середня, нирковидна, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька. Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення м'яке, положення відносно грунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Поверхня плоду гладенька, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість кольорів кори один, основний колір коричневий. М'якуш товстий, основний колір оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня шорстка.

Товарний урожай - 293 ц/га; днів до достигання - 124; вміст сухої речовини - 8,4 %. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 0,5 %.

Гарбуз крупноплідний

® 08415001 Ювілей — Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, середня кількість стебел. Стебло за кольором зелене, округле за формою, має середнє жорстке опушення. Листкова пластинка за розміром велика, округла, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька. Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення шорстке, положення відносно грунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Форма плоду плеската, поверхня сегментована, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість кольорів кори один, основний колір сірий. М'якуш за товщиною товстий, основний колір червоно-оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня гладенька.

Товарний урожай - 287 ц/га; днів до достигання - 126; вміст сухої речовини - 12,0 %. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 3,4 %.

Селера коренеплідна

09167001 Президент — Закритий грунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина середня за висотою. Розмір верхівкового листочка великий. Черешок короткий. Коренеплід великого розміру, є незначні виступи на поверхні. Основний колір шкірки коренеплоду білуватий, забарвлення м`якуша біле.

Тривалість періоду від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості 141 доба. Висота рослин 60 см. Стійкість до вилягання 8 балів. Стійкість до обсипання 9 балів. Зимостійкість 9 балів. Посухостійкість 7 балів. Збір сухої речовини в середньому за рік використання 1,5 т/га. Ураженість хворобами: борошнистою росою 1%; септоріозом 1%; білою гниллю 0,5%. Вміст білка 1,5%. Вміст клітковини 1,9%.

Монарда двійчаста

® 08484001 Слава

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення сильна, за висотою (другого та нас
тупних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) – велика, габітус – прямий. Листок: закрученість верхньої пари листків по
спіралі відсутня, антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення помірна, довжина пластинки листка
середня, ширина пластинки – середня, інтенсивність зеленого забарвлення сильна, форма плас
тинки – видовжено-яйцевидна, зубчастість краю листка помірна, пухирчатість – відсутня, черешок середньої довжини. Га
луження стебла наявне, інтенсивність галуження помірне, висота прикріплення нижнього пагона висока, опушення стеб
ла відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення наявне, нижня частина стебла з антоціановим забарвленням , форма поперечного
перерізу стебла гостро кутаста. Час початку цвітіння пізній. Суцвіття: за діаметром середнє, на стеблі суцвіть багато, ярусність – наявна,
розмір приквітків (брактеол) великий, антоціанове забарвлення приквітків (брактеол) сильне, основне забарвлення квітки лілове, форма
середньої частки нижньої губи квітки не роздвоєна, інтенсивність антоціа
нового забарвлення чашечок помірна, форма чашечки відкрита. Плід (горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

® 08484002 Серпанок

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення сильна, за висотою (другого та нас
тупних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) – середня, габітус – прямий. Листок: закрученість верх
ньої пари листків по спіралі відсутня, антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення помірна, довжина
пластинки листка довга, ширина пластинки – середня, інтенсивність зеленого забарвлення помірна, форма пластинки – видовжено-
яйцевидна, зубчастість краю листка сильна, пухирчатість – відсутня, черешок середньої довжини. Га
луження стебла відсутнє, інтенсивність галуження відсутнє або дуже слабке, опушення стебла сильне, антоціанове забарвлення наявне,
з антоціановим забарвленням все стебло, форма поперечного перерізу стебла гостро кутаста. Час початку цвітіння ранній. Суцвіття: за
діаметром велике, на стеблі суцвіть мало, ярусність – відсутня, розмір приквітків (брактеол) середній, антоціанове забарвлення
приквітків (брактеол) помірне, основне забарвлення квітки бузкове, форма серед
ньої частки нижньої губи квітки не роздвоєна, інтенсивність антоціанового забарвлення чашечок помірна, форма чашечки відкрита. Плід
(горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

® 08484003 Сніжана

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення відсутнє, за висотою (другого та наступних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) –
мала, габітус – прямий. Листок: закрученість верхньої пари листків по спіралі відсутня, антоціанове забарвлення відсутнє, довжина
пластинки листка середня, ширина пластинки – широка, інтенсивність зеленого забарвлення світла, форма пластинки –яйцевидна,
зубчастість краю листка слабка, пухирчатість – наявна, черешок середньої довжини.
Галуження стебла наявне, інтенсивність галуження помірне, висота прикріплення нижнього пагона середня, опушення
стебла відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення відсутнє, форма поперечного перерізу стебла гостро кутаста. Час початку
цвітіння пізній. Суцвіття: за діаметром велике, на стеблі суцвіть середня кількість, ярусність – відсутня, роз
мір приквітків (брактеол) великій, антоціанове забарвлення приквітків (брактеол) відсутнє або дуже слабке, основне забарвлення квітки

біле, форма середньої частки нижньої губи квітки не роздвоєна, інтенсивність антоціанового забарвлення чашечок відсутня або дуже слабка, форма чашечки відкрита. Плід (горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

Огірочник лікарський

® 08487001 Космічний

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина висока за висотою, габітус (розетка) напіврозлогий, інтенсивність зеленого забарвлення листків темне, довжи на листкової пластинки розеткового листка довга, ширина – середня, за розміром листок (відношення ширина/довжина) великий, форма листкової пластинки широкоеліптична, форма краю – слабко хвиляста, пухирчастість листка сильна, опушеність – помірна, черешок середній за довжиною. Стебло: опушеність наявна, ступінь опушення помірне, за діамет ром – середнє, кількість міжвузлів середня, інтенсивність антоціанового забарвлення стебла слабка. Час цвітіння росли ни ранній, тривалість періоду від сходів до споживчої стиглості середній, тривалість вегетаційного періоду (до повного достигання насіння) середній, квітка середнього розміру синьо-зеленого забарвлення, тип суцвіття – щитковидна волоть. Достигання насіння дуже розтягнуто, форма насінини обернено яйцеподібна, маса 1000 насінин велика.

Сільськогосподарські: інші

Гісоп лікарський

® 08376001 Водограй

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

У сходів антоціанове забарвлення відсутнє. Рослина за висотою куща середня, за габітусом – напіврозлога, діаметр куща великий, кількість стебел середня, залистяність рослини сильна, діаметр стебла середній, кількість гілочок першого по рядку середня. Положення листків напіввертикальне, опушеність листків слабка, забарвлення – зелене, за довжиною і шириною листок середній, глянсуватість листкової пластинки помірна, пухирчатість – слабка. Час цвітіння рослини пізній, тривалість періоду цвітіння середня. Кількість квіток у несправжній кільчатці середня, квітка за довжиною середня, суцвіття за довжиною довге, нещільне, язичкові квітки суцвіття білого кольору. Час повної стиглості насіння пізній, маса 1000 насінин середня, насінина за довжиною і шириною середня. Вміст ефірної олії на сиру масу високий, вміст ізопінокамфору середній, пінокамфору – високий.

Урожайність наземної зеленої маси 20 т/га, вміст ефірної олії 0,26 %, вміст пінокамфору – 39,3 %, вміст ізопінокамфору – 28,5 %, збір ефірної олії 52 кг/га. Висота рослин 75 см, цвітіння дружне, стійкі до вилягання. Сорт морозо- та посухостійкий Стійкість до основних хвороб і шкідників дуже висока.

Сафлор красильний

® 09323001 Лагідний

Зона вирощування: Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Висота рослини на 15 день після появи сходів середня, висота місця прикріплення першої гілки середня, довжина найдовшої первинної гілки середня. Первинний листок: довжина пластинки середня, ширина пластинки – широка, відношення довжини до ширини пластинки середнє, довжина черешка листка дуже коротка. колючки відсутні на первинному листку, або дуже мало, зубчастість відсутня, або дуже слабка. Час цвітіння середній, суцвіття розміщені високо, язичкова квітка оранжева, довжина та ширина середнього приквітка суцвіття середня, відношення довжи
ни до ширини приквітка середнє, колючки на середньому приквітку суцвіття відсутні або дуже мало, зміна кольору язичкової квітки наявна. Шостий листок: помірного зеленого кольору, за довжиною і шириною пластинки середній, відношення довжини до ширини пластинки середнє, яйцевидної форми, колючки на шостому листку відсутні або їх дуже мало, зубчастість відсутня або дуже слабка. Маса 1000 насінин середня, сім'янка середнього розміру, біла за кольором, вміст олії середній, вміст олеїнової кислоти середній.

За даними заявника урожайність насіння 20,5 ц/га, маса 1000 насінин 44 г, висота рослин 99 см, тривалість вегетаційного періоду 110 діб, середня тривалість цвітіння 14 діб. Стійкість до посухи дуже висока, до осипання, вилягання – висока, стійкість до основних хвороб 8 балів, до шкідників – 3 бали. Вміст жирної олії 31,5 %.

Хміль звичайний

10021001 Ньюпорт

Лісостеп, Полісся

Заявник: Фірма "Агрос"

*Рослина веретеноподібної форми, тип росту нормальний, маса верхівки середня. Листки середнього розміру, пухирчастість з верхнього боку слабка. Час початку цвітіння ранній. Бічні пагони середньої третини рослини за довжиною середні, залистяність помірна, шишок багато, верхньої третини рослини пагони короткі, шишок – середня кількість. Час збирання стиглих шишок середній. Шишка широкоовальна, мала, луски повністю відкриті, помірно зеленого кольору.

*Урожайність повітряно сухих шишок 2,8 т/га. Тривалість вегетаційного періоду 135 днів. Висота рослини 12 м. Маса 100 сухих шишок 89 г. Зимостійкість 5 балів. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками: фузаріозом – 15%, псевдопероноспорозом – 23%, попелицею 20%. Вміст, % на суху речовину: загальних смол – 3,4, альфа-кислот – 17, коефіцієнт ароматичності – 0,55, кількість ефірної олії – 2,4%. Напрям використання - пивоваріння, парфумерна промисловість. Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника

10021002 Наггет

Лісостеп, Полісся

Заявник: Фірма "Агрос"

*Рослина веретеноподібної форми, тип росту нормальний, маса верхівки висока. Листки великі, пухирчастість з верхнього боку слабка. Час початку цвітіння середній. Бічні пагони середньої третини рослини за довжиною середні, залистяність помірна, шишок середня кількість, верхньої третини рослини пагони середньої довжини, шишок – середня кількість. Час збирання стиглих шишок пізній. Шишка овальна, середня, луски злегка відкриті, помірно зеленого кольору.

*Урожайність повітряно сухих шишок 2,2-2,5 т/га. Тривалість вегетаційного періоду 129 днів. Висота рослини 12 м. Маса 100 сухих шишок 82 г. Зимостійкість 5 балів. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками: кореневими гнилями 11%, псевдопероноспорозом – 20%, попелицею 21%. Вміст, % на суху речовину: загальних смол – 3,4, альфа-кислот – 14, коефіцієнт ароматичності – 0,42, кількість ефірної олії – 1,4%.
Напрям використання - пивоваріння, парфумерна промисловість. Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника

Яблуня домашня

® 08086001 Аріан — Степ, Лісостеп, Полісся.

Заявник: ІНРА-Інстітут Насьйональ де ля Решерш Агрономик, с/о Агрі Обтансіон СА

* Дерево помірного росту, розгалужене. Однорічний пагін тонкий, темно-коричневий, міжвузля дуже коротке, опушення на периферичній половині помірне. Листкова пластинка середнього розміру, надрізи країв зазублені. Черешок листка середньої довжини. Квітка мала. Плід середнього розміру, кулястий, ребристість сильна. Восковий наліт на шкірці помірний, маслянистість відсутня або незначна. Відтінок забарвлення плоду - червоний. За характером - суцільний рум"янець. Заіржавлення навколо плодоніжки та на щічках велике. Сочевички великі. Плодоніжка середньої довжини і товщини. Лійка глибока. М"якоть тверда, кремова. Насінні комірки закриті або ледь відкриті. Цвіте в ранні строки. Час збирання врожаю та споживчої стиглості середній.
* Дані заявника.

* За даними заявника середній урожай з дерева 30,0 кг. Вміст сухої речовини в плодах 11 %, вміст загального цукру 14 %. Рекомендовані грунтово-кліматичні зони – Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

09086011 Єверія

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"

* Дерево помірного росту, розгалужене. Плодоносить на коротких і довгих пагонах. Однорічний пагін середньої товщини, світло-коричневий, сильно опушений на периферичній половині. На пагоні середня кількість сочевичок. Листкова пластинка середнього розміру, спрямована донизу. Край пластинки зазублений. Черешок листка середньої довжини. Бутони білого кольору. Квітка середнього розміру. Приймочки розміщені нижче пиляків. Плоди дуже малі, кулястої форми. Ребристість відсутня або слабка. Чашечка середнього розміру. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість відсутня або слабка. Основне забарвлення плодів жовто-зелене з червоним відтінком. За характером - суцільний рум"янець. Заіржавлення на плодах відсутнє або мале. Вони вкриті сочевичками невеликого розміру. Плодоніжка довга, тонка. Лійка неглибока. М"якоть тверда, жовта. Насінні комірки закриті або ледь відкриті. Цвіте в середні строки.
* Дані заявника.

® 09086001 Зарі — Лісостеп

Заявник: Беттер3фрут Н.В.

*Дерево сильнорослe, розлоге, плодоносить на коротких і довгих пагонах. Однорічний пагін за товщиною середній до товстого, помірно опушений. Міжвузля довгі. Сочевичок багато. Квітка від середнього до великого діаметру. Листок довгий середньої ширини, стосовно пагона спрямований назовні. Край двічігородчастий. Черешок від середнього до довгого. Плід циліндричної форми, великого розміру. Ребристість помірна. Чашечка велика. Плодоніжка довга та за товщиною від середньої до товстої. Основне забарвлення шкірки жовте. Восковий наліт відсутній або дуже слабкий. Заіржавлення навколо чашечки та по всій поверхні відсутнє або дуже слабке. Сочевички середні. М'якуш кремовий, твердість мякоті середня. Насінні комірки закриті або ледь відкриті.
Група стиглості - пізньо літній

*За даними заявника: середній урожай 25,3 (ц/га), середній урожай з дерева 10,9 (кг). Середня маса плоду, г -22,1. Зимостійкість 7 балів, ступінь підмерзання 7 балів, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: борошнистою росою 2, паршею - 2; попелицею - 2,

плодожеркою - 5. Вміст загального цукру - 13,9%, загальна кислотність -7,7%. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Лісостеп.
* Дані заявника

Степ

® 08086002 КІВГ 198

Заявник: К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті (IT)

* Дерево помірного росту, розгалужене. Однорічний пагін середньої товщини, червоно-коричневий, міжвузля середньої довжини, опушення на периферичній половині помірне. Листкова пластинка середнього розміру, спрямована назовні, надрізи країв пилчасті. Черешок листка середньої довжини. Квітка середнього діаметру, приймочка розташована вище пиляків. Плід від середнього до великого розміру, еліптичний, ребристість відсутня або слабка. Восковий наліт на шкірці помірний, маслянистість помірна. Основне забарвлення плоду жовте, відтінок – пурпурово-червоний, за характером забарвлення - суцільний рум"янець із слабко визначеними смугами. Заіржавлення навколо плодоніжки та на щічках відсутнє або мале. Сочевичок середня кількість, малі. Плодоніжка довга, середньої товщини. Лійка середньої глибини. М"якоть дуже тверда, кремова. Насінні комірки напіввідкриті. Цвіте в ранні строки. Час збирання врожаю та споживчої стиглості пізній.
* Дані заявника.

* За даними заявника середня урожайність 500 ц/га, середній урожай з дерева 20,0 кг. Стійкість до посухи 7 балів. Вміст сухої речовини в плодах 15 %, вміст загального цукру 14 %, вітаміну С 5 мг%, загальна кислотність 7%. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ.
Дані заявника.

Степ

09086007 Леді Крим

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"

* Дерево помірного росту, розгалужене. Плодоносить на коротких і довгих пагонах. Однорічний пагін середньої товщини, світло-коричневий, сильно опушений на периферичній половині. На пагоні середня кількість сочевичок. Листкова пластинка середнього розміру, спрямована догори. Край пластинки двічіпилчастий. Черешок листка середньої довжини. Бутони переважно помірно-червоного кольору. Квітка середнього розміру. Приймочки розміщені на одному рівні з пиляками. Плоди від середніх до великих, циліндричної форми. Ребристість відсутня або слабка. Чашечка середнього розміру. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість значна. Основне забарвлення плодів жовто-зелене з пурпурово-червоним відтінком. За характером - суцільний рум"янець. Заіржавлення на плодах відсутнє або мале. Вони вкриті сочевичками середнього розміру. Плодоніжка середньої довжини і товщини. Лійка глибока. М"якоть тверда, кремова. Насінні комірки напіввідкриті.
Цвіте в середні строки. Урожай збирають дуже пізно. Споживча стиглість плодів настає дуже пізно.
* Дані заявника.

* За даними заявника за схеми садіння 3,5 х 1,0 середня врожайність 32,0 т/га, середній урожай з дерева 11,0 кг, середня маса плоду 160 г. Зимостійкість 9 балів, посухостійкість - 7. Вміст сухих речовин в плодах 17,0%, загального цукру 15,95%, пектинових речовин 1,2 мг%, вітаміну С 15,75 мг%.
Рекомендована грунтово-кліматична зони – Степ.
* Дані заявника.

Степ

09086010 Спринт

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"

* Дерево помірної сили росту, розгалужене. Плодоносить на коротких і довгих пагонах. Однорічний пагін середньої товщини, світло-коричневий, дуже опушений на периферії. Листкова пластинка спрямована донизу, довга й широка. Край листка зазублений. Черешок

середньої довжини. Бутони переважно білі. Квітка середнього розміру. Розташування пелюсток проміжне. Приймочки розміщені нижче пиляків. Плоди дуже малі, кулясті. Ребристість відсутня або слабка. На кінці чашечки сильне огрубіння й нерівності. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість незначна. Основне забарвлення плоду жовто-зелене з червоним відтінком. За характером - тільки суцільний рум"янець. Заіржавлення відсутнє. Сочевичок мало. Плодоніжка дуже довга, тонка. Лійка і блюдце неглибокі. М"якоть тверда, жовтувата. Насінні комірки закриті або ледь відкриті.
Цвіте в середні строки.
* Дані заявника.

* За даними заявника середня маса плоду - 15 г, максимальна - 20 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 7 балів. Ураженість хворобами борошнистою росою та паршею - 3 бали, ураженість попелицею - 3 бали.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

09086008 Фуджина — Степ

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"

* Дерево помірної сили росту, розгалужене і розлоге. Плодоносить на коротких і довгих пагонах. Однорічний пагін середньої товщини, червоно-коричневий, сильно опушений на периферичній половині. Має багато сочевичок. Листкова пластинка середнього розміру, спрямована донизу. Край пластинки зазублений. Черешок листка середньої довжини. Бутони переважно світло-рожевого забарвлення. Квітка велика. Пелюстки розташовані вільно. Приймочки розташовані вище пиляків. Плоди від великих до дуже великих, кулясті. Ребристість відсутня або слабка. Чашечка мала. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість незначна. Основне забарвлення плодів жовто-зелене з помірним пурпурово-червоним відтінком. За характером забарвлення з рум"янцем, смугасте і крапчасте. Заіржавлення на плодах відсутнє або його дуже мало. Сочевички малі. Їх багато. Плодоніжка середньої довжини і товщини. Лійка глибока. М"якоть плоду тверда, кремова. Насінні комірки напіввідкриті.
Цвіте в середні строки. Урожай збирають пізно. Час споживчої стиглості - від пізнього до дуже пізнього.
* Дані заявника.

* За даними заявника за схеми садіння 3,5 х 1,0 середня врожайність 43,1 т/га, середній урожай з дерева 15,1 кг, середня маса плоду 190 г. Зимостійкість 9 балів, посухостійкість - 7. Вміст сухих речовин в плодах 17,6%, загального цукру 18,1%, пектинових речовин 1,2 мг%, вітаміну С 8,36 мг%. Дегустаційна оцінка 9 балів.
Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ.
* Дані заявника.

09086009 Хорнголд — Степ

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"

* Дерево помірної сили росту, розгалужене. Плодоносить на коротких і довгих пагонах. Однорічний пагін середньої товщини, світло-коричневий, сильно опушений на периферичній половині. Листкова пластинка довга й широка, спрямована донизу. Край пластинки зазублений. Черешок листка середньої довжини. Бутони переважно білого кольору. Квітка середнього розміру. Приймочки розташовані нижче пиляків. Плоди дуже малі, кулясті. Ребристість відсутня або слабка. Чашечка середнього розміру. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість незначна. Основне забарвлення плодів жовто-зелене з червоним відтінком. За характером - тільки суцільний рум"янець. Заіржавлення на плодах відсутнє або мале. Сочевичок мало. Плодоніжка тонка. Лійка неглибока. М"якоть плоду тверда, жовтувата. Насінні комірки закриті або ледь відкриті.
Цвіте в середні строки.
* Дані заявника.

* За даними заявника середня маса плоду 22,0 г. Зимостійкість та посухостійкість 7 балів. Ураженість хворобами борошнистою росою та паршею - 3 бали, ураженість попелицею - 3 бали, пошкодження плодожеркою - 3 бали. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ.
* Дані заявника.

Груша звичайна

09076003 Гармонія — Степ

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"

* Дерево середньої сили росту, слабо розгалужене, напіврозлоге. Однорічний пагін хвилястий, помірно-коричневий із середньою кількістю сочевичок. Вегетативні бруньки з гострими верхівками, відхилені від пагона. Подушка середнього розміру. Верхівка молодого пагона слабко опушена. Антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке. Листкова пластинка середнього розміру з гострою основою та верхівкою. Центральна жилка сильно вигнута. Черешок середньої довжини. Прилистки відсутні. Квіткові бруньки середньої довжини, розташовані головним чином на шпорцях. Чашолисток середньої довжини, відігнутий від віночка. Пелюстки віночка округлі, середнього розміру, відокремлені. Основа пелюстки клиновидна. Приймочка розташована на рівні пиляків. Плід дуже великий. Максимальний діметр розташований ближче до чашечки. У поздовжньому розрізі плід симетричний, увігнутий з боків. Основний колір шкірки жовтий з рожево-червоним відтінком. Плодоніжка середньої довжини, товста, помірно викривлена, розташована під кутом до верхівки плоду. Чашолистики за достигання розкриті. Блюдце нешироке, помірної глибини. Довкола нього злегка ребриста зона. М"якоть середньозерниста, м"яка, соковита. Зернятка еліптичні.
Цвіте в середні строки. Достигає пізно.
* Дані заявника.

* За даними заявника середня врожайність становить 370 ц/га, середній урожай з дерева – 13 кг. Зимостійкість та посухостійкість 5 балів. Вміст сухої речовини в плодах – 18,67%, загального цукру – 14,25%, вітаміну С – 6,3 мг,%.
Напрям використання – універсальний.
Рекомендована грунтово-кліматична зони – Степ.
* Дані заявника.

® 09076004 Городищенська — Лісостеп

Заявник: Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

Гібрид 2450 х Гібрид 439.
* Дерево середньорослe, розлоге. Вегетативні бруньки відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабке. Листкова пластинка довга, форма основи та верхівки тупа, надрізи країв гострозазублені. Черешок листка середньої довжини. Квіткові бруньки розташовані головним чином на шпорцях. Квітка середня, пелюстки - широко-яйцевидні, доторкуються. Плід великий, симетричний, опуклий, жовто-зелений. Відтінок основного кольору – оранжевий. М'якоть соковита, слабозерниста, м'яка, зернятка – еліптичної форми.

* За даними заявника за схеми садіння 7 х 4/5 х 3 м середня врожайність становить 221,3/276,4 ц/га. Середня маса плоду – 183,0 г, максимальна – 270,0 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Вміст загального цукру – 13,55%, вітаміну С – 4,07 мг,%, пектинових речовин 0,68%.
Група стиглості - осіння. Дегустаційна оцінка – 9 балів.
Напрям використання – універсальний.
Рекомендована грунтово-кліматична зони – Лісостеп.
* Дані заявника.

® 07076001 Кармен — Лісостеп

Заявник: Істітуто Сперіментале Пер Ла Фруттіколтура (IT)

Dr. Jules Guyot x Bella di Giugno

* Дерево середньорослe, пряме. Вегетативні бруньки відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона відсутнє або дуже слабке. Листкова пластинка середня, вузька, форма основи рівна, верхівки - округла, надрізи країв округлозубчасті. Черешок листка короткий. Квіткові бруньки розташовані головним чином на шорцях, середньої довжини. Квітка середня, пелюстки - широко-яйцевидні, перекриваються. Плід середній, злегка асиметричний, профіль боків увігнутий, основний колір шкірки - жовто-зелений. Відтінок основного кольору світло-червоний. М'якоть помірно соковита, слабозерниста, середньої твердості, зернятка – яйцеподібні. Час початку цвітіння – середній, споживчої стиглості ранній.

* За даними заявника середня врожайність становить 300 ц/га, середній урожай з дерева – 12 кг. Посухостійкість 6 балів. Вміст сухої речовини в плодах – 14,8%, загального цукру – 14,2%, вітаміну С – 4,0 мг,%.
Напрям використання – універсальний.
Рекомендована грунтово-кліматична зони – Лісостеп.
* Дані заявника.

Айва довгаста

® 05207001 Новорічна — Степ, Лісостеп

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Виділений із сіянців від вільного запилення місцевої форми №2.
Рослина середньорослa, пряма. Однорічний пагін прямий, сильно опушений у верхній третині, зеленувато-коричневий. Сочевички великі. Вегетативна брунька притиснута до пагона. Листкова пластинка округла, з гострою верхівкою. Черешок короткий. Прилистки наявні. Квітка велика, світло-рожева. Пелюстки еліпсоподібні, дотикаються одна до одної. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, округлий, без шийки, жовтий, неопушений.

За даними заявника за схеми садіння 6 х 4 м середня врожайність становить 171 ц/га. Середня маса плоду - 320 г, максимальна - 390 г.
Сорт зимо- і посухостійкий - 8 балів. Стійкість до борошнистої роси і парші - 9 балів. Група стиглості - середня.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп.
Напрям використання – універсальний.
* Дані заявника.

® 05207002 Октябрина — Степ, Лісостеп

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Виділено із сіянців від вільного запилення сорту айви Мускатна.
Рослина середньорослa, пряма. Однорічний пагін прямий, сильно опушений, зеленувато-коричневий. Сочевички - великі. Вегетативна брунька притиснута до пагона. Листкова пластинка широка, яйцеподібна з округлою основою і гострою верхівкою. Черешок короткий. Прилистки наявні. Квітка велика, світло-рожева. Пелюстка віночка еліпсоподібна. Маточка розміщена на одному рівні з пиляками. Плід великий, округлий, жовтий, без шийки, майже неопушений, дуже запашний.

За даними заявника за схеми садіння 6 х 4 м середня врожайність становить 184 ц/га. Середня маса плоду - 300 г, максимальна - 410 г.
Сорт зимо- і посухостійкий - 8 балів, стійкість до борошнистої роси і парші - 9 балів. Група стиглості - середня.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп.

Напрям використання – універсальний.
* Дані заявника.

Абрикос звичайний

® 07070006 Ауток

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево сильної сили росту, розлоге. У молодого пагона слабке антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок середня кількість. Листкова пластинка великого розміру, темно-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - звужена, верхівка - середньозагострена. Край - зубчастий, сильно хвилястий. Черешок листка середній, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - світло-оранжевий. М'якоть оранжева, ніжна, середньої твердості. Кісточка подовжена. Сорт ранній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 130 (ц/га), урожай з дерева 47 (кг) Зимостійкість 7 балів, вимерзання квіткових бруньок, 25%, стійкість до посухи 9 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 1; клястероспоріозом - 5. Вміст сухої речовини в плодах - 15,8%, вміст загального цукру - 11,7%, загальна кислотність -0,86%. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника

® 07070009 Альянс

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево сильної сили росту, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок мало. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - звужена, верхівка - середньо загострена. Край - зубчастий, помірно хвилястий. Черешок листка довгий, за товщиною середній. Квітка дрібна. Пелюстка широко-еліптична. Плід середній, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - від кремового до жовтого. М'якоть світло-оранжева, проміжна, середньої твердості. Кісточка подовжена. Сорт ранній. Листок восени - жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 125 (ц/га), урожай з дерева 45 (кг) Зимостійкість 7 балів, вимерзання квіткових бруньок, 23,9%, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 3; клястероспоріозом - 5. Вміст сухої речовини в плодах - 17,4%, вміст загального цукру - 10,5%, загальна кислотність -1,41%. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника

® 07070010 Альтаїр

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньої сили росту, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка малого розміру, світло-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - зрізана, верхівка - середньозагострена. Край - зубчастий, помірно хвилястий. Черешок листка короткий, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка широко-еліптична Плід середній, переважно асиметричний. Поверхня - злегка шишкувата. Основний колір шкірки - світло-оранжевий. М'якоть оранжева, проміжна,тверда. Кісточка подовжена. Сорт середньопізній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 100 (ц/га), урожай з дерева 33 (кг) Зимостійкість 5 балів, вимерзання квіткових бруньок, 33%, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 1; клястероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 13,8%, вміст загального цукру - 11,3%, загальна кислотність -1,33%. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника

® 07070003 Гамлет

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево сильної сили росту, слабко розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Кількість сочевичок середня. Листкова пластинка великого розміру, темно-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - звужена, верхівка - коротко-загострена. Край - двіччі-зубчастий, слабко хвилястий. Черешок листка середній, за товщиною товстий. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід середній, переважно симетричний. Поверхня - злегка шишкувата. Основний колір шкірки - від кремового до жовтого. М'якоть світло- оранжева, проміжна, середньої твердості. Кісточка подовжена. Сорт середньопізній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 115 (ц/га), урожай з дерева 34,5 (кг). Зимостійкість 7 балів, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 3; клястероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 14,6%, вміст загального цукру - 14,6%, загальна кислотність - 1,72%. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника

® 07070007 Дивний

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньої сили росту, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок мало. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - зрізана, верхівка - короткозагострена. Край - округло-зубчастий, слабко хвилястий. Черешок листка середній, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід середній, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - світло-оранжевий. М'якоть світло-оранжева, ніжна, середньої твердості. Кісточка витягнута. Сорт ранній. Листок восени - жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 100 (ц/га), урожай з дерева 36 (кг) Зимостійкість 5 балів, вимерзання квіткових бруньок, 48,5%, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 3; клястероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 14%, вміст загального цукру - 12,9%, вміст каротину - 1,23%, загальна кислотність -2,20%. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника

® 07070002 Костінський

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньої сили росту, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка дуже великого розміру, світло-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - звужена, верхівка - подовженозагострена. Край - округло-зубчастий, слабко хвилястий. Черешок листка довгий, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - від кремового до жовтого. М'якоть кремова, проміжна, тверда. Зростання кісточки із м'якоттю відсутнє. Кісточка витягнута. Сорт середньопізній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 100 (ц/га), урожай з дерева 36 (кг) Зимостійкість 5 балів, вимерзання квіткових бруньок, 40%, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 7; клястероспоріозом - 5. Вміст сухої речовини в плодах - 17,5%, вміст загального тцукру - 13,9%, вміст каротину - 0,5%, загальна кислотність -0,7%. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника

® 07070008 Крокус

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньої сили росту, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка великого розміру, світло-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - зрізана, верхівка - середньозагострена. Край - двічі-зубчастий, помірно хвилястий. Черешок листка середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - оранжевий. М'якоть оранжева, за щільністю проміжна, тверда. Кісточка витягнута. Сорт ранній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 120 (ц/га), урожай з дерева 43 (кг) Зимостійкість 7 балів, вимерзання квіткових бруньок, 24,8%, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 3; клястероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 17,5%, вміст загального тцукру - 12,9%, загальна кислотність -1,9%. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника

® 07070004 Наслаждєніє

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево сильнорасле, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка середнього розміру, темно-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - звужена, верхівка - коротко-загострена. Край - зубчастий, помірно хвилястий. Черешок листка довгий, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - від кремового до жовтого. М'якоть кремова, проміжна,тверда. Зростання кісточки із м'якоттю відсутнє. Кісточка витягнута. Сорт середньопізній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 95 (ц/га), урожай з дерева 34 (кг) Зимостійкість 5 балів, вимерзання квіткових бруньок, 38,2%, стійкість до посухи 9 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 3; клястероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 17,4%, вміст загального цукру - 8,2%, вміст каротину - 2,5%, загальна кислотність -0,6%. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника

® 07070005 Пам'яті Агеєвой

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньої сили росту, слабко розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка середнього розміру, світло-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - зрізана, верхівка - подовженозагострена. Край - двічізубчастий, сильно хвилястий. Черешок листка середній, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка широко-еліптична. Плід середній, переважно асиметричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - світло-оранжевий. М'якоть оранжева, проміжна, тверда. Зростання кісточки із м'якоттю відсутнє. Кісточка витягнута. Сорт ранній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 150 (ц/га), урожай з дерева 54 (кг) Зимостійкість 7 балів, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 5; клястероспоріозом - 5. Вміст сухої речовини в плодах - 19,1%, вміст загального цукру - 13,3%, загальна кислотність -1,16%. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника

® 10070001 Южанін

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево слаборосле, розлоге. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона сильне. Сочевичок на однорічному пагоні середня кількість. Листкова пластинка велика, помірного зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа листка звужена, верхівка – подовжено-загострена. Краї - хвилясті. Черешок середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка – широко-еліптична. Плід середній, округлий, переважно симетричний, основний колір шкірки - оранжевий. Поверхня гладенька. Інтенсивність антоціанового забарвлення шкірки сильна. М'якоть оранжева, структура - проміжна, тверда. Кісточка округла. Час початку цвітіння – середній. Час достигання плодів – середньопізній.

*За даними заявника: урожайність товарна 129 (ц/га), урожай з дерева 31,0 (кг), маса плоду 48,0 (г). Вміст загального цукру - 7,7 %, вітаміну С - 4,6 мг%. Дегустаційна оцінка 7 балів. Зимостійкість та посухостійкість 6 балів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ.

* Дані заявника

® 10070002 Ялтінец — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево сильноросле, розлоге. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона помірне. Сочевичок на однорічному пагоні багато. Листкова пластинка середня, помірного зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа листка зрізана, верхівка – подовжено-загострена. Надрізи з краю - двічізубчасті. Черешок короткий. Квітка середнього розміру. Пелюстка – широко-еліптична. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня гладенька. Інтенсивність антоціанового забарвлення шкірки помірна з рум'янцем, основний колір – світло–оранжевий. М'якоть світло-оранжева, структура - проміжна, середньої твердості. Кісточка мала, подовжена, ступінь зростання кісточки із м'якоттю - слабка. Час початку цвітіння – середній. Час достигання плодів – середньопізній.

*За даними заявника: урожайність товарна 125 (ц/га), урожай з дерева 41,0 (кг), маса плоду 52,0 (г). Вміст загального цукру – 9,1 %, вітаміну С – 5,6 мг%. Дегустаційна оцінка 7 балів. Зимостійкість 7, посухостійкість 8,5 балів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ.

* Дані заявника

Алича (слива розлога)

® 10072001 Десертна Рання — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево середньо росле. Крона - помірно щільна. Положення однорічної гілки - напіввертикальне. Вегетативна брунька мала, конічна, злегка відхилена. Листок спрямований догори стосовно пагона. Листкова пластинка еліптична, з гострим кінчиком, помірно зеленого забарвлення. З верхнього боку глянсуватість слабка, з нижнього – помірно опушена. Край листкової пластинки городчастий. Черешок середньої довжини, опушення верхнього боку слабке, борозенка - середня. Квітконіжка довга. Квітки на однорічних гілочках наявні, середі, пелюстки віночка розташовані вільно. Пелюстка - оберненояйцевидна, слабохвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, округлий, симетричний. Верхівка - плеската, лійка - середня. Основне забарвлення плоду фіолетово-синє. М'якоть жовта з помірною щільністю та соковитістю. Кісточка середня, округло-еліптична, поверхня - зерниста. Час початку цвітіння - середній. Строк достигання плодів - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявників: середня врожайність – 170,0 ц/га, середній урожай з дерева – 25,5 кг, середня маса плоду – 31,0 г. Зимостійкість та посухостійкість – середня. Стійкість прти моніліозу середня. Вміст загального цукру – 9,5%, вітаміну С – 9,3 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 8,1 балів. Транспортабельність – 8,5 балів. Сорт середнього строку достигання.
Напрям використання - універсальний. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

® 07072002 Рум'яна Зорька

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.
*Дерево середньо росле. Крона - помірно щільна. Положення однорічної гілки - напіввертикальне. Вегетативна брунька мала, конічна, притиснута до пагона. Листок спрямований догори стосовно пагона. Листкова пластинка еліптична, з гострим кінчиком, темно зеленого забарвлення. З верхнього боку глянсуватість помірна, з нижнього - слабо опушена. Край листкової пластинки городчастий. Черешок короткий, опушення верхнього боку відсутнє або дуже слабке, борозенка - середня. Квітконіжка середньої довжини. Квітки на однорічних гілочках наявні, середі, пелюстки віночка доторкаються. Пелюстка - обернено-широко-еліптична, слабохвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, овальний, симетричний. Верхівка - плеската, лійка - середня. Основне забарвлення плоду жовте. М'якоть жовта, щільна та соковита. Кісточка мала, округло-еліптична, поверхня - дрібнозерниста. Час початку цвітіння - пізній. Строк достигання плодів - пізній.
* Дані заявника.

*За даними заявників: середня врожайність – 140,0 ц/га, середній урожай з дерева – 50,5 кг, середня маса плоду – 43,0 г. Зимостійкість та посухостійкість – 5-7 балів. Стійкість прти моніліозу середня. Вміст загального цукру – 9,7%, вітаміну С – 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 8,1 балів. Транспортабельність – 8,5 балів. Сорт пізнього строку достигання.
Напрям використання - універсальний. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

® 07072001 Феміда

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.
*Дерево середньоросле. Крона - помірно щільна. Положення однорічної гілки - напіввертикальне. Вегетативна брунька мала, конічна, злегка відхилена. Листок спрямований догори стосовно пагона. Листкова пластинка еліптична, з гострим кінчиком, світло зеленого забарвлення. З верхнього боку глянсуватість слабка, з нижнього - слабко опушена. Край листкової пластинки городчастий. Черешок короткий, опушення верхнього боку відсутнє або дуже слабке, боріздка - мілка. Квітконіжка середньої довжини. Квітки на однорічних гілочках наявні. Квітка мала, пелюстки віночка доторкаються. Чашолисток - овальний. Пелюстка - обернено-широко-еліптична, хвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, овальний, симетричний. Верхівка - плеската, лійка - мілка. Основне забарвлення плоду темно-синє. М'якоть жовта, помірно щільна та соковита. Кісточка середнього розміру, округло-еліптична, поверхня - дрібнозерниста. Час початку цвітіння - пізній. Строк достигання плодів - середній.
* Дані заявника.

*За даними заявників: середня врожайність - 192,0 ц/га, середній урожай з дерева – 57,7 кг, середня маса плоду – 38,0 г. Зимостійкість та посухостійкість - 5 балів. Моніліальним опіком уражується слабо. Вміст загального цукру – 10,4%, вітаміну С – 10,8 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 8,1 балів. Транспортабельність - 9 балів. Сорт середнього строку достигання.
Напрям використання - універсальний. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

Черешня

® 05085005 Пікова дама — Степ, Лісостеп

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Отримано в результаті схрещування сортів Риночна х Бахор №932.
* Дерево сильнорослe, напівпіднесене. Вегетативні бруньки злегка відхилені від пагона. Листкова пластинка довга, темно-зелена. Черешок середньої довжини з оранжево-жовтими залозками. Квітка - середня, пелюстки - округлі, дотикаються. Плід великий, серцеподібний, кіноварно-червоний на ясно-жовтому тлі. М'якоть темно-червона, помірно пружна, помірно солодка і дуже соковита. Кісточка мала, широкоеліптична.

За даними заявника за схеми садіння 6 х 7 м середній урожай з дерева становить 32 кг. Середня маса плоду - 6,5 г, максимальна - 8,5 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 8 балів. Група стиглості - ранньосередня. Плодоношення щорічне. Вік вступу в період плодоношення щеплених дерев – 4 роки. Напрям використання – десертний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп.
* Дані заявника.

® 05085006 Призерка — Степ, Лісостеп

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Одержано в результаті вільного запилення сорту Бігаро із Вінолі 2.
* Дерево середньорослe, поникле. Вегетативні бруньки злегка відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона помірне. Листкова пластинка середнього розміру, темно-зелена. Черешок листка середньої довжини із темно-червоними залозками. Квітка - середня, пелюстки - округлі, дотикаються. Плід великий, округло-плескатий, темно-червоний. М'якоть червона, пружна, помірно солодка і дуже соковита. Кісточка середнього розміру, вузькоеліптична.

За даними заявника за схеми садіння 6 х 7 м середній урожай з дерева становить 20 кг. Середня маса плоду - 6,7 г, максимальна - 7,3 г. Сорт зимостійкий - 7 балів. Група стиглості - дуже рання. Плодоношення періодичне (невиражене). Вік вступу в період плодоношення щеплених дерев – 4-5 років. Напрям використання – десертний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп.
* Дані заявника.

® 05085007 Услада — Степ, Лісостеп

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Одержано в результаті гібридизації сортів Ластівка х Рамон Оліва №690. Сіянці одержані з недозрілих зародків через ембріокультуру.
* Дерево середньорослe, дуже піднесене. Вегетативні бруньки злегка відхилені від пагона. Молодий пагін із сильним антоціановим забарвленням верхівки. Листкова пластинка середнього розміру, темно-зелена. Черешок листка середньої довжини з темно-червоними залозками. Квітка середня, пелюстки - округлі, дотикаються. Плід великий, округлий, червоний. М'якоть червона, помірно пружна, помірно солодка і помірно соковита. Кісточка середнього розміру, широкоеліптична.

За даними заявника за схеми садіння 6 х 7 м середній урожай з дерева становить 17 кг. Середня маса плоду - 5,5 г, максимальна - 6,5 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 9 балів. Плодоношення щорічне. Вік вступу в період плодоношення щеплених дерев – 4-5 років. Група стиглості - дуже рання. Напрям використання – десертний.

Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп.
* Дані заявника.

Слива домашня

® 07080003 Вікторіна — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.
*Дерево слаборосле. Крона - щільна. Однорічна гілка розміщена напіввертикально. Вегетативна брунька мала, конічна, злегка відхилена від пагона. Листок спрямований догори стосовно пагона. Листкова пластинка еліптична, з прямим або майже прямим кінчиком, помірно-зеленого забарвлення з верхнього боку. Глянцуватість верхнього боку слабка, опушення нижнього боку - слабке. Край листкової пластинки городчастий. Черешок короткий, слабко опушений з верхнього боку. Боріздка - мілка. Залозки розташовані на основі листка й на черешку. Квітка середнього розміру, пелюстки віночка доторкуються. Пелюстка еліптичної форми, хвиляста по краю. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, продовгуватий, рівнобокий. Верхівка - плеската. Лійка - помірна. Основне покривне забарвлення плоду - пурпурове. М'якоть жовта, помірно щільна та соковита. Кісточка мала, видовжено еліптична. Зі шва кісточка плеската, з основи - видовжено-еліптична, симетрична. Бокова поверхня кісточки - зерниста. Край спинних швів суцільний. Час цвітіння - середній. Строк достигання - середній.
* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність 120,0 ц/га, середній урожай з дерева - 24,0 кг, середня маса плоду – 48,0 г, максимальна – 70,0 г. Зимостійкість та посухостійкість – 7 балів. Стійкість проти хвороб – 6 балів. Вміст загального цукру – 10,4%, вітаміну С – 4,6 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 8,1 балів. Транспортабельність - 8 балів. Сорт середнього строку достигання. Напрям використання - універсальний. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

Персик звичайний

® 09079002 Вавіловський — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Валіант х Мирянін.
*Дерево сильноросле, напівпряме. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля довгі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка яскрава. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок світло-рожевий. Пелюсток п'ять, великі, округлі. Зав'язь опушена. Листкова пластинка великого розміру, зеленувато-жовта. Черешок листка середній, нектарники ниркоподібної форми. Плід великий, округлий, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе - червоне. Плід слабоопушений, кисло-солодкого смаку. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовтого кольору, тверда. Кісточка яйцеподібна, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування дуже слабка. Наявне помірне зростання кісточки із м'якоттю. Сорт ранньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

* За даними заявника: середня урожайність 244,0 ц/га, урожай з дерева 61,0 (кг), маса плоду 170,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах 13,6%, загального цукру 12,1%, вітаміну С 9,2 мг%. Загальна кислотність 0,92%. Зимостійкість та посухостійкість середня. Напрям використання – універсальний. Транспортабельність висока.
* Дані заявника

® 09079004 Дємєрджинський — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Валіант х Фаворіта Моретіні

***Дерево сильнорослe, розлоге. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля довгі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка яскрава. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок світло-рожевий. Пелюсток п'ять, великі, округлі. Зав'язь опушена. Листкова пластинка довга, середньої ширини, зеленувато-жовта. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід середній, округлий, симетричний. Основне забарвлення – жовто-оранжеве, поверхневе – темно-червоне. Плід слабо опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-бориздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю наявне. Сорт ранньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.**

*** За даними заявника: середня урожайність 15,3 т/га, урожай з дерева 28,0 (кг), маса плоду 130,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах 13,15%, загального цукру 6,89%, вітаміну С 16,5 мг%. Загальна кислотність 0,79%. Зимостійкість та посухостійкість середня. Напрям використання – універсальний. Транспортабельність середня.**

*** Дані заявника**

® 07079003 Етюдний — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

***Дерево середньорослe, напівпряме. Квітковий пагін тонкий, міжвузля короткі. Генеративні бруньки поодинокі. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середні, округлі. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середня, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники округлої форми. Плід середній, округлий, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе – рожево-червоне. Плід слабо опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, тверда. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-бориздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю наявне. Сорт пізньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.**

*** За даними заявника: середня урожайність 11,8 т/га, урожай з дерева 17,8 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 15,75%, загального цукру 8,66%, вітаміну С 10,03 мг%. Загальна кислотність 0,79%. Зимостійкість 5 балів, посухостійкість 5.**

*** Дані заявника**

® 07079013 Карнавальний

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

***Дерево середньорослe, напівпряме. Квітковий пагін тонкий, міжвузля середньої довжини. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка яскрава. Внутрішня сторона чашечки – оранжевого забарвлення. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середні, широко-еліптичні. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середньої ширини, довга, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід середнього розміру, еліптичний, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе – червоне. Плід опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовтого кольору, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка яйцеподібна, ямкувато-бориздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю наявне. Сорт ранньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.**

*** За даними заявника: середня урожайність 11,6 т/га, урожай з дерева 17,4 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 17,1%, загального цукру 10,35%, вітаміну С 11,1 мг%. Загальна кислотність 0,40%. Зимостійкість 3 бали.**

*** Дані заявника**

Степ

® 09079001 Кандидатський

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Лауреат х Санрайз.

*Дерево сильнорасле, напівпряме. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля середні. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка яскрава. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок світло-рожевий. Пелюсток п'ять, великі, округлі. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середня, зелена. Черешок листка короткий, нектарники ниркоподібної форми. Плід великий, округлий, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе - червоне. Плід помірно опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовто-оранжева, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка яйцеподібна, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування дуже слабка. Наявне слабке зростання кісточки із м'якоттю. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання слабка.

* За даними заявника: середня урожайність 289,0 ц/га, урожай з дерева 72,0 (кг), маса плоду 130,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах 12,9%, загального цукру 8,6%, вітаміну С 12,6 мг%. Загальна кислотність 0,46%. Зимостійкість висока, посухостійкість середня. Напрям використання – універсальний. Транспортабельність висока.

* Дані заявника

Степ

® 07079004 Кримський Діамант

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньорасле, розлоге. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля короткі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки – зеленувато-жовта. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середні, широко-еліптичні. Зав'язь опушена. Листкова пластинка велика, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники округлої форми. Плід великий, еліптичний, симетричний. Основне забарвлення – кремово-біле, поверхневе – рожево-червоне. Плід опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть біла, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю наявне. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

* За даними заявника: середня урожайність 13,6 т/га, урожай з дерева 20,4 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 14,7%, загального цукру 8,79%, вітаміну С 6,66 мг%. Загальна кислотність 0,50%. Зимостійкість та посухостійкість 5 балів.

* Дані заявника

Степ

® 07079015 Кримський Шедевр

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньорасле, розлоге. Квітковий пагін тонкий, міжвузля довгі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки – оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, малі, широко-еліптичні. Зав'язь опушена. Листкова пластинка велика, зелена. Черешок листка короткий. Плід великий, еліптичний, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе – рожево-червоне. Плід опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю наявне. Сорт ранньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

* За даними заявника: середня урожайність 13,45 т/га, урожай з дерева 20,2 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 13,7%, загального цукру 9,7%, вітаміну С 8,66 мг%. Загальна кислотність 0,42%. Зимостійкість та посухостійкість 5 балів.

* Дані заявника

Степ

® 07079001 Меркурій

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево низькорослe, розлоге. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля середньої довжини. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки – оранжева. Віночок темно-рожевий. Пелюсток п'ять, великі, округлої форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка велика, зелена. Черешок листка середньої довжини. Плід середній, еліптичний, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе – рожево-червоне. Плід опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-бориздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю відсутє. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

* За даними заявника: середня урожайність 17,5 т/га, урожай з дерева 26 кг. Вміст сухої речовини в плодах 13,7%, загального цукру 9,1%, вітаміну С 7,6 мг%. Загальна кислотність 0,5%. Зимостійкість 5, посухостійкість 3 бали.
* Дані заявника

® 10079008 Мірянін — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Саламі х Тріумф.
*Дерево високе, сильнорослe, розлоге. Квітковий пагін товстий, міжвузля довгі. Генеративні бруньки розміщені по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки – зеленувато-жовта. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, великі, широко-еліптичні. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середня, зелена. Черешок короткий, нектарники ниркоподібної форми. Плід великий, округлий, симетричний. Основне забарвлення – жовто-оранжеве, поверхневе - темно-червоне. Плід помірно опушений. Шкірка товста. М'якоть світло-жовта, тверда. Смак - помірний кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-бориздчаста. Здатність до розтріскування дуже слабка. Наявне сильне зростання кісточки із м'якоттю. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання помірна.

За даними заявника: середня урожайність 233,0 ц/га, урожай з дерева 35,0 (кг), маса плоду 150,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах 16,9%, загального цукру 9,1%, вітаміну С 11,0 мг%. Загальна кислотність 0,59%. Напрям використання – універсальний. Транспортабельність висока.

® 09079003 Освіжаючий — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Сантарин х Старт
*Дерево сильнорослe, напівпряме. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля середні. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок темно-рожевий. Пелюсток п'ять, малі, широко-еліптичні. Зав'язь опушена. Листкова пластинка довга, вузька, зеленувато-жовта. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід великий, округлий, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе – темно-червоне. Плід слабо опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовто-оранжева, тверда. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка яйцеподібна, ямкувато-бориздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю відсутнє. Сорт пізньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

* За даними заявника: середня урожайність 22,5 т/га, урожай з дерева 45,0 (кг), маса плоду 170,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах 14,7%, загального цукру 11,5%, вітаміну С 15,3 мг%. Загальна кислотність 0,54%. Зимостійкість та посухостійкість висока. Напрям використання – універсальний. Транспортабельність висока.
* Дані заявника

® 10079002 Ожиданіє

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Кремлівський вільного запилення.
*Дерево високе, сильнорасле, розлоге. Квітковий пагін тонкий, міжвузля довгі. Генеративні бруньки розміщені по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середнього розміру, округлої форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка коротка, середньої ширини, зелена. Черешок короткий, нектарники ниркоподібної форми. Плід середній, округлий, симетричний. Основне забарвлення - жовте, поверхневе - світло-червоне. Плід помірно опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньотверда. Смак - помірний кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-бориздчаста. Здатність до розтріскування дуже слабка. Наявне сильне зростання кісточки із м'якоттю. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

За даними заявника: середня урожайність 132,0 ц/га, урожай з дерева 19,9 (кг), маса плоду 130,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах 11,85%, загального цукру 9,72%, вітаміну С 8,54 мг%. Загальна кислотність 0,45%. Напрям використання – універсальний. Транспортабельність висока.
* Дані заявника

® 10079001 Подарок Ліке

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Ред Хейвен х Сочний.
*Дерево середньорасле, розлоге. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля довгі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок темно-рожевий. Пелюсток п'ять, великі, широко-еліптичної форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка велика, зелена. Черешок листка довгий, нектарники ниркоподібної форми. Плід середній, еліптичний, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе - темно-червоне. Плід помірно опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-бориздчата. Здатність до розтріскування дуже слабка. Наявне сильне зростання кісточки із м'якоттю. Сорт ранньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

За даними заявника: середня урожайність 138,0 ц/га, урожай з дерева 20,7 (кг), маса плоду 135,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах 12,5%, загального цукру 7,16%, вітаміну С 9,2 мг%. Загальна кислотність 0,28%. Напрям використання – універсальний. Транспортабельність висока.
* Дані заявника

® 07079010 Персей

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньорасле, напівпряме. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля короткі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, великі, широко-еліптичної форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка велика, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід середнього розміру, округлої форми, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе рожево- червоне. Плід має дуже рідке опушення. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, тверда. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-бориздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю відсутнє. Сорт пізньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

* За даними заявника: середня урожайність 121 ц/га, урожай з дерева 18,1 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 16,1%, загального цукру 10,69%, вітаміну С 5,2 мг%. Загальна кислотність 0,42%. Зимостійкість 5 балів.
* Дані заявника

® 07079012 Понтійський — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньоросле, напівпряме. Квітковий пагін товстий, міжвузля довгі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка яскрава. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середнього розміру, округлої форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка вузька середньої довжини, зелена. Черешок листка за довжиною середній, нектарники ниркоподібної форми. Плід великий, округлої форми, симетричний. Основне забарвлення – кремово-жовте, поверхневе - червоне. Плід має дуже густе опушення. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Наявне зростання кісточки із м'якоттю. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання слабка.

За даними заявника: середня урожайність 124 ц/га, урожай з дерева 18,5 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 16,1%, загального цукру 14,3%, вітаміну С 7,8 мг%. Загальна кислотність 0,8%. Зимостійкість 2 бали.
* Дані заявника

® 07079014 Південна Фантазія — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньоросле, напівпряме. Квітковий пагін тонкий, міжвузля короткі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки – оранжева. Віночок темно-рожевий. Пелюсток п'ять, малі, вузько-еліптичної форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середньої довжини, широка, зелена. Черешок листка середньої довжини. Плід великий, еліптичний, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе – рожево-червоне. Плід опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування слабка. Зростання кісточки із м'якоттю відсутє. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

* За даними заявника: середня урожайність 13 т/га, урожай з дерева 19,6 кг. Вміст сухої речовини в плодах 16,8%, загального цукру 7,87%, вітаміну С 7,33 мг%. Загальна кислотність 0,85%. Зимостійкість та посухостійкість 5 балів.
* Дані заявника

® 07079002 Родзинка — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньоросле, напівпряме. Квітковий пагін тонкий, міжвузля короткі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, великі, округлої форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середнього розміру, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід середнього розміру, округлої форми, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе рожево- червоне. Плід має дуже рідке опушення. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка яйцеподібна, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування слабка. Зростання кісточки із м'якоттю сильне. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання слабка.

За даними заявника: середня урожайність 117 ц/га, урожай з дерева 17,6 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 17,1%, загального цукру

11,4%, вітаміну С 16,5 мг%. Загальна кислотність 0,48%. Зимостійкість 5 балів.
* Дані заявника

Степ

® 07079009 Рум'яний Нікітський

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньорослe, напівпряме. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля середньої довжини. Генеративні бруньки розміщені поодиноко. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середнього розміру, широкоеліптичної форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середньої довжини, вузька, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід середнього розміру, округлої форми, симетричний. Основне забарвлення – зеленувато-жовте, поверхневе темно-червоне. Плід має дуже рідке опушення. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-бориздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю сильне. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання слабка.

За даними заявника: середня урожайність 128 ц/га, урожай з дерева 19,2 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 14,9%, загального цукру 11,2%, вітаміну С 5,7 мг%. Загальна кислотність 0,84%. Зимостійкість 3 бали.
* Дані заявника

Степ

® 07079005 Сердолік

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньорослe, розлоге. Квітковий пагін товстий, міжвузля короткі. Генеративні бруньки розміщені по дві і більше. Квітка яскрава. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середнього розміру, широко-еліптичної форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середьої ширини, довга, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід середнього розміру, округлої форми, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе рожево-червоне. Опушення рідке. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, тверда. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-бориздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю сильне. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка .

За даними заявника: середня урожайність 122 ц/га, урожай з дерева 18,3 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 15,3%, загального цукру 9,47%, вітаміну С 8,75 мг%. Загальна кислотність 0,41%. Зимостійкість 3 бали.
* Дані заявника

Степ

® 07079008 Сопрано

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньорослe, напівпряме. Квітковий пагін товстий, міжвузля середньої довжини. Генеративні бруньки розміщені по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, великого розміру, широкоеліптичної форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середнього розміру, зелена. Черешок листка короткий, нектарники ниркоподібної форми. Плід великий, округлої форми, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе рожево-червоне. Опушення помірне. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-бориздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю сильне. Сорт ранньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка .

За даними заявника: середня урожайність 138 ц/га, урожай з дерева 20,8 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 14,1%, загального цукру 8,77%, вітаміну С 8,28 мг%. Загальна кислотність 0,54%. Зимостійкість 3 бали.

* Дані заявника

® 07079018 Стрєлєц

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Ветеран х Арт.

*Дерево середньорослe, напівпряме. Квітковий пагін середньої довжини та товщини. Генеративні бруньки подвійні. Квітка яскрава. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середнього розміру, округлої форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середня, зелена. Черешок короткий, нектарники ниркоподібної форми. Плід середній, округлий, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе - темно-червоне. Плід опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка округла, боріздчата. Здатність до розтріскування слабка. Наявне сильне зростання кісточки із м'якоттю. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання дуже слабка.

За даними заявника: середня урожайність 200,0 ц/га, урожай з дерева 30,0 (кг), маса плоду 85,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах 13,7%, загального цукру 7,71%, вітаміну С 13,4 мг%. Загальна кислотність 0,49%. Напрям використання – універсальний. Транспортабельність висока.

* Дані заявника

® 07079011 Темісовський

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево високорослe, напівпряме. Квітковий пагін товстий, міжвузля середні. Генеративні бруньки розміщені по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, малого розміру, вузько-еліптичної форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середнього розміру, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід середнього розміру, еліптичної форми, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе червоне. Опушення густе. Шкірка товста. М'якоть жовта, тверда. Солодкий смак слабкий, кислий помірний. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю помірне. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання помірна .

* За даними заявника: середня урожайність 246 ц/га, урожай з дерева 37 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 16,1%, загального цукру 12,3%, вітаміну С 9,8 мг%. Загальна кислотність 0,5%. Зимостійкість 3 бали.

* Дані заявника

® 07079016 Юбілейний Ранній

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Ветеран х Фаворіт Моренттіні.

*Дерево середнє, сильнорослe, розлоге. Квітковий пагін середньої довжини та товщини. Генеративні бруньки подвійні. Квітка дзвоникоподібна. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середнього розміру, широко-еліптичної форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка довга, широка, зелена. Черешок середньої довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід середній, округлий, симетричний. Основне забарвлення – зеленувато-жовте, поверхневе - темно-червоне. Плід опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, тверда. Смак – помірний. кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувата. Здатність до розтріскування слабка. Наявне сильне зростання кісточки із м'якоттю. Сорт ранньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання слабка.

За даними заявника: середня урожайність 168,0 ц/га, урожай з дерева 25,2 (кг), маса плоду 120 (г). Дегустаційна оцінка 8,5 балів. Вміст сухої речовини в плодах 13,0%, загального цукру 12,5%, вітаміну С 12,4 мг%. Загальна кислотність 0,6%. Напрям використання –

універсальний. Транспортабельність висока.
* Дані заявника

Жимолость синя

® 09341001 Алісія

Лісостеп

Заявник: Краснокутський науково- дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Відбірний сіянець від вільного запилення жимолості камчатської.
* Кущ низький. Пагони світло-зелені, прямі, довгі, опушення слабке. Листки середні, яйцевидні, світло-зеленого кольору, опушення слабке. Квітка середнього розміру, приквітки листоподібні. Плоди середні з помірним восковим нальотом, еліптичниі, фіолетово-сині, товщина шкірки середня, м'якоть волокниста, ніжна, смак кисло-солодкий, гіркота відсутня. Час початку цвітіння пізній, час достигання ягід від середнього до пізнього.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 1,5 м середня врожайність рослин сорту становить 5,0 т/га. Середня маса ягоди – 1,0 г, максимальна – 1,1 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості – середньо-пізня. Напрям використання - універсальний. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп.
* Дані заявника.

® 09341002 Спокуса

Лісостеп

Заявник: Краснокутський науково- дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Відбірний сіянець від вільного запилення жимолості камчатської.
* Кущ середньорослий. Пагони буро-зелені, прямі, короткі, опушення слабке. Листки середні, ланцетні, зеленого кольору, опушення слабке. Квітка мала, приквітки шилоподібні. Плоди середні з помірним восковим нальотом, веретеноподібний, фіолетово-синій, товщина шкірки середня, м'якоть щільна, середньої консистенції, смак -солодкий, гіркота відсутня. Час початку цвітіння середній, час достигання ягід середній.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 1,5 м середня врожайність рослин сорту становить 5,2 т/га. Середня маса ягоди – 1,06 г, максимальна – 1,23 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості – середня. Напрям використання - унівесальний. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп.
* Дані заявника.

® 08341001 Чайка

Лісостеп

Заявник: Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

Невідоме схрещування.
* Кущ середньо рослий. Пагони зелені, вигнуті, середньої довжини, опушення відсутнє. Листки середні, овальні, темно-зеленого кольору, опушення відсутнє. Квітка середнього розміру, приквітки листоподібні. Плоди великі з помірним восковим нальотом, еліптичні, блакитні, товщина шкірки середня, м'якоть щільна, середньої консистенції, смак кисло-солодкий, гіркота слабка. Час початку цвітіння середній, час достигання ягід від ранній.

* За даними заявника за схеми садіння 3 х 1,0 м середня врожайність рослин сорту становить 3,25 т/га. Середня маса ягоди – 1,150 г, максимальна – 1,25 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості – рання.
Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп.
* Дані заявника.

Суниця

09084003 Радослявка — Лісостеп, Полісся

Заявник: Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

* Рослина кулясто-сплющена, середньощільна, середньоросла. Листя зелене з верхнього боку, пухирчастість слабка, блиск сильнй. Краї листків зубчасті. Волоски на черешку сильно відхилені. Вусів середня кількість, опушені, антоціанове забарвлення сильне. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка середня. Чашечка менша від віночка. Пелюстки віночка головної квітки дотикаються. Плід великий, переважно конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона вільна від зерняток відсутня або дуже мала. Забарвлення плоду червоне, злегка нерівномірне, із сильним блиском. Зернятка заглиблені в плід. М'якоть білувато-рожевого забарвлення, твердість помірна. Повітряна комірка відсутня або дуже мала.

За даними заявника середня маса ягоди – 11,2 г. Сорт зимостійкий - 9 балів. Стійкість до ураженості шкідниками та пошкодження хворобами 8-9 балів. Група стиглості - рання. Напрям використання – десертний, можливе заморожування.
Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп, Полісся
* Дані заявника.

09084002 Стефанія — Лісостеп, Полісся

Заявник: Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

* Рослина кулясто-сплющена, щільна, сильноросла. Листя ясно-зелене з верхнього боку, пухирчастість помірна, блиск помірний. Краї листків зубчасті. Волоски на черешку злегка відхилені. Вусів багато, слабоопушені, антоціанове забарвлення сильне. Суцвіття розташоване на під листками. Квітка велика. Чашечка більша від віночка. Пелюстки віночка головної квітки перекриваються. Плід середній, переважно конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона вільна від зерняток відсутня або дуже мала. Забарвлення плоду червоне, рівномірне, із помірним блиском. Зернятка урівень з плодом. М'якоть червоного забарвлення, тверда. Повітряна комірка відсутня або дуже мала.

* За даними заявника середня урожайність з куща 0,8 кг, маса ягоди – 10,8 г. Сорт зимостійкий - 9 балів. Стійкість до ураженості шкідниками та пошкодження хворобами 8-9 балів. Група стиглості - рання. Напрям використання – десертний, можливе заморожування.
Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп, Полісся
* Дані заявника.

Горіх грецький

® 10075002 Карлик 5 — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Відбір серед сіянців.
* Дерево слаборосле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх середнього розміру, форма у повздовжньому перерізі широко-яйцевидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, товщина шкарлупи середня, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, дуже світле, велике, відсоткове відношення до загальної маси горіха велике. Час достигання між раннім і середнім. Оплодень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 4 х 4 м середня врожайність становить 40,6 ц/га. Середня маса плоду – 10,5 г, максимальна – 15,2 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – ранньо-середня.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

Степ

® 10075003 Карлик 3

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Відбір серед сіянців.
* Дерево слаборосле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх середнього розміру, форма у повздовжньому перерізі широко-трапецієвидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, шкарлупа тонка, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, дуже світле, середнє, відсоткове відношення до загальної маси горіха середнє. Час достигання між раннім і середнім. Оплодень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 4 х 4 м середня врожайність становить 50,0 ц/га. Середня маса плоду – 12,0 г, максимальна – 14,7 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – середня.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

Степ

® 10075001 Подарунок Валентини

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Невідоме схрещування.
Дерево слаборосле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх дуже великий, форма у повздовжньому перерізі трапецієвидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, товщина шкарлупи середня, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, дуже світле, дуже велике, відсоткове відношення до загальної маси горіха велике. Час достигання між раннім і середнім. Оплодень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 6 х 4 м середня врожайність становить 82 ц/га. Середня маса плоду – 27,5 г, максимальна – 32,3 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – ранньо-середня.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

Степ

® 10075004 Пурпуровий

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Невідоме схрещування.
* Дерево слаборосле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх великий, форма у повздовжньому перерізі яйцевидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, шкарлупа середньої товщини, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, велике, відсоткове відношення до загальної маси горіха велике. Час достигання ранній. Оплодень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 6 х 4 м середня врожайність становить 68,8 ц/га. Середня маса плоду – 15,0 г, максимальна – 17,4 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – середня.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

Мигдаль звичайний

10215002 Боспор — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Винослівий х Tuono.
Дерево за силою росту помірне, розлоге. Однорічний пагін середньої товщини зі слабким антоціановим забарвленням. Листкові бруньки розпускаються одночасно з початком цвітіння. Листкова пластинка середня, темно-зеленого кольору, надрізи з країв городчасті. Генеративні бруньки розміщені переважно на плодушках, конічної форми, забарвлення верхівкових пелюсток рожево-біле, чашолистиків – коричнево-зелене. Час початку цвітіння дуже пізній. Квітка середнього розміру, форма пелюсток еліптична, забарвлення рожево-біле, тичинок середня кількість, маточок інколи дві. Недостиглий плід середнього розміру, яйцеподібної форми. Час достигання середній. Стійкість до розтріскування сухого плоду помірна. Ядро за формою шороко-еліптичне, середнього розміру, жовто-коричневе.

* За даними заявника за схеми садіння 7 х 6 м середній урожай з дерева – 8,4 кг, середня маса плоду – 2,6 г. Посухостійкість та зимостійкість 5 балів. Стійкість проти хвороб: клястероспоріоз – 4, сіра плодова гниль – 3 бали. Вихід ядра – 34,8%. Група стиглості – середня.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

10215001 Олександр — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Винослівий х Tuono.
Дерево за силою росту помірне, пряме. Однорічний пагін середньої товщини з помірним антоціановим забарвленням. Листкові бруньки розпускаються одночасно з початком цвітіння. Листкова пластинка середньої ширини, коротка, темно-зеленого забарвлення, надрізи з країв городчасті. Генеративні бруньки розміщені переважно на плодушках, конічної форми, забарвлення верхівкових пелюсток рожево-біле, чашолистиків – червоно-коричневе. Час початку цвітіння дуже пізній. Квітка малого розміру, форма пелюсток еліптична, забарвлення рожево-біле, тичинок середня кількість, маточок інколи дві. Недостиглий плід середнього розміру, яйцеподібної форми. Час достигання середній. Стійкість до розтріскування сухого плоду помірна. Ядро за формою шороко-еліптичне, середнього розміру, жовто-коричневе.

* За даними заявника за схеми садіння 7 х 6 м середній урожай з дерева – 8,5 кг, середня маса плоду – 1,7 г. Посухостійкість та зимостійкість 5 балів. Стійкість проти хвороб: клястероспоріоз, сіра плодова гниль – 4 бали. Вихід ядра – 41,9%. Група стиглості – середня.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

Унабі справжній (зізіфус)

® 10124002 Сініт — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Мутація сорту Кітайскій 60.
* Дерево середньоросле, напіврозлоге, колючки наявні. Однорічний пагін середній, бурий. Плодоносний пагін, середній, кремувато-зелений. Квітка середнього розміру. Плід малий, еліптичний, коричневого забарвлення. М'якоть біло-зелена, тверда. Кісточка мала, вузько-еліптична, жовто-коричнева.

За даними заявника за схеми садіння 5 х 5 м середня врожайність становить 130,0 т/га. Середня маса плоду - 5,0 г, максимальна – 6,0 г. Група стиглості - рання. Дегустаційна оцінка 4,8 балів. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді, технічна переробка. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

Степ

® 10124001 Цукерковий

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Мутація сорту Я-цзао.
* Дерево слаборосле, пряме, колючки відсутні. Однорічний пагін короткий, бурий. Плодоносний пагін, короткий - кремувато-зелений. Квітка середнього розміру. Плід малий, еліптичний, темно-коричневого забарвлення. М'якоть біло-зелена, тверда. Кісточка мала, вузько-еліптична, жовто-коричнева.

За даними заявника за схеми садіння 4 х 4 м середня врожайність становить 160,0 ц/га. Середня маса плоду - 5,0 г, максимальна – 6,5 г. Група стиглості - рання. Дегустаційна оцінка 5 балів. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді, технічна переробка. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

Ліщина велика (Фундук)

Лісостеп, Полісся

09216002 Барселонський

Заявник: Михаць Остап Романович

* Рослина сильноросла, розлога. Кореневих паростків середня кількість. Однорічний пагін товстий, слабоопушений, листкова пластинка зеленого кольору. Чоловіче суцвіття довге, зеленого кольору. Час цвітіння чоловічих та жіночих квіток від раннього до середнього. Плід великого розміру, світло-коричневий, короткий, кулястої форми. Ядро велике, яйцеподібне, зовнішня шкіра сильно закорковіла. Час достигання середній. Відсоток ядра за масою малий.

* За даними заявника середня урожайність 15 ц/га, середній урожай з дерева 3-4 кг, маса плоду 2,9 г, максимальна 4,5 г. Зимостійкість висока та посухостійкість середня. Вихід ядра 40%. Твердість шкарлупи 5 балів, виповненість горіха 7 балів.
* Дані заявника.

Лісостеп, Полісся

09216003 Галле

Заявник: Михаць Остап Романович

* Рослина сильноросла, розлога. Кореневих паростків утворює мало. Однорічний пагін середньої товщини, сильно опушений, листкова пластинка червоного кольору. Чоловіче суцвіття середньої довжини, рожево-коричневого кольору. Приймочка фіолетова. Час цвітіння чоловічих та жіночих квіток пізній. Плід конічної форми, великого розміру, світло-коричневий. Ядро велике, яйцеподібної форми, зовнішня шкіра незакорковіла або дуже слабкозакорковіла. Час достигання пізній. Відсоток ядра за масою дуже малий.

* За даними заявника середня урожайність 15 ц/га, середній урожаи з дерева 3-4 кг, маса плоду 4 г, максимальна 4,7 г. Зимостійкість висока, посухостійкість середня. Вміст жиру – 53,1 %, вміст білку – 20,8%. Вихід ядра 37-40%. Твердість шкарлупи 9 балів, виповненість горіха 9 балів.
* Дані заявника.

09216001 Косфорд — Лісостеп, Полісся

Заявник: Михаць Остап Романович

* Рослина сильнорослa, пряма. Кореневих паростків утворює мало. Однорічний пагін тонкий, слабоопушений, листкова пластинка зеленого кольору. Чоловіче суцвіття довге, рожево-коричневого кольору. Приймочка фіолетова. Час цвітіння чоловічих квіток від середнього до пізнього, жіночих - пізній. Плід великого розміру, світло-коричневий, короткий майже циліндричної форми. Ядро велике, короткоциліндричної форми, зовнішня шкіра сильнозакорковіла. Час достигання від середнього до пізнього. Відсоток ядра за масою дуже великий.

* За даними заявника середня урожайність 16 ц/га, середній урожай з дерева 3,2-4,5 кг, маса плоду 2,1 г, максимальна 3,4 г. Зимостійкість висока та посухостійкість висока. Вихід ядра 57%. Твердість шкарлупи 3 бали, виповненість горіха 5 балів.
* Дані заявника.

Айва х яблуня

® 03411001 УУПРОЗ-6

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

* Міжвидовий гібрид напівкультурної форми айви х суміш пилку яблуні сортів: Антонівки, Кальвіля снігового, Мекінтоша. Дерево помірної сили росту, з розлогою формою крони. Тип плодоношення – на коротких пагонах. Однорічний пагін помірно опушений у верхній половині. Міжвузля середнє. Квітка велика, жовтава і рожева. Пелюстки доторкуються одна до одної. Листкова пластинка середня. Краї рифлені. Плід дуже малий, жовто – зелений, ребристий, восковий наліт відсутній або дуже слабкий. М'якуш дуже твердий, зеленуватий. Насінні комірки цілком відкриті. Час початку цвітіння та збиральної стиглості дуже пізній.

Плоди не їстівні і не придатні для технічної преробки. Напрям використання – підщепа яблуні, груші, айви, глоду, хеномелесу. Зимостійкість середня, посухостійкість слабка. Група стиглості - пізньоосіння
* Дані заявника.

Хурма східна

® 10442003 Золотиста — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Тріумф х Українка
* Дерево середньорослe, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) жовто-коричневий, середній, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – понад чотири. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші завжди наявні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром велике, напіввидовжене, темно-коричневе. Час цвітіння і розкриття вегетативний бруньок пізній, час споживчої стиглості – середній.

Середня врожайність становить 333,3 т/га. Середня маса плоду 218,5 г, максимальна – 291,0 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.
* Дані заявника.

Степ

® 10442005 Зірочка

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Батумський II х Фуйю
* Дерево середньорослe, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) жовто-коричневий, середній, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середня, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – понад чотири. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші завжди наявні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром велике, напіввидовжене, темно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок, споживчої стиглості – пізній.

Середня врожайність становить 22,08 т/га. Середня маса плоду 155,7 г, максимальна – 234,2 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – відсутня або слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.
* Дані заявника.

Степ

® 10442001 Мрія

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Kuro Kuma x Fuji
* Дерево середньорослe, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) червоно-коричневий, довгий, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика жіночої квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – більше чотирьох. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – неправильно-овальний, забарвлення шкірочки – червоно-оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші інколи присутні. В'яжуча речовина завжди наявна. Насіння за розміром велике, вузько-еліптичне, темно-коричневе. Час цвітіння і розкриття вегетативних бруньок пізній, час споживчої стиглості – середній.

Середня врожайність становить 458,3 т/га. Середня маса плоду 240,5 г, максимальна – 287 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.
* Дані заявника.

Степ

® 09442002 Нікітська бордова

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Росіянка х вільне запилення.
* Дерево середньорослe, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) сіро-коричневий, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, маленькі, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика жіночої квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – більше чотирьох. Плід малий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині - округлий, забарвлення шкірочки – червоно-оранжеве, забарвлення м'якуша – червоно-оранжеве, коричневі плямки на м'якуші відсутні. В'яжуча речовина завжди

наявна. Насіння за розміром – середнє, напівшироко-еліптичне, темно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок та споживчої стиглості – пізній.

Середня врожайність становить 29,1 т/га. Середня маса плоду 115 г, максимальна – 130 г. Сорт зимостійкий, посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.
* Дані заявника.

® 10442004 Південна красуня — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Shogatsu
* Дерево середньорослe, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) сіро-коричневий, середній, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, маленькі, еліптичні. Листкова пластинка довга, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – понад чотири. Плід середній, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – оранжево-червоне, забарвлення м'якуша – оранжево-червоне, коричневі плямки на м'якуші завжди відсутні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром середнє, широко-яйцеподібне, темно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок, споживчої стиглості – середній.

Середня врожайність становить 350,0 т/га. Середня маса плоду 150,0 г, максимальна – 165,0 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.
* Дані заявника.

® 09442001 Росіянка — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Diospyros virgniana L. x * Diospyros kaki L.
* Дерево сильнорослe, напівпрямостояче. Однорічний пагін (з під сонячного боку) сіро-коричневий, довгий з середньою довжиною міжвузля, сочевичок багато, середнього розміру, видовжені. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – жіночі і чоловічі. Діаметр вінчика жіночої квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – більше чотирьох. Плід середнього розміру, стиснутий, неправильно-овальний, забарвлення шкірочки – жовто-оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші відсутні. В'яжуча речовина завжди наявна. Насіння за розміром – мале, широко-яйцеподібне, помірно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок та споживчої стиглості – пізній.

Середня врожайність становить 35,42 т/га. Середня маса плоду 97 г, максимальна – 125 г. Сорт зимостійкий, посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.
* Дані заявника.

® 10442002 Сувенір осені — Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Hachiay x Fuyu.
* Дерево середньорослe, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) жовто-коричневий, середній, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика жіночої квітки – середній, форма чашечки – ромбічна,

кількість пелюсток віночка – понад чотири. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші завжди наявні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром велике, напіввидовжене, темно-коричневе. Час цвітіння і розкриття вегетативний бруньок пізній, час споживчої стиглості – ранній.

Середня врожайність становить 41,67 т/га. Середня маса плоду 197,0 г, максимальна – 230,0 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.
* Дані заявника.

Степ

® 10442006 Українка

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Тсуру Hoko
* Дерево середньорослe, за габітусом напівпрямостояче. Однорічний пагін (з під сонячного боку) жовто-коричневий, середній, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середня, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – жіночі і чоловічі. Діаметр вінчика жіночої квітки – середній, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – понад чотири. Плід середній, еліптичний, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки у м'якуші завжди наявні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром велике, напіввидовжене, темно-коричневе. Час цвітіння і розкриття вегетативний бруньок - пізній, час споживчої стиглості – ранній.

Середня врожайність становить 34,38 т/га. Середня маса плоду 95,0 г, максимальна – 115,0 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – відсутня або слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.
* Дані заявника.

Вишнево-черешневий гібрид

Степ, Лісостеп

® 05465001 Афродіта

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Гріот Остгеймський х Валерій Чкалов.
*Дерево помірної сили росту, напіврозлоге, помірно розгалужене. На молодому пагоні антоціанове забарвлення помірне, опушення слабке, сочевичок мало. Листкова пластинка середньої довжини та ширини, із темно зеленим забарвленням верхнього боку. Черешок середньої довжини. Залозки наявні. Квітка велика, з округлими пелюстками, що дотикаються. Плід великий, плоско-кулястий, шкірка та м'якоть темно-червоного забарвлення. Сік помірно-червоний. Плід середньої пружності, солодкий, кислотність помірна, соковитий. Кісточка середнього розміру, округлої форми. Час цвітіння середній. Плоди достигають дуже рано.

*За даними заявника: урожайність товарна 83,42 (т/га), урожай з дерева 30,0 (кг), маса плоду 6,0 (г), дегустаційна оцінка 4,8 балів. Зимостійкість та посухостійкість висока. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп. Напрям використання - універсальний. * Дані заявника

Ожина звичайна

Лісостеп

08482001 Насолода

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Частково відоме схрещування Тріпл Крови, Торнфрі.

* Рослина за габітусом напівпряма, нових пагонів мало. Пагін у стані спокою за довжиною середній, антоціанове, забарвлення помірне, колючки відсутні. Листок непарно перистий. Колір пелюсток квітки білий. Ягода велика, еліптична, чорна. Початок цвітіння ранній, достигання середній.

За даними заявника за схеми садіння 3,0 х 1,5 м середня врожайність рослин сорту становить 16,7 т/га. Середня маса ягоди – 3,6 г, максимальна – 4,7 г. Зимостійкість – 3, посухостійкість - 8 балів. Група стиглості – середньо-пізня. Напрям використання – універсальний. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп.

* Дані заявника.

Виноград

Виноград справжній

® 10073002 Лівія — Степ, Лісостеп

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

* Сорт столовий. Має 110 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються рано. Верхівки молодих пагонів повністю відкриті . Верхній бік пластинки молодого листка зелений із антоціановими плямами. Положення пагона у просторі напівпряме. Вусики середні, послідовних вусиків менше трьох. Квітка має добре розвинені тичинки і редуковану маточку. Розвинений листок великий, п'ятикутна, з п'ятьма лопатями. Листкові вирізи між лопатями неглибокі. Зубці розвиненого листка середньої довжини, обидва боки випуклі. Початок достигання ягід дуже ранній. Гроно велике, середньої щільності, ніжка середня. Ягода дуже велика, тупо-яйцеподібна, колір шкірки без воскового нальоту – рожевий, важко відокремлюється від плодоніжки. Товщина шкірки середня. М'якоть соковита, тверда. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін жовтувато-коричневий, гладенький.

Сорт ранньостиглий, столового призначення. Стійкий проти мілдью, сірої гнилі, оїдіуму, слабостійкий до філоксери. Середня врожайність – 168 ц/га, середня маса гроно – 580 г, середня маса 100 ягід – 620 г. Цукристість –18,8 %, кислотність – 6,2 г/л. Вихід соку (сусла) - 60 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано вирощувати у всіх виноградарських зонах України.

* Дані заявника.

® 10073001 Південнобережний — Степ, Лісосотеп

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

* Сорт столовий. Має 136 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівки молодих пагонів повністю відкриті . Верхній бік пластинки молодого листка жовто – зелений. Положення пагона у просторі напівпряме. Вусики короткі, послідовних вусиків менше трьох. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок великий, сецевидний, з п'ятьма лопатями. Листкові вирізи між лопатями глибокі. Зубці розвиненого листка середньої довжини, обидва боки випуклі. Початок достигання ягід середній. Гроно середнього розміру, середньої щільності, ніжка коротка. Ягода середня, еліптична, колір шкірки без воскового нальоту – фіолетово-червоний, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Товщина шкірки середня. М'якоть соковита, тверда. Насіння рудиментарне. Здерев'янілий пагін темно-коричневий, борозечастий.

Сорт середньостиглий столового призначення. Стійкий проти мілдью, сірої гнилі, оїдіуму, середня стійкість до філоксери. Середня врожайність – 150 ц/га, середня маса грона – 253 г, середня маса 100 ягід – 325 г. Цукристість –18,4 %, кислотність – 7,3 г/л. Вихід соку (сусла) - 60 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано вирощувати у всіх виноградарських зонах України.

* Дані заявника.

Декоративні та лікарські

Астильба

® 10348004 Анюта

Лісостеп

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Рослина за вистою середня. Листок помірно зеленого забарвлення, краї сегментів бурі, глянсуватість верхнього боку сильна. Суцвіття волотеподібне, середньої висоти, дуже широке, пухке, блідо-рожевого кольору. Початок цвітіння середній. Тривалість цвітіння середня.

* Зимостійкість, стійкість до хвороб та шкідників – 9 балів. Період від початку цвітіння до втрати декоративності 9 днів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп.
* Дані заявника.

® 10348003 Лебідонька

Лісостеп

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Рослина за вистою середня. Листок помірно зеленого забарвлення, краї сегментів бурі, глянсуватість верхнього боку слабка. Суцвіття поникле, середньої висоти, середнього діаметру, щільне, білого кольору. Початок цвітіння дуже ранній. Тривалість цвітіння середня.

* Зимостійкість, стійкість до хвороб та шкідників – 9 балів. Період від початку цвітіння до втрати декоративності 9 днів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп.
* Дані заявника.

® 10348002 Оченята

Лісостеп

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Рослина низька. Листок помірно зеленого забарвлення, краї сегментів бурі, глянсуватість верхнього боку слабка. Суцвіття ромбічне, середньої висоти, вузьке, щільне, блідо-рожевого кольору. Початок цвітіння середній. Тривалість цвітіння середня.

* Зимостійкість, стійкість до хвороб та шкідників – 9 балів. Період від початку цвітіння до втрати декоративності 9 днів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп.
* Дані заявника.

® 10348001 Хурделиця

Лісостеп

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Рослина висока. Листок помірно зеленого забарвлення, глянсуватість верхнього боку слабка. Суцвіття поникле, середньої висоти, широке, помірно щільне, білого кольору. Початок цвітіння ранній. Тривалість цвітіння середня.

* Зимостійкість, стійкість до хвороб та шкідників – 9 балів. Період від початку цвітіння до втрати декоративності 9 днів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп.
* Дані заявника.

Калістефус китайський

10285002 Ангеліна

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Невідоме схрещування.
*Сортогрупа принцеса. Час початку цвітіння ранній. Рослини за висотою високі, колоноподібні, антоціанове забарвлення головного стебла і гілок наявне. Галуження середнє. Наявні квітконоси 2-го і 3-го порядків. Залистяність середня, опушеність листка слабка. Суцвіття сферичне, дуже повне, щільне, мале, темно-синє. Язичкова квітка лопаточкоподібна, коротка, горизонтальна, загострена. Трубчаста квітка довга. Насіння антоціаново-коричневе, вузькоклиноподібне.

Рослини сорту стійкі проти хвороб і шкідників, стійкість квіток за зрізування 2 тижні. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

4 09285002 Весільна — Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Частково відоме схрещування Дарунок матері.
*Сортогрупа художня. Час початку цвітіння середній. Рослини за висотою дуже високі, колоноподібної форми, антоціанове забарвлення головного стебла і гілок відсутнє. Галуження середнє. Наявні квітконоси 2-го і 3-го порядків. Залистяність середня, опушеність листка помірна. Суцвіття сферичне, повне, середньої щільності, середнього діаметру, світле синьо-фіолетове. Язичкова квітка стрічкоподібна, середня, горизонтальна. Трубчаста квітка коротка. Насіння сірувато-коричневе, вузькоклиноподібне.

Рослини сорту стійкі проти хвороб і шкідників, період цвітіння від початку цвітіння до втрати декоративності 40 днів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп, Плісся.
* Дані заявника.

® 09285001 Єва — Степ, Лісостеп, Плісся

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Частково відоме схрещування Унікум (мікс).
* Сортогрупа унікум. Час початку цвітіння пізній. Рослини за висотою середні, колоноподібні, антоціанове забарвлення головного стебла і гілок наявне. Галуження середнє. Наявні квітконоси 2-го і 3-го порядків. Залистяність середня. Наявне антоціанове забарвлення листка та помірна опушеність. Суцвіття сферичне, повне, середньої щільності, середнього діаметру, темне пурпурово-червоне. Язичкова квітка стрічкоподібна, середня, горизонтальна. Трубчаста квітка коротка. Насіння сірувато-коричневе, вузькоклиноподібне.

* За даними заявника стійкість проти хвороб і шкідників 9 балів. Період цвітіння від початку цвітіння до втрати декоративності 50 днів. Рекомендовані грунтово-кліматичні зони – Степ, Лісостеп, Плісся.
* Дані заявника.

10285001 Оксамит — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

*Сортогрупа хризантемовидна. Час початку цвітіння ранній. Рослини за висотою середні, овальної форми, антоціанове забарвлення головного стебла і гілок наявне. Галуження сильне. Наявні квітконоси 2-го і 3-го порядків. Залистяність середня, опушеність листка помірна. Суцвіття опукле, дуже повне, щільне, великого діаметру, червоне. Язичкова квітка трубчаста, довга, загорнута догори. Трубчаста квітка довга. Насіння сірувато-сріблясто-жовте, вузько клиноподібне.

Рослини сорту стійкі проти хвороб і шкідників, стійкість квіток за зрізування 2 тижні. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

Лілійник

10236003 Вечірній Кривбас

Степ

Заявник: Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України

* Час початку вегетації середній. Рослина за життєвою формою напівспляча, за вистою середня. Листок широкий, середньої довжини, пониклий біля верхівки, темно–зелений. Квітконос виступаючий над листками, залистяність відсутня. Суцвіття середньої довжини, нещільне, приквітки відсутні. Час цвітіння середньоранній. Квіток на рослині середня кількість, середнього діаметру, прості, павукоподібні, пурпурові, двокольорові. Часточки оцвітини розташовані вільно. Тривалість вегетаційного періоду середня.

*Висота рослин 85 см. Період від початку вегетації до початку цвітіння – 93 дні. Тривалість цвітіння 30 днів. Зимостійкість – 9 балів.
Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ.
* Дані заявника.

10236001 Скіфське золото

Степ

Заявник: Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України

* Час початку вегетації середній. Рослина за життєвою формою напівспляча, за висотою низька. Листок середній, пониклий біля верхівки, світло–зеленого кольору. Квітконос виступаючий над листками, залистяність відсутня. Суцвіття середньої довжини, середньої щільності, приквітки відсутні. Час цвітіння середньоранній. Квіток на рослині середня кількість, середнього діаметру, прості, зіркоподібної форми, жовті, двотонові. Часточки оцвітини напівдотичні. Вегетаційний період середній.

*Висота рослин 60 см. Період від початку вегетації до початку цвітіння – 80 днів. Тривалість цвітіння 31 день. Зимостійкість – 9 балів.
Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ.
* Дані заявника.

10236004 Степова зоря

Степ

Заявник: Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України

* Час початку вегетації середній. Рослина за життєвою формою напівспляча, компактна, низька. Листок середній, пониклий біля верхівки, помірно–зелений. Квітконос виступаючий над листками, залистяність відсутня. Суцвіття середньої довжини, середньої щільності, приквітки відсутні. Час цвітіння середньоранній. Квіток на рослині мало, середнього діаметру, прості зіркоподібні, рожеві, одноколірні. Часточки оцвітини напівдотичні. Тривалість вегетаційного періоду довгий.

*Висота рослин 60 см. Період від початку вегетації до початку цвітіння – 95 днів. Тривалість цвітіння 35 днів. Зимостійкість – 9 балів.
Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ.
* Дані заявника.

10236005 Тернівчанка

Степ

Заявник: Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України

* Час початку вегетації середній. Рослина за життєвою формою напівспляча, низька. Листок середній, пониклий біля верхівки, помірно–зелений. Квітконос виступаючий над листками, залистяність відсутня. Суцвіття середньої довжини, середньої щільності, приквітки відсутні. Час цвітіння ранній. Квіток на рослині мало, середнього діаметру, повні, рожеві, одноколірні. Часточки оцвітини дотичні. Тривалість вегетаційного періоду довгий.

*Висота рослин 60 см. Період від початку вегетації до початку цвітіння – 90 днів. Тривалість цвітіння 43 днів. Зимостійкість – 9 балів.

Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ.
* Дані заявника.

® 08236006 Ювілейний — Степ

Заявник: Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України

* Час початку вегетації середній. Рослина за вистою низька, компактна. Листок середній, прямий, світло – зелений. Квітконос виступаючий над листками, залистяність відсутня. Суцвіття коротке, середньої щільності, приквітки відсутні. Квіток на рослині багато, середнього діаметру, прості, рожеві, одноколірні. Чашолистки напівдотичні. Тривалість вегетаційного періоду середня.

*Висота рослин 45-55 см. Період від початку вегетації до початку цвітіння – 100-102 дні. Тривалість цвітіння 25-30 днів. Зимостійкість – 9 балів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ.
* Дані заявника.

Льон великоквітковий (декоративний)

® 10308001 Вогник — Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: Запорізький національний університет

* Кущ середньої висоти. Квітка відкрита, середня, колір віночка мідно-червоний. Наявна темна пляма в центрі квітки та дві поздовжні білі смуги в нижній частині пелюстки. Насіння оливкового кольору. Початок цвітіння середній.

* Висота рослини, см - 40. Період від початку вегетації до цвітіння, днів - 40. Тривалість вегетаційного періоду, днів - 120. Напрям використання: садова рослина.
* Дані заявника.

Півонія

® 10242012 Геркулес — Полісся, Лісостеп

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Сорт ранній. Рослина середня з розлогим кущем. Листки темно-зеленого кольору. Квітки великі, повні, червоного забарвлення. Крайова та центральна пелюстки пурпурово-рожеві. Забарвлення слабко вигорає. Аромат слабкий. Тичинки кремового кольору, маточка – червона.

* Середня висота рослини в період цвітіння, 95 см. Зимостійкість 9 балів. Період від початку вегетації до початку цвітіння 55 днів, тривалість цвітіння 7 днів. Тривалість збереження декоративної зрізки 5 днів.
* Дані заявника.

® 10242013 Квазімодо — Плісся, Лісостеп

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Сорт пізній. Рослина висока з розлогим кущем. Листки темно-зеленого кольору. Квітки малі, напівповні, рожевого забарвлення. Крайова та центральна пелюстка пурпурові. Забарвлення слабко вигорає. Аромат специфічний. Маточка – рожева.

* Середня висота рослини в період цвітіння, 95 см. Зимостійкість 9 балів. Період від початку вегетації до початку цвітіння 55 днів, тривалість цвітіння 7-9 днів. Тривалість збереження декоративної зрізки 5-6 днів.
* Дані заявника.

® 10242014 Малинова Ватра

Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Сорт дуже ранній. Рослина висока з розлогим кущем. Листки темно-зеленого кольору. Квітки середні, повні, червоного забарвлення. Крайова пелюстка та центральна пурпурово-рожеві. Забарвлення слабко вигорає. Аромат слабкий. Колір тичинкової нитки – кремовий. Маточка – рожева.

*Середня висота рослини в період цвітіння, 105 см. Зимостійкість 9 балів. Період від початку вегетації до початку цвітіння 50-55 днів, тривалість цвітіння 7-9 днів. Тривалість збереження декоративної зрізки 5-6 днів.
* Дані заявника

® 10242011 Писанка Коломиї

Полісся, Лісостеп

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Сорт ранній. Рослина висока з напіврозлогим кущем. Листки помірно зеленого кольору. Квітки середні, прості, червоного забарвлення. Крайова пелюстка темно рожево-червона. Забарвлення не вигорає. Аромат специфічний. Тичинки кремового кольору, маточка – рожева.

* Середня висота рослини в період цвітіння, 90 см. Зимостійкість 9 балів. Період від початку вегетації до початку цвітіння 50 днів, тривалість цвітіння 9 днів. Тривалість збереження декоративної зрізки 6 днів.
* Дані заявника.

® 10242010 Чумацький Шлях

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Сорт ранній. Рослина висока з напіврозлогим кущем. Листки зеленого кольору. Квітки середні, прості, червоного забарвлення. Крайова пелюстка пурпурова. Забарвлення слабко вигорає. Аромат слабкий. Тичинки рожевого кольору, маточка – червоний.

* Середня висота рослини в період цвітіння, 90 см. Зимостійкість 9 балів. Період від початку вегетації до початку цвітіння 40 днів, тривалість цвітіння 8 днів. Тривалість збереження декоративної зрізки 5 днів.
* Дані заявника.

Троянда

® 09246006 Благовіст

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Рослина середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення слабкої інтенсивності. Стебло вкрите середньою кількістю переважно пурпурових шипів. Листок середнього розміру, темно зеленого кольору, з верхнього боку помірний глянець. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок еліптичної форми із заокругленою основою й загостреною верхівкою. Квітка оранжева, округлої форми, великого діаметру з великою кількістю пелюсток. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат сильний. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, обернено-еліптична, середнього розміру. Зубчастість відсутня або дуже слабка. Завертання країв відсутне або дуже слабке, хвилястість відсутня або дуже слабка. На внутрішньому боці пелюстки два кольори. Основний колір зовнішнього боку пелюстки світло-зелений. Домінуючий колір тичинкової нитки оранжевий.
* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 120, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -80, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 270, зимостійкість 5 балів.

* Дані заявника.

® 10246001 Граційний Танок — Полісся, Лісостеп.

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Рослина кущового типу, напівпряма, низька. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення середньої інтенсивності. Стебло вкрите середньою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середній, темно зеленого кольору, глянець з верхнього боку слабкий. Хвилястість краю листкової пластинки помірна. Кінцевий листочок овальний із тупою основою та верхівкою. Квітка округлої форми, напівповна, велика. Профіль верхньої та нижньої частини плескатий. Група кольору квітки рожева суміш, колір середини – рожевий. Аромат середній. Пелюстка серцеподібна, середня, зубчастість відсутня або дуже слабка. Завертання країв відсутнє або дуже слабке. На внутрішньому боці пелюстки один колір. Тичинкова нитка переважно оранжевого кольору.
* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 150, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -80, тривалість вегетаційного періоду (дн) -200,0. Зимостійкість 5 балів.
* Дані заявника.

® 09246010 Емпінто — Закритий грунт

Заявник: Бартелс Роуз Брідінг Б.В.

* Рослина від низької до середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення сильної інтенсивності. Стебло вкрите середньою кількістю переважно зеленуватих шипів. Листок довгий помірного зеленого кольору, від слабко до помірно глянцуватого з верхнього боку. Хвилястість краю листкової пластинки від слабкої до помірної. Кінцевий листочок із заокругленою основою й овальною верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, від середнього до великого діаметру. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка обернено еліптична, середньої довжиниза шириною -середня до широкої. Зубчастість слабка. Завертання країввід помірного до сильного, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір. На основі з внутрішнього боку пелюстки наявна пляма від малого до середнього розміру, світло-жовтого кольору. Тичинкова нитка переважно червоного кольору.
* Дані заявника.

Висота рослини (см) - 70-80, Період від вегетації до початку цвітіння (дн) -70, тривалість вегетаційного періоду (дн) -2500, тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 14.

® 09246011 Емпара — Закритий грунт

Заявник: Бартелс Роуз Брідінг Б.В.

* Рослина від низької до середньої висоти. На молодих пагонах є антоціанове забарвлення від слабкої до середньої інтенсивності. Стебло вкрите малою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середньої довжини, помірного зеленого кольору, глянець з верхнього боку середній. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок із серцевидною основою й округлою верхівкою. Квітка жовта, зіркоподібної форми, середнього діаметру. Профіль верхньої та нижньої частини плескато-випуклий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Членування чашолисток дуже сильне. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, яйцеподібної форми, за довжиною та шириною від короткої до середньої . Зубчастість слабка. Завертання країв від помірного до сильного, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір . Пляма на основі з внутрішнього боку пелюстки відсутня. Домінуючий колір тичинкової нитки оранжевий.

Висота рослини (см) - 70 - 80. Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -70, тривалість вегетаційного періоду (дн) 2500,

тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 14.

® 09246003 Келих аромату

Заявник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

* Рослина клумбова, пряма, середньої висоти. Антоціанове забарвлення молодого пагона середнє. На стеблі середня кількість шипів червонуватого кольору. Листок середній, темно-зелений. Інтенсивність антоціанового забарвлення молодого пагона середня. Глянець верхнього боку відсутній або дуже слабкий. Хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Кінцевий листочок еліптичний із заокругленою основою та гострою верхівкою. Квітучі збіжисті пагони відсутні. На неквітучих збіжистих пагонах квіток багато. Бутон у повздовжньому розрізі овальної форми. Квітка велика, повна, зіркоподібна. Має велику кількість пелюсток, щільна. За профілем верхня частина квітки – плескато-випукла, нижня – увігнута. Аромат сильний. Пелюстка велика, округла. Зубчастість і хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Завертання країв відсутнє або дуже слабке. Основний колір внутрішнього боку пелюстки темний пурпурово-червоний, світліший біля верхівки. Пляма на основі відсутня. Тичинкова нитка коричнево-червона. Оплодень малий. Плід у поздовжньому перерізі ліровидний.
* Дані заявника.

Висота рослини (см) - 100, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -58, тривалість вегетаційного періоду (дн) -174,0. Зимостійкість 5 балів.
* Дані заявника.

Полісся, Лісостеп, Степ.

® 09246007 Кримський самоцвіт

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Рослина за типом росту клумбова, габітус прямий, висока. На молодих пагонах антоціанове забарвлення відсутнє. Стебло вкрите малою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середнього розміру, темного зеленого кольору, з верхнього боку слабкий глянець. Хвилястість листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Кінцевий листочок еліптичної форми із тупою формою основи та загостреною верхівкою. Група кольору квітки зелена, колір середни жовтий. Квітка округлої форми, середнього діаметру з великою кількістю пелюсток. Профіль верхньої та нижньої частини плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням , серцеподібної форми, коротка за довжиною та середня за шириною. Зубчастість відсутня або дуже слабка. Завертання країв сильне, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки два кольори. Основний колір зовнішнього боку пелюстки темно-зелений. Домінуючий колір тичинкової нитки рожевий.
* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 70, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -90, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 270. Зимостійкість 5 балів.
* Дані заявника.

Закритий грунт

® 07246018 Лексхкаеп

Заявник: Левасі Лтд

* Рослина від низької до середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення середньої інтенсивності. Стебло вкрите малою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середнього розміру, помірного зеленого кольору, з верхнього боку помірний глянець. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок еліптичної форми із заокругленою основою й загостреною верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, середнього діаметру з середньою кількістю пелюсток. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням ,округла, середня за довжиною та шириною. Зубчастість слабка. Завертання країв помірне, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір.

На основі з внутрішнього боку пелюстки пляма відсутня. Домінуючий колір тичинкової нитки світло-жовтий.
* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 70, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -50, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 2500,до 7 років, тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 14.
* Дані заявника.

® 09246005 Місхор — Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Рослина клумбового типу росту, габітус прямий. Рослина середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення сильної інтенсивності. Стебло вкрите малою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок довгий, темно-зеленого кольору, з верхнього боку сильний глянець. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок вузько-еліптичної форми із заокругленою основою й загостреною верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, великого діаметру з великою кількістю пелюсток. Профіль верхньої та нижньої частини плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням , серцеподібної форми, середня за довжиною та широка за шириною. Зубчастість відсутня або дуже слабка. Завертання країв відсутнє або дуже слабке, хвилястість помірна. На внутрішньому боці пелюстки два кольори. Розташування вторинного кольору на внутрішньому боці пелюстки суцільно. Основний колір зовнішнього боку світло-зелений. Домінуючий колір тичинкової нитки світло-жовтий.
* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 120, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -92, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 270, зимостійкість 5 балів.
* Дані заявника

® 09246008 Полька Бабочка — Полісся, Лісостеп, Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Рослина висока, витка. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення середньої інтенсивності. Стебло вкрите середньою кількістю переважно зеленуватих шипів. Листок довгий, темно зеленого кольору, глянець з верхнього боку слабкий. Хвилястість краю листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Кінцевий листочок еліптичний із гострою основою й загостреною верхівкою. Квітка округлої форми, повна, середнього діаметру. Профіль верхньої частини випуклий, нижньої – плескато-випукла. Група кольору квітки оранжева суміш, колір середини – оранжевий. Аромат середній. Пелюстка округла, середня, зубчастість відсутня або дуже слабка. Завертання країв відсутнє або дуже слабке, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір. Тичинкова нитка переважно жовтого кольору.
* Дані заявника.

Висота рослини (см) - 250, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -70, тривалість вегетаційного періоду (дн) -270,0. Зимостійкість 5 балів.
* Дані заявника.

® 09246004 Первісток — Полісся, Лісостеп, Закритий грунт

Заявник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

* Рослина клумбова, напівпряма, середньої висоти. Інтенсивність антоціанового забарвлення молодого пагона слабке. На стеблі середня кількість шипів червонуватого кольору. Листок середній, помірно зелений. Глянець верхнього боку відсутній або дуже слабкий. Хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Кінцевий листочок еліптичний із заокругленою основою та гострою верхівкою. Квітучі

збіжисті пагони відсутні. На неквітучих збіжистих пагонах квіток дуже мало. Бутон у повздовжньому розрізі еліптичної форми. Квітка велика, повна, зіркоподібна. Має середню кількість пелюсток, помірно щільна. За профілем верхня частина квітки – випукла, нижня – плеската. Аромат помірний. Пелюстка велика, округла. Зубчастість і хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Завертання країв слабке. Внутрішній бік пелюстки темний пурпурово-червоний. Пляма на основі відсутня. Тичинкова нитка жовта. Оплодень малий. Плід у поздовжньому перерізі грушоподібний.

* Дані заявника.

Висота рослини (см) - 80, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -60, тривалість вегетаційного періоду (дн) -180. Зимостійкість 5 балів.

* Дані заявника.

® 09246001 Схоюрі

Закритий грунт

Заявник: ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ (NL)

* Рослина за типом росту клумбова, габітус прямий , низька. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення слабкої інтенсивності. Стебло вкрите шипами від середньої кількості до багата переважно червонуватих шипів. Листок довгий, помірного зеленого кольору, помірний глянцець з верхнього боку, антоціанове забарвлення відсутнє . Край листкової пластинки від дуже слабої до слабкої хвилястості. Кінцевий листочок еліптичної форми із заокругленою основою й загостреною верхівкою. Квітучі збіжисті пагони відсутні. Квітка повна, середнього діаметру з помірною щільністю пелюсток. Середина оранжева. Квітка зіркоподібної форми. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка обернено-еліптична, за розміром від малої до середньої, за довжиною від короткої до середньої середня заі шириною. Зубчастість слабка. Завертання країв сильне, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір, основний колір на внутрішньому боці помаранчево-червоний. . На основі з внутрішнього боку пелюстки наявна пляма, від середнього до великого розміру, жовтого колбору.. Домінуючий колір тичинкової нитки червоний.

* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 60, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -75, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 1825, тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 11.

* Дані заявника.

® 09246002 Схекслу

Закритий грунт

Заявник: ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ (NL)

* Рослина за типом росту клумбова, габітус прямий, низька. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення від слабкої до середньої інтенсивності. Шипи відсутні. Листок середнього розміру, інтенсивність кольору від світлого до помірного, з верхнього боку помірний глянець. Хвилястість листкової пластинки від слабкої до помірної. Кінцевий листочок овальної форми із заокругленою основою й гострою верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, середнього діаметру , кількістю пелюсток від малої до середньої. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням ,обернено-еліптичної форми, від короткої до середньої за довжиною та від середньої до широкої за шириною. Зубчастість слабка. Завертання країв від помірного до сильного, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір. Основний колір на внутрішньому боці пелюстки освітлені до кремового (RHS 56 C-D). На основі з внутрішнього боку пелюстки пляма відсутня.Домінуючий колір тичинкової нитки світло-жовтий.

* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 65, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -75, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 1825,

тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 11.
* Дані заявника.

® 08246003 Тан01990 — Закритий грунт

Заявник: Розен Тантау. Матиас Тантау Нахфольгер

* Рослина від низької до середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення від слабкої до помірногосередньої інтенсивності. Стебло вкрите середньою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середнього розміру, помірного зеленого кольору, з верхнього боку середній глянець. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок еліптичної форми із заокругленою основою й гострою верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, середнього діаметру з середньою до великої кількістю пелюсток. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням ,обернено-еліптичної форми, середня за довжиною та середня до широкої за шириною. Зубчастість слабка до середньої. Завертання країв помірне до сильного, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір. На основі з внутрішнього боку пелюстки пляма відсутня. Основний колір зовнішнього боку світло блакитно-рожевий до фіолетового, світліший до основи. Домінуючий колір тичинкової нитки жовтий.
* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 60, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -60, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 2500,до 7 років, тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 8 - 12.
* Дані заявника.

Флокс волотистий

® 09248002 Біла Вежа — Полісся, Лісостеп

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Рослина дуже висока, напіврозлога. Антоціанове забарвлення, та опушення стебла – відсутнє, забарвлення під час повного цвітіння – світло-зелене. Листок широко ланцетний. Суцвіття середньє, щільне, округле. Забарвлення пуп'янка рожеве. Квітка середнього діамеру, пелюстки слабко перекриваються. Тип забарвлення верхнього боку - одноколірний. Основне забарвлення верхнього боку віночка - біле. Домінуюче забарвлення трубки віночка біле. Забарвлення не вигорає. Початок цвітіння пізній.

* Рослини сорту зимостійкі, стійкі проти хвороб та шкідників. Період цвітіння від початку цвітіння до втрати декоративності 27 днів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Полісся, Лісостеп.
* Дані заявника

® 09248001 Красень — Полісся, Лісостеп

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Рослина висока, компактна. Антоціанове забарвлення стебла наявне, опушення відсутнє, забарвлення під час повного цвітіння – темно-зелене. Листок широко ланцетний. Суцвіття велике, щільне, конічне з виступом. Забарвлення пуп'янка рожеве. Квітка середнього діамеру, пелюстки дуже перекриваються. Тип забарвлення верхнього боку - двоколірний. Основне забарвлення верхнього боку віночка - світле синьо-рожеве. Домінуюче забарвлення трубки віночка рожеве. Забарвлення не вигорає. Початок цвітіння пізній.

* Рослини сорту зимостійкі, стійкі проти хвороб та шкідників. Період цвітіння від початку цвітіння до втрати декоративності 25 днів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Полісся, Лісостеп.
* Дані заявника

Азиміна трилопатева

Степ

® 10443001 Вікторія

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Невідоме схрещування.

*** Дерево середньорослe, пряме. Однорічний пагін середній, коричневого забарвлення. Квітка велика з понад чотирма пелюстками. Плід великий, вузько-еліптичний, з жовто-оливковою м'якоттю. Насінина середнього розміру, напівкуляста, темно-коричневого забарвлення.**

За даними заявника за схеми садіння 3 х 4 м середня врожайність становить 220,8 ц/га. Середня маса плоду – 325,0 г, максимальна – 380,0 г. Сорт зимостійкий, посухостійкість середня. Група стиглості - середня. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді, нетермічна переробка.

*** Дані заявника.**

Заявник, власник, підтримувач та їхні адреси

Код	Назва	Адреса
8	ТОВ "Сингента"	03040, вул. Васильківська 14, 5 поверх, м. Київ, Україна
15	Державний науковий заклад Всеросійський науково-дослідний інститут рису	П/в Білозерне, м. Краснодар, Росія, 350921
16	Державна наукова установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)	Вул. Філатова, 17, м. Краснодар-38, Росія, 350038
25	Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка	П/в 12, м. Краснодар, Росія, 350012
29	Дочірне підприємство "Рейлін"	Вул. І. Сірка 15, м. Київ, 03143
30	Кейджо, Інк.	20 Вілвуд Лейн, Скарбороу, Мейн, США
32	Селекційна станція Горна Стреда, Словакія	Партриганська 401, 91624, Горна Стреда, Словакія
33	Саката Веджитеблз Юроп САС	Домені Де Саблас БП11, Рю Ду Мулін 30620 Уцхауд, Франція, +330466/71-75-00, +330466717550, e-mail: amandine.lochet@sakata-eu.com
49	Закрите акціонерне товариство Науково - виробнича фірма "Російскіє сємєна"	вул. Селезнівська 11а, стр. 2, м. Москва, 127030
50	Спільне українсько-польське підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "КРОКУС" Лтд	46020, м. Тернопіль, вул. Коновальця, 4
83	Республіканське науково - дослідне унітарне підприємство "Інститут картоплярства Національної академії наук Білоруси""	Вул. Ковальова 2а, с. Самохваловичі, Мінський р-н, 223013
113	Вест Ресурс	Кишинів, вул. Н.Йорга, 21, Молдова
122	ТОВ "Уніфер"	Вул. Мелітопольська, 17б, м. Каховка, Херсонська обл, Україна, 74800
126	Товариство з обмеженою відповідальністю агропромислова фірма "Еліта Дона"	пров. Сільськогосподарський 6, м. Ростов - на- Дону, 344038, Росія
141	Всеросійський науково-дослідний інститут рослинництва ім. М.І. Вавилова	Вул. Герцена, 44, Санкт-Петербург, Росія, 190000
142	Семенсес Прогрейн ІНК	Ранг Вас- Рівієр НОРД, Сант-цезар, Квебек
149	Всеросійський науково-дослідний інститут селекції і насінництва овочевих культур (ВНДІ)	П/в Лісове містечко, Одинцовський р-н, Московська обл., Росія, 143080
155	Селянсько-фермерське господарство "Степове"	Україна, Запорізька обл, Запорізький р-н, с. Степове, вул. Ясна, 32
157	Установа "Селекційна станція ім. М.М. Тімофеєва"	Вул. Пасічна, 5, Москва, Росія, 127550
169	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рапсоіл"	Вул. Молодіжна 9, стм. Гостомель, Київська обл.
175	ТОВ Науково-виробниче товариство "Насіння"	03142, Україна, м. Київ, вул. Кримського, 4а, к. 410, а/с 145
177	Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету	Вул. Шевченко, 10, м. Ніжин ,Чернігівська обл., 16600
181	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"	19635, с. Білозір"я, вул.Леніна, 2, Черкаського р-ну, Черкаської обл.
191	Мельничук Максим Дмитрович	Вул. Ломоносова, 24, кв. 123, м. Київ, 03022
192	Заграфова Майя Йосипівна	Проїзд Тутковського, 6, кв. 13, м. Житомир
201	ВНДІ зернобобових і круп'яних культур	П. Стрелецький, м. Орел, Росія, 303112,
209	Північно-Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Донського зонального науково-дослідного інституту сільського господарства	П/в Дослідна станція, Тарасівський р-н, Ростовська обл., Росія, 346055
211	ВНДІ виноградарства і виноробства ім. Я..І. Потапенко	Пр. Платова, 166, м. Новочеркаськ, Ростовська обл., Росія, 346421
212	Державна наукова установа Всеросійський науково - дослідний інститут зернових культур ім. І.Г.Калиненко	Науковий городок, 3, м. Зерноград, Ростовська обл., Росія, 347740

Код	Назва	Адреса
213	Кемпбеллс Сідз	28605 Каунтрі Роуд 104, Девіс, СА 95616, США
215	Вілморін	49250 La Menitre, Franse
216	ДНУ "Донська дослідна станція ім. Л.А. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур"	П/в Суходольськ, п. Опорний, Азовський р-н , Ростовська обл., Росія, 346754
217	Донський зональний науково-дослідний інститут сільського господарства	Сел. Расвєт, Аксайський р-н, Ростовська обл., Росія, 346714
218	ТОВ "Монсанто Україна"	Бізнес Центр "Ірва" вул.Радищева 10/14, м.Київ, Україна, 03680
224	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Перспектива"	Вул. Леніна 112, с. Білозіря, Черкаський р-н, Черкаська обл., 19635
230	Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська насіннєва компанія"	Вул. Озерна 14 кв. 124, м. Київ, 04209
237	Мічурінська державна сільськогосподасрька академія	Вул. Інтернаціональна 101, м. Мічурінськ, Тамбовська обл., Росія, 393740
272	Науково-виробниче товариство "Насіння"	03022, м. Київ, вул. Васильківська, 28, оф. 406, Україна
273	Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина
279	Ходовля Рослин Рольничих "Насьона Кобєжиц"спулка з о.о.	вул. Спортова, 21, 55-040, Кобєжіце, Польща
286	Сілван Угорщина ЛТД	2330 Dunaharasti Irinyi Janjs ut 1
293	Товариство з обмеженою відповідальністю "Біоальянс"	Вул. Колекторна 30, м. Київ, 02099
302	Національний науковий центр "Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича Української академії аграрних наук"	03680, м.Київ, вул.акад.Заболотного, 19
303	Ялтушківська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Ялтушків, Барський р-н, Вінницька обл., 23021
304	Уладово-Люлінецька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Жовтневе, Калинівський р-н, Вінницька обл., 22412
305	Інститут кормів Української академії аграрних наук	21100, Проспект Юності, 16, м. Вінниця
306	Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук	23227, вул. Мічуріна, 1, с. Агрономічне, Вінницький р-н, Вінницька обл.
307	Волинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	с. Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626
309	Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	93733, вул. Октябрська, 14 с. Металіст, Слов'яносербський р-н., Луганська обл.,
310	Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	Вул. Дослідна, 1, п/в Олександрівка, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52041
311	Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук	49027, вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ
312	Дніпропетровський державний аграрний університет	Вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49600
313	Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	П/в Дослідне, Ясинуватський р-н., Донецька обл., 86081
314	Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	Вул. Ілліча 7,с. Опитне, Артемівський р-н, Донецька обл., 84571
315	Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	86053, Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Піски, вул. Стадіонна, 15
317	Донецький ботанічний сад Української академії наук України	83053, Донецьк-59, пр-т. Ілліча, 110
318	Інститут хмелярства Української академії аграрних наук	Вул. Київська, 191, м. Житомир, 10000
319	Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук	П/в Пересувне 2, Малинський р-н, Житомирська обл., 11605
320	Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук	Вул. Київське шосе, 131, Житомир-7, 10007

Код	Назва	Адреса
323	Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Пр.Свободи,17, С. Велика Бакта, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 90252
325	Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук	Вул. Вакуленчука, 99, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72311, тел.: 80619 431378, 80619 431320
327	Розівська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	Вул. Академічна, 5, смт Розівка, Розівський р-н, Запорізька обл., 70304
328	Запорізький національний університет	Україна -69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
329	Інститут олійних культур Української академії аграрних наук	70417, вул. Весняна, 1, с. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл.
330	Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	С. Пядики, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., 78254
332	Івано - Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Розумовського, 9а, м. Івано-Франківськ, 76028
333	Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук	Вул. Заболотного, 150, Київ, 03143
334	Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук	Вул. Клінічна, 25, Київ, 03141
335	Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Мала Вільшанка, 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175
336	Маслівський державний аграрний технікум	П/в Маслівка, Миронівський р-н, Київська обл., 08850
337	Київська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"	С. Литвинівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07334
339	Сквирська дослідна станція Інституту агроекології Української академії аграрних наук	09000, вул. Селекційна, 1, м. Сквира, Київська обл.
340	Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	52523, вул. Бугаєнка, 3, п/в Раївка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., +38-05663-46-728
341	Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук	П/в Центральне, Миронівський р-н, Київська обл, 08853
343	Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	П/в Борова, Фастівський р-н, Київська обл., 08520
344	Інститут садівництва Української академії аграрних наук	03027, м.Київ, вул. Садова 6, смт. Новосілки
345	Національний науковий центр "Інститутземлеробства Української академії аграрних наук"	08162, вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
347	Інститут картоплярства Української академії аграрних наук	07853, вул. Чкалова, 22, смт. Немішаєво, Бородянський р-н, Київська обл.
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України	вул. Тімірязєвська, 1, Київ, 01014
349	Відкрите акціонерне товариство "Терезине"	П/в. Терезине, м. Біла Церква, Київська обл., 09133 тел. 6-55-12 факс 6-55-64
350	Національний університет біоресурсів і природокористування	03041, вул. Героїв оборони, 15, м. Київ
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України	вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022
356	Кіровоградський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	27602, вул. Центральна 2, п/в Сазонівка, м. Кіровоград
357	Кримська дослідна станція овочівництва Кримського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	с. Укромне, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим, 97536
358	Кримський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	П/в Клепініно, Красногвардійський р-н, Автономна Республіка Крим, 97010

Код	Назва	Адреса
359	Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	97517, с. Маленьке, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим
361	Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"	смт Аграрне, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95492 тел. (0652) 26-37-52, 22-72-67 факс. (0652) 22-39-66
362	Кримська науково-дослідна станція лікарських рослин Консорціуму "Укрфітотерапія"	Вул. Верхня, 1, с. Лікарське, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим, 97557
363	Кримська помологічна станція Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру Української академії аграрних наук	с. Дальнє, буд. 1, м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, 99049
364	Національний інститут винограду і вина"Магарач" Української академії аграрних наук	Вул. Кірова, 31, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, 98600
365	Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук	смт. Нікіта, м.Ялта, Автономна Республіка Крим, 98648
366	Інститут ефіроолійних і лікарських рослин Української академії аграрних нау	вул. Київська, 150, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95493 тел. (0652) 267-007, факс (0652) 267-039
367	Моргун Володимир Васильович	Вул. Стрітенська 17 кв. 6, м. Київ -25
369	Львівський національний аграрний університет	М. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381 тел. +38-0322-294-69-19, факс+38-0322-298-07-65
370	Передкарпатська дослідна станція Інституту землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук	82127, с. Лішня, вул. І. Франка, 32, Дрогобицького району, Львівська область
371	Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук	81115, с. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
372	Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	С. Неслухів, Кам'янсько-Бузький р-н, Львівська обл., 80455
375	Логвиненко Валентина Федорівна	Проспект Глушкова 32 кв. 116, м. Київ
376	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"	Вул. Ходарєва 1а, с. Дерезувате, Синельніківський р-н, Дніпропетровська обл., 52523 тел./ факс 0562- 399-125; 0562 - 399-111
378	Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса
379	Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук	65496, м. Одеса, вул. 40-річчя Перемоги, 27, смт. Таїрове
381	Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Маякська дорога, 1, с. Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667
385	Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук	С. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37535
386	Полтавська державна аграрна академія	Вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003
387	Полтавський інститут агропромислового виробництва ім. М.І. Вавілова Української академії аграрних наук	Вул. Шведська, 86, Полтава, 36029
388	Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Національної академії аграрних наук	38251, п/в Вереміївка, Семенівський р-н, Полтавська обл., тел.: +3805534196143, факс: +380553419641, e-mail: veremiivka@vikard.net
389	Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук	П/в Устимівка, Глобинський р-н, Полтавська обл., Україна, 39074
392	Сумський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	42343, вул. Паркова,3, с. Сад, Сумський р-н., Сумська обл.
393	Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук	Вул. Терещинків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400

Код	Назва	Адреса
394	Іванівська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Сонячне, Охтирський р-н, Сумська обл., 42768
395	Подільська дослідна станція Тернопільського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Незалежності, 19, м. Хоростків, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., 48240 тел. +38-03557-511-47 факс. +38-03557-511-31
399	Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	м. Красноград, Харківська обл., 63308 тел./факс. +38-057-44-93-145
402	Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук	62478, вул. Інститутська, 1, п/в Селекційний, Харківський р-н, Харківська обл.
403	Краснокутський науково- дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	вул.Тельмана, 10, смт. Краснокутськ, Харківська обл., 62000
404	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук	61060, Московський проспект, 142, м. Харків
405	Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва	62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в Комуніст-1, навчальне містечко ХНАУ, корпус 2, кімната 235
406	Інститут механізації та електрифікації сільського господарства	Вул. Артема, 44, м. Харків, 61000
409	Херсонський державний аграрний університет	Вул. Рози Люксембург, 23, м. Херсон, 73006
410	Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	Вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600
411	Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук	с. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483
412	Інститут рису Української академії аграрних наук	75705, с. Антонівка, Скадовський р-н, Херсонська обл.
414	Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	С. Новоолексіївка, 3, Генічеський р-н, Херсонська обл., 75560 тел. +38-05534-255-83
416	Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"	25006, м. Кіровоград, вул. Мурманська, 29 "Г"
417	Подільський державний аграрно-технічний університет	32316, вул. Шевченка 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.
418	Хмельницький інститут агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук	31182, с. Самчики, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.
421	Інститут коренеплідних культур Української академії аграрних наук	Вул. Інтернаціональна, 4, м. Умань, Черкаська обл., 20300
422	Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Верхнячка, Христинівський р-н, Черкаська обл., 20022 тел. 04745 2-25-54
423	Науково-виробнича фірма "Геліо"	Вул.Карла Маркса,40,м. Вінниця,21034
424	Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук	С. Млїїв, Городищенський р-н, Черкаська обл., 19512
427	Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук	Вул. Вавилова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500
428	Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче обєднання "Чернігівеліткартопля"	Вул. Я. Лизогуба, 13, п/в Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522
429	Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17035
430	Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17131
432	Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Кузнєцова, 21а, м. Чернівці, 58026
433	Придністровська дослідна станція садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	вул.Яблунівська, 1, м. Чернівці, 58013

Код	Назва	Адреса
435	Кравченко Владислав Андрійович	Вул. Полкова, 57, м. Київ, 04078
437	Монсанто Інтернешнл Сьорл	Ру дес Вігнеронс 1А, 1110, Моргес, Швейцарія
447	Республіканське унітарне підприємство"Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі по землеробству"	Вул. Тімірязєва, 1, м. Жодіно, Мінська обл., Білорусь, 222160
462	Білявська Людмила Григорівна	Вул. Сковороди 1/3, гурт. 3, м. Полтава, 36003
465	РАГТ Генетик С.А.	Вул. Еміля Сінгля - сай місуевість Бурран п/с 3336, FR-12033, Розе Седекс 9
472	Товариство зобмеженою відповідальністю "Авіас 2000"	Аеропорт б 42, м. Дніпропетровськ, 49042
483	ТОВ "Ялтушківська ДСС"	Сел. Черешневе, Барський р-н, Вінницька обл., 23021, тел. (4341) -354-68
484	Розен Тантау. Матиас Тантау Нахфольгер	Торнешер Вег 13, 25436, Уетерзен Германія
485	Коссад Семанс ЕС А	3.І. Де Мо п/с 109 82303 Кассад Седекс
500	Селянсько фермерське господарство " Родень 10"	Сел. Помоклі, Переяслав - Хмельницкий р-н, Київська обл., тел. (04467) 55-678, 74 - 335, 74 - 267
504	Насіннєва компанія Лаєн Сідс Лімітед	СМ96СН Ессекс, Вудхем Мортімер
506	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ярд"	Вул. Совхозна 23, м. Кримськ, 353384 тел. (86131) 511-59
519	Осева ПРО с.р.о.а	Янковцова 18, 170 37 Прага
520	Луганський національний аграрний університет	М. Луганськ-8, 91008
530	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна насіннєва компанія"	вул.Курчатова, 62 а, м. Рівне 33018
538	Ситнік Ігор Данилович	Вул. Генерала Родимцева 3а кв. 45, м. Київ, 03041
539	Приватне науково-виробниче підприємство "Насіння"	вул.Інтернаціональна 4/6, м.Умань, Черкаська обл., 20300
540	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроальянс - 21"	Чернігівська обл., м.Бахмач, вул.Петровського, 62 тел. +38-04635-2-17-73
541	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК "	вул. Орджоніккідзе 10, м. Москва, 117071
549	Сінгента Сідз ЛТД	Маркет стейшн, Маркет райсен, Лінкольншир, ЮК
557	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Поділля-Плант"	вул.Наукова, б 1, к.23, с.Медвеже Вушко, Вінницький р-н, Вінницька обл. 23226
558	Панам Франція САРЛ	Домеін де КАРЛЕС Рю де Віллєбрюмер 31340 Віллємур сур Тарн
568	Приватне підприємство "Насіннєва фірма "Софія"	вул. Героїв оборони 10, офіс 17 м.Київ 03680
583	Науково-дослідне аграрне підприємство "Мак України" у формі ТОВ	вул. Сім"ї Хохлових м.Київ,
585	Паришкура Володимир Іванович	вул.Борщова, 4/12, м.Чернігів, 14020
586	Державне підприємство Дослідне господарство науково-дослідного інституту сільськогосподарської мікробіології Української академії аграрних наук	вул.Малиновського, 43, м.Чернігів 14020
596	Потопальський Анатолій Іванович	м.Київ, вул. Голосіївська, 4 кв 37 03039
597	Юркевич Лариса Назарівна	м.Київ, вул.Теремківська, 15 кв 18, 03187
598	Грамінекс-Насіона Сп.з о.о	вул.Каролінівська, 72 97-300 Піотрков Тріб. +004844 647 66 43
599	Поморсько Мазовецка Годівля Земляка Сполка з.о.о.	76-024 Сєдзіба в Стрезекесіне 76-024 Свєшино Повят Кошалінський Воєводство Західньопоморське
600	Євро Грас Брідінг ГмбХ і Ко. КГ	вул. Вайсенбургер, 5 59557 Ліпштадт
601	Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.	вул. Друвендаалсестег, б 6, (6708 ПБ) м.Вагенінген
606	Придністровський науково-дослідний інститут сільського господарства	Вул. Миру, 50, м. Тирасполь, Молдова, 3300
607	Молдавський науково-дослідний інститут плодівництва	Вул. Фруктова, 14, м. Кишинів, Молдова, 277019
612	Державна установа "Науково-практичний інститут рослинництва"	С. Пашкани, Криулянський р-н, Молдова, 278336

Код	Назва	Адреса
614	Науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства Молдови	Вул. Фруктова, 14, м. Кишинів, Молдова, 277019
622	Кишинівський сільськогосподарський інститут ім. Фрунзе	Вул. Грибова, 44, м. Кишинів, Молдова, 277049
627	Кочубей Олександр Васильович	вул.Міщенка, 2, м.Полтава, 36011
629	Сокирко Петро Григорович	вул.Дослідна, 16, с.Степне, Полтавський р-н, Полтавська обл., 38744
634	Чекрізов Іван Олексійович	вул.Шведська 86, м.Полтава, 36029
635	Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"	03164 , м Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23-Б
644	К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті (IT)	Лок. Боаттоне Стат. Ромеа КМ 116, 44020, С. Джузеппе ді Комаччо (ФЕ), ІТАЛІЯ
647	Приватне підприємство "Агросвіт"	вул.Горького, 40, м.Нова Каховка, Херсонська обл., 74907
655	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Колос"	вул.Ватутіна, 18А, с.Пустоварівка Сквирський р-н, Київська обл., 09051 тел. +38-04468-2-21-40; факс. +38-04468-5-12-36
658	Шевченко Ігор Андрійович	вул.Гвардійців Широнінців, 18-Г кв.43, м.Харків, 61120 тел.8-067-466-69-28
663	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"	39000, тупик Автопарківський, 5, м. Глобине, Полтавська обл.
670	Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд	Інвергоурі Данді ДД2 5ДА, Шотландія
672	Меосіс Лімітед	Бредбурн Хаус Стебл Блок, Іст Моллінг, Кент МЕ19 6 ДЗ Англія
679	Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннева Приватна Компанія"	Проспект Науки, 37, м.Київ 03028 тел. +38-044-522-40-33
681	Ситник Ігор Данилович	м.Київ, вул.Генерала Родімцева, 3а кв.45 03041
684	Сідс 2000	115 Н. 3 рд. Ст., Брекенрідж, Міннесота США
685	Кітчен Сід кампані Інк.	П.с. 286, 1149 Н.Вайн Ст. Артур, Іллінойс, 61911
686	Сіннер Брос & Бреснахан	П.О. 549, Каселтон, 58012, НД США
687	Експериментальна станція Мінесоти	277 Кофі холл, 1420 Еклес Авеню, Сн.Полл Міннесота 55108 США
690	Просід Інк.	705 Е Брюстер, Харві Північна Дакота, 58341, США
691	Сейбр ТОВ	П.С. 386 Вілмарб Міннесота 56201 США
694	Годовля рослин Стрельцє Сполка з о.о.	99-307 д. Стрельцє, ул. Гловна 20, Польща
696	Південний біотехнологічний центр у рослинництві Української академії аграрних наук та Міністерства освіти і науки України	65036 м.Одеса, Овідіопольська дорога, 3
699	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма-Елітсортнасіння"	вул.Кіквідзе, 30 А, м.Київ, 01103
707	Продукція і Годовля Рослин Огроднічих Кшешовіце Сп. з о.о.	32-065 - Кшешовіце
711	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"	07400, Київська обл., м.Бровари, тел. +38-044-207-47-48, факс +38-044-207-47-47
712	"Спуйня" Селекція і насінництво городніх рослин с.п. з о.о. у Нохові	Вул. Ліпова, 12, 63-100, Шрем, Польща
713	Адванта Інтернешнл Б.В., (СЕС - Європа Н.В./С.А.)	Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgium
719	Адванта Інтернешнл Б.В. (Ван дер Хаве, Голландія, та Зенека, Бельгія)	П.я. Бокс 1, 4420 АА Капелла , Дійквелсестраат 70
720	Сільськогосподарський дослідний інститут Угорської академії наук, Мартонвашар	Н - 2462, Мартонвашар, Р.О.В., Угорщина
721	Сатімекс Кведлінбург	Німеччина, 06484, м. Кведлінбург, вул. Гросс Орден, 19
724	ДЛФ - Тріфоліум А/С	9,Ny Qstergade DK 4000,Roskilde Denmark, Postbox 59
725	Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насінницька агрофірма"Ільінічна"	129278, Росія, м.Москва, вул.П.Корчагіна, 2 тел/факс (495) 582-87-13
736	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, Київ, Україна, 03022
738	Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.	П.О.бокс, 9801, Б.Д. Леуварден, Голландія
740	Інносід Б.В.	П.О.Вокс 10000, 5250 ГА Віймен, Голандія

Код	Назва	Адреса
741	Агріко Кооператив Б.А.	П.О. Б. 70 8300 АБ Емелорд, Нідерланди
743	СесВандерхаве Н.Б./С.А.	Індустріпарк, 15 В-3300, м.Тінен, Бельгія
744	Монсанто Холланд Б.В.	Вестейнд 161, 1601ВМ, Ерхуїзен, (поштова адреса: Постбус 22, 1600АА, Енхуїзен)
749	Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД	2 Хайленд Драйв Бленхейм, Онтаріо, Канада, H0P1A0
751	Бейо Заден Б.В.	П.О.Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхьюзен, Голандія.
753	Нюнемс Б.В.	П.О.Бокс 4005, 6080 АА, Хелен, Голандія. Пр.
758	Жемойда Віталій Леонідович	Пров. Сільськогосподарський, 1, кв.29, Київ, Україна, 03041
759	Хмарський Микола Іванович	Вул. Академіка Заболотного, 112, кв. 10, Київ, Україна, 03187
760	Калінчук Олег Іванович	Вул. Калініна, 57, кв. 174, м. Черкаси, Україна, 18000
765	ТОВ агрофірма " Нібас"	Вул. Польова 100-А,смт Петропавлівка, Дніпропетрівська обл., Україна, 52700
767	Піонер Семена Холдінг ГезмбХ	Індустрігеланде, Піонерштрасе, А -7111, Парндорф, Австрія.
770	МТІ Маїс Технолоджіс Інтернейшнл ГмбХ	Ludwig Boltzmann Strabe 2, 7100 Neusiedl am See (office@maizetec.com)
772	Лекс Воорн Розенвеределинк Б.В.	П.Я 94, 1430 АВ Аальсмеер Нідерланди
788	Марібо Сід ГмбХ	Бреуншвайгер Штр., 22 б, Д - 38154, Кенігілютер ам Ельм, Німеччина
789	Харріс Моран Сідс Компані	Модесто СА, 95352, США, поштова скринька 4938
791	Товариство з обмеженою відповідальністю науково виробничий дорадчий центр "Сільський господар"	23227, с.Агрономічне, вул.Мічуріна, 1, Вінницького р-ну, Вінницької обл.
793	Лімагрейн Юроп	Ферме де Лєтан БП3 77390 Вернуль Лєтан Франція
796	САС Флоримонд Депре Вев е Фіс	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242, тел: +33320/849-490, факс: +33320/849-856, e-mail: Nicolas.henry@fljrimond-desprez.fr
798	Колодій Юрій Антонович	С. Хиночи, Володимирецький р-н, Рівненська обл., 34313
800	Пітер Богдан Чикалюк	20 Вілдвуд Лейн, Скарбороу, Мейн, США
801	Ден Хартіг Б.В.	Продуктівех 2 8304, м.Еммелурд, Нідерланди
806	Євраліс Семанс	Авеню Гастон Фоєбюс, 64231 Лескар Седекс, Франція.
807	Дойче Заатфеределунг АГ	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина
808	Інститут оздоровлення і відродження народів України	Музей НАП України, смт. Пирогів, Київ, 03026
821	ЗАТ „ЗКІ Золдещег Кутато Інтезет"	6000, м. Кечкемет, Месой Дюла, ут.6
822	ТОВ Науково виробниче підприємство "Агрокапітал"	61057, м.Харків, пров.Театральний, 4 оф. 33 тел. +38-057-757-35-31 факс.+38-057-714-30-77
824	КВС Лохов ГмбХ	Поштфах 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина
825	П.Х. Петерсен Заатцухт Лундегеард	Postfach 6 d 24976 Lundsgaard, Postlangballig
826	Пархоменко Анатолій Костянтинович	Вул. Родімцева 11, кв. 156, Київ, Україна, 03041
827	Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України	50089, м.Кривий Ріг - 89, вул. Маршака, 50
829	Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген	Поштфах 1363, 38358 Шонінген, Німеччина.
840	Енза Заден Біхір Б.В.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди
843	Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агросинтез"	69035, м.Запоріжжя, пр.Маяковського, 3
844	Монсанто Технолоджі ЛТД	800Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167
848	Резерв	
851	Дорощук Василь Олексійович	м.Вінниця, п-вАгрономічне, вул.Мічуріна, 15 кв.9
853	Приватний підприємець Медведєв Олександр Олександрович	09210, вул. Стадіонна, 26, с.Стайки, Кагарлицький р-н, Київська обл.

Код	Назва	Адреса
856	Товариство з обмеженою відповідальністю Селекційно-насінницький центр "Євросорт"	41854, с. Жовтневе, вул.Володимирська, 1, Білопільський р-н, Сумська обл., Україна
860	Центр овочівництва	11420, Смедеревська Паланка, ул.Караджорджевича, 71 Сербія
861	Такіі Європа Б.В.	Хофдвег 19, 1424 ПС Де Квакел, Нідерланди
862	Сіркл Сі Сідс Інк.	2493 380 т Стріт, Гарі, МН 56545
866	Насіннєва компанія Аурора с.п.а.	віа Грамчі, 1/А 45013, Боттріге ді Адрія, Ровіго, Італія
869	Вінницький державний аграрний університет	Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, Україна, 21008
873	Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія - Нова", Української академії аграрних наук	Смт Асканія - Нова, Чаплинський р-н, Херсонська область, Україна, 75230
879	Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад	М. Горкого 30, 21000 Нові Сад, Сербія
880	Селген, а.с.	Янковцова 18, 170 37 Прага 7, Чеська Республіка
882	ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ (NL)	Hoofdweg 81,1424 PD De Kwakel,The Netherlands (NL)
883	Кволіті Кропс Агро СРЛ	27 Попа Саву стріт, 011431, Бухарест Румунія
884	Кутновска Годовла Бурака Цукрового Сп. з о.о.	Вул. Чопіна 25, 99-300 Кутно, Польща
886	Науково-дослідний центр "Магроселект"	Вул. Косеуцелор, 35, м. Сорока, Молдова, 3001 тел/факс (+373 230) 3-08-02)
887	Нікерсон - Цваан Б.В.	А/с 1, 4410 АА, Рілланд, Голландія (Schanseind 27, 4921PM MADE P.O. Box 28, 4920 AA Made The Netherlands, tel: +31162-690-900, +31 162-680-970, info@nickerson
888	Приватне мале підприємство " Тирас"	Вул. Живова, 32, м. Тернопіль, Україна 46008, тел./факс +38-0352-23-50-22
890	Холлар Сідз	П. О. Бокс 106, Роккі Форд, Колорадо, США, 81067
893	Товариство з обмеженою відповідальністю " Агрофірма Гавриш"	103287, Москва, вул 2-а Хуторська, 11, стр.1. Росія
898	Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого грунту"	127287, м.Москва, 2-га Хутірська, буд. 11, с. 1
900	Клоз	Руа Луіс Саліант, З.І. Ля Моте, 26800, Порт-Лес-Валанс, Франція
901	Комбісід	Вул. Буйше-Шілінській, 50,21, Х - 1054, Будапешт, Угорщина
912	Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ	24363, Хохенліті, Холызес, Німеччина
914	Піксід Канада Інк.	п/с.304, Грінфілд Роад 1, Ліндсей, Онтаріо, К9V4S3
917	Державне підприємство "Проектно-конструкторський технологічний інститут "Плодмашпроект"	Вул. Київська/пт. Перемоги, 75/1, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95017
918	Доу Агросайенсіс ВмбХ	Ноттендорфер Гассе, 11 1130 Відень
919	Сумський національний аграрний університет	Вул. Кірова, 160, м. Суми, Україна, 40021
920	Приватне підприємство " Сорт"	08853, П/в Центральне, Миронівкий р-н, Київська обл., Україна
922	Закрите акціонерне товариство " Селена"	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, Україна
924	Маїсадур Семанс	BP27 route de Saint Sever 40001 Mont de Marsan Cedex FRANCE
926	Заатен-Уніон ГмбХ	Ейзенштрасе 12, 30916 Ізернхаген ХБ, Німеччина /Eisenstrabe 12 D 30916 Isernhagen
927	Золана Аграр-Продукте ГмбХ унд Ко. КГ	Кілортале 9, Д - 20144 Гамбург, Німеччина
934	Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В.	п/с 139, 8200 АС Лелистуд, Нідерланди, тел.: +31/113-55-7100; факс: +31/113-55-2237, e-mail: Titus-de.Vries@limagrain.com
937	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна компанія зернових культур"	шегед, ПФ. 391, 6726, Угорщина
938	КВС ЗААТ АГ	Грімзельштрассе 31, 37555 Айнбек, Німеччина
939	Маєр Б.В.	Stationsweg 18a 4416 PJ Kruiningen The Netherlands
946	Осева Ексімпо Прага с.р.о.	Бженец 1436, 696 Бзенек, ICO: 639 86175, Чеська Республіка

Код	Назва	Адреса
947	Сейєт Плантефоредлінг І/С	Норемарксвей 67, Сейєт ДК - 8700 Хорсенс, Данія
950	Інститут агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук	Вул. Метрологічна, 12, Київ, Україна, 03143
954	Приватна виробнича фірма " Агроцентр"	Вул. Мільмана,110,м. Дніпропетровськ, Україна, 49049
955	Агро-Тіп	Ам Тобербух 7, Д - 21255, Тоштедт, Німеччина
957	Костюченко Віктор Іванович	Будинок 42, кв 10,с.Дослідне, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52071
962	Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"	52500, вул. Гагарина 21, с. Веселе, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна
964	Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско"	вул.Горького, 40, м.Нова Каховка, Херсонська обл., 74907
966	Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробнича комерційна фірма "Селекта"	49000, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська 11
969	Моравосід спол. с р.о.	69201 Мікулов-Муслов, Чеська Республіка
971	Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ унд Ко.КГ	47800 Крефельд-Бокум, Магдебург шрт., 2, Гевегбегебіт Бокум-Норд, Німеччина
981	Люкс Рів'єра С.Р.Л	Via San Rocco 1, 18039, Bevera di Vetimiglia (IM) Italy, E-mail:info.ita@nirpinternational.com
983	Дікманн ГмбХ і Ко. КГ	Кірххорстерштрассе, 16 Д - 31 688 Нінштедт, тел. +49/572495190, факс: +49/5724951977, E-mail: j.dieckmann@a-dieckmann.de
984	Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	Вул. Незалежності 39, с. Крути, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., Україна, 16645
985	Істітуто Сперіментале Пер Ла Фруттіколтура (ІТ)	Віа. Фйоранелло 52, 00134 Рома, Італія
988	Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер Сад"	72382, Запорізька обл., Мелітопільський р-он, с. Садове, вул. Горохова, 8
989	ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед	Республіка Кіпр, м. Нікосія, Стасіну 1, Мітсі Білдін 1, оф. 4, Платейя Елефтеаріс, а/с 1505
991	Малополска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.	30-002 Краков, вул. Збозова, 4, Польща
993	БЦ Інститут селекції і рослинництва	пл.Маруличев 5/1, 10 000 Загреб, Хорватія
995	С. Мейер б.в.	Stationsweg 18a, P. O. Box 1, 4416 ZG Kruiningen, The Netherlands. Пр.: ВАТ " Крафт Фудз Україна",вул.Набережна 28а, м. Тростянець, Сумська обл.
998	Кішкун Дослідний Центр	Кішкунхалас Х - 6400, Фузеспустца, 42, Угорщина
999	Компанія (Товаріство з обмеженою відповідальністю) " Агрозовнішнаука"	Вул. Суворова 9, м. Київ, Україна, 01010
1006	Заатцухт Фритц Ланге КГ	Постфах 1352, Д - 23602 Бад Швартау, Німеччина
1010	Заявник не зареєстрований	-
1011	Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ	Парквег 4, Д - 18190 Грос Люзевіц, Німеччина
1012	Товариство з обмеженою відповідальністю фермерське господарство "Владам"	Вул. В. Морська, 107, м. Миколаїв, Україна, 327001
1013	Поп Врієнд Сідз Б.В.	П.О.Бокс 52 16193 Г Андійк, Голандія
1024	НВО "Еліта" Інституту рослинництва ім.В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук	Пр. Московский, 42, м. Харків, Україна, 61060
1025	Інститут захисту рослин Української академії аграрних наук	Вул. Васильківська, 33, Київ, Україна, 01033
1028	Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"	09051, с. Пустоварівка, пл. Ватутіна 18 а, Сквирський р-он., Київська обл.
1031	Сидорчук Валерій Іванович	Вул. Вокзальна, 3, кв. 57, м. Біла Церква, Київська обл., Україна тел.6-16-26
1034	Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х	Ширменштрасе 19, А - 4020 Лінц, Австрія
1042	ТОВ "Селекційна станція " ТСГА ім. М.М. Тимофієва	Вул. Пасична, 5, м. Москва, Росія, 127550
1043	Державне підприємство "Россортнасіннєовоч"	Дєгтярний пров., 6, м. Москва, Росія, 103050
1044	Агрофірма "Наско"	Вул. Володимирська 91, Київ, Україна, 03150

Код	Назва	Адреса
1046	Єврoплант Пфланценцухт Гмбх	Wulf-Werum Str. 1; D-21303 Lueneburg (Germany), www.europlant.biz
1048	Секобра Речерчес	Центр де Буа Енді - 78580 МОЛЬ, Франція
1050	Сингента Сідз Б. В.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаізен, Голландія.
1051	Акціонерне товариство "Українська соя"	Вул. Жуковського, 20, м. Одеса, Україна, 65036
1054	Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"	Вул. Полкова 57, м. Київ, 04078
1055	Піонер Хай-Бред Світзерленд СА	Via Cantonale - Galleria 3, CH - 6928 Manno, Switzerland
1059	Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю	91490, м. Луганськ, с. Тепличне, вул. Степова, 11
1067	Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру	Вул.Садова 1, с. Плодове, м. Нова Каховка, Україна, 74992
1068	Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"	Вул. Мухіна, 24, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, 334203
1070	Мале науково-виробниче підприємство "Корн"	С. Ольгино, Горностаєвський р-н, Херсонська область, Україна, 74621
1071	Підприємство городнього насінництва і розсади, "ЦНОС"	60-951 Познань, вул Копаніна 28/32, Польща.
1072	Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о.	30-130 Краков, вул. Ридля 53/55, Польща.
1073	Н.Л. Крестензен Ерфуртер Замен унд Пфланценцухт ГмбХ	Markstrasse 38, 99084 Erfurt, Germany, Пр. : Пахаренко і Партнери, вул. Пушкінська, 9, к.11, Київ, 252034
1076	ДПДГ "Асканійське" Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук	74862, вул. 40-річчя Перемоги 16, с. Тавричанка, Каховський р-он, Херсонська обл.
1079	Сінгента Сідз С.А.С.	12, шемен де л"Обі Б.П. 27, 31790 Сен Совер, Франція.
1080	Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Елітсортнасіння"	Артема 11, Київ, 04053, Україна
1081	Підприємство городнього насінництва і розсади Ожарув Мазовецькі (ПНОС)	Вул. Жеромського 3, 05-850 Ожарув Мазовецькі, Польща.
1083	Товариство з обмеженою відповідальністю "Технаука"	Вул. Степова 11а, с. Тепличне, м. Луганськ, Україна, 94490
1084	ПлантіКо Годовля і Насєнництво Огороднiче Големб'єв Сполка з о.о.	99-300 Кутно, Польща
1085	Дмитрієв Володимир Ігорович	03115, м. Київ, вул. Верховинна - 18, кв. 96
1086	Сингента Сідс АБ	Зокербруксваген 1, БОКС 302, С-261 23, Ландакрона, Швеция.
1087	ВАТ "Крафт Фудз Україна"	Вул. Набережна 28А, м.Тростянець, Сумська обл., Україна, 42460
1090	Заатен-Унион Румунія Срл.	Стр. Ion Лука Караіале Нр.3, 020041 Бухарест, Румунія
1091	Сидорчук Валерій іванович	Кв. 57, 3, вул. Вокзальна, м. Біла Церква, Україна, 09100
1092	Синьогуб Сергій Васильович	09100 м.Біла Церква, Київська обл., вул.Леваневського, 47/1, кв. 124, тел.7-62-28
1093	Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"	Вул. Шушенська, 65, м. Запоріжжя, Україна, 69089
1096	Бурлов В.В.,Карпенко О.О.,Краевський А.М.,Крутько В.И.	Вул. Леніна, 51/27, с. Металіст, Слов"яносербський р-н, Луганська обл., Україна, 349020
1097	Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна	П/в Мала Вільшанка-1, Білоцерківський р-н, Київська обл., Україна, 09175
1100	Спільне підприємство "Виробниче об"єднання "Агро-Пром-Сервіс "	Вул. Велика Бердичівська , 52/19, м. Житомир, Україна, 10008 тел./факс +38-0412-25-18-37
1102	Рійк Цваан Велвер ГмбХ	Верлер штрасе, 1, Д - 59514, Вельвер, Німеччина
1106	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рапсодія"	Немирівське шосе, 26, м. Вінниця, Україна., 23200
1107	Щербань Сергій Васильович	69093, м. Запоріжжя, вул. Дегтярьова, б.6, кв.194.
1109	Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	18015, вул. Пастерівська, 76, м. Черкаси, Україна, тел.: (80472) 31-40-52, e-mail: reg_centr_ck_apv@ukrt.ua

Код	Назва	Адреса
1110	Акціонерна компанія "Контакт"	Пров. Слюсарний, 1, м. Харків , Україна, 61003
1112	Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"	03680, вул. Героїв Оборони 10 , Київ
1114	Агропромислова фірма "Флора" у формі товариства з обмеженою відповідальністю	65045, вул. Спиридонівська, буд. 26, кв. 3, м. Одеса
1117	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче мале підприємство "Антарія"	Вул. Машинобудівників, 2-б, а/с 67, стм. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08162
1121	Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"	91055, м. Луганськ, вул. Куракіна, 4/83
1123	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд"	Вул. Рози Люксембург, 23, Херсон, Україна, 73006
1124	Приватне сільськогосподарське селекційно-дослідне підприємство "БОР"	Вул. Затишна, 17, с. Дачне, Біляївський р-н, Одеська обл., Україна, 67624
1129	Клиша Андрій Іванович	М. Красноград, Харківська обл., Україна, 63308
1141	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"	Вул. Акад. Проскури 1, м. Харків 61070, Україна
1149	Заатцухт Йозеф Бройн ГмбХ і Ко. КГ	Амсельвеч 1-Д 91074 Герцогенаурах
1153	"ГАЕ Решерш"	41 рю де рів'єр 91720 Месс
1155	ІНРА-Інстітут Насьйональ де ля Решерш Агрономик, с/о Агрі Обтансіон СА	Шемен де ля Петіт Мінієр- п/я 36, 78041 ГІЯНКУР Седекс, Франція
1159	Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"	Вул. Салютна 20 А кв. 26, м. Київ, 03190
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"	Вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 тел. +38-032-240-99-70, факс.+38-032-240-39-94
1174	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"	с. Мельники, Канівського р-н, Черкаської обл., 19043, тел. 04736 - 9-63-45
1178	Заклад Огроднічий Пшиборув Сп. з о.о.	Пшиборув 123, 39-217, Грабіни, Польща
1180	Закрите акціонерне товариство агропромислова корпорація "Зоря"	с.Зоря, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35314 тел. +38-03626-330-70 факс. +38-0362-275-380
1192	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець"	с. Полігон, Жовтневий р-н, Миколаївська обл., 57217
1194	Р2н	Руе Еміле Сінгла - Сіте де Бурран, п/я 3336, ФР 122033 Родез Седекс 9, Франція
1197	Де Ройтер Сідз	П.Б. 1050, 2660 ВВ Бергменходк
1206	Екланд Маркетінг Ко. Каліфорнія, Інк.	П/с 6067, Чіко, Каліфорнія, 95927, США
1210	ІП "НС СЕМЕ УКРАЇНА"	64032, с. Красне, Кегичівський р-он., Харківська обл., Україна
1213	Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард	Лундсгард, 24977, Грундхоф
1215	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграна Фрут Україна"	вул. Тарнагородського, 32, м. Вінниця, 21022, Україна
1219	Сингента Кроп Протекшн АГ	Шварцвальдалее 215, 4002 Базель, Швейцарія
1221	Добружанський Сільськогосподарський Інститут	9520, м. Генерал Тошево, Болгарія
1225	Беттер3фрут Н.В.	Willem de Croylaan 42 3001, Heverlee, Belgium
1227	Палента технолоджіс	J. Alfaro Avehue, the Century Tower, Seventh floor № 713, Panama, republic of Panama
1229	Левасі Лтд	Кіпр (CY). P.O. Box 21865, Nicosia, Cyprus
1233	Кондратенко Микола Вікторович	вул. Ентузіастів, 15 кв. 127, м. Київ
1235	Сич Зеновій Деонизович	вул. Генерала Родимцева, 1 "А" кімната 912, тел
1237	СЮД СЕРЕАЛЬ	Ма де Соль, РН 6113, 30300 Фурк, Франція
1239	ПЛАНАСА А.О "Плантас де Наварра"	Дорога Сан Адріан, км.1, м. Вальтьєрра (провінція Наварра), Іспанія - 31514
1247	ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"	61120, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд. 18, корпус "Г", к. 43
1253	Ходовля Рослин Смоліце Сп.з.о.о Група ІХАР	Смоліце 146, 63-740 Кобилін, Польша
1267	Сарл Адріен Момон і Сини	вул. Мартинваль, 7 М.Мон Ен Певель-59246

Код	Назва	Адреса
1277	Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"	Черкаська обл., Черкаський р-он., с. Мошни, вул. Савченка, 324
1280	ТОВ "Хімагромаркетинг"	02160, м. Київ, пр-т. Возз'єднання 15
1288	Ме-Тан Тохумкулук Тарім Уренлері Хайвансілік Пазарлама Санаї Ве Тікарет Лтд. Сіркеті	Кепні Кою Бандірма/Балікезір, Туреччина
1290	Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"	с. Петрівка, Красногвардейський район, АР Крим , 97012, Україна
1292	Захаренко Іван Іванович	71716 Запорізька обл., м. Молочанськ, вул. Таврійська, б.9 тел. +380/977027963, факс +380/617847299, e-mail: mityay2004@mail.ru
1294	Де Рейтер Інтелектуал Пропертi БВ	Hoofdweg 131-133 1424, De Kwakel, NL
1306	ТОВ "Агрофірма Суми-Насіння"	42343, вул. Заозерна, 39, с. Сад, Сумського р-ну, Сумської обл., Україна
1325	ТОВ "Науково-дослідне виробниче аграрне підприємство "Українська гірчиця"	Вінницька обл., Чернівецький р-он., с. Борівка, вул. Перемоги, 18, 24123
1331	Інвентум Віктор ГмбХ	Постштрассе 6, CH-6300 Цуг, Швейцарія, тел.: 0577 17-74-72, факс: 703-21-65
1334	Ларк Сидс Интернешнл	811 Лас Палмас Роад, Пасадена, КА, 91105, США
1340	CEMO a.c.	798 17 Smrzice, Czech republic
1348	Ходовля Рослин Сновідза Сп. З.о.о	Сновідза 8, 59-407 Мстивоїв, Польща, +48/768718322, +48768/718322, e-mail: hrsnowidza@02pl
1350	Суедвестсаат ГбР	Им Рейнфелд 1-13, Д-76437, Раштатт, Німмечина
1360	Сільськогосподарське підприємство "Укрсоя-21"	вул. Дзержинського, 1, м. Овідіополь, Одеська обл., 67801, Україна
1362	Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.	Віа Траверсетоло, 260-43020 Піластрелло ді Марано - Парма-Італія
1364	Михаць Остап Романович	12450, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Городище, вул. Комсомольська, 24
1368	Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	41663, с. Малий Самбір, Конотопський р-н., Сумська обл.
1370	ТОВ "Стіомі -Холдінг"	01133, м. Київ, вул. Щорса, 29
1388	Приватне підприємство "Варіант"	74823, Херсонська обл., Каховський р-он., с. Малокаховка, пров. Виноградний, буд. 8
1390	Лімагрейн Централ Юроп Сіріалс, с.р.о.	Praha 9 Kie, Podevorska 755/5, PSC 19800 Czech Republic, tel. :), fax: , e-mail: Oleg.Khekalo@limagrain.com
1394	Артюх Олексій Миколайович	08330, Київська обл., Бориспільський р-он., с. Дударівка, вул. Карла Маркса 22А
1396	Друмов Дмитро Валерійович	67571, Одеська обл., Комінтернівський р-он., с. Фонтанка, вул. Сонячна 1А
1400	Київський національний університет імені Тараса Шевченка	01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64
1404	Хазера Генетікс	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim
1410	ГСС Заатцухт Зальцмюнде ГмбХ	Райффайзенштрассе, 1 23815 Вестерраде
1416	Бартелс Роуз Брідінг Б.В.	Rietwijkeroordweg 15-1432 JG - Aalsmeer, The Netherlands
1418	ICI Сементі С.п.А.	Італія, Фіденца (Парма), 43036, с. Понте Гіара, 8/А
1435	Солтіс	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1447	Консорциум Дойчер Баумшулен ГмбХ	Хауптшрасе 21, D-25474 Еллурбек, Німеччина
1492	Фірма "Агрос"	4364 Bellevue Ct., Turlock CA 95382 USA

СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Зона - Рекомендована зона вирощування

П	Полісся
Л	Лісостеп
С	Степ
Кр	Крим
ЗГр	захищений ґрунт
1....15	тимчасові виноградарські зони
гідроп	гідропоніка
К	Карпати
ЗҐр(СТ)	захищений ґрунт (скляна теплиця)
ЗГр(ПТ)	захищений ґрунт (плівкова теплиця)

Характеристика 1 - Продуктивність

7-9	висока
5	середня
<5	нижче середньої

Характеристика 2 - Напрям використання

впв	весняного промислового використання
оз	озимий
ЗПВ	для зон промислової вигодівлі
уц	урожайно-цукристий
цукр	цукристий
++	технічного напрямку
спц	спеція
парф	парфумерна промисловість
пер	переробка
фарм	фармацевтична промисловість
зпл	запилювач
слн	сильний
дф	добрий філер
цін	цінний
ф	філер
зерн	зерновий
зк	зерно-кормовий
пв	пивоварний
зф	задовільний філер
х	харчовий
фж	фуражний
олн	олійний
конд	кондитерський
вол	високоолеїновий
тхн	технічний
лік	лікарський
стл	столовий
тхст	технічно-столовий
сал	салатний
конс	консервний
зс	для соління
ун	універсального призначення
свж	споживання у свіжому вигляді
сил	силосний
лп	луко-пасовищний
мед	медонос
ск	сінокісний
піщ	піщаний
закав	закавказький
зак	залуження схилів та еродованих земель
овоч	овочевий
зх	захисний
прм	промисловий
зріз	зріз
озл	озеленення
аром	ароматичний
склт	скелетний
нц	напівцукровий
корм	кормовий
він	віничний
дкр	декоративного оформления
лпв	для літнього промислового використання
сд	сидерат
зрош	на зрошуваних землях
хп	для харчової промисловості
всш	придатний для високоштамбової культури
г	гостра
нг	напівгостра
со	солодка
цу	цукристо-урожайний

Характеристика 3 - Група стиглості

дп	дуже пізній
др	дуже ранній
зим	зимовий
літ	літній
нр	надранньостиглий
осін	осінній
пс	пізньостиглий
рс	ранньостиглий
рсдн	ранньосередній
скс	скоростиглий
сп	середньопізній
ср	середньоранній
сс	середньостиглий

Характеристика 4 - Зимостійкість/Холодостійкість

7-9	висока
>5	вищесередньої
5	середня
<5	низька

Характеристика 5 - Стійкість до посухи

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 6 - Стійкість до полягання

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 7 - Стійкість до осипання

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 8 - Стійкість до хвороб

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 9 - Якість

вбіл	високобілковий
сбіл	середньобілковий
вкліт	висококлітковинний
скліт	середньоклітковинний
мал	малоалкалоїдний
сал	середньоалкалоїдний
вдек	високодекоративний
дек	декоративний
вщі	з високою щільністю покриття
сщі	з середньоющільністю покриття
влеж	високолежкий
слеж	середньолежкий
вц	високоцукристий
сц	середньоцукристий
вкр	висококрохмальний
скр	середньокрохмальний
вл	високоолійний
сл	середньоолійний
боп	безопійний
лік	лікарський
о	низькоеруковий
++	високоеруковий
о+	середньоеруковий
нгл	низькоглюкозинолатний
сгл	середньоглюкозинолатний
цін	цінний
ф	філер
зрош	на зрошуваних землях
слн	сильний
слн	сильний

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний бюлетень

OFFICIAL BULLETIN

КАТАЛОГ СОРТІВ РОСЛИН ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ У 2011 РОЦІ (І і ІІ частини)

Номер підготували: Києнко З. Б., Мілієнко М. В., Колесніченко О. В., Загинайло М. І., Лисікова В. М., Жаркова Г. Г., Дем'яненко Л. В., Лівандовський А. А., Павлюк Н. В., Гринів С. М., Костенко Н. П., Таганцова М. М., Безручко О. І., Майстер Н. В., Мізерний В. О., Мізерна Н. А., Шпак З. С., Ільченко Я.В., Матус В. М., Камінська Л. В., Улич Л. І., Телепенько О. В., Свинарчук О В., Дудка Д. В., Симоненко В. А., Гоцуєнко Л. М.

Підписано до друку 19.05.2011 року. Формат 60х84 1/8. Папір офсетний
Гарнітура Times. Ум.-др. арк. 59,29. Тираж 500 пр.
Зам. 195/2011
Віддруковано у ТОВ "Алефа" з оригінал-макета замовника.
Адреса видавництва: вул. Тампере, 12, м. Київ, Україна, 02105,
тел./факс: (044) 528-80-30. E-mail: alefaa@ukr.net
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 306 від 28.12.2000